SER PROTAGONISTA

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

QUÍMICA

MANUAL DO PROFESSOR

Área do conhecimento:
Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
Componente curricular:
Química

ENSINO MÉDIO

VOLUME ÚNICO

ANA LUIZA P. NERY
RODRIGO MARCHIORI LIEGEL
VERA LUCIA MITIKO AOKI

Editor responsável: **André Zamboni**
Organizadora: **SM Educação**

Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida
por SM Educação.

sm

MANUAL DO PROFESSOR

SER PROTAGONISTA

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

QUÍMICA

Área do conhecimento:
Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
Componente curricular:
Química

ENSINO MÉDIO

VOLUME ÚNICO

ANA LUIZA P. NERY

Bacharela e licenciada em Química pela Universidade de São Paulo (USP).
Doutora em Ciências pela USP.
Professora no Ensino Médio.

RODRIGO MARCHIORI LIEGEL

Bacharel e licenciado em Química pela USP.
Mestre em Ciências pela USP.
Doutor em Química pela USP.
Professor no Ensino Médio.

VERA LUCIA MITIKO AOKI

Bacharela e licenciada em Química pela USP.
Professora no Ensino Médio.

Editor responsável:

ANDRÉ ZAMBONI

Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Especialista em Jornalismo Científico pela Unicamp.
Editor de livros didáticos.

Organizadora: **SM Educação**
Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por SM Educação.

São Paulo, 1ª edição, 2024

sm

Ser Protagonista Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Química

© SM Educação
Todos os direitos reservados

Direção editorial André Monteiro
Gerência editorial Lia Monguilhott Bezerra
Coordenação editorial André Zamboni
Edição executiva André Zamboni
Edição Mauro Faro (coord.), Esther Durães, Larissa Prada, João Messias Júnior
Colaboração técnico-pedagógica Izael Araújo Lima, Isabella Maria Italiano Lopes, Isabela Corradi Sgai, Giovana Pasqualini da Silva, Adelaide Viveiros, Tathiana de Almeida Guizellini Baruffaldi
Suporte editorial Camila Alves Batista, Fernanda de Araújo Fortunato
Coordenação de preparação e revisão Cláudia Rodrigues do Espírito Santo
Preparação: Beatriz Silva Pereira dos Santos, Berenice Baeder, Helaine Albuquerque, Vera Lúcia Rocha
Revisão: Fátima Valentina Cezare Pasculli, Luiza Emrich, Sheila Fabre
Apoio de equipe: Amanda Taioque Moreira, Camila Lamin Lessa, Lívia Taioque
Coordenação de *design* Gilciane Munhoz
***Design*:** Paula Maestro
Coordenação de arte Vitor Trevelin
Edição de arte: Fernando César Fernandes
Assistência de arte: Renata Toscano
Assistência de produção: Júlia Stacciarini Teixeira
Coordenação de iconografia Josiane Laurentino
Pesquisa iconográfica: Adriana Neves, Pamela Rosa
Tratamento de imagem: Marcelo Casaro, Robson Mereu
Capa APIS Design
Ilustração da capa: Davi Augusto
Projeto gráfico APIS Design
Editoração eletrônica Estação das Teclas Editorial
Pré-impressão Américo Jesus, Mauro Moreira
Fabricação Alexander Maeda
Impressão

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Nery, Ana Luiza P.
Ser protagonista ciências da natureza e suas tecnologias : química / Ana Luiza P. Nery, Rodrigo Marchiori Liegel, Vera Lucia Mitiko Aoki ; organizadora SM Educação ; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por SM Educação ; editor responsável André Zamboni. -- 1. ed. -- São Paulo : Edições SM, 2024.

Componente curricular: Química.
Área do conhecimento: Ciências da natureza e suas tecnologias.
ISBN 978-85-418-3558-9 (aluno)
ISBN 978-85-418-3551-0 (professor)

1. Química (Ensino médio) I. Liegel, Rodrigo Marchiori. II. Aoki, Vera Lucia Mitiko. III. Zamboni, André. IV. Título.

24-229713 CDD-540.7

Índices para catálogo sistemático:
1. Química : Ensino médio 540.7

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1ª edição, 2024

SM Educação
Avenida Paulista, 1842 – 18º andar, cj. 185, 186 e 187 – Condomínio Cetenco Plaza
Bela Vista 01310-945 São Paulo SP Brasil
Tel. 11 2111-7400
atendimento@grupo-sm.com
www.grupo-sm.com/br

APRESENTAÇÃO

CARA ESTUDANTE, CARO ESTUDANTE,

Você já deve ter ouvido falar nas mídias e até mesmo discutido em rodas de conversa sobre temas como preservação e conservação ambiental, energia e suas aplicações no cotidiano, reações químicas, engenharia genética e tecnologias aplicadas ao estudo dos átomos. Esses são alguns temas do mundo contemporâneo relacionados às Ciências da Natureza, e conhecê-los nos possibilita compreender assuntos que fazem parte de nossa vida e refletir de modo mais consciente sobre o mundo em que vivemos.

Esta coleção traz os fascinantes conhecimentos da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias em três volumes únicos: um volume de Biologia, um de Física e um de Química. Neste volume de Química, os conteúdos são apresentados de forma organizada, simples e direta, para fortalecer sua compreensão e ampliar sua visão de si e do mundo. Esperamos que esta obra colabore para aprimorar seu pensamento crítico e incentivar sua participação na sociedade, contribuindo para que se torne uma cidadã ou um cidadão mais consciente e atuante. Aproveite-a para questionar e questionar-se, aprofundando suas reflexões e motivando-se para a ação.

Acreditamos em seu protagonismo e em sua capacidade de buscar respostas e soluções para os desafios presentes e para os que ainda estão por vir. Temos confiança de que, por meio de sua atuação e de sua interação com o mundo, você desenvolverá as competências e as habilidades necessárias ao pleno exercício da cidadania no século XXI, seguindo caminhos coerentes com seu projeto de vida.

Bom trabalho!

Equipe editorial

CONHEÇA SEU LIVRO

ABERTURAS

Abertura de unidade
A partir de um pequeno texto, perguntas e uma imagem impactante, você vai começar a refletir sobre o assunto da unidade; além disso, vai conhecer os objetivos que serão desenvolvidos ao longo dos capítulos.

Abertura de capítulo
Um texto e uma imagem abrem o capítulo, acompanhados de questões sobre o que você já sabe do tema em estudo.

APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS E BOXES



Conteúdo apresentado de maneira organizada. Ilustrações, esquemas, fotografias e eventuais glossário e atividades resolvidas facilitam a compreensão do conteúdo.

Objeto digital
O ícone indica um objeto digital presente no livro digital.

Ampliação
Boxes com informações que ampliam ou complementam o assunto.

Não escreva no livro.

O texto principal é complementado por boxes especiais, que aprofundam ou contextualizam o conteúdo.

Ação e cidadania

Apresenta exemplos de aplicações da ciência que promovem melhorias na vida das pessoas e no ambiente ou que se relacionam a direitos e deveres dos cidadãos.

AÇÃO E CIDADANIA

Sobrevivência e condições dignas de trabalho

No Brasil, os lixões constituem a única alternativa de renda para milhares de famílias em situação de extrema pobreza que lá buscam por materiais recicláveis. A prática representa risco à saúde e exige um compromisso conjunto

PARA EXPLORAR

Assista

Experimento de Rutherford: a descoberta do núcleo do átomo

O vídeo, de 2022, ilustra o experimento realizado por Ernest Rutherford. Duração: 55 s.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B21bot-CzdM. Acesso em: 11 out. 2024.

Para explorar

Traz indicações de *sites*, livros, filmes, entre outras, para você explorar o assunto.

Ciência se discute

Apresenta debates, conflitos e controvérsias na comunidade científica ou entre sociedade e ciência.

CIÊNCIA SE DISCUTE

A descoberta do oxigênio

Historiadores admitem que a descobert
como oxigênio envolve no mínimo três pers
cês Antoine Lavoisier (1743-1794), o teólog
Priestley (1733-1804) e o químico sueco Car
-1786). No século XVIII, diversos estudiosc
der o comportamento dos "ares". Em 177
grande lente para focalizar raios solares e
de óxido de mercúrio, e depois testou o gá
e testar o "ar", ele notou que este era capaz
de uma vela e, ao expor um camundor

DE OLHO NO CONCEITO

Leis ponderais

A matéria é constituída de átomos, os quais são caracterizados pela massa atômica. Nas transformações da matéria, ocorrem rearranjos de átomos, gerando novas espécies químicas.

Todos os átomos presentes em um sistema inicial permanecem no sistema final. Assim, pode-se concluir que a massa do sistema se conserva, pois,

De olho no conceito

Retoma e/ou define algum conceito importante para a compreensão do conteúdo.

Química e...

Explora tópicos que possibilitam um estudo interdisciplinar com os outros componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias ou com os componentes curriculares de outras áreas do conhecimento.

QUÍMICA E LITERATURA

O Chapeleiro Maluco

No livro *Alice no país das maravilhas*, de Lewis Carroll, o excêntrico Chapeleiro Maluco é uma personagem famosa por seu comportamento caótico e imprevisível. Embora Carroll não tenha explicitamente ligado o Chapeleiro à intoxicação por mercúrio, a expressão faz referência a uma condição real que afligia a indús-

ROTEIRO

4. O vinagre é formado por uma mistura contendo, aproximadamente, 5% de ácido acético em água. O ácido acético tem a seguinte fórmula estrutural:

• Que tipo de interação intermolecular ocorre entre o ácido

Roteiro

Propõe, ao longo dos capítulos, atividades que trabalham os conteúdos estudados.

QUÍMICA E GEOGRAFIA

COMO O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESTÁ TRANSFORMANDO ALGUNS PAÍSES NOS LIXÕES DO MUNDO

Categorias de E-LIXO

Não escreva no livro.

Os efeitos negativos dos lixões de eletrônicos nos países em desenvolvimento são muitos, mas os principais estão relacionados a impactos ambientais e à saúde da população local. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem se observado um aumento na contaminação por substâncias tóxicas, principalmente em crianças e mulheres grávidas. Nesses locais, o processamento do lixo eletrônico é feito de maneira informal e sem a tecnologia dos países desenvolvidos. Uma grande parte do e-lixo é queimada, gerando material particulado com compostos orgânicos tóxicos derivados do plástico, que são inalados por adultos e crianças. Além disso, equipamentos elétricos têm quantidades relativamente grandes de metais, incluindo metais altamente tóxicos como chumbo, mercúrio e cádmio. Esses metais sofrem lixiviação durante o processamento, contaminando o solo e a água. Consequentemente, os cultivos próximos apresentam metais tóxicos. Como esses elementos entram nas teias tróficas, também há contaminação de outros alimentos, como ovos, leite e peixe. A ingestão ou inalação dessas toxinas aumenta os riscos de desenvolvimento de doenças neurológicas, renais e cardiovasculares, por exemplo.

Fontes de pesquisa: Weiss, Marco. Children and digital dumpsites: e-waste exposure and child health. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341779/9789240029200-eng.pdf. Blaus, C. P. et al. The Global e-waste Monitor 2024. Geneva/Bonn: International Telecommunication Union (ITU) and United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), 2024. Disponível em: https://ituh.globalresearch.org/public/storm/files/9911-blaus-e-waste-monitor-2024-web-version.pdf?1713000000. Acesso em: 17 out. 2024. Ministério do Meio Ambiente. Brasil ultrapassa 2 Mt e 2024. Disponível em: https://portal.ua.br/ambiente-sustentabilidade/pages/ua-brasil-ultrapassa-2-mt-de-e-lixo-gerado-e-mil-gestas-de-residuos/. Acesso em: 17 out. 2024.

Lixo eletrônico ilegal encontrado em contêiner na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia. Foto de 2024.

Conecte as ideias

1. Em grupos, conversem sobre quais seriam as causas da geração de tamanha quantidade de lixo eletrônico. Em seguida, compartilhem suas ideias com os demais grupos e, para cada causa levantada, proponham, em conjunto, a solução do problema.
2. Faça uma pesquisa sobre economia circular e elabore um esquema que apresente a implementação da logística reversa para o aumento da reciclagem do lixo eletrônico.
3. Nas Olimpíadas Rio 2016, cerca de 30% das medalhas foram feitas com material reciclado. Quatro anos depois, o Japão tomou iniciativas para tornar as Olimpíadas de Tóquio 2020 as mais sustentáveis de todos os tempos.

PARA EXPLORAR

Leia

Dia Mundial da Reciclagem: por que é importante reciclar o lixo eletrônico?

O texto, publicado em maio de 2022, na *National Geographic Brasil*, traz informações sobre os benefícios ambientais e econômicos de reciclar o lixo eletrônico.

Disponível em: https://www.nationalgeographic.com.br/meio-ambiente/2022/05/dia-mundial-da-reciclagem-por-que-e-importante-reciclar-o-lixo-eletronico. Acesso em: 17 out. 2024.

• É possível obter 0,012 mol de ouro com a reciclagem de 300 smartphones. Se uma medalha de ouro contém cerca de 6,7 g de ouro metálico, calcule quantos smartphones seriam necessários para produzir todas as 340 medalhas de ouro entregues nas Olimpíadas de Tóquio. Dado: massa molar do ouro = 197 g/mol.

Não escreva no livro.



CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

PETRÓLEO E PROBLEMAS AMBIENTAIS

Efeitos causados nos organismos pela contaminação por petróleo.

Fonte de pesquisa: Tessari, M. G. Riano, E. P. Senane ecological impacts caused by one of the worst orphan oil spills worldwide. Marine Environmental Research, v. 187, p. 105898, 2023.

Para discutir

1. Por que é difícil combater o efeito dos derramamentos de petróleo?
2. Quais são os impactos sociais causados por derramamentos de petróleo que atingem a costa?
3. Pesquise a contenção dos derramamentos de petróleo no mar e descreva as técnicas utilizadas.

Não escreva no livro.

Química e...

Explora temas que possibilitam um estudo interdisciplinar com os outros componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias ou com os componentes curriculares de outras áreas do conhecimento.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente

Estimula a reflexão sobre ciência e tecnologia e suas implicações na sociedade e no ambiente.

APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS E BOXES

SEÇÕES DE CAPÍTULO

Não escreva no livro.

SEÇÕES DE CAPÍTULO



Ciência tem história

Apresenta e discute o contexto em que algumas ideias científicas foram construídas, estimulando a discussão e a reflexão.



Atividades

Ao final dos capítulos, há um conjunto de atividades sobre os assuntos abordados. Pode incluir um exemplo de atividade resolvida.

Práticas de Ciências

Atividades práticas, experimentais e investigativas, levam você a desenvolver as várias formas de investigação próprias da ciência.

SEÇÕES DE FECHAMENTO DA UNIDADE



Pensando Ciências

Apresenta um problema/uma questão a ser solucionado(a) por meio da aplicação do pensamento computacional.

Não escreva no livro.



Estudo de caso
Texto narrativo em que uma personagem ou um narrador apresenta uma situação-problema, para que você e os colegas discutam e, em grupo, proponham uma solução e/ou interpretação para o caso.



Questões globais
Questões mais elaboradas e/ou atividades do Enem e de vestibulares do país para você se familiarizar com os exames de ingresso no Ensino Superior.

SEÇÕES DE FECHAMENTO DA UNIDADE

Projetos
Os projetos propõem a realização de atividades que envolvem a comunidade, em busca de um bem coletivo.

PROJETOS

SUMÁRIO

UNIDADE 1 — 12

QUÍMICA E ESTUDO DOS MATERIAIS

CAPÍTULO 1 **Química: objeto de estudo e aplicações** ... 14
Onde a química está presente? ... 14
Conhecimento químico ... 15
Objeto digital – Carrossel de imagens: Química decolonial ... 16
Química Verde: uma abordagem mais sustentável para a conservação ambiental ... 17
Ciência tem história: Da Alquimia à Química: uma jornada de transformação científica ... 19
Práticas de Ciências: Regras de segurança e descarte de resíduos ... 20
Atividades ... 21

CAPÍTULO 2 **Propriedades da matéria** ... 22
Medições ... 22
Massa ... 23
Volume ... 23
Densidade ... 23
Propriedades da matéria ... 24
Práticas de Ciências: Duas maneiras de diferenciar líquidos ... 29
Sistemas ... 30
Substâncias puras e misturas ... 31
Substâncias simples e substâncias compostas ... 33
Propriedades específicas dos materiais e separação de misturas ... 34
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: Jardins filtrantes ... 39
Atividades ... 40

CAPÍTULO 3 **Modelos atômicos e características dos átomos** ... 42
Aplicações dos raios X ... 42
Modelos atômicos de Dalton e Thomson ... 43
O modelo de Rutherford e as partículas fundamentais do átomo ... 43
Próton, nêutron e elétron ... 45
Número atômico ... 46
Isótopos ... 47
A reelaboração do modelo atômico de Rutherford ... 48
Espectros atômicos ... 50
O modelo atômico de Rutherford-Bohr ... 51
Distribuição eletrônica em camadas ou níveis de energia ... 52
Critérios para prever a distribuição eletrônica ... 53
Práticas de Ciências: Teste de chama ... 54
Atividades ... 55

CAPÍTULO 4 **Ligações químicas** ... 56
Introdução ao estudo das ligações químicas ... 56
Objeto digital – Infográfico clicável: A Tabela Periódica ... 58
Substâncias iônicas, moleculares e metálicas ... 59
Ligação iônica ... 60
Ligação covalente ... 62
Ligação metálica ... 63
Química e Sociologia: A importância dos catadores de materiais recicláveis na reciclagem do alumínio ... 65
Fórmulas das substâncias moleculares: as representações de Lewis ... 66
Ligações simples, duplas e triplas ... 66
A polaridade das ligações e das moléculas ... 67
Geometria molecular e polaridade de moléculas ... 68
Estado físico das substâncias e as forças intermoleculares ... 69
Práticas de Ciências: Moldando sólidos com um martelo ... 73
Atividades ... 74

Pensando Ciências: Como saber se é ouro mesmo? ... 76
Questões globais ... 78

UNIDADE 2 — 80

O MACRO E O MICRO

CAPÍTULO 1 **Relações entre massas de átomos e moléculas** ... 82
O Modelo-Padrão e a massa dos átomos ... 82
Massa atômica ... 83
Isótopos e massa atômica ... 85
Massas moleculares ... 86
Práticas de Ciências: Determinação de um padrão de massa ... 89
Atividades ... 90

CAPÍTULO 2 **Quantidade de matéria** ... 91
Quantidades de substâncias ... 91
A unidade mol ... 93
Objeto digital – *Podcast*: Mol, a "dúzia" química ... 93
Relação entre mol, massa molar e constante de Avogadro ... 95
Práticas de Ciências: O mol e a massa molar ... 96
Ciência tem história: Determinação da constante de Avogadro ... 99
Atividades ... 100

CAPÍTULO 3 **Contando átomos e moléculas** ... 102
Reações químicas ... 102
Equações químicas ... 103
Objeto digital – Vídeo: Evidências de reações químicas ... 104

Não escreva no livro.

Balanceamento de equações ... 108
Tipos de fórmula ... 109
Práticas de Ciências: Queima da palha de aço ... 112
Cálculo estequiométrico ... 113
Reagente em excesso e reagente limitante ... 118
Reagentes impuros e rendimento de uma reação ... 120
Química e Matemática: Razões, proporções e reações químicas ... 123
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: O estudo da concentração de CO_2 na atmosfera no século XX ... 124
Atividades ... 126
Estudo de caso: Linus Pauling e a vitamina C ... 128
Questões globais ... 130

UNIDADE 3 — 132
O COMPORTAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS

CAPÍTULO 1 O comportamento dos gases ... 134
Como os gases afetam a vida na Terra ... 134
Características dos gases ... 135
Práticas de Ciências: Características dos gases ... 138
Transformações gasosas ... 139
Práticas de Ciências: Transformações gasosas ... 141
Química e Biologia: A produção de biogás ... 142
Objeto digital – Carrossel de imagens: Projetos de geração de energia limpa ... 142
Atividades ... 143

CAPÍTULO 2 Funções inorgânicas ... 144
Introdução às funções químicas ... 144
Funções inorgânicas ... 145
Ácidos ... 145
Bases ... 148
Óxidos ... 150
Práticas de Ciências: Simulando a chuva ácida ... 154
Sais ... 155
Ciência tem história: Dissociação eletrolítica ... 157
Atividades ... 158

CAPÍTULO 3 Soluções e propriedades coligativas das soluções ... 160
As diferentes propriedades de uma solução de sal de cozinha ... 160
As soluções ... 161
Relações entre a quantidade de soluto e a de solvente ou a de solução ... 163
Propriedades coligativas ... 167
Práticas de Ciências: Osmose ... 172
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: Dessalinização ... 173
Atividades ... 174
Pensando Ciências: Como descobrir se o leite foi adulterado? ... 176
Questões globais ... 178

UNIDADE 4 — 180
ENERGIA E TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA

CAPÍTULO 1 Termoquímica ... 182
A energia dos alimentos é química ... 182
Transformações exotérmicas e endotérmicas ... 183
Energia envolvida nas transformações ... 184
Objeto digital – Infográfico clicável: A evolução dos termômetros ... 184
Poder calorífico de um combustível e calor de combustão ... 185
Entalpia e variação de entalpia de reação ... 186
Lei de Hess ... 189
Energia de ligação ... 190
Entalpia-padrão de formação (ΔH^0_f) ... 191
Química e Matemática: Diagramas de entalpia ... 193
Práticas de Ciências: Analisando a queima de uma vela ... 195
Atividades ... 196

CAPÍTULO 2 Cinética química ... 198
As enzimas aceleram as reações químicas ... 198
Rapidez das reações ... 199
Como as reações ocorrem? ... 201
Práticas de Ciências: Rapidez de uma reação química ... 202
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: A decomposição das sacolas de mercado ... 203
Fatores que alteram a rapidez das transformações químicas ... 204
Catalisadores ... 205
Ciência tem história: O conceito de catalisador ... 206
Atividades ... 207
Pensando Ciências: Como se determina a quantidade de calorias de um alimento? ... 208
Questões globais ... 210

PROJETO 1 — 212
Produtos químicos em casa: manual para identificação, uso e armazenagem

Não escreva no livro.

UNIDADE 5 — ELETROQUÍMICA — 216

CAPÍTULO 1 Contando elétrons ... 218
Reações envolvendo transferência de elétrons ... 218
Reações de oxirredução ... 219
Número de oxidação (Nox) ... 219
Nox e as reações de oxirredução ... 221
Práticas de Ciências: Por que o ferro enferruja? ... 222
Balanceamento de equações de oxirredução ... 223
Reações redox e produção de corrente elétrica ... 224
Espontaneidade das reações ... 227
Pilhas comerciais ... 227
Objeto digital – Infográfico clicável: Logística reversa de pilhas e baterias ... 228
Química e Física: Como funciona a recarga de baterias? ... 230
Corrosão de metais: um exemplo de pilha ... 231
Proteção contra a corrosão ... 232
Atividades ... 235

CAPÍTULO 2 Eletrólise ... 237
Energia elétrica gerando transformações químicas ... 237
Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa ... 238
Ciência tem história: Seriam o sódio e o potássio metais? ... 242
Comparação entre a eletrólise e o funcionamento das pilhas ... 243
Principais aplicações da eletrólise ... 244
Práticas de Ciências: Cobreação de um objeto metálico ... 249
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: A reciclagem do alumínio ... 250
Atividades ... 252

Estudo de caso: A manutenção da Estátua da Liberdade ... 254
Questões globais ... 256

UNIDADE 6 — EQUILÍBRIOS QUÍMICOS — 258

CAPÍTULO 1 Estado de equilíbrio ... 260
Reconhecendo os equilíbrios químicos ... 260
Equilíbrio químico ... 262
Práticas de Ciências: Estabelecendo o equilíbrio químico ... 264
Constantes de equilíbrio ... 266
Cálculo das constantes de equilíbrio ... 269
Ciência tem história: Influências sociais na síntese industrial da amônia no século XX ... 270
Princípio de Le Châtelier ... 272
Atividades ... 274

CAPÍTULO 2 Equilíbrios ácido-base ... 275
Ácidos e bases no cotidiano ... 275
Objeto digital – Vídeo: Pinturas corporais indígenas ... 275
Ácidos e bases segundo a teoria de Arrhenius ... 276
Ácidos e bases segundo a teoria de Brönsted-Lowry ... 276
Constantes de ionização de ácidos e de dissociação de bases ... 278
Equilíbrio iônico e produto iônico da água ... 279
Determinação do pH ... 281
Indicadores ácido-base ... 283
Cálculo de pH de soluções de ácidos e bases ... 284
Titulação ácido-base ... 285
Práticas de Ciências: Investigando o pH de soluções ... 286
Sistema-tampão ou solução-tampão ... 287
Química e Biologia: A acidificação dos oceanos ... 289
Atividades ... 290

CAPÍTULO 3 Equilíbrios em sistemas heterogêneos ... 292
Acidificação dos oceanos ... 292
Equilíbrios heterogêneos ... 293
Solubilidade de gases em líquidos ... 294
Perturbação de equilíbrios heterogêneos ... 295
Produto de solubilidade (K_{PS}) ... 296
Práticas de Ciências: A influência da temperatura na solubilidade dos sais ... 297
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: Despoluição da água por precipitação ... 298
Atividades ... 300

Estudo de caso: Comprimidos e antiácidos: o que eles podem nos contar sobre o controle do pH ... 302
Questões globais ... 304

UNIDADE 7 — A QUÍMICA DA VIDA — 306

CAPÍTULO 1 Ciclos biogeoquímicos ... 308
Introdução aos ciclos biogeoquímicos ... 308
Ciclo da água ... 309
Objeto digital – *Podcast*: Cidades-esponjas ... 309
Práticas de Ciências: Construindo um terrário para observar o ciclo da água ... 310
Ciclo do carbono ... 311
Ciclo do oxigênio ... 312

Ciclo do nitrogênio ... 313
Ciência tem história: Johanna Döbereiner e o sucesso da soja brasileira ... 314
Atividades ... 316

CAPÍTULO 2 **Carbono e cadeias carbônicas** ... 317
A versatilidade do carbono ... 317
Introdução à Química Orgânica ... 318
O carbono e as ligações covalentes ... 318
Práticas de Ciências: Geometria molecular ... 322
Carbono e cadeias carbônicas ... 323
Algumas características dos compostos orgânicos ... 325
Química e Língua Portuguesa: Uma palavra, vários significados ... 327
Atividades ... 328

CAPÍTULO 3 **Hidrocarbonetos** ... 330
Hidrocarbonetos e mudanças climáticas ... 330
Hidrocarbonetos ... 331
Petróleo: fonte de hidrocarbonetos ... 337
A queima de combustíveis fósseis e as mudanças climáticas ... 339
Objeto digital – Mapa clicável: Principais fontes de energia elétrica nos estados brasileiros ... 339
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: Petróleo e problemas ambientais ... 340
Carvão mineral: fonte de hidrocarbonetos aromáticos ... 341
Isomeria ... 341
Práticas de Ciências: Destilação seca da madeira ... 343
Atividades ... 344

CAPÍTULO 4 **Funções orgânicas** ... 346
Introdução às funções orgânicas ... 346
Funções nitrogenadas ... 347
Funções halogenadas ... 351
Funções oxigenadas ... 353
Isomeria óptica ... 360
Práticas de Ciências: Produzindo álcool em gel ... 364
Atividades ... 365

Estudo de caso: O dilema do uso do DDT ... 366
Questões globais ... 368

UNIDADE 8 **370**
QUÍMICA, SISTEMA PRODUTIVO E AMBIENTE

CAPÍTULO 1 **Reações químicas na natureza e no sistema produtivo** ... 372
Reações químicas e a obtenção de produtos ... 372
Processos de obtenção de alguns metais ... 373
Galvanoplastia ... 375
Reações que envolvem funções oxigenadas ... 376
Práticas de Ciências: Investigando a fermentação ... 380
Sabões ... 388
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: Ciência dos aromas: os segredos por trás do gosto da sua comida ... 390
Atividades ... 391

CAPÍTULO 2 **Polímeros sintéticos** ... 393
Plásticos ... 393
Monômeros e polímeros ... 394
Tipos de polímeros ... 395
Práticas de Ciências: Cadeias poliméricas ... 398
Ciência tem história: Polímeros mais resistentes, baratos e versáteis ... 399
Reciclagem de materiais plásticos ... 400
Objeto digital – *Podcast*: Microplásticos ... 400
Atividades ... 401

CAPÍTULO 3 **Gestão de resíduos: práticas e desafios** ... 402
Descarte adequado de resíduos perigosos: uma questão de saúde pública e ambiental ... 402
O que acontece com o lixo descartado? ... 403
Química e Geografia: Como o descarte de equipamentos eletrônicos está transformando alguns países nos lixões do mundo ... 405
Objeto digital – Vídeo: Celulares: de onde vêm, para onde vão ... 405
Os perigos do mercúrio: de Minamata ao Tapajós ... 407
Práticas de Ciências: Impactos do descarte ilegal ... 409
Atividades ... 411

Pensando Ciências: Como corrigir o solo ácido na agricultura? ... 412
Questões globais ... 414

PROJETO 2 **416**
Série de vídeos: identificando *fake news* sobre temas científicos

Respostas das atividades de cálculo ... 420
Transcrição dos áudios ... 421
Bibliografia comentada ... 424

QUÍMICA E ESTUDO DOS MATERIAIS

2. Não, pois para determinar a densidade de um material ou de um objeto é necessário medir sua massa e seu volume.

Tudo o que podemos observar nessa foto (como os prédios, os carros, o asfalto das ruas, as árvores), e muito do que não vemos nela (como o vapor de água e os gases presentes no ar atmosférico), é formado por átomos, partículas que se unem por ligações químicas.

Nos primeiros modelos atômicos, os átomos eram descritos como estruturas indivisíveis, porém, à medida que partículas menores foram sendo descobertas mediante resultados experimentais, novos modelos surgiram.

Dependendo da natureza do átomo e de como ele se liga a outros átomos, diversos materiais com diferentes propriedades são formados e utilizados em aplicações variadas.

Nesta unidade, você vai conhecer mais sobre os átomos e as ligações químicas e, assim, compreender como alguns fenômenos acontecem.

OBJETIVOS

- Compreender a Química, o conhecimento químico e os princípios da Química Verde.
- Reconhecer as propriedades da matéria.
- Identificar substâncias puras e misturas.
- Conhecer e analisar modelos atômicos e partículas elementares.
- Compreender as diferentes ligações químicas.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. Quais características dos materiais presentes na imagem os tornam adequados para suas funções?
2. Você conseguiria determinar a massa, o volume e a densidade dos elementos retratados na foto sem a ajuda de aparelhos?
3. É comum as pessoas associarem a Química somente à poluição e aos produtos tóxicos, esquecendo-se de sua contribuição para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Sugira uma explicação para esse fato.

1. Respostas variáveis. Podem ser citadas, por exemplo, a dureza e a resistência mecânica de materiais de alvenaria, a transparência do vidro de janelas, etc.
3. Porque no senso comum a Química está frequentemente associada a imagens de chaminés produzindo poluição, venenos, armas nucleares, produtos que fazem mal à saúde, entre outros.

O Teatro Amazonas, localizado na cidade de Manaus (AM), foi construído em 1896. Foto de 2022. ▸

Luís Salvatore/ Pulsar Imagens

UNIDADE 1

1 Química: objeto de estudo e aplicações

2 Propriedades da matéria

3 Modelos atômicos e características dos átomos

4 Ligações químicas

PARA COMEÇAR

1. Quando você pensa em "Química", que imagem vem à sua mente? Descreva essa imagem e explique por que a escolheu.
2. Ao observar a foto desta página, o que você imagina que o cientista está investigando?
3. Você seria capaz de identificar alguma propriedade que relacione o alimento mostrado na foto com os líquido presente nos frascos?

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Por meio de experimentos em laboratório, é possível identificar a composição e as propriedades dos alimentos.

3. Resposta pessoal. Os estudantes podem mencionar, por exemplo, que os líquidos presentes nos frascos são substâncias produzidas em laboratório iguais àquelas presentes no alimento.

QUÍMICA: OBJETO DE ESTUDO E APLICAÇÕES

2. Resposta pessoal. Comente com os estudantes que é possível, por exemplo, identificar os compostos presentes em um alimento com o auxílio de equipamentos de laboratório.

ONDE A QUÍMICA ESTÁ PRESENTE?

O que uma atividade com tubos de ensaio contendo líquidos coloridos tem em comum com frutas, legumes e sucos? Há alguma relação entre esses materiais, que são denominados naturais, com a Química? Ou essa ciência está relacionada apenas a atividades experimentais, realizadas com equipamentos específicos, e a produtos criados pelo ser humano, como pilhas e medicamentos?

Não se preocupe se você não tiver uma ideia clara sobre o assunto. No momento, é importante saber que todos esses materiais – e muitos outros, naturais ou não – são objeto de estudo da Química.

Há inúmeros exemplos de aplicação dos conhecimentos dessa ciência: certificação da qualidade da água de uma fonte mineral; cálculo do teor de poluentes presentes no ar; determinação da quantidade de conservantes utilizados em certo alimento, considerando os limites seguros para a saúde do consumidor; avaliação da qualidade de alimentos vendidos sem conservantes, os quais também podem ser nocivos à saúde humana; entre outros.

Se, por um lado, o uso de fertilizantes artificiais e agrotóxicos aumenta a produtividade agrícola e contribui para diminuir a escassez de alimentos e a fome, por outro, ele lança na natureza materiais tóxicos que podem comprometer o ambiente.

A aplicação de conhecimentos químicos também está relacionada com os processos de tratamento e controle de água e esgotos, possibilitando o fornecimento de água adequada para o consumo da população.

New Africa/Shutterstock.com/ID/BR

Não escreva no livro.

CONHECIMENTO QUÍMICO

O conhecimento químico formal teve início no século XVI, quando foi estabelecida a concepção de ciência moderna. Parte dele, entretanto, sempre esteve presente nas sociedades e na relação cotidiana do ser humano com a natureza.

O domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade. Além da iluminação noturna, do aquecimento e da proteção contra o ataque de animais, o fogo permitiu o cozimento de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes.

Reconhecer materiais inflamáveis, apagar a chama usando água ou areia, verificar transformações nos alimentos ao assá-los ou cozinhá-los constituem conhecimento químico. Esse saber foi obtido de **modo empírico**, ou seja, com base em observação, prática, erros e acertos.

Além disso, as carnes passaram a ser conservadas por mais tempo ao serem defumadas (em contato com a fumaça), secas ao sol ou salgadas.

Um dos passos decisivos para o desenvolvimento das sociedades foi a identificação dos metais e suas propriedades adequadas para a produção de ferramentas. Os primeiros metais a serem utilizados – ouro, prata e cobre – eram extraídos diretamente da natureza, sem a necessidade de processos que envolvessem transformações.

De algum modo, o ser humano percebeu que certos minérios, quando expostos ao fogo, transformavam-se em metais. Chumbo e estanho foram obtidos dessa forma.

Entre 2000 a.C. e 3000 a.C., algumas civilizações dominaram a produção e o uso do bronze (mistura metálica de cobre e estanho), um material resistente e adequado para a confecção de armas e ferramentas. Essa tecnologia impulsionou a agricultura e permitiu uma nova organização econômica das sociedades.

Por volta de 1500 a.C., foi possível produzir o ferro a partir de seus minérios, com o desenvolvimento de fornos capazes de atingir temperaturas mais elevadas que as de fogueiras. As ligas obtidas desse metal produziam ferramentas e armas muito mais resistentes que as de bronze.

O desenvolvimento da cerâmica, do vidro, das técnicas de mumificação e de alguns medicamentos são outros exemplos de aquisição de conhecimento das transformações e propriedades dos materiais.

PARA EXPLORAR

Leia

***O livro da Química*, de Maria da Anunciação Rodrigues. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2022.**

O livro mostra, por meio de infográficos, ilustrações e textos, como a Química está presente em nosso dia a dia.

A contribuição da Química para a sociedade

A Química é responsável por muitos avanços científicos e tecnológicos que têm contribuído para o aumento da qualidade e da expectativa de vida do ser humano.

Entre essas contribuições, merecem destaque o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento de medicamentos e de materiais biodegradáveis e recicláveis e a produção de combustíveis menos poluentes.

Apesar de todos esses benefícios, o que predomina na sociedade é uma imagem negativa da Química, pois são muitos os processos industriais que geram resíduos tóxicos, os quais, quando não são devidamente tratados, provocam sérios danos ambientais. Dessa forma, é comum as pessoas relacionarem a palavra "química" com poluição, contaminação, desastres, situações de perigo ou risco de explosão.

Apesar desse aspecto negativo e da necessidade de reversão desse quadro, a Química tem uma participação fundamental no desenvolvimento da sociedade.

Os profissionais dessa área – professores, pesquisadores, químicos industriais e técnicos químicos de nível médio – buscam um mundo melhor, em que as pessoas tenham mais qualidade de vida, mais conforto e segurança.

1. Porque várias descobertas feitas com o auxílio da Química possibilitaram o desenvolvimento de medicamentos e vacinas que, por exemplo, aumentam a expectativa de vida. A Química também tem papel fundamental no desenvolvimento de fontes de energia limpa, contribuindo para a preservação do ambiente.

ROTEIRO

1. Por que a Química pode ser considerada uma aliada do ser humano tanto para o aumento da qualidade e expectativa de vida da população quanto para a preservação do ambiente?

Conexões entre a Química e outras áreas do conhecimento

Química decolonial

A Química, muitas vezes vista como uma disciplina restrita à Tabela Periódica, a fórmulas complexas e a tubos de ensaios, na verdade está conectada ao nosso cotidiano.

Ao explorar estrutura, propriedades e transformações dos materiais, a Química contribui significativamente com a Biologia, a Física, a Geografia, a História, a Medicina e a Engenharia, entre outras áreas do conhecimento. Essas interações são fundamentais para resolver problemas dos mais simples aos mais complexos, desenvolver inovações tecnológicas que beneficiam a sociedade e promover uma compreensão mais abrangente e integrada do mundo.

A História mostra como a Química tem desempenhado papel decisivo em eventos históricos, como as duas grandes guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Química contribuiu na produção de fertilizantes, que permitiram um aumento na produção de alimentos. Porém, por meio da Química também foram desenvolvidos explosivos e gases venenosos, como os gases cloro e mostarda, os quais provocaram efeitos devastadores nas trincheiras.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Química contribuiu para o desenvolvimento de vacinas contra doenças como o tétano e a difteria, o que reduziu significativamente o número de mortes por doença entre os soldados; além de desempenhar papel fundamental na produção de medicamentos e de antibióticos, como a penicilina.

A descoberta da penicilina pelo escocês Alexander Fleming (1881-1955), em 1928, é um exemplo notável da sinergia entre Química e Biologia. Fleming, observando o crescimento inibido de bactérias ao redor de um fungo, deu início a uma jornada que revolucionaria a Medicina. As contribuições da Química possibilitaram a elucidação estrutural da penicilina e o desenvolvimento de métodos de produção em massa, abrindo caminho para o tratamento eficaz de infecções bacterianas que antes eram fatais.

Já em colaboração com a Física, as contribuições da Química envolvem o desenvolvimento de pilhas e baterias, de supercondutores, nanomateriais e polímeros avançados, entre outros materiais.

A Química também se conecta à Geografia no estudo da composição do solo, da água e dos minerais, possibilitando a compreensão dos processos geológicos que moldam o planeta Terra e os recursos naturais que sustentam a vida nele. Essa interação é fundamental para o desenvolvimento de soluções para problemas ambientais, como a poluição do solo e da água, a desertificação e as mudanças climáticas.

QUÍMICA E GEOGRAFIA

La Palma: uma erupção vulcânica sob o olhar da Química e da Geografia

Imagine um vulcão em erupção, liberando lava incandescente e gases quentes na atmosfera. Foi o que ocorreu com o vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, no arquipélago das ilhas Canárias (Espanha), em 2021. Durante a atividade vulcânica, que durou mais de 80 dias, a Química entrou em cena na análise da composição da lava e dos gases coletados. A lava, rica em basalto, revelou a presença de elementos como ferro, magnésio, cálcio, sódio e alumínio em proporções específicas, fornecendo pistas sobre a composição do magma e a dinâmica vulcânica da região. O monitoramento da concentração dos gases liberados durante a erupção foi fundamental para avaliar os riscos à saúde pública.

Sander Meertins/Alamy/Fotoarena

Vulcão Cumbre Vieja, na Espanha, durante erupção em 2021.

A Geografia, por sua vez, dedicou-se ao mapeamento de riscos e aos impactos da catástrofe natural. Por meio de estudos geológicos detalhados, foi possível identificar áreas de alto risco, como zonas de fluxo de lava e áreas propensas a deslizamentos de terra, permitindo a implementação de medidas de proteção para a população local. Também auxiliou na compreensão dos impactos da erupção no meio ambiente, como as mudanças na topografia da ilha.

A análise conjunta da Química e da Geografia possibilita o desenvolvimento de modelos precisos a serem utilizados na prevenção de erupções, bem como a identificação de áreas de alto risco e a tomada de medidas para proteger a vida humana e minimizar os danos causados por esses eventos naturais de grande magnitude.

1. **Faça uma pesquisa sobre algum desastre natural ou causado pelo ser humano que tenha acontecido no Brasil nos últimos anos. Explique como a Química, em conjunto com outras áreas do conhecimento, pode ajudar a minimizar as consequências desse desastre.**

1. Resposta variável. A Química está presente, por exemplo, em pesquisas sobre os impactos do aquecimento global, como secas prolongadas ou inundações, frequentes em várias regiões do Brasil nos últimos anos.

Não escreva no livro.

QUÍMICA VERDE: UMA ABORDAGEM MAIS SUSTENTÁVEL PARA A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Em um mundo cada vez mais consciente dos impactos ambientais decorrentes das atividades humanas, a busca por soluções sustentáveis torna-se cada vez mais urgente. Nesse contexto, a **Química Verde** surge como uma abordagem inovadora para repensarmos a maneira como produzimos e consumimos, buscando minimizar o impacto ambiental e promover o desenvolvimento sustentável.

Mas, afinal, o que é Química Verde? O que a diferencia da "Química tradicional"? E como ela pode contribuir para um futuro mais sustentável?

A Química Verde, ou Química para o desenvolvimento sustentável, não é uma ideia recente. Seus princípios começaram a ser formulados na década de 1970, em resposta à crescente preocupação com a poluição ambiental causada pela indústria química. No entanto, foi apenas na década de 1990 que o termo Química Verde se popularizou, com a publicação dos 12 Princípios da Química Verde, pelos pesquisadores estadunidenses Paul Anastas e John Warner, em artigo intitulado "Green Chemistry: An Integrative Approach" (Química Verde: uma abordagem integradora) na revista *Accounts of Chemical Research*. Esses princípios servem como um guia fundamental para o desenvolvimento de produtos e processos químicos mais sustentáveis, visando minimizar impactos ambientais e priorizar a saúde humana.

São estes os princípios:

- **Prevenção da geração de resíduos:** Buscar minimizar ou eliminar a geração de resíduos desde o início do processo, reduzindo a necessidade de tratamento e disposição desses resíduos.
- ***Design* de produtos:** Projetar produtos que sejam eficazes e seguros, com menor impacto ambiental durante todo o seu ciclo de vida.
- **Uso de matérias-primas renováveis:** Utilizar fontes renováveis de matérias-primas sempre que possível, diminuindo a dependência de recursos finitos e poluentes.
- **Minimização do consumo de energia:** Buscar reduzir o consumo de energia em todas as etapas do processo, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa.
- **Utilização de solventes e auxiliares menos perigosos:** Substituir solventes e auxiliares tóxicos por alternativas mais seguras para o meio ambiente e para a saúde humana.
- ***Design* para a reciclabilidade:** Projetar produtos e embalagens que sejam facilmente reciclados ou reutilizados, diminuindo o volume de lixo enviado para aterros sanitários.
- **Redução de derivados:** Buscar minimizar a formação de derivados intermediários perigosos durante a produção.
- **Catálise para uma produção mais eficiente:** Utilizar catalisadores para tornar os processos químicos mais eficientes e menos poluentes.
- **Desenvolvimento de produtos químicos mais seguros:** Projetar produtos químicos que sejam menos tóxicos para o meio ambiente e para a saúde humana.
- **Monitoramento e avaliação contínuos:** Monitorar e avaliar continuamente os impactos ambientais dos processos químicos, buscando identificar oportunidades de melhoria.
- **Informações para a tomada de decisões:** Disponibilizar informações sobre os riscos dos produtos químicos para que decisões embasadas sejam tomadas.
- **Prevenção da química acidental:** Implementar medidas para prevenir acidentes químicos e minimizar seus impactos.

Em 2000, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac, na sigla em inglês) adotou oficialmente esses princípios, reconhecendo sua importância. Essa oficialização garantiu maior visibilidade à Química Verde, incentivando sua adoção por empresas e instituições de pesquisas em todo o mundo.

Desde então, a Química Verde tem impulsionado o desenvolvimento de processos sustentáveis, como a transformação do milho em plástico biodegradável. O **bioplástico de milho**, também conhecido como **poliácido láctico (PLA)**, é um biomaterial inovador derivado de recursos renováveis, em contraste com os plásticos tradicionais, cuja matéria-prima para sua produção é o petróleo. Apesar de suas vantagens, o bioplástico de milho ainda enfrenta alguns desafios, como o custo de produção, que pode ser superior ao dos plásticos tradicionais. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda por produtos sustentáveis, espera-se que o custo do PLA diminua e sua produção torne-se mais competitiva.

Outros avanços da Química Verde envolvem a redução de resíduos gerados na manufatura de produtos farmacêuticos populares e a modificação de processos de extração e branqueamento de celulose na indústria, reduzindo significativamente os resíduos decorrentes da produção do papel.



Svengine/iStock/Getty Images

Tommaso Guicciardini/SPL/Fotoarena

A polpa de celulose, que é matéria-prima para a fabricação do papel, tem cor marrom ao ser extraída da madeira. O papelão ondulado (**A**) é produzido com a polpa marrom. Por meio de um processo chamado branqueamento, as substâncias responsáveis por essa coloração escura são retiradas e a polpa se torna branca (**B**).

2. Como consumidores, podemos dar preferência a produtos que sejam recicláveis, não contenham embalagens em quantidade desnecessária e sejam duráveis.

ROTEIRO

2. Os princípios da Química Verde foram propostos para que a indústria química invista em processos de produção que economizem matérias-primas, gerem menos resíduos e produzam materiais seguros e recicláveis. Para que essa abordagem alcance os resultados esperados, os consumidores também precisam estar atentos ao adquirir e utilizar produtos. Quais atitudes podemos ter, como consumidores, para tornar efetivas as mudanças que as indústrias fazem em seus processos de produção ao seguir os princípios da Química Verde?

No Brasil, a utilização do bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de plástico representa uma abordagem inovadora e sustentável dentro do campo da Química Verde. O bagaço, um subproduto abundante da indústria sucroalcooleira, tem o potencial de ser transformado em bioplástico, contribuindo para a redução da dependência de plásticos derivados do petróleo e diminuindo os impactos ambientais. No entanto, essa transformação enfrenta diversos desafios técnicos e econômicos que precisam ser superados para viabilizar a produção em larga escala.

Cabe a todos nós, consumidores, cobrarmos das autoridades públicas e das empresas a adoção de processos industriais que não provoquem danos ao ambiente.

AÇÃO E CIDADANIA

Sustentabilidade: o segredo para um futuro melhor

A sustentabilidade tornou-se um termo onipresente em nosso cotidiano. É citada em noticiários, propagandas, discursos políticos, etc. Mas qual é o seu real significado?

O conceito de sustentabilidade ganhou destaque global a partir do relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Esse relatório definiu desenvolvimento sustentável como aquele que "satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades".

De acordo com essa definição, devemos usar os recursos do planeta de forma consciente e responsável, garantindo que eles estejam disponíveis para as próximas gerações.

Na prática, a sustentabilidade se traduz em uma série de ações e políticas para reduzir o impacto negativo das atividades humanas no ambiente, o que inclui medidas como a redução da emissão de gases de efeito estufa, a proteção da biodiversidade, o uso racional da água e da energia, e a promoção de práticas agrícolas e industriais sustentáveis.

Cada um de nós pode contribuir para a sustentabilidade de maneira prática e significativa. Reduzir o consumo de plástico, optar por produtos biodegradáveis e apoiar políticas e empresas que promovam práticas sustentáveis são passos importantes. Na esfera pessoal, pequenas ações, como reciclar, economizar energia e água e reduzir o desperdício alimentar, fazem uma grande diferença. Na esfera profissional, as pessoas podem aplicar princípios de sustentabilidade em suas áreas de atuação, desde a implementação de processos industriais mais limpos até a promoção de práticas agrícolas sustentáveis.

A sustentabilidade é uma responsabilidade compartilhada que exige a colaboração entre todas as disciplinas e todos os setores da sociedade.

Ao integrar as contribuições das Ciências da Natureza e das Ciências Humanas, podemos desenvolver soluções inovadoras e práticas que garantam um futuro sustentável para todos.

1. Identifique práticas sustentáveis aplicadas na escola onde você estuda e em sua casa. Em seguida, reúna-se com os colegas para elaborar uma proposta de implementação de uma nova prática sustentável na escola ou na comunidade. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

DA ALQUIMIA À QUÍMICA: UMA JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO CIENTÍFICA

A história da Química é uma narrativa rica e complexa, que se desdobra ao longo de séculos de busca pela compreensão da natureza da matéria e de suas transformações. Uma parte fundamental dessa história é a transição gradual da Alquimia, com suas raízes místicas e filosóficas, para a Química, uma ciência moderna fundamentada em princípios empíricos e metodologia rigorosa.

A Alquimia foi uma prática filosófica e protocientífica que remonta a civilizações antigas, como a egípcia, a árabe, a grega, a mesopotâmica e a chinesa. Porém, ela se desenvolveu e se expandiu ao longo da Idade Média (séc. V a séc. XV) e do Renascimento (séc. XIV a séc. XVII). Seus principais objetivos eram a busca pela transmutação de metais menos nobres em ouro; a produção do elixir da longa vida, uma espécie de medicamento que curaria todas as doenças e tornaria imortal quem o ingerisse; e a obtenção da pedra filosofal, o saber que conduziria à transmutação e ao elixir.

No entanto, a Alquimia não se restringia apenas à transformação da matéria, mas também envolvia aspectos filosóficos, simbólicos e espirituais, buscando uma compreensão mais profunda do Universo e do ser humano. No contexto social da época em que a Alquimia floresceu, havia uma forte interconexão entre filosofia, espiritualidade e "ciência". Muitas práticas dos alquimistas ocorriam em segredo e utilizavam simbologias complexas, o que contribuía para seu caráter enigmático e misterioso. Por esses motivos, muitos praticantes da Alquimia foram perseguidos pelo movimento da Inquisição (séc. XVII a séc. XVIII).

Embora várias das ideias e práticas alquímicas fossem envoltas em simbolismos, esses pioneiros contribuíram significativamente para o surgimento da Química experimental, com a criação e o desenvolvimento de técnicas e procedimentos laboratoriais, como o banho-maria, a destilação, a sublimação e a cristalização; além disso, produziram versões rudimentares de equipamentos de laboratório, como o balão de destilação e o almofariz. Muitas substâncias químicas importantes, como o álcool etílico, alguns ácidos e metais, também foram identificadas e sintetizadas por alquimistas.



Biblioteca Médica Harvey Cushing e John Hay Whitney, Universidade de Yale/D/BR

Os quatro elementos em *De responsione mundi et de astrorum ordinatione* (*Da resposta do mundo e da disposição das estrelas*), de Isidoro de Sevilha (1472). Segundo a Teoria dos Quatro Elementos, a matéria, inclusive o corpo humano, seria composta de água, ar, fogo e terra.

O surgimento da metodologia científica durante o Renascimento e a Revolução Científica (séc. XVIII) marcou um ponto de virada na história da Química. Figuras como o irlandês Robert Boyle (1627-1691) e o francês Antoine Lavoisier (1743-1794) desempenharam papéis cruciais nesse processo, promovendo a observação cuidadosa, a experimentação controlada e a formulação de teorias baseadas em evidências.

Boyle foi pioneiro no uso de métodos científicos experimentais. Postulou que a matéria seria constituída de "aglomerados de partículas" que se combinariam de infinitos modos, formando compostos. Com isso, ele desconceituou a Teoria dos Quatro Elementos. Lavoisier, com seus experimentos sobre a combustão e a conservação da massa, estabeleceu os fundamentos da moderna teoria das reações químicas, derrubando, assim, a antiga teoria do flogisto (uma substância que estaria presente em todos os compostos inflamáveis e que se desprenderia ou seria absorvida durante o processo de calcinação).

Desde então, a Química tem evoluído, abrangendo áreas tão diversas quanto a síntese de novos materiais, a compreensão da estrutura molecular e a aplicação de métodos químicos na medicina e na indústria. A transição da Alquimia para a Química é uma história de perseverança, curiosidade e transformação intelectual.

Para discutir

1. Resposta pessoal. A diferença fundamental entre a Alquimia e a Química moderna reside na abordagem metodológica e filosófica. Enquanto a primeira era marcada por uma mistura de práticas experimentais, especulação filosófica e busca por objetivos místicos, a segunda é uma disciplina científica baseada em observação cuidadosa, experimentação controlada e formulação de teorias fundamentadas em evidências empíricas.

1 **Explique a diferença fundamental entre a abordagem da Alquimia e da Química moderna na investigação da natureza da matéria e das suas transformações.**

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Como a Alquimia está relacionada com o desenvolvimento da Química como ciência?**

3 **Pesquise e discuta com os colegas como a transição da Alquimia para a Química refletiu não apenas mudanças na ciência, mas também transformações sociais, culturais e filosóficas ao longo do tempo.**

2. Os alquimistas desenvolveram métodos e equipamentos que foram fundamentais para o desenvolvimento da Química e são utilizados até hoje; identificaram e sintetizaram várias substâncias, como álcool etílico e diversos ácidos; também trabalharam com metais importantes, contribuindo para o conhecimento e uso desses materiais.

Não escreva no livro.

Regras de segurança e descarte de resíduos

Na classificação de produtos químicos, utilizam-se símbolos para alertar sobre o risco envolvido em seu manuseio. Sobre quais perigos esses símbolos nos alertam? Nesta atividade, você e os colegas vão identificar esses símbolos, além de discutir e estabelecer regras básicas de segurança. Também vão reconhecer a importância do descarte correto de resíduos.

Material

- cartolina ou papel *kraft*
- pincel marcador (canetão)
- régua

Como fazer

1. A seguir, estão relacionadas algumas ocorrências comuns em laboratórios de Ciências. Proponha uma alternativa de ação para lidar com cada uma dessas ocorrências. Nessa proposta, utilizem os símbolos de segurança indicados nesta seção.

Nocivo ou irritante

Tóxico ou muito tóxico

Facilmente ou extremamente inflamável

Ilustrações: Reinaldo Vignati/ID/BR

Corrosivo

Explosivo

Comburente

- Liberação de gases tóxicos.
- Contato de material agressivo (ácidos, bases) com a pele.
- Contato de material agressivo (ácidos, bases) com a roupa (calça, camisa, etc.).
- Uso de material inflamável (solventes, derivados de petróleo, etc.).
- Quebra de material de vidro e projeção dos estilhaços.
- Queimadura com chama ou pelo contato com material aquecido.
- Contaminação por vapores de materiais tóxicos, de alimentos, refrigerantes ou de outras bebidas deixados sobre a bancada do laboratório.

2. Formem grupos com os colegas. Analisem as propostas individuais e elejam as mais adequadas para agir em cada uma das ocorrências relatadas.

3. Em seguida, sob a orientação do(a) professor(a), a turma toda deve resumir, em conjunto, as conclusões dos grupos e montar um painel com as regras de segurança em laboratórios.

4. Relacionem os procedimentos considerados viáveis para o descarte de resíduos de experimentos realizados em laboratório (materiais corrosivos e que contêm metais pesados, como pilhas, entre outros).

5. Em seguida, sintetizem as conclusões dos grupos e montem um painel com as regras de descarte de resíduos.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem que o uso dos símbolos de alerta em um laboratório é vantajoso, pois indicam as medidas e precauções que devem ser tomadas no manuseio e contato com determinada substância, assim como alerta como manusear líquidos inflamáveis, para não causar acidentes ou até mesmo princípio de incêndio, entre outras.

Para concluir

1 **Durante o trabalho em grupo, quais critérios foram usados para fazer a escolha das melhores alternativas de ação?** Resposta variável.

2 **Quais são as vantagens no uso dos símbolos de alerta em um laboratório?**

3 **Como você poderia aplicar essas regras de segurança no ambiente doméstico? Proponha, com seu grupo, uma forma de fazer a comunicação desses resultados para seus familiares e para as pessoas da comunidade em que você vive.**

3. Resposta variável. Essas regras podem ser aplicadas ao ambiente doméstico, compartilhando as informações obtidas nesta prática, assim como verificar pontos e ambientes que podem indicar perigo. De acordo com cada grupo, os estudantes podem se programar e verificar a melhor forma de apresentar os resultados para seus familiares e para a comunidade.

Não escreva no livro.

ATIVIDADES

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 Você encontrou a seguinte receita de desinfetante natural, em uma publicação na internet, intitulada "Como limpar a casa sem produtos químicos":

Receita

8 xícaras (2 L) de água

1/2 xícara (125 mL) de sabão de coco em barra ralado

1 xícara (250 mL) de álcool

400 g de folhas verdes de eucalipto ou 1 colher de sopa de óleo essencial de eucalipto

a) Explique por que a afirmação "sem produtos químicos" está incorreta.

b) Discuta por que o uso incorreto do termo "natural" pode ser enganoso e quais são as possíveis consequências dessa desinformação para os consumidores.

Resolução

a) A Química é a ciência que estuda a matéria, sua estrutura, transformações e propriedades. Logo, todos os ingredientes da receita são materiais constituídos de uma ou mais substâncias químicas.

b) Na publicação, o termo "natural" faz referência a materiais supostamente saudáveis, que não causariam danos à saúde e ao ambiente. Porém, há produtos naturais que prejudicam a saúde, como ocorre, por exemplo, com o veneno de cobra. O termo "produto natural" é usado na Química como referência a materiais extraídos da natureza. O sabão de coco ralado é obtido a partir de processos industriais, portanto não é um produto natural.

2 Comente evidências históricas que nos permitem concluir que o conhecimento químico sempre esteve presente no desenvolvimento da sociedade. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 O domínio do fogo pode ser considerado um conhecimento químico? Por quê? Cite alguns avanços tecnológicos dessa descoberta para a sociedade. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 Explique como o conceito de sustentabilidade é abordado nas *charges* a seguir.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Charges sobre sustentabilidade do artista Valfrido Ricardo Martins (Rico), publicadas no jornal *O Vale*, em 2008 e 2009, respectivamente.

5 A Química é responsável por diversos avanços científicos e tecnológicos, como o aumento na produção de alimentos e o desenvolvimento de medicamentos. Muitos processos industriais geram, no entanto, resíduos tóxicos que provocam sérios danos ambientais e à saúde. Em sua opinião, a Química traz mais benefícios ou prejuízos para as pessoas e para o ambiente? É possível ter avanços nessa área sem afetar o ambiente e a saúde das pessoas? Resposta pessoal. Faça um balanço dos prós e dos contras da atividade industrial para a sociedade.

6 Cite exemplos de como a Química Verde tem impulsionado o desenvolvimento de processos sustentáveis para a produção de novos materiais. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7 Várias técnicas de laboratório utilizadas atualmente foram desenvolvidas pelos alquimistas. Duas delas são bem populares: o aquecimento em banho-maria e a destilação. Faça uma pesquisa sobre essas duas técnicas e em quais situações elas são usadas. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

PROPRIEDADES DA MATÉRIA

PARA COMEÇAR

1. Indique três medições (grandezas) que poderiam ser feitas durante o trajeto de sua casa até a escola.
2. Quais unidades de medida estão associadas a essas grandezas?
3. Você considera alguma dessas medições para não chegar atrasado à escola?
4. Por que é importante fazer medições?

1. e **2.** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que seria a medida do tempo necessário para percorrer a distância em que se encontra até a escola.

4. Porque em muitas das nossas atividades precisamos usar quantidades determinadas, sejam elas de massa, de comprimento, volume, etc.

MEDIÇÕES

A imagem mostra alguns alimentos comuns no dia a dia. Quando vamos ao supermercado, percebemos que diversos produtos são vendidos de acordo com diferentes tipos de medição, que indicam a quantidade do material contido na embalagem. Por exemplo, líquidos como óleo, leite ou água são vendidos em unidades de volume (litros ou mililitros); arroz, feijão e açúcar, em unidades de massa (quilogramas); e o papel higiênico é vendido em rolos com certa medida de comprimento (metros). Essas grandezas (volume, massa e comprimento) estão associadas a medições feitas por instrumentos específicos, como a balança, que mede a massa, ou a fita métrica, que afere o comprimento de algum objeto.

Todos os dias, as pessoas utilizam medições: para dosar a quantidade de açúcar ou adoçante no café ou em um suco, para verificar a temperatura ambiente antes de sair de casa (para determinar a escolha por roupas mais leves ou mais grossas, por exemplo), para regular a pressão de pneus de bicicletas, automóveis e caminhões, etc.

As medições podem ser classificadas em **quantitativas** (quando usamos um valor numérico em uma receita: "adicione 150 mL de leite a 400 g de farinha") ou **qualitativas** (quando não empregamos um valor numérico, como em "asse até dourar" no preparo de um alimento).

Neste capítulo, além de estudar grandezas (o que pode ser medido) e suas unidades de medida, você vai aprofundar conhecimentos sobre a matéria, reconhecer que algumas de suas propriedades podem ser utilizadas na identificação dos materiais e, ainda, analisar o comportamento de alguns materiais quando aquecidos.

A medida usada para a comercialização depende de cada produto. Na foto, vemos produtos que são vendidos por massa (arroz e feijão), volume (leite), unidades (ovos) e comprimento (papel higiênico).

Rita Barreto/Fotoarena
Rita Barreto/Fotoarena
Rita Barreto/Fotoarena
sripfoto/Shutterstock.com/ID/BR
showcake/Shutterstock.com/ID/BR

Não escreva no livro.

MASSA

A **massa** é uma grandeza relacionada à quantidade de material presente em um corpo. Sua medida é feita por **balanças** que permitem a comparação entre a massa de um material e a massa adotada como padrão.

Apesar de a unidade-padrão de massa ser o **quilograma (kg)**, é muito comum também o uso de seus submúltiplos, como o grama (g) e o miligrama (mg), ou múltiplos, como a tonelada (t).

VOLUME

O **volume** é a grandeza que corresponde ao espaço ocupado por um corpo. A medida de volume de líquidos geralmente é feita com o uso de vidrarias apropriadas, como cilindros graduados ou provetas (**A**), pipetas (**B**) e balões volumétricos (**C**) (veja foto ao lado), que apresentam marcações que permitem medir volumes.

As unidades de volume derivam das unidades de comprimento. A unidade-padrão de volume é o **metro cúbico (m^3)**, que deriva do metro, e corresponde ao volume de um cubo de 1 metro de aresta, que equivale a 1 000 litros. As unidades mais usadas no dia a dia, entretanto, são o litro (L) e o mililitro (mL), também aceitas pelo SI.

ID/BR



O cubo apresenta volume de 1 m^3 (1 m × 1 m × 1 m), que corresponde à unidade-padrão de volume no SI. Entretanto, as unidades de volume mais utilizadas são o litro (L), que corresponde a 1 dm^3, e o mililitro (mL), que corresponde a 1 cm^3.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Vidrarias utilizadas para medir o volume de líquidos em laboratório.

DENSIDADE

Os meios de comunicação frequentemente noticiam casos de derramamento de petróleo no mar. Esse óleo não afunda, formando, na superfície da água, grandes manchas, que podem ser contidas com o uso de boias, por exemplo. Materiais mais densos que a água tendem a afundar nela, e os menos densos, a flutuar. O óleo, portanto, não afunda na água porque sua densidade é menor.

A **densidade** é uma grandeza que relaciona a massa de um material com o volume que ele ocupa.

A densidade pode ser expressa pela divisão da massa pelo volume:

$$\text{densidade} = \frac{\text{massa}}{\text{volume}} \Rightarrow d = \frac{m}{V}$$

A unidade de densidade no SI é o **quilograma por metro cúbico (kg/m^3)**, embora as unidades mais utilizadas sejam o grama por centímetro cúbico (g/cm^3) e o grama por mililitro (g/mL).

Vale ressaltar que a densidade depende da temperatura, pois o volume dos materiais sofre contração ou dilatação de acordo com a variação da temperatura. Assim, é adequado indicar a temperatura em que foi feita a medição.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Se um cubo de chumbo (**A**) e outro de alumínio (**B**), de volumes iguais a 27 cm^3, forem colocados separadamente em uma balança, a 25 °C, a massa de cada um deles será, respectivamente, 305,1 g e 72,9 g.

ROTEIRO

1. Sabendo que o chumbo é um metal mais denso do que o alumínio, responda:

a) Se compararmos a massa de uma esfera de chumbo e a de uma esfera de alumínio idênticas em volume, qual terá mais massa? Justifique.

b) Se compararmos um bloco de chumbo e um bloco de alumínio, ambos com massa de 5 kg, qual desses blocos ocupará o maior volume? Justifique.

1. a) A esfera de chumbo, pois o material mais denso apresenta massa maior para volumes iguais.
b) O bloco de alumínio, pois o material menos denso ocupa um volume maior para massas iguais.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Tanto o diamante como a grafita são formados apenas por átomos de carbono, apesar de apresentarem propriedades diferentes. A grafita é um mineral quebradiço, bom condutor de eletricidade e bom lubrificante. O diamante é um mineral duro, isolante elétrico e abrasivo. Já há tecnologia para fazer diamantes artificiais a partir da grafita, mas trata-se de um processo complexo e de alto custo, em que o valor do diamante depende do tamanho da pedra: 1 quilate corresponde a 0,20 grama de carbono. Com base nesses dados, responda às questões:

a) Qual seria o volume de grafita necessário para a obtenção de um diamante de 3,0 quilates, considerando que a densidade da grafita é igual a 2,0 g/cm³?

b) Considerando que a densidade do diamante é igual a 3,5 g/cm³, qual será o volume do diamante obtido?

Resolução

a) Se 1 quilate de diamante corresponde a 0,20 g, então 3,0 quilates correspondem a 0,6 g. Portanto, um diamante de 3,0 quilates tem massa igual a 0,6 g.

Dessa forma, a massa necessária de grafita também é igual a 0,6 g.

Sabendo que a densidade da grafita é igual a 2,0 g/cm³, temos que:

2,0 g —— 1 cm³

0,6 g —— V cm³

$V = 0{,}3$ cm³

Portanto, o volume de grafita necessário é 0,3 cm³.

b) Sabendo que a densidade do grafite é igual a 3,5 g/cm³, temos que:

3,5 g —— 1 cm³

0,6 g —— V cm³

$V = 0{,}17$ cm³

Portanto, o volume do diamante obtido é 0,17 cm³.

PROPRIEDADES DA MATÉRIA

Quando uma porção de água pura, em uma panela, ferve ao ser aquecida sobre a boca do fogão, podemos observar pelo menos dois fenômenos: o primeiro, a água líquida transformando-se em água gasosa, e o segundo, a combustão do gás de cozinha, que produz uma chama azul e fornece energia para o aquecimento da água. Essas duas transformações têm diferentes características.

A fervura (ebulição) não altera a composição da matéria água (ela continua sendo água) e ocorre a uma temperatura específica nas condições do aquecimento, o que corresponde a uma propriedade física da água.

Já a queima (combustão) do gás de cozinha implica uma alteração de composição, pois esse gás e o gás oxigênio se transformam em outros materiais. A combustibilidade é uma propriedade química do gás de cozinha.

As **propriedades químicas** de um material estão associadas à sua capacidade de se transformar em outro material. Uma propriedade química da gasolina, por exemplo, é a de se queimar em determinadas condições e, com isso, produzir energia e outros materiais.

Zoom-zoom/iStock/Getty Images

Durante a ebulição da água, em uma panela sobre a chama de um fogão a gás, ocorrem duas transformações facilmente identificáveis: a combustão (queima) do gás e a mudança de estado físico da água.

Não escreva no livro.

As **propriedades físicas** de um material são as que podem ser observadas ou medidas sem que ocorra modificação na composição do material. Alguns exemplos de propriedades físicas são: a cor, a dureza, o estado físico (sólido, líquido ou gasoso) e a densidade. Uma propriedade física do diamante, por exemplo, é ser sólido em condições ambientes.

As propriedades físicas podem ser **gerais** ou **específicas**.

Propriedades físicas gerais da matéria

Todos os materiais, independentemente de sua composição, apresentam massa e volume. Por isso, tanto a massa quanto o volume são classificados como **propriedades físicas gerais da matéria**. A medida de 1 quilograma pode representar a massa de qualquer material, bem como 1 litro pode ser associado ao volume de inúmeros materiais.

Outros exemplos de propriedades gerais são a impenetrabilidade (dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço) e a temperatura (corpos que estão em um mesmo ambiente apresentam a mesma temperatura depois de determinado tempo).

As propriedades gerais da matéria não permitem diferenciar os materiais.

Propriedades físicas específicas da matéria

O conhecimento da massa ou do volume de um objeto não permite a identificação do material de que ele é feito. Os materiais apresentam, porém, certas propriedades físicas – como densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, condutibilidades elétrica e térmica, cor, textura, sabor e cheiro – que variam de um material para outro. Essas são as **propriedades físicas específicas da matéria**. Cada material apresenta um **conjunto** exclusivo de propriedades específicas, o que possibilita sua identificação.

Cor, textura, sabor e cheiro são propriedades específicas chamadas de **organolépticas** – aquelas percebidas pelos órgãos dos sentidos. Em muitos casos, não é adequado tentar verificar todas essas propriedades para identificar certos materiais, porque há, por exemplo, gases tóxicos e líquidos letais que, assim como a água, são inodoros e incolores. Por isso, não devemos inalar nem ingerir ou manipular materiais de composição desconhecida.

Observe algumas propriedades físicas específicas da água neste quadro.

Estado físico a 25 °C e $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa	líquido
Temperatura em que a água ferve a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa	100 °C
Temperatura em que o gelo se funde a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa	0 °C
Densidade a 25 °C e $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa	1 g/cm^3
Propriedades organolépticas	incolor, inodora, insípida

Fonte de pesquisa: Gomes, A. S.; Clavico, E. Propriedades físico-químicas da água. Universidade Federal Fluminense, Departamento de Biologia Marinha, Niterói, 2005. Disponível em: http://ole.uff.br/wp-content/uploads/sites/290/2017/11/PropriedadesH2O.pdf. Acesso em: 20 set. 2024.

Ser líquida, incolor, inodora e insípida não é uma característica exclusiva da água. Podemos afirmar, entretanto, que ferver a 100 °C e congelar a 0 °C (em ambos os casos, a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa), ter densidade de 1 g/cm^3 a 25 °C e ser incolor, inodora e insípida correspondem a um conjunto de propriedades que pertencem somente à água.

Da mesma forma, uma pessoa pode ser reconhecida pelo conjunto de suas características: fisionomia, cor da pele, dos olhos e dos cabelos, impressões digitais e outros traços pessoais. É por isso que essas características são consideradas na expedição de documentos de identificação de uma pessoa, como cédula de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e carteira profissional.

ATIVIDADE RESOLVIDA

A pirita é um mineral que ficou conhecido como "ouro de tolo" por apresentar alguma semelhança com o ouro verdadeiro. Esse mineral não é um metal, mas apresenta a aparência de um cristal brilhante de cor dourada e, por isso, uma análise apenas visual pode confundi-lo com o metal precioso. Entretanto, é possível diferenciar uma amostra de pirita de uma de ouro mediante a análise de algumas das propriedades desses materiais.

Dentre as possibilidades apresentadas a seguir, indique quais seriam adequadas para a identificação das amostras. Justifique sua resposta.

I. Determinar a massa das amostras.

II. Determinar o volume das amostras.

III. Testar a condutibilidade elétrica das amostras.

Resolução

Das possibilidades apresentadas, apenas o teste de condutibilidade (item III) dos materiais poderia diferenciar as amostras. O ouro, por ser metal, é um bom condutor de corrente elétrica (apresenta condutividade elétrica). A pirita, por não ser um metal, não apresenta condutividade elétrica.

A massa (item I) e o volume (item II) são propriedades gerais da matéria que não caracterizam determinado material. Uma amostra de pirita pode ter a mesma massa ou um mesmo volume de uma amostra de ouro.

Propriedades extensivas e intensivas da matéria

As propriedades físicas podem ainda ser classificadas em extensivas ou intensivas. As **propriedades extensivas** variam conforme a quantidade do material contido na amostra. É o caso da energia liberada em uma combustão: duplicando, por exemplo, a quantidade de combustível, duplica-se a quantidade de energia liberada. As **propriedades intensivas** são as que não dependem da quantidade de material contido na amostra. É o caso da temperatura e da densidade, que não se alteram quando varia a quantidade de material.

ROTEIRO

2. **Classifique as propriedades citadas a seguir em extensivas ou intensivas.**

a) A temperatura em que o gelo derrete.

b) A cor do açúcar.

c) A densidade da gasolina.

d) A massa de um livro.

Intensivas: a, b e c. Extensiva: d.

Tim Winter/iStock/Getty Images

A massa e o volume são propriedades extensivas (dependem da quantidade da amostra). A densidade (relação entre massa e volume) é uma propriedade intensiva (não depende da quantidade da amostra analisada). Independentemente da quantidade de gelo presente na água líquida, ele flutua porque tem densidade menor que a da água do mar. *Iceberg* na Antártida. Foto de 2024.

Não escreva no livro.

Mudanças de estado físico

Uma observação atenta revela que a matéria, além de ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso, pode coexistir em mais de um estado físico. Isso ocorre nas **mudanças de estado físico** ou de **estados de agregação**.

Variações de temperatura e de pressão podem provocar mudanças de estado físico da matéria sem, contudo, alterar sua composição.

Se cubos de gelo forem retirados de um congelador e expostos à temperatura ambiente, depois de alguns instantes eles começam a derreter. Nesse caso, o gelo sofre **fusão** (passagem do estado sólido ao líquido). O processo inverso é denominado **solidificação**.

Quando a água líquida é colocada em aquecimento constante, em determinado momento começa a ferver, e bolhas de vapor de água saem do líquido. Trata-se da **ebulição** da água (passagem do estado líquido ao gasoso). Se uma tampa é colocada no recipiente que contém a água em ebulição, o vapor de água transforma-se em água líquida na superfície interna da tampa. A passagem do estado gasoso ao líquido por diminuição de temperatura ou por aumento de pressão recebe o nome de **condensação** ou **liquefação**.



AMj Studio/ID/BR

Esquema da mudança de estado físico da água. Lembre-se de que a água no estado gasoso não é visível. O que geralmente se vê, quando a fervemos, é uma névoa constituída de gotículas de água formadas pela condensação do vapor. Cores-fantasia.

Alguns materiais podem sofrer **sublimação**: passam diretamente do estado sólido ao gasoso. É o que acontece com a naftalina usada para combater traças. A naftalina sublima, deixando o armário impregnado com seu vapor. O processo inverso (a passagem direta do estado gasoso ao sólido) é chamado também de **sublimação** ou, ainda, de **ressublimação**. **Atenção**: A naftalina é tóxica.

Os processos que ocorrem com aquecimento (**absorção de calor**) são chamados de **endotérmicos**. É o caso da **fusão**, da **vaporização** e da **sublimação**.

Os processos que ocorrem com resfriamento (**liberação de calor**) são chamados de **exotérmicos**. É o que ocorre na **condensação** (ou **liquefação**), na **solidificação** e na **ressublimação**.

Gelo-seco

Gelo-seco é o nome popular do dióxido de carbono solidificado, muito utilizado como recurso de refrigeração. A temperatura na superfície de um bloco de gelo-seco é igual ou inferior a −78 °C. À medida que o gelo-seco é aquecido, ele se torna imediatamente gás de dióxido de carbono (gás carbônico), sem passar pelo estado líquido (ou seja, sofre sublimação).

Quando o ar quente circula sobre o gelo-seco, forma-se uma "nuvem branca", que, por ser mais densa que o ar, permanece ao nível do chão.

Frank Hammerschmidt/dpa/Alamy/Fotoarena

O gelo-seco é muito utilizado para produzir o efeito especial de nevoeiro em apresentações musicais e espetáculos teatrais, por exemplo.

Observações

1. **Os termos gás e vapor não são sinônimos. Todo vapor é gás, mas nem todo gás é vapor. Considera-se vapor um gás que pode passar para o estado líquido apenas por aumento de pressão, sem que seja necessária uma diminuição de temperatura.**
2. **A vaporização pode ocorrer em velocidades diferentes, dependendo da quantidade de energia envolvida. A evaporação corresponde a uma vaporização que se dá na superfície do líquido a uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição. A ebulição corresponde à vaporização com formação de bolhas quando o líquido atinge a temperatura de ebulição.**

Gráficos de mudança de estado físico

O acompanhamento dos valores de temperatura em função do tempo de aquecimento do gelo até sua total vaporização nos permite construir a curva de aquecimento da água, como veremos a seguir.

ID/BR



Diagrama de mudança de estado físico da água ou de curva de aquecimento da água.

AMj Studio/ID/BR



Os valores da temperatura de ebulição da água dependem da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura de ebulição. Cores-fantasia.

Curva de aquecimento da água

Considere uma amostra de água a −25 °C, retirada de um *freezer*, que é aquecida até alcançar a temperatura de 130 °C, sob pressão de $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa. A temperatura do sistema é medida em intervalos regulares de tempo, e os valores obtidos são usados para construir um gráfico de temperatura (em °C) em função do tempo de aquecimento (em minutos). Com esse procedimento, é possível construir um gráfico como o representado no gráfico (**A**).

Sob fornecimento de energia contínuo, a temperatura do gelo aumenta até atingir 0 °C, mas permanece constante durante todo o processo de fusão. Essa temperatura constante corresponde à **temperatura de fusão** (TF) do gelo. A temperatura do sistema (gelo + água líquida) não varia nesse período.

Terminada a fusão, a temperatura da água líquida aumenta até atingir 100 °C, quando se inicia a segunda mudança de estado físico: a ebulição. Graficamente, observa-se um segundo patamar paralelo ao eixo do tempo. Note que a temperatura do sistema também permanece constante durante todo o processo de passagem do estado líquido para o gasoso (vapor), pois a energia fornecida ao sistema é absorvida para converter todo o líquido em vapor. Essa temperatura é chamada de **temperatura de ebulição** (TE) da água.

Sob pressão constante, as temperaturas de fusão e de ebulição da água apresentam valores fixos. O tempo de aquecimento, entretanto, varia de acordo com a quantidade de matéria que está sendo aquecida.

3. Temperatura de condensação: 444,6 °C; temperatura de solidificação: 119 °C.

ROTEIRO

3. O gráfico a seguir (fora de escala) representa o que acontece com determinada quantidade de substância enquanto ela perde calor.

ID/BR



Identifique a temperatura de condensação e a temperatura de solidificação dessa substância.

Pontos zero e cem

Anders Celsius (1701-1744), astrônomo, físico e geofísico sueco, foi o primeiro cientista a associar a aurora boreal ao campo magnético da Terra. Ele também fez observações sobre eclipses e publicou um catálogo com um total de trezentas estrelas com os respectivos cálculos de magnitude.

Entretanto, Celsius tornou-se conhecido principalmente pela escala termométrica que hoje leva seu nome. Ele propôs utilizar uma escala de temperatura centígrada em termômetros de mercúrio na qual a temperatura de ebulição da água (à pressão atmosférica ao nível do mar) fosse zero e a temperatura de solidificação da água fosse 100 graus. O também sueco Carl Linnaeus (1707-1778), médico e botânico, sugeriu a inversão da escala centígrada (zero grau Celsius para a temperatura de solidificação e 100 graus Celsius para a de ebulição), e é dessa forma que essa escala é utilizada até hoje.

Celsius popularizou o termômetro de mercúrio. Esse metal não adere ao vidro, sua aparência permite uma leitura fácil e sua expansão térmica é uniforme, podendo ser utilizado para medir amplas faixas de temperatura. Hoje, a fabricação e a comercialização desse tipo de termômetro são proibidas, pelo fato de o mercúrio ser um metal altamente tóxico.

Não escreva no livro.

Duas maneiras de diferenciar líquidos

De que modo pode-se diferenciar e identificar líquidos visualmente parecidos? É o que você e os colegas vão descobrir neste experimento em duas partes, por meio de aquecimento das amostras e da proposta de uma abordagem experimental.

Material

- béquer de 500 mL
- 2 copos de vidro transparente
- termômetro que meça temperaturas até 110 °C
- suporte de ferro com garra
- tripé com tela de amianto*
- bico de Bunsen ou lamparina
- água de torneira (d = 1 g/cm³)
- sal de cozinha (d = 2,7 g/cm³)
- 2 batatas pequenas (d = 1,1 g/cm³)
- bastão de vidro

* O material que compõe a chamada tela de amianto atualmente é a cerâmica, embora o nome antigo tenha sido mantido.

Equipamentos de segurança

Avental de algodão com mangas compridas e óculos de segurança.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Parte da aparelhagem usada durante o experimento. Observe a posição em que deve ficar o termômetro.

Como fazer

Parte A – Elaboração de curva de aquecimento de líquidos

ATENÇÃO!
O aquecimento deve ser feito pelo(a) professor(a).

1. Adicione 200 mL de água de torneira ao béquer e, em seguida, coloque-o sobre a tela de amianto sustentada pelo tripé de ferro.
2. Prenda o termômetro de maneira que o bulbo fique abaixo do nível da água. Espere 5 minutos para que o sistema atinja o equilíbrio térmico e anote a temperatura inicial da água.

ATENÇÃO!
Não aproxime o bulbo do termômetro do fundo do recipiente.

3. Observe o(a) professor(a) iniciar o aquecimento da água sobre a chama do bico de Bunsen. Ele(a) deve agitar o sistema com o bastão de vidro, tomando cuidado para não batê-lo no termômetro.
4. Anote as temperaturas em intervalos de 1 minuto. Determine a temperatura de ebulição da água.
5. Registre a temperatura do sistema por 5 minutos após o início da ebulição.
6. Adicione uma colher (de sopa) bem cheia de sal de cozinha à água em ebulição. Anote como o sistema se comporta após essa adição. Acompanhe o aquecimento e anote a temperatura de ebulição.
7. Registre a temperatura por 5 minutos após o início da ebulição.
8. Construa os gráficos de aquecimento da água de torneira e da água salgada: T (°C) × tempo (min).

Resíduo

A mistura de água e sal de cozinha pode ser despejada na pia.

Parte B – Identificação experimental de duas amostras líquidas incolores

Na parte **A**, verificamos a possibilidade de diferenciar experimentalmente dois líquidos (água de torneira sem adição de sal e com adição de sal) por meio de aquecimento. Agora, em grupo, você e os colegas vão propor um método para identificar as duas amostras – água de torneira e água salgada utilizando apenas dois copos pequenos e duas batatas pequenas, sem utilização de aquecimento.

IMPORTANTE!
Não se deve comer, beber, tocar ou cheirar as amostras de materiais no laboratório.

Para concluir

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1 **Descreva o procedimento proposto pelo grupo para diferenciar a água da torneira da água salgada (parte B) e faça um desenho esquemático da observação experimental.**

2 **O procedimento proposto foi adequado? Por quê?**

2. Resposta variável. Caso o esperado não tenha sido observado, discuta com os estudantes o que pode ter acontecido. Peça a eles que repitam o procedimento com a adição de maior quantidade de sal à água salgada.

SISTEMAS

A natureza apresenta grande diversidade de materiais. É preciso analisar a composição e as propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados ou transformados nos mais diversos objetos.

Para facilitar a análise dos materiais, os cientistas delimitam uma porção do universo que é o foco da análise e recebe o nome de **sistema**.

O estado de um sistema é descrito pelas propriedades gerais e específicas dos materiais que o compõem, incluindo as condições de pressão e de temperatura em que se encontram.

Sistemas homogêneo e heterogêneo e fases

Um sistema pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo, dependendo de seu aspecto. Uma porção de água filtrada apresenta um único aspecto em todos os seus pontos e, por isso, corresponde a um sistema homogêneo. Uma amostra de granito não apresenta aspecto uniforme em sua extensão e corresponde a um sistema heterogêneo. Cada um dos diferentes aspectos observados em um sistema é chamado de **fase**.

Fase é uma porção do sistema que apresenta as mesmas características em todos os seus pontos, sendo, portanto, de aspecto uniforme mesmo quando observada ao microscópio comum.

O **sistema homogêneo** apresenta aspecto uniforme e as mesmas características em toda a sua extensão. Esse sistema é monofásico (constituído de uma única fase).

O **sistema heterogêneo** apresenta aspectos e características diferentes em sua extensão. Esse sistema pode ser formado por duas fases (bifásico), por três (trifásico) ou por mais fases (polifásico).

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Michal812/Shutterstock.com/ID/BR

A gasolina (à esquerda) é um exemplo de sistema homogêneo; o granito (à direita) é um exemplo de sistema heterogêneo.

QUÍMICA E FÍSICA

Diferentes tipos de sistema

Durante a queima da madeira, além do consumo de oxigênio do ambiente, há liberação de outros gases e de energia. Trata-se de um **sistema aberto**, pois ocorre troca de materiais e de energia com o ambiente. Um pedaço de madeira queimando é um exemplo de sistema aberto, pois nele ocorre troca de matéria e de energia com o ambiente.

Em um **sistema fechado** não há troca de materiais com o ambiente. É o caso de um termômetro, em que há troca de energia, mas não de materiais com o ambiente.

O **sistema isolado (adiabático)** é aquele que não permite troca de matéria nem de energia com o ambiente. Um exemplo que se aproximaria de um sistema isolado seria um líquido quente (ou gelado) dentro de uma garrafa térmica, mas sabemos que nele há troca lenta de energia com o ambiente porque a temperatura não se mantém.

1. Na prática, é possível construir um sistema totalmente isolado? Explique.

1. Não é possível construir um sistema totalmente isolado, mas é possível construir sistemas com trocas muito pequenas de massa e de calor com o ambiente.

Apesar de a classificação visual ser de grande importância para definir se um sistema é homogêneo ou heterogêneo, a observação a olho nu nem sempre é confiável. O leite, por exemplo, tem aparência homogênea a olho nu, mas, quando visto ao microscópio, apresenta pequenas porções de gordura dispersas no líquido e, portanto, constitui um sistema heterogêneo.

A água é o componente que se encontra em maior quantidade no leite e nela estão dissolvidos ou dispersos vários outros elementos. A gordura, um de seus componentes mais ricos, pode ser retirada do leite por

Não escreva no livro.

ter menor densidade e ser utilizada para fazer manteiga, creme de leite e produtos diversos. A cor esbranquiçada do leite se deve às suas proteínas, muito importantes na produção de queijos, ricota e outros derivados. A lactose é responsável pelo sabor adocicado. O leite fornece as vitaminas A, C, D, E, K e várias do complexo B, fundamentais ao nosso organismo. Além disso, ele contém vários sais minerais, sendo excelente fonte de cálcio, importante na formação de ossos e dentes.



DimaSobko/iStock/Getty Images

Eye Of Science/SPL/Fotoarena

Leite visto a olho nu e, no detalhe, ao microscópio (imagem colorizada; aumento de cerca de 330 vezes).

SUBSTÂNCIAS PURAS E MISTURAS

Muitos materiais são formados por várias substâncias. A gasolina, por exemplo, é composta de diferentes substâncias combustíveis, e sua composição depende de sua procedência. A de origem árabe contém diferentes teores dessas substâncias, em comparação com a gasolina produzida no Brasil ou na Rússia, por exemplo.

A água pura, ou simplesmente água, apresenta a mesma composição, onde quer que tenha sido obtida.

Substâncias puras

Se montássemos uma aparelhagem para recolher o vapor de água formado durante o aquecimento da água mineral, da água de um rio ou de qualquer outra fonte e o condensássemos, obteríamos somente a água, também denominada **água destilada**. A água obtida dessa forma apresenta várias propriedades com valores definidos, tais como densidade, temperatura de fusão (TF) e temperatura de ebulição (TE). A água é identificada por esse conjunto de propriedades.

O cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha, também apresenta sempre características próprias: é formado por pequenos cristais brancos, tem sabor característico (salgado), e sua densidade, temperatura de fusão e de ebulição e outras propriedades são constantes. Esse conjunto de propriedades caracteriza o cloreto de sódio, seja ele obtido da água do mar ou de minas terrestres.

PROPRIEDADES			
Substâncias	**Densidade (g/cm^3) a 25 °C**	**TF (°C) a $1,0 \cdot 10^5$ Pa**	**TE (°C) a $1,0 \cdot 10^5$ Pa**
água	1,0	0	100
cloreto de sódio	2,17	801	1 465

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

A água destilada e o cloreto de sódio são exemplos de substância química. As propriedades constantes decorrem do fato de apresentarem composição fixa. **Substância química** (ou apenas **substância**) é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido e constante, e tem composição fixa, independentemente da origem ou forma de obtenção.

O conjunto de propriedades físicas específicas (temperatura de fusão e de ebulição, densidade, solubilidade, entre outras) é usado para identificar uma substância química e não depende da quantidade da amostra analisada.

ROTEIRO

4. Cada substância tem um conjunto único de propriedades constantes e específicas que permitem sua identificação. No entanto, praticamente todos os materiais encontrados na natureza são misturas de substâncias, e as propriedades variam de acordo com a composição. Sobre a composição dos sistemas, responda às questões:

a) Um sistema homogêneo pode ser formado por várias substâncias? Justifique.

b) Um sistema heterogêneo pode ser formado por uma única substância? Justifique.

4. a) Sim, no caso de uma mistura homogênea. **b)** Sim, pois o sistema pode ser formado por uma única substância em estados físicos diferentes.

RusN/Stock/Getty Images

Amostra de cristais de cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha.

Misturas

GaiBru Photo/Shutterstock.com/ID/BR

Bolsa de soro fisiológico usada em hospitais e prontos-socorros para casos de desidratação.

Quando uma substância é adicionada a outra, ambas deixam de ser puras e passam a ser as substâncias de um novo sistema chamado de **mistura**. Na natureza, praticamente todos os materiais são misturas. As propriedades das misturas variam conforme a proporção de cada componente.

O soro fisiológico, por exemplo, é uma mistura que contém 0,9 g de cloreto de sódio em 100 mL de água.

As salmouras são misturas de sal comum que, além de cloreto de sódio – principal componente nelas dissolvido –, contêm cloreto de magnésio, iodato de potássio, antiumectantes e água (em maior quantidade).

Sistema	Classificação	Composição	Número de substâncias
soro fisiológico	homogêneo	0,9 g de cloreto de sódio + 100 mL de água	2
salmoura	homogêneo	36 g de sais + 100 mL de água	várias

Se excesso de sal for adicionado à salmoura em temperatura ambiente e sob agitação, haverá depósito de sal não dissolvido no fundo do frasco. Essa mistura passa então a ser **heterogênea**, por apresentar mais de uma fase. As misturas **homogêneas** (**soluções**) apresentam uma única fase.

Fases e substâncias de uma mistura

Em uma mistura, cada constituinte corresponde a um componente.

- **Água, álcool e um pedaço de ferro:** mistura heterogênea formada por três componentes e duas fases (sistema bifásico). Água e álcool correspondem a uma fase; o ferro, a outra.
- **Água salgada, álcool, óleo e sal não dissolvido:** mistura heterogênea de quatro componentes e três fases (sistema trifásico). Uma fase é formada por água salgada e álcool. O óleo forma outra fase. O sal não dissolvido, mais uma fase.
- **Água líquida e água sólida (gelo):** sistema heterogêneo de um componente e duas fases (sistema bifásico). Uma fase é constituída de água líquida; a outra, de água sólida.

Misturas gasosas

O ar filtrado e seco é uma mistura homogênea. Ele é formado principalmente por nitrogênio, oxigênio e argônio. Nele também são encontrados outros gases (como o gás carbônico) em pequenas porcentagens.

Todas as misturas gasosas são homogêneas. Mesmo que um dos gases seja colorido, depois de algum tempo as substâncias gasosas se misturam uniformemente, formando uma mistura homogênea.

Misturas líquidas

As misturas líquidas podem ser homogêneas ou heterogêneas.

Água e óleo, por exemplo, formam um **sistema heterogêneo** (são **líquidos imiscíveis** – que praticamente não se dissolvem um no outro). Água e álcool compõem um **sistema homogêneo** (**líquidos miscíveis** – que se dissolvem um no outro). Observe essas misturas nas fotos ao lado.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Aspectos das misturas de água e óleo (**A**) e de água e álcool (**B**).

Misturas sólidas

Ligas metálicas são misturas sólidas homogêneas. Latão (mistura de cobre e zinco), bronze (mistura de cobre e estanho) e aço (mistura de ferro e carbono) são alguns exemplos de ligas metálicas.

Não escreva no livro.

SUBSTÂNCIAS SIMPLES E SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS

Substância pura é aquela que tem uma composição fixa e um conjunto de propriedades específicas e constantes, que permite sua identificação. Essa composição fixa pode ser representada por uma fórmula química, que indica o(s) elemento(s) químico(s) presente(s) na substância e a sua proporção. Por exemplo, você já deve ter visto que a fórmula química da água é H_2O e também deve saber que o gás oxigênio é representado pela fórmula química O_2.

As substâncias puras podem ser compostas ou simples. As compostas, formadas por dois ou mais elementos químicos, se decompõem, produzindo outras substâncias. As simples, formadas por um único elemento químico, não sofrem decomposição.

A água, uma **substância composta**, se decompõe em determinadas condições – por exemplo, ao passar por um processo de eletrólise (fornecimento de energia à água) –, produzindo os gases hidrogênio e oxigênio.

$$\text{água líquida} \xrightarrow{\text{eletrólise}} \text{gás hidrogênio} + \text{gás oxigênio}$$

Já os gases hidrogênio e oxigênio, que são **substâncias simples**, não sofrem decomposição, mesmo sob a ação de calor, de luz, de eletricidade ou de qualquer manipulação química.

Substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos e sofrem decomposição, produzindo outras substâncias menos complexas. Exemplos: a água (H_2O), o cloreto de sódio ($NaC\ell$) e a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$).

Substâncias simples são formadas por um único elemento químico e não sofrem decomposição. Exemplos: o gás oxigênio (O_2), o ferro metálico (Fe) e o mercúrio líquido (Hg).

Comparação entre curvas de aquecimento de substâncias e misturas

Durante as mudanças de estado físico de uma substância pura, a temperatura permanece constante. Dizemos que existe um único valor para a temperatura de fusão e um único valor para a temperatura de ebulição.

Quando se coloca certa quantidade de salmoura (mistura de água e sal) no congelador, verifica-se que, sob pressão de $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa, o congelamento se inicia a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão da água (0 °C). A temperatura não permanece constante durante o congelamento, isto é, apresenta uma faixa de temperaturas de solidificação.

Quando se aquece a salmoura ao nível do mar, o sistema começa a ferver a uma temperatura superior à temperatura de ebulição da água (100 °C). A temperatura não permanece constante durante a ebulição, isto é, apresenta uma faixa de variação. Os valores iniciais da temperatura de ebulição dependem da proporção entre as quantidades de sal e água.

Os gráficos a seguir representam a curva de aquecimento, sob pressão de $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa, de uma amostra de gelo (**A**) e de uma mistura de água e sal (**B**). Observe que as temperaturas de fusão e ebulição de uma substância pura permanecem constantes durante o aquecimento.



Curva de aquecimento da água (**A**) e de uma mistura de água e sal (**B**). Note que as temperaturas de fusão e ebulição da mistura não permanecem constantes.

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DOS MATERIAIS E SEPARAÇÃO DE MISTURAS

Separação de misturas heterogêneas

Quase todos os materiais extraídos da natureza ou que estão ao nosso redor são formados por misturas de substâncias. Sem percebermos, em nosso cotidiano, usamos vários métodos de separação dessas misturas. Observe algumas misturas heterogêneas apresentadas a seguir.

Exemplos de misturas heterogêneas	
I	Feijão + pedrinhas
II	Areia fina + areia grossa
III	Grãos de café + folhinhas secas
IV	Pó de café + água quente
V	Grãos de ferro + areia

Neste outro quadro, apresentamos cinco métodos usados para a separação de misturas heterogêneas.

Método de separação	
A	Separação magnética (com ajuda de ímã)
B	Filtração (com ajuda de funil e papel de filtro)
C	Catação (por diferença visual entre os sólidos)
D	Peneiração (com uso de peneira)
E	Ventilação (com a ajuda de corrente de ar)

A separação de misturas heterogêneas é relativamente fácil e, certamente, alguns métodos usados nesse processo são muito familiares. Tente relacionar os métodos apresentados no segundo quadro com a separação das misturas **I** a **V** do primeiro quadro. Troque ideias com os colegas e, se precisar, peça ajuda ao(à) professor(a).

As imagens a seguir mostram os processos usados para a separação das misturas.

Alexandre Dotta/Science Source/Fotoarena

Com o uso de um ímã, os grãos de ferro são atraídos e separados da areia. A separação magnética é o método mais indicado para separar o ferro e outros metais com propriedades magnéticas de materiais que não são atraídos por ímãs.

Rabizo/Stock/Getty Images

Ao preparar o café coado, é feita uma filtração, em que o pó fica retido no papel-filtro e o líquido é recolhido em um recipiente. O coador de plástico faz a mesma função que o funil em uma filtração feita em laboratório.

Fernando Favoretto/Criar Imagem

A catação do feijão é feita para separar impurezas, sujeiras ou outros grãos antes do preparo do alimento. Nesse método, os componentes da mistura precisam ser grandes o suficiente para serem selecionados com as mãos.

A peneiração é um método usado para separar materiais com grãos de tamanhos diferentes. No caso da areia fina e da areia grossa, o tamanho dos grãos não permite que essa separação seja feita por catação, por exemplo.

Dirceu Portugal/Fotoarena

Sergio Ranalli/Pulsar Imagens

Durante a colheita do café, muitas folhas são recolhidas com os grãos. Durante a ventilação, uma corrente de ar leva as folhas, enquanto os grãos de café, que são mais pesados, voltam para a peneira.

Não escreva no livro.

A figura (**A**) mostra a aparelhagem usada no laboratório para fazer a filtração e separar o sólido pulverizado (em pó) de um líquido. Quando as partículas sólidas são muito pequenas, o processo de filtração pode ser acelerado com a filtração a vácuo (**B**), em que a mistura heterogênea sólido-líquido, colocada sobre o papel-filtro em um funil especial (funil de Büchner), é submetida a uma baixa pressão, promovendo a sucção do líquido para um recipiente específico (kitassato) utilizado.

Aparelhagem usada em laboratório para filtração comum. Cores-fantasia.



Ilustrações: Reinaldo Vignati/ID/BR

Representações sem proporção de tamanho.

Aparelhagem para a filtração a vácuo. Cores-fantasia.

Quando há nítida diferença de solubilidade e de densidade entre os componentes da mistura, que permite visualizar o nível de separação entre as fases, podemos separá-los por sifonação (figura **C**) ou decantação. Esses métodos também são usados para separar líquidos imiscíveis (pouco solúveis um no outro), que apresentam diferentes densidades, como é o caso de água e óleo. Quando colocados em um funil de decantação (ou de separação), o líquido mais denso, sob a ação da gravidade, desce e é escoado para outro frasco, como mostra a figura **D**.

Um outro método de separação de misturas usado quando há diferença de densidade entre os componentes é a **centrifugação**. A centrífuga é um aparelho que acelera o processo de sedimentação, pois, ao girar a mistura em alta velocidade, o componente mais denso é "arremessado" ao fundo ou à lateral do recipiente, sedimentando-o. Como exemplo, podemos citar a separação, por centrifugação, do sangue total em frações, de acordo com as diferentes densidades e tamanhos das células sanguíneas:

- Concentrado de hemácias: parte do sangue que contém os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo corpo. É utilizado para pacientes com anemia ou que tiveram hemorragias.
- Concentrado de plaquetas: é fundamental no processo de coagulação, contribuindo para o controle de hemorragias ou de plaquetas funcionalmente anormais.
- Plasma: contém componentes importantes como albumina, fibrinogênio, fatores de coagulação, anticorpos (que protegem contra infecções), vitaminas e sais minerais.

A transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante, que pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. Embora a transfusão de sangue total ainda ocorra ocasionalmente em circunstâncias muito especiais, a tendência da medicina transfusional é utilizar o componente sanguíneo indicado para o tratamento da deficiência específica do paciente.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Separação de sólido (terra) e líquido (água) por meio de sifonação. Esse método também é usado para separar líquidos imiscíveis, como água e óleo.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Funil de decantação usado na separação de líquidos imiscíveis de densidades diferentes. Cores-fantasia.

Okrasiuk/Shutterstock.com/ID/BR

Nixx Photography/Shutterstock.com/ID/BR

O sangue é fracionado por centrifugação (**E**). Em destaque (**F**), amostras de sangue antes de passar pela centrífuga (à direita) e depois do procedimento (à esquerda).

ROTEIRO

5. Associe o método de separação mais adequado a cada uma das misturas listadas.

I. Filtração.
II. Peneiração.
III. Decantação.
IV. Separação magnética.
V. Catação.

a) Pedaços de plástico e de papel.
b) Água e gasolina.
c) Poeira e ar atmosférico.
d) Açúcar refinado e açúcar cristal.
e) Pó de ferro e farinha de trigo.

I-c; II-d; III-b; IV-e; V-a.

Ainda sobre processos de separação de misturas com diferenças de densidade entre componentes, temos a **levigação**. Esse método usa a água corrente para "carregar" sólidos de baixa densidade, enquanto os mais densos permanecem depositados no fundo do recipiente. É usado por garimpeiros para separar o ouro do barro, por exemplo. Por ter menor densidade, o barro é arrastado pela água corrente, enquanto o ouro permanece no fundo de um tipo de bacia chamada bateia. A propósito, muitos garimpos ilegais têm causado grandes impactos ambientais e altos níveis de contaminação de rios e de solos por mercúrio, com graves consequências à saúde e à rotina da população local.

Paulo Santos/Reuters/Fotoarena

Luciana Whitaker/Pulsar Imagens

(**A**) Garimpeiro usando a bateia para separar a lama do ouro por meio da levigação. (**B**) Ouro obtido no final do processo de separação.

QUÍMICA E GEOGRAFIA

Yanomamis de nove aldeias assediadas pelo garimpo estão contaminados por mercúrio

Uma pesquisa realizada com indígenas do povo Yanomami, do subgrupo Ninam, de nove aldeias localizadas em Roraima, mostrou que todos os participantes estão contaminados por mercúrio. Os maiores níveis de exposição foram detectados em indígenas que vivem nas aldeias localizadas mais próximas aos garimpos ilegais de ouro. [...]

"Esse cenário de vulnerabilidade aumenta exponencialmente o risco de adoecimento das crianças que vivem na região e, potencialmente, pode favorecer o surgimento de manifestações clínicas mais severas relacionadas à exposição crônica ao mercúrio, principalmente nos menores de 5 anos", explica o coordenador do estudo, Paulo Basta, médico e pesquisador da Ensp[Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca]/Fiocruz.

O estudo realizou as coletas na região do Alto Rio Mucajaí, em outubro de 2022. O local é alvo do garimpo ilegal há décadas, o que vem causando destruição ambiental, insegurança, violência e prejuízos à saúde dos indígenas. "O garimpo é o maior mal que temos hoje na Terra Yanomami. É necessária e urgente a desintrusão, a saída desses invasores. Se o garimpo permanece, permanece também a contaminação, [a] devastação, doenças como malária e desnutrição e isso é o resultado dessa pesquisa, é a prova concreta!", enfatiza o vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami (HAY), Dário Vitório Kopenawa.

[...]

YANOMAMIS de nove aldeias assediadas pelo garimpo estão contaminados por mercúrio. Portal Fiocruz, 3 abr. 2024. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/2024/04/yanomamis-de-nove-aldeias-assediadas-pelo-garimpo-estao-contaminados-por-mercurio. Acesso em: 29 maio 2024.

1. Além da contaminação por mercúrio da água, do solo e de pessoas, quais outras consequências socioeconômicas e ambientais podem ser associadas ao garimpo ilegal?

O garimpo ilegal causa destruição ambiental, insegurança, violência e prejuízos à saúde dos indígenas.

Não escreva no livro.

Tratamento da água

A decantação também é uma das etapas do tratamento da água. Em uma estação de tratamento de água (ETA), ocorrem diversas fases, cada uma com uma finalidade e um rígido controle de dosagens de produtos químicos e padrões de qualidade. Assim que é captada do manancial, a água recebe uma adição de cloro para facilitar a retirada de material orgânico e de metais. Em seguida, a água passa, de acordo com a sequência mostrada na ilustração, pelas fases:

- **Coagulação e floculação**: adição de sulfato de alumínio ou cloreto de ferro e cal, que são substâncias que aglutinam as impurezas para a formação dos flocos de sujeira.
- **Decantação**: a água passa por grandes tanques de água para separar os flocos de sujeira, formados na etapa anterior, que, então, se depositam no fundo dos tanques.
- **Filtração**: a água atravessa tanques contendo pedras, areia e carvão, que são responsáveis por reter a sujeira que não foram separadas na decantação.
- **Desinfecção**: é feita uma última adição de cloro para garantir que a água chegue isenta de bactérias e vírus até a casa do consumidor.
- **Fluoretação**: adição de flúor à água para prevenir cáries nos dentes.

PARA EXPLORAR

Assista

Como é feito o tratamento de água

O vídeo do canal Manual do Mundo (2017) mostra como é feito o tratamento da água captada na represa do Guarapiranga, na cidade de São Paulo. Duração: 7 min 35 s.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cWBSFOVyiMI&ab. Acesso em: 12 jun. 2024.

Reinaldo Vignati/ID/BR



Representação sem proporção de tamanho.

1. O poder público deve manter uma estrutura de tratamento e distribuição de água para a população. Em locais em que isso não é possível, como muitas zonas rurais, devem ser construídos reservatórios, como açudes ou poços artesianos. A qualidade da água nesses locais deve ser monitorada, e a população local deve ser capacitada para fazer o tratamento caseiro dessa água antes do consumo.

Representação esquemática dos processos utilizados no tratamento de água.

Fonte de pesquisa: Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo (Sabesp). Tratamento de água. Sabesp, [20--]. Disponível em: https://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=47. Acesso em: 28 maio 2024.

AÇÃO E CIDADANIA

Canudo da vida

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 2 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso a água potável. Soluções simples e eficientes de combate a esse fato têm sido propostas, como o *lifestraw* ("canudo da vida", em inglês), um tubo de plástico que filtra a água suja e contaminada conforme ela passa por uma série de fibras longas, tornando-a, então, potável. Ao sugar a água contaminada por uma das extremidades do canudo, antes de chegar à boca, 99,9% de parasitas e bactérias, que causam cólera, febre tifoide e diarreia, ficam presos em seu sistema de filtragem. Seu inventor, o dinamarquês Mikkel V. Frandsen, ajudou a combater a doença do verme de Guiné em países da África ao doar 37 milhões de unidades desses canudos, o que reduziu os casos da doença de 3,5 milhões, em 1986, para poucas dezenas, em 2018.

Robert Pavsic/Stock/Getty Images

Com o canudo da vida, é possível beber água diretamente de um curso de água.

Fontes de pesquisa: 46% da população global vive sem acesso a saneamento básico. *ONU News*, [*s. l.*], 22 mar. 2023. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2023/03/1811712; Gorvett, Z. O canudo que permite beber água suja de esgoto sem ficar doente. *BBC News Brasil*, [*s. l.*], 20 abr. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-43646495. Acessos em: 21 ago. 2024.

1. Além de iniciativas como a distribuição do *lifestraw*, o que o poder público deve fazer para garantir à população o acesso a água potável?

Dissolução fracionada

Suponha agora a seguinte situação: você está acampando na praia e deixa cair na areia o sal de cozinha que levou para preparar a comida. E agora, como separar o sal da areia?

Você poderá fazer, inicialmente, uma **dissolução fracionada**, método que pode ser usado quando há diferença de solubilidade entre os sólidos da mistura e um solvente. No caso, a adição de água à mistura implicará a dissolução apenas do sal e, fazendo uma filtração, você poderá separar a areia que ficará retida no filtro, passando por ele a água salgada.

E o que fazer para separar o sal da água? Em uma panela, a água salgada poderá ser aquecida até vaporizar completamente, restando apenas o sal no fundo da panela, sólido com elevada temperatura de fusão.

Nessa situação, não havia necessidade de recuperar a água, apenas o sal. Contudo, muitas vezes, precisamos separar e recuperar todos os componentes de uma **mistura líquida homogênea**. É o que veremos a seguir.

Separação de misturas homogêneas

Destilação simples

Esse processo é aplicado para separar os componentes de misturas formadas, geralmente, por um líquido e um sólido não volátil (sólido que não vaporiza facilmente) – por exemplo, a mistura de água e sal de cozinha do exemplo anterior. O processo é exemplificado na figura **A**.

Quando a mistura é aquecida, o líquido entra em ebulição e os vapores formados no balão de destilação passam para um aparelho chamado **condensador**. Em contato com as paredes frias do condensador, o vapor transforma-se em líquido novamente e é recolhido em um frasco. Se o sólido obtido no balão ainda contiver um pouco de líquido, pode-se secá-lo em uma estufa.

Destilação fracionada

A destilação fracionada é utilizada para separar misturas contendo dois ou mais líquidos miscíveis, que apresentem temperaturas de ebulição (TE) não muito próximas. Essa técnica é empregada quando se deseja obter componentes mais puros ou misturas que contenham poucos componentes. Utiliza-se a destilação fracionada, por exemplo, no refino do petróleo, em que se obtêm diversas frações, dentre elas gasolina e óleo *diesel*, constituídas de diversas substâncias.

A aparelhagem usada nesse processo é mostrada na figura **B**. Os vapores formados durante o aquecimento da mistura entram na coluna de fracionamento. Os componentes menos voláteis (os que têm temperatura de ebulição mais alta) se condensam, retornando ao balão. Os mais voláteis atravessam a coluna e se condensam ao passar pelo condensador, e são recolhidos no erlenmeyer na forma líquida.

Ilustrações: Reinaldo Vignati/ID/BR



Esquema de destilação simples. Cores-fantasia.



Esquema de destilação fracionada. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa (**A** e **B**): Destilação. Centro de Educação Superior à Distância. Universidade Federal de Sergipe, [20--]. Disponível em: https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalago/10344804042012Quimica_Organica_Experimental_Aula_5.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

Destilação por arraste a vapor

A destilação por arraste a vapor é uma técnica bastante utilizada para extrair óleos essenciais de plantas, folhas, raízes, etc. Nesse processo, a amostra vegetal geralmente é triturada e colocada em um balão contendo água. Sob aquecimento, os óleos se desprendem do interior das células vegetais e vaporizam junto com a água. Os vapores formados passam pelo condensador e o líquido é recolhido em outro frasco. Como os óleos essenciais são imiscíveis em água, o líquido formado é bifásico e os óleos podem ser separados da água por decantação.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

JARDINS FILTRANTES

Um jardim filtrante é um tipo de jardim desenvolvido para purificar parte do esgoto residencial. Nesses jardins, são tratadas as águas provenientes de pias, tanques e chuveiros, ricas em sabões, detergentes, restos de alimentos e gorduras, conhecidas como águas cinzas.

O esgoto proveniente dos vasos sanitários, conhecido como águas negras, deve ser destinado a uma estação de tratamento de esgotos ou descartado em uma fossa séptica.

Nos jardins filtrantes, a descontaminação da água é feita por plantas aquáticas flutuantes ou parcialmente imersas. Nas raízes dessas plantas vivem microrganismos que decompõem as substâncias poluentes presentes nas águas cinzas. Após passarem por essa filtragem realizada pelas raízes das plantas, as águas podem se reintegrar ao ambiente sem causar poluição ou contaminação.

As águas que passam pelo jardim filtrante também podem ser reutilizadas para fins não potáveis, como irrigação de jardins e lavouras, lavagem de ruas e pátios, uso no vaso sanitário, etc.

Pedro Hernandes/EMBRAPA/SCT

Jardim filtrante em unidade da Embrapa. Foto de 2022.

Além da despoluição da água e do tratamento do esgoto, o jardim filtrante melhora o aspecto paisagístico, pois muitas das plantas usadas nesse processo têm características ornamentais.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolveu pesquisas para adaptar a implantação de jardins filtrantes em propriedades rurais.

Nesse caso, é construído um pequeno lago impermeabilizado, com pedras, areia e plantas aquáticas, que realiza o tratamento das águas cinzas. O jardim filtrante complementa o uso de outras duas tecnologias criadas pela empresa: a fossa séptica biodigestora, que faz o tratamento das águas negras, e o clorador Embrapa, que auxilia na descontaminação da água captada de rios, lagos ou poços artesianos, reduzindo o risco de a população rural ser exposta a doenças como hepatite, diarreia, tifo, giardíase, entre outras.

Fontes de pesquisa: Embrapa. Jardim filtrante. Tecnologias. Portal Embrapa, Brasília, DF, [20--]. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/7417/jardim-filtrante; Ecotelhado. Jardim filtrante: o que é, como funciona e seus benefícios. Ecotelhado, [*s. l.*], 19 maio 2023. Disponível em: https://ecotelhado.com/blog/jardim-filtrante-o-que-e-como-funciona-e-seus-beneficios/. Acessos em: 20 set. 2024.

Para discutir

1. Um jardim filtrante é composto de plantas aquáticas flutuantes ou parcialmente imersas que fazem a descontaminação da água. Nas raízes dessas plantas vivem microrganismos que decompõem as substâncias poluentes presentes nas águas cinzas. Se essa água for descartada em um jardim comum, ocorrerá a contaminação do solo e o desenvolvimento das plantas será prejudicado, podendo ocasionar até sua morte.

1 **O que diferencia um jardim filtrante de um jardim comum?**

2 **O que pode ser feito com a água purificada pelo jardim filtrante? Essa água é potável?**

2. A água descontaminada pelo jardim filtrante não é potável. No entanto, essa água é limpa o suficiente para reintegrar rios, lagos e mares. Também pode ser usada na irrigação de jardins e lavouras, na lavagem de ruas e pátios, no vaso sanitário, etc.

3 **Podemos afirmar que os jardins filtrantes trazem benefícios que vão além do tratamento da água? Reúnam-se em grupos para discutir sobre essa questão e, depois, apresentem à turma as conclusões a que chegaram.**

Respostas pessoais. Os estudantes podem citar o aspecto paisagístico e a economia de água proporcionada pela utilização da água de reúso.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 A tabela a seguir apresenta os valores de algumas propriedades físicas de quatro substâncias, sob a mesma pressão.

Substância	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)	Densidade (g/cm³)
Água	0,0	100,0	1,000
Acetona	– 94,8	56,2	0,791
Álcool	– 114,5	78,4	0,789
Naftalina	80,2	218,5	1,145

Analisando-se os dados da tabela, assinale a alternativa correta sobre as substâncias consideradas.

a) As quatro substâncias encontram-se no estado líquido na temperatura ambiente.

b) O líquido mais volátil na temperatura ambiente é o álcool.

c) A densidade é a propriedade mais indicada para diferenciar acetona de álcool.

d) A naftalina é sólida na temperatura ambiente e flutua na superfície da água.

e) A naftalina é a única substância sólida na temperatura ambiente dentre as quatro substâncias apresentadas na tabela.

Resolução

Alternativa **e**.

A alternativa **a** é falsa porque a naftalina torna-se líquida em temperaturas superiores a 80,2 °C. A água, a acetona e o álcool são líquidos na temperatura ambiente.

A alternativa **b** é falsa porque o líquido mais volátil na temperatura ambiente é o de menor temperatura de ebulição, isto é, a acetona.

A alternativa **c** é falsa porque o valor da densidade do álcool é muito próximo do valor da acetona, não sendo um bom critério de identificação.

A alternativa **d** é falsa porque, apesar de a naftalina ser sólida na temperatura ambiente, afundaria em contato com a água por ser mais densa.

2 Em uma indústria fabricante de placas de alumínio, deseja-se transportar 100 placas para entregar a um cliente. Considerando que o veículo de transporte pode carregar até 3 toneladas e que as dimensões de cada placa são 2 m × 50 cm × 2 cm, calcule:

a) a massa, em kg, de cada placa de alumínio; 54 kg

b) a quantidade mínima de viagens necessárias para que apenas um veículo de transporte entregue o material solicitado ao cliente. Duas viagens.

Dado: densidade do alumínio = 2,7 g/cm³.

3 A determinação da densidade de um sólido de formato irregular pode ser feita cumprindo-se as etapas abaixo. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

- Medição da massa do sólido em uma balança.
- Introdução do sólido em uma proveta que contém certa quantidade de líquido. (**Observação**: O sólido deve ser mais denso que o líquido e não se dissolver nele, assim como deve ter tamanho compatível com o tamanho da proveta.)
- Determinação do volume do sólido pelo registro da diferença entre o volume inicial e o volume final do líquido indicados na proveta.
- Cálculo da densidade por meio do quociente entre massa e volume.

Ao colocar um sólido de massa igual a 2,1 g em uma proveta com 10 mL de água, observou-se que o volume final do líquido foi de 10,6 mL. O sólido era formado por vidro ou por diamante? Justifique.

Dados: d_{vidro} = 2,7 g/cm³; $d_{diamante}$ = 3,5 g/cm³.

4 A produção de alimentos liofilizados envolve diferentes etapas. Para remover a umidade dos alimentos, estes são congelados em temperaturas muito baixas, de forma que a água dos alimentos é transformada em gelo, em congelamento muito rápido. Depois, os alimentos são colocados em câmaras de vácuo para que o gelo neles presente seja transformado em vapor, sem passar pela fase líquida. Assim, a umidade dos alimentos é removida e os alimentos desidratados, chamados liofilizados, podem ser embalados de forma conveniente. Solidificação e posterior sublimação.

Durante os processos descritos, a água passou por quais mudanças de estado?

5 Ao colocar um ovo de galinha em um copo contendo água, o ovo afunda. Em um segundo copo, dissolve-se uma certa quantidade de sal de cozinha e, ao colocar o mesmo ovo, este passa a flutuar no líquido. Essas observações indicam que: Alternativa **c**.

a) a adição de sal à água aumenta a densidade do líquido e diminui a densidade do ovo.

b) a adição de sal à água diminui a densidade do líquido e aumenta a densidade do ovo.

c) a adição de sal à água aumenta a densidade do líquido, que passa a ser maior do que a do ovo.

d) a adição de sal à água diminui a densidade do líquido, que passa a ser menor do que a do ovo.

6 Considere que uma garrafa plástica de 2 L foi preenchida com 1,5 L de água, a 25 °C, e depois colocada em um congelador. Qual volume o sólido (gelo) ocupará no momento em que toda a água estiver congelada a 0°C?

Dados: densidade da água a 25 °C = 1,00 g/cm³; densidade do gelo a 0 °C = 0,92 g/cm³. 1,63 L

Não escreva no livro.

12. Para a temperatura de 20 °C, a tabela informa que **X** e **Z** são sólidos, pois suas temperaturas de fusão são superiores a 20 °C. Já o material **Y** é gasoso, pois 20 °C é maior que a temperatura de ebulição do material.

7 **Para identificar e determinar o grau de pureza de um sólido, as propriedades físicas mais indicadas são:** Alternativa **d**.

a) cor e dureza.

b) densidade e cor.

c) solubilidade e massa.

d) temperatura de fusão e densidade.

e) volume e temperatura de ebulição.

8 **Quando um copo de vidro cheio de água gelada é colocado à temperatura ambiente, percebe-se que ele fica todo "suado" por fora, pela formação de pequenas gotículas de água na superfície externa dele. Esse fenômeno pode ser explicado:** Alternativa **c**.

a) pelo fato de a água gelada atravessar o copo, que é feito de material poroso.

b) pela evaporação da água do copo para sua superfície externa.

c) pela condensação dos vapores de água, presentes na atmosfera, na superfície gelada do copo.

d) pela sublimação da água presente no ar atmosférico sobre a superfície externa do copo.

e) pelo fato de a temperatura do ar ser menor do que a temperatura da água do copo.

9 **Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e sua posição relativamente distante do Sol faz com que sua temperatura seja baixa, com médias em torno de −145 °C. Considere as temperaturas de fusão e de ebulição de três substâncias apresentadas na tabela abaixo e suponha que a pressão em Júpiter seja a pressão normal de $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa.**

Substância	Temperatura de ebulição (°C)	Temperatura de fusão (°C)
metano	− 162	− 182
propano	− 42	− 188
eteno	− 104	− 169

Nessas condições, a −145 °C, os estados físicos do metano, propano e eteno são, respectivamente, **9.** Alternativa **c**.

a) sólido, líquido e gasoso.

b) líquido, líquido e sólido.

c) gasoso, líquido e líquido.

d) gasoso, líquido e gasoso.

e) líquido, gasoso e gasoso.

10 **O ciclo da água é um fenômeno que envolve os estados físicos da água e suas transformações por meio de processos que absorvem energia (endotérmicos) e liberam energia (exotérmicos). Sobre as mudanças de estado físico e as variações de energia envolvidas nesse ciclo, analise as afirmativas a seguir e indique se são verdadeiras ou falsas.**

I. A precipitação de água (chuva) envolve a condensação de vapor de água (processo endotérmico).

II. O congelamento de água de um rio corresponde à solidificação da água (processo endotérmico).

III. Em dias muito quentes, a água evapora (processo endotérmico).

IV. A evaporação da água de rios e lagos ocorre pelo processo de vaporização (processo exotérmico).

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

11 **Um estudante coletou dados da variação da temperatura da água em função do tempo durante uma aula experimental. Os valores encontrados estão na tabela a seguir. Com base nesses dados, construa um gráfico e indique a mudança de estado físico que esse gráfico representa.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

T (°C)	tempo (min)
40	1
20	3
0	5
0	8
−10	10
−20	12

12 **Para uma avaliação adequada das condições de armazenamento dos materiais, é importante considerar suas propriedades físico-químicas. Observe os dados de três materiais na tabela a seguir.**

Material	TF (°C)	TE (°C)
X	232	2603
Y	−220	−188
Z	28	671

- Identifique os estados físicos de cada um dos materiais (**X**, **Y** e **Z**) a 20 °C, nas mesmas condições de pressão em que foram obtidas as temperaturas de fusão e de ebulição indicadas na tabela.

13 **Considere um copo com cubos de gelo flutuando na água líquida pura em equilíbrio térmico a 0 °C. O copo é colocado na temperatura ambiente e observa-se que o gelo vai derretendo com o passar do tempo. No período em que ainda há gelo, pode-se afirmar que:**

a) a temperatura e o volume do sistema aumentam.

b) a temperatura e o volume do sistema diminuem.

c) a temperatura permanece constante e o volume do sistema aumenta.

d) a temperatura permanece constante e o volume do sistema diminui.

e) a temperatura aumenta e o volume do sistema diminui.

13. Alternativa **d**. Considerando que a água está pura, a temperatura permanece constante enquanto houver gelo e água no sistema. Como a densidade do gelo é menor que a da água, ao se transformarem em líquido (maior densidade), o volume vai diminuir.

CAPÍTULO 3

MODELOS ATÔMICOS E CARACTERÍSTICAS DOS ÁTOMOS

PARA COMEÇAR

1. Que modelos atômicos você conhece? Descreva-os.
2. Você sabe o que são partículas subatômicas? Cite exemplos.
3. E o que são raios X? Quais são as suas aplicações?

1. Resposta pessoal. Incentive os estudantes a falar de seus conhecimentos prévios sobre a composição da matéria, incluindo os modelos atômicos.

2. Resposta pessoal. Pergunte aos estudantes o que eles imaginam ser as partículas subatômicas. É mais provável que eles citem os prótons, nêutrons e elétrons, mas também podem mencionar os *quarks*, que compõem os prótons e os nêutrons.

3. Os raios X são ondas eletromagnéticas de frequência entre 30 petahertz e 30 exahertz, criadas pela desaceleração de partículas ou pela transição de elétrons nas camadas energéticas. Por sua alta faixa de energia, os raios X transpassam algumas estruturas e outras não. Por isso, são usados na medicina (diagnósticos por imagem), na indústria (para detectar falhas em materiais e em estruturas, por exemplo) e na segurança (detecção de armas). Promova com a turma uma discussão sobre os raios X e suas aplicações.

APLICAÇÕES DOS RAIOS X

Uma cena corriqueira em aeroportos no Brasil e no exterior é a verificação das malas dos passageiros e do que eles levam consigo em mochilas, bolsos, carteiras, etc. Isso é feito com o uso de equipamentos ou mesmo com a revista individual realizada por funcionários habilitados.

Antes de embarcar, os próprios passageiros precisam passar por equipamentos de segurança como: detectores de metal, que disparam um alarme quando alguém leva um objeto feito de metal; detectores de traços, que são capazes de identificar vestígios de explosivos e de drogas no corpo e nas roupas; equipamentos de raios X, por meio dos quais é possível visualizar armas, facas ou outros objetos que geram suspeita.

A descoberta dos raios X, no início do século XX, surpreendeu a comunidade científica em todo o mundo, por possibilitar, de forma inovadora e precisa, a visualização do interior do corpo humano por meio de radiografias.

A utilização de raios X em equipamentos de segurança em aeroportos, na medicina e na biologia (em radiografias de partes do corpo, como ossos), na produção industrial (por exemplo, na eliminação de microrganismos em alimentos por irradiação) e em outras áreas está relacionada a um grande passo dado pelos cientistas: a concepção científica de **modelo atômico**.

Essa concepção não se deu de repente. Trata-se de uma evolução, que incluiu os estudos sobre as relações estabelecidas entre as massas de reagentes e os produtos obtidos nas transformações químicas, sobre os raios X e a radioatividade e sobre os raios catódicos utilizados nos antigos televisores de tubo – hoje quase totalmente substituídos por aparelhos com tecnologias mais modernas.

Neste capítulo, você vai estudar como os cientistas chegaram às concepções de modelo atômico e qual é a relação delas com fenômenos como radioatividade, raios X, fluorescência e fosforescência.

Verificação do interior de bagagens usando equipamento de raios X. Esse procedimento de segurança é muito comum em aeroportos.

Sunshine Seeds/Alamy/Fotoarena

Não escreva no livro.

MODELOS ATÔMICOS DE DALTON E THOMSON

Dois modelos atômicos que ficaram bastante conhecidos foram os elaborados pelos britânicos John Dalton (1766-1844) e Joseph John Thomson (1856-1940).

Entre 1803 e 1808, Dalton propôs que a matéria era formada por partículas distintas, denominadas átomos. Ele concebia os átomos como esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Para cada elemento existia um tipo de átomo.

ID/BR



Representação de alguns elementos químicos sugerida por Dalton.

Fonte de pesquisa: Filgueiras, C. A. L. Duzentos anos da teoria atômica de Dalton. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 20, nov. 2004. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc20/v20a07.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

Em 1898, após a descoberta dos elétrons e sabendo que a matéria era neutra, Thomson propôs um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, pois era constituído de uma esfera maciça, de carga elétrica positiva, que continha "corpúsculos" de carga negativa (elétrons) nela dispersos e em número suficiente para anular sua carga positiva.

ID/BR



Modelo atômico proposto por Thomson. Representação em cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: The discovery of the electron. [20--]. Disponível em: http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/raisin.html. Acesso em: 11 out. 2024.

Embora em ambos os modelos os átomos sejam esféricos, o de Dalton não admitia a possibilidade de o átomo ser divisível. Já o de Thomson assumia a natureza elétrica do átomo, incluindo que poderiam ser removidas ou acrescentadas partículas (elétrons), ou seja, considerava o átomo "divisível".

Observe, então, uma característica muito importante do desenvolvimento científico: assim como o modelo de Thomson incorpora novas ideias ao de Dalton, a comunidade científica aceita o princípio de que, para que haja avanços, nem sempre é necessário descartar ideias anteriores.

O MODELO DE RUTHERFORD E AS PARTÍCULAS FUNDAMENTAIS DO ÁTOMO

A descoberta da **radioatividade**, emissão espontânea de radiação invisível e de alta energia pela matéria, foi fundamental para a evolução do pensamento científico do final do século XIX. Há vários tipos de radiação, sendo os mais comuns a radiação alfa (α), a beta (β) e a gama (γ).

O experimento de Rutherford

Grande parte dos experimentos que culminaram no estabelecimento de um novo modelo de átomo foi conduzida, entre 1909 e 1910, pelo físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), enquanto estudava o fenômeno da radioatividade com seus colaboradores, o físico alemão Johannes Wilhem Geiger (1882-1945) e o físico britânico Ernest Marsden (1889-1970).

Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partículas alfa, provenientes de material radioativo, uma fina folha de ouro. As partículas que atravessavam a lâmina metálica eram detectadas em um anteparo fluorescente apropriado para essa finalidade. A seguir, a representação do experimento de Rutherford.

PARA EXPLORAR

Assista

Experimento de Rutherford: a descoberta do núcleo do átomo

O vídeo, de 2022, ilustra o experimento realizado por Ernest Rutherford. Duração: 55 s.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B21bot-CzdM. Acesso em: 11 out. 2024.



AMJ Studio/ID/BR

Esquema simplificado do experimento realizado por Rutherford, Geiger e Marsden. No detalhe, a trajetória das partículas. Representação em cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M. *Chemistry and chemical reactivity*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. p. 66-67.

Já naquela época, sabia-se que a radiação alfa era constituída de partículas de carga elétrica positiva capazes de atravessar lâminas metálicas muito finas. Rutherford observou que 99% das partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvios; um por cento das partículas atravessava a lâmina, com desvios; e apenas uma em cada 10 mil partículas (0,01%) colidia com a lâmina e voltava, sem atravessá-la. As poucas partículas alfa desviadas ou que não conseguiam atravessar a folha de ouro eram aquelas que passavam muito próximo do núcleo dos átomos que compunham a lâmina de ouro ou as que se chocavam contra ele.

Rutherford concluiu que a maioria das partículas que conseguiam atravessar a lâmina passava por espaços vazios e, por isso, não se desviavam da trajetória inicial. Segundo ele, o átomo seria constituído, então, de uma região central, chamada **núcleo**, e de uma região periférica, muito maior que o núcleo, denominada **eletrosfera**.

O núcleo seria maciço, formado por partículas de carga positiva, denominadas prótons, e concentraria quase toda a massa do átomo. Ao redor do núcleo, movimentando-se na eletrosfera, estariam os elétrons. Essa região não ofereceria resistência à passagem de partículas de carga positiva, o que explicaria a ausência de desvios em 99% das partículas alfa. A partir desse experimento, concluiu-se, também, que o núcleo é cerca de 100 mil vezes menor do que o átomo.

Para explicar os valores das massas dos átomos, Rutherford propôs a existência de partículas neutras no núcleo, com massa muito próxima à dos prótons. Ele, entretanto, não conseguiu comprovar a existência delas. Os nêutrons foram detectados apenas em 1932, pelo físico britânico James Chadwick (1891-1974), que era colaborador de Rutherford, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra.



ID/BR

Representação do modelo atômico de Rutherford. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M. *Chemistry and chemical reactivity*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. p. 67.

O modelo de Rutherford e as transformações da matéria

As transformações químicas e os fenômenos físicos conhecidos até o final do século XIX apresentam conservação da massa e dos elementos. O modelo atômico de Dalton assimilou essa informação ao considerar o átomo indestrutível e indivisível.

No modelo sugerido por Rutherford, o átomo é formado por duas partículas fundamentais: prótons e elétrons. As reações químicas e as transformações físicas geralmente apresentam conservação das massas e dos elementos, sendo entendidas como processos em que os núcleos atômicos permanecem intactos. Nesses casos, ocorrem alterações somente na eletrosfera.

Com o estudo da radioatividade, os cientistas constataram que os átomos não são indestrutíveis. Nas transformações radioativas, previstas pelo modelo de Rutherford, ocorrem a transmutação de elementos e até mesmo a formação de elementos químicos artificiais.

Não escreva no livro.

PRÓTON, NÊUTRON E ELÉTRON

As partículas subatômicas (prótons, nêutrons e elétrons) são descritas conforme as seguintes características: sua carga relativa; sua carga, expressa em coulomb (C); sua massa relativa; e sua massa, expressa em quilograma (kg).

Este quadro ilustra as características dessas três partículas subatômicas usando como referência as do próton.

	Próton	Nêutron	Elétron
Símbolo	p^+ ou p	n	e^- ou e
Carga relativa	+1	0	−1
Carga (C)	$1{,}602 \cdot 10^{-19}$	0	$-1{,}602 \cdot 10^{-19}$
Massa relativa	1	1,002	0,0005448
Massa (kg)	$1{,}673 \cdot 10^{-27}$	$1{,}675 \cdot 10^{-27}$	$9{,}109 \cdot 10^{-31}$

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. Seção 1. Versão eletrônica.

Íons

Um átomo apresenta em sua eletrosfera uma quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons do núcleo, sendo eletricamente neutro. Dessa forma, um átomo de magnésio (Mg), por exemplo, tem 12 prótons e 12 elétrons, e o átomo de flúor (F) tem 9 prótons e 9 elétrons.

Em processos químicos, porém, um átomo ou uma molécula pode perder ou ganhar elétrons, formando **íons**.

Quando uma espécie neutra perde elétrons, transforma-se em um íon positivo, chamado **cátion**. Um exemplo dessa transformação é a que ocorre com o cátion magnésio, representado por Mg^{2+}, que tem 12 prótons em seu núcleo e 10 elétrons em sua eletrosfera.

Por sua vez, quando uma espécie neutra recebe elétrons, transforma-se em íon negativo, o **ânion**. O ânion F^- (fluoreto), por exemplo, tem 9 prótons em seu núcleo e 10 elétrons em sua eletrosfera.

Observe que a carga do íon é representada no **lado superior** direito do símbolo do elemento químico. O número 1 pode ser omitido; então, o fluoreto pode ser representado por F^{1-} ou F^-.

A formação de íons envolve perda ou ganho de partículas das eletrosferas dos átomos, e não do núcleo.



ID/BR

Esquemas da distribuição de partículas em átomos e íons de magnésio (acima) e de flúor (abaixo). Representações em cores-fantasia.

NÚMERO ATÔMICO

Em 1913, o físico britânico Henry Moseley (1887-1915), assistente de Rutherford, desenvolveu um método experimental que possibilitou determinar a carga nuclear dos átomos. (A carga nuclear está diretamente relacionada com a quantidade de prótons do núcleo do átomo, pois cada próton apresenta carga relativa +1). O experimento consistia na análise da interação dos raios X com os átomos da amostra.

Moseley percebeu que os átomos de um mesmo elemento apresentavam sempre a mesma carga nuclear. Sendo assim, átomos de elementos distintos teriam, necessariamente, cargas nucleares diferentes. Por isso, cada elemento químico é caracterizado em função da quantidade de prótons que contém.

O número de prótons de um átomo é chamado **número atômico** e é representado pela letra **Z**.

É o número atômico, portanto, que identifica um elemento químico: átomos de mesmo número atômico são de um mesmo elemento químico.

Número de massa

Para descrever o núcleo de um átomo, é preciso conhecer a quantidade de prótons e nêutrons que o constituem. A **massa relativa** de um átomo pode ser calculada com base nas massas relativas de prótons e nêutrons, que, como já mostramos, são próximas a 1,0. Esse valor é aproximado, pois as massas de prótons e nêutrons não são exatamente iguais.

O **número de massa** (representado por **A**) de um átomo corresponde à soma do número de prótons (**Z**) com o número de nêutrons do átomo (**n**).

$$A = Z + n$$

Assim, se determinado átomo de potássio (K) apresenta número de massa 39, isso quer dizer que seu núcleo apresenta 20 nêutrons, pois o número atômico do potássio é 19.

ID/BR



Átomo de nitrogênio, que tem $A = 14$ e $Z = 7$. Logo, esse átomo conta com sete nêutrons. Representação em cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Badash, L. Ernest Rutherford. *In: Encyclopedia Britannica*. [*S. l.*]: Britannica Group, 2016. Disponível em: https://www.britannica.com/biography/Ernest-Rutherford/McGill-University. Acesso em: 2 maio 2025.

Representação de espécies químicas

A International Union of Pure and Applied Chemistry (Iupac), ou União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que o número de massa e o número atômico sejam representados antes do símbolo do elemento, em sobrescrito e subscrito, respectivamente. A carga relativa do íon (ou número de carga) deve ser indicada no lado superior direito, logo depois do símbolo. No caso de átomo neutro, não se grafa o zero. A seguir, o modelo geral dessa representação (a letra **E** indica um elemento químico qualquer):

$$^{A}_{Z}E^{carga}$$

Assim, a notação $^{37}_{17}C\ell$ indica que um átomo de cloro tem 17 prótons e 20 nêutrons no núcleo ($A = 17 + 20 = 37$) e 17 elétrons na eletrosfera.

Algumas vezes, entretanto, o número atômico é omitido da representação, pois cada elemento é definido pela carga nuclear de seus átomos. Logo, o símbolo do elemento corresponde a uma quantidade específica de prótons no núcleo, que pode ser conhecida consultando-se a Tabela Periódica.

Não escreva no livro.

O quadro a seguir apresenta exemplos de representações de íons.

Íons	$^{27}A\ell^{3+}$	$^{81}Br^{-}$	$^{85}Rb^{+}$	$^{80}Se^{2-}$	$^{58}Ni^{2+}$
Prótons	13	35	37	34	28
Elétrons	10	36	36	36	26
Nêutrons	14	46	48	46	30

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Com base nos dados conhecidos, veja as relações que podem ser estabelecidas entre *A*, *Z* e *n*.

O número de elétrons é obtido pela análise da carga do íon. Em $^{27}A\ell^{3+}$, por exemplo, percebe-se que há três elétrons a menos que prótons. Logo, são 10 elétrons. Trata-se, portanto, de um **cátion de alumínio**.

Como nos ânions o número de elétrons excede o número de prótons, conclui-se que $^{81}Br^{-}$ e $^{80}Se^{2-}$ são ânions.

Para obter o número de nêutrons em um átomo, subtrai-se o número atômico do número de massa.

$$n = A - Z$$

Os íons $^{81}Br^{-}$, $^{85}Rb^{+}$ e $^{80}Se^{2-}$ apresentam o mesmo número de elétrons. Em razão disso, esses íons são chamados de **isoeletrônicos**.

Na natureza, também há átomos de elementos distintos com o mesmo número de massa, como ^{40}Ar e ^{40}Ca. Esses átomos são denominados **isóbaros**.

ISÓTOPOS

É muito comum existir átomos de um mesmo elemento com números de massa diferentes. Quando isso acontece, os núcleos apresentam a mesma quantidade de prótons, mas diferem quanto à quantidade de nêutrons. Esses átomos são chamados **isótopos**. São, portanto, átomos que têm o mesmo número atômico, mas diferem quanto ao número de massa. São exemplos de isótopos:

^{12}C, ^{13}C e ^{14}C $\qquad$ $^{35}C\ell$ e $^{37}C\ell$ $\qquad$ ^{235}U e ^{238}U

A maioria dos elementos tem isótopos que são encontrados na natureza em proporção fixa. A tabela a seguir fornece alguns exemplos.

Abundância relativa de alguns isótopos naturais*					
Isótopo	**Abundância relativa**	**Isótopo**	**Abundância relativa**	**Isótopo**	**Abundância relativa**
^{1}H	99,99%	^{19}F	100%	^{54}Fe	5,8%
^{2}H	0,01%	^{23}Na	100%	^{56}Fe	91,7%
^{10}B	19,9%	^{24}Mg	79,0%	^{57}Fe	2,1%
^{11}B	80,1%	^{25}Mg	10,0%	^{107}Ag	51,8%
^{12}C	98,9%	^{26}Mg	11,0%	^{109}Ag	48,2%
^{13}C	1,1%	^{31}P	100%	^{127}I	100%
^{16}O	99,76%	$^{35}C\ell$	75,8%	^{235}U	0,7%
^{17}O	0,04%	$^{37}C\ell$	24,2%	^{238}U	99,3%
^{18}O	0,20%	//////////	//////////	//////////	//////////

(*) Isótopos com ocorrência muito baixa foram suprimidos da tabela.

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

ROTEIRO

1. A expressão "enriquecimento de urânio", que frequentemente aparece na mídia, refere-se a uma purificação isotópica do urânio, por meio da qual se obtém maior quantidade relativa do isótopo ^{235}U em uma amostra.

Pesquise outras aplicações de amostras que apresentem uma composição isotópica distinta da encontrada na natureza.

Outro uso muito comum de isótopos é na medicina nuclear, na qual servem para diagnósticos e tratamentos de doenças.

Apenas os isótopos do hidrogênio recebem nomes específicos. O isótopo mais comum, o ^{1}H, é o **prótio**, enquanto os isótopos ^{2}H e ^{3}H são conhecidos, respectivamente, como **deutério** (^{2}D) e **trítio** (^{3}T). O prótio não tem nêutron (seu núcleo contém apenas um próton); o deutério tem um próton e um nêutron, e o trítio apresenta um próton e dois nêutrons. Na natureza, o prótio é o isótopo do hidrogênio mais abundante, e o trítio é o isótopo mais raro (são encontrados apenas traços desse isótopo).

Elemento, substância simples e substância composta

Com o estudo das reações de decomposição, foi possível conceituar substância simples e substância composta em nível **macroscópico**, considerando-se a possibilidade de uma substância poder, ou não, ser decomposta em outras.

Posteriormente, esse conceito pôde ser reelaborado em razão da constituição atômica das substâncias, ou seja, em termos de modelo. Nesse novo contexto, considera-se que **substâncias simples** são aquelas constituídas de átomos de um único elemento químico e que **substâncias compostas** são aquelas constituídas de átomos de dois ou mais elementos químicos.

Assim, para classificar uma substância em simples ou composta, basta analisar sua fórmula, desde que esta seja conhecida. São exemplos de substâncias simples o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o enxofre, representados, respectivamente, por O_2, N_2, $C\ell_2$ e S_8. A água (H_2O), o cloreto de sódio ($NaC\ell$) e o dióxido de carbono (CO_2) são exemplos de substâncias compostas.

A REELABORAÇÃO DO MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD

O modelo atômico proposto por Rutherford – em que o átomo é constituído de um núcleo denso e de uma eletrosfera, na qual se movimentam os elétrons – permitiu a compreensão de uma série de fenômenos que não foram explicados por modelos anteriores. A descrição de átomo feita por Rutherford foi a base para entender os modelos atômicos mais modernos.

Esse modelo, no entanto, não foi capaz de elucidar uma questão importante: Como os elétrons, dotados de carga negativa, podiam movimentar-se em torno de um núcleo positivo sem perder energia e sem colidir com ele? Na época, já se conhecia o comportamento de uma carga elétrica ao se movimentar ao redor de outra carga elétrica de sinal oposto.

O estudo da luz forneceu mais alguns subsídios para o início de uma nova teoria e para o aperfeiçoamento do modelo atômico.

O espectro eletromagnético

O arco-íris resulta da decomposição da luz solar que incide em gotículas de água suspensas na atmosfera.

A luz branca, ao atravessar um prisma, decompõe-se em um espectro que apresenta as cores do arco-íris.



ID/BR

Representação da decomposição da luz branca ao atravessar um prisma.

Não escreva no livro.

Espectro luminoso visível é a imagem observada na decomposição da luz, formada por regiões com cores que se sucedem.

A decomposição da luz solar produz uma variedade de radiações, denominadas **radiações eletromagnéticas**.

Além da luz visível, outras radiações são eletromagnéticas, como as ondas de rádio, as micro-ondas, os raios infravermelhos, a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama (γ). Essas radiações são invisíveis aos olhos humanos.



Representação do espectro eletromagnético: apenas uma pequena parte dele sensibiliza a visão humana.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M. *Chemistry and chemical reactivity*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. p. 278.

DE OLHO NO CONCEITO

Radiações eletromagnéticas

A energia radiante emitida pelo Sol propaga-se pelo espaço na forma de ondas eletromagnéticas. Essas radiações são ordenadas segundo seu espectro eletromagnético. Como qualquer tipo de onda, as radiações eletromagnéticas apresentam comprimento (λ) (lê-se lambda) e frequência (*f*).

Comprimento de onda (λ)

É a distância entre duas cristas vizinhas de uma onda.



Frequência (*f*)

É o número de ondas em um determinado período de tempo.

No vácuo, essas ondas se propagam na velocidade da luz (*c*), em que:

$$c = \lambda \cdot f$$

Quanto maior a frequência de uma radiação, maior sua energia.

ESPECTROS ATÔMICOS

Certas substâncias, quando aquecidas na chama de um bico de Bunsen, conferem coloração à chama. A cor observada é característica do elemento presente na substância aquecida.

Charles D. Winters/Science Source/Fotoarena

David Taylor/SPL/Fotoarena

David Taylor/SPL/Fotoarena

As diferentes colorações das chamas dependem da substância aquecida: sais de bário (à esquerda), de lítio (ao centro) e de cobre (à direita).

Em 1856, o químico alemão Robert Bunsen (1811-1899) e seu colaborador, o físico alemão Gustav Kirchhoff (1824-1887), investigaram o espectro das chamas.

Em seus estudos, eles utilizaram um conjunto de lentes para selecionar um feixe de luz emitido pelo elemento aquecido, fazer esse feixe atravessar um prisma e observar uma série de linhas coloridas luminosas separadas por regiões escuras.

Essas linhas constituíam o **espectro de emissão** de determinado elemento. Cada elemento apresentava um **espectro descontínuo** característico, assim denominado por apresentar linhas luminosas intercaladas por regiões sem luz.

Quando um tubo contendo hidrogênio a baixas pressões é submetido a altas temperaturas ou a uma descarga elétrica, ocorre emissão de radiação eletromagnética. No momento em que o feixe de luz dessa radiação atravessa um prisma, observa-se um espectro descontínuo.



AMJ Studio/ID/BR

Representação da obtenção do espectro de emissão do hidrogênio: formação de linhas descontínuas e de cores diferentes. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M. *Chemistry and chemical reactivity*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. p. 283.

Se outro elemento gasoso é colocado no interior do tubo, obtém-se um espectro diferente. Não há dois elementos químicos com o mesmo espectro de emissão.

Para explicar as características dos espectros atômicos, o físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) propôs, em 1913, um modelo para o comportamento dos elétrons no átomo. Com esse modelo, ele procurou esclarecer por que os elétrons se mantêm na eletrosfera sem se dirigir para o núcleo e sem colidir com ele.

Bohr sugeriu que a teoria sobre a luz proposta pelo físico alemão Max Planck (1858-1947) poderia ser aplicada ao átomo. Segundo essa teoria, toda a energia do elétron é **quantizada**, ou seja, os elétrons absorvem ou emitem quantidades fixas de energia na forma de pequenos pacotes denominados *quanta*.

2. Porque os elementos químicos emitem e absorvem energia de modo único, obtendo um espectro de emissão diferente para cada um deles.

ROTEIRO

2. Por que certas substâncias, quando aquecidas na chama de um bico de Bunsen, conferem diferentes colorações à chama?

Não escreva no livro.

O MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD-BOHR

As ideias de Niels Bohr, que tiveram o apoio de Rutherford, resultaram em um aprimoramento do modelo da estrutura do átomo. O novo modelo estabelecia os princípios fundamentais a seguir.

- Os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas.
- O elétron não pode ter energia zero, ou seja, estar parado no átomo.
- Em cada camada eletrônica, o elétron apresenta energia constante: quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron com relação ao núcleo, e, quanto mais distante dele, maior sua energia.
- Para passar de um nível de menor energia para um de maior, o elétron absorve determinada quantidade de energia. Ao fazer o caminho inverso (do nível de maior para o de menor energia), ele libera energia; essa liberação pode ocorrer na forma de luz. A quantidade que é absorvida ou liberada por um elétron corresponde exatamente à diferença entre um nível de energia e outro. Como existem apenas algumas órbitas possíveis, há somente alguns valores de energia, por isso, a denominação **energia quantizada**.



ID/BR

Modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Representação em cores-fantasia.

Representação sem proporção de tamanho.

Fonte de pesquisa: Atom. *In*: *Encyclopedia Britannica*. [*S. l.*]: Britannica Group, 2016. Disponível em: https://www.britannica.com/science/atom/Orbits-and-energy-levels. Acesso em: 2 maio 2025.

O modelo de Bohr e os espectros dos elementos

O modelo de Bohr explicava os espectros descontínuos dos elementos. Para ele, os elétrons que recebiam energia (proveniente do aquecimento ou de descargas elétricas) passavam para níveis de maior energia. Quando eles se encontravam nesses níveis, dizia-se que o átomo estava **eletronicamente excitado**. Ao retornarem ao estado de menor energia, denominado **estado fundamental**, acontecia a emissão de energia, que poderia ocorrer sob a forma de luz.

Ainda de acordo com Bohr, cada linha luminosa separada do espectro do hidrogênio indicava a energia liberada quando o elétron passava de um nível mais externo para outro mais próximo ao núcleo.

Ao considerar o átomo de hidrogênio composto de um núcleo que continha um único próton, em torno do qual havia um único elétron, Bohr calculou todas as linhas do espectro desse elemento, observando que os valores encontrados coincidiam com os obtidos experimentalmente no espectro descontínuo.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Fogos de artifícios utilizam íons metálicos para gerar explosões luminosas e coloridas. A energia térmica liberada na explosão da pólvora transfere o elétron do estado fundamental para o estado excitado de maior energia. Logo em seguida, o elétron retorna para o estado fundamental, liberando fótons com a energia correspondente. Associe as figuras a seguir, relacionando-as com a excitação do elétron devido à energia térmica e ao relaxamento eletrônico com a consequente liberação de luz. Explique.



Figura 1

Figura 2

ID/BR

Resolução

A Figura 1 corresponde à emissão de fótons com o elétron passando de um nível de energia mais elevado (mais distante do núcleo) para o estado fundamental. A Figura 2 representa a excitação eletrônica, com o elétron recebendo energia (térmica) e saltando para um maior estado de energia (camada mais afastada do núcleo).

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA EM CAMADAS OU NÍVEIS DE ENERGIA

Bohr propôs que os elétrons se situam em níveis de energia, ou camadas eletrônicas – numeradas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 –, as quais também poderiam ser representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. A camada 1 (ou K) seria a mais próxima do núcleo e de menor energia, e a 7 (ou Q), a mais distante e de maior energia.

A forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo, em camadas ou níveis de energia, é denominada **distribuição eletrônica**.

A figura a seguir mostra a distribuição eletrônica dos átomos de hidrogênio, de hélio e de lítio.



ID/BR

Isótopos de hidrogênio, de hélio e de lítio. Representação em cores-fantasia.

	K	L	M	N
^{1}H	1	//////	//////	//////
^{2}He	2	//////	//////	//////
^{3}Li	2	1	//////	//////
^{6}C	2	4	//////	//////
^{11}Na	2	8	1	//////
$^{11}Na^{+}$	2	8	//////	//////
^{12}Mg	2	8	2	//////
$^{12}Mg^{2+}$	2	8	//////	//////
^{15}P	2	8	5	//////
$^{17}C\ell$	2	8	7	//////
$^{17}C\ell^{-}$	2	8	8	//////

Para cada elemento, as camadas (níveis) apresentam diferentes valores de energia de acordo com o número atômico e o número de elétrons presentes. É por isso que átomos de diferentes elementos têm espectros distintos.

A tabela desta página mostra a distribuição eletrônica em níveis de energia de átomos neutros e íons de alguns elementos.

Observe, na tabela, que a distribuição eletrônica começa pela camada K. O único elétron do átomo de hidrogênio (H) está situado nessa camada, bem como os dois do átomo de hélio (He).

Note que os elétrons do átomo de carbono (C) situam-se nas camadas K e L, enquanto os dos átomos de fósforo (P) e cloro (Cℓ) estão também localizados na camada M. Os átomos neutros e os íons mostrados na tabela não têm elétrons na camada N. A distribuição eletrônica de átomos e íons segue algumas regras. É o que você vai ver a seguir.

CIÊNCIA SE DISCUTE

Bohr e a fissão nuclear

Nascido em Copenhague, no dia 5 de outubro de 1885, Niels David Bohr formou-se em Física em 1911. Nesse mesmo ano, transferiu-se para o Laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge. [...]

No ano seguinte, foi para Manchester, para trabalhar com E. Rutherford. [...]

Para Bohr, o encontro com Rutherford foi decisivo: daí por diante resolveu dedicar-se ao estudo da estrutura do átomo. [...]

[...]

O modelo [de Bohr] revelou-se muito favorável para a interpretação do fenômeno da fissão do urânio, que abriu caminho para a utilização da energia nuclear. De fato, Bohr notou que durante a fissão de um átomo de urânio desprendia-se enorme quantidade de energia. Notou, então, que se tratava de uma nova fonte energética de elevadíssimas potencialidades. Justamente com a finalidade de aproveitar essa energia, Bohr foi até Princeton (Filadélfia) para se encontrar com Einstein e Fermi e discutir com eles o problema.

Em 1933, juntamente com seu aluno Wheeler [John Archibald Wheeler, físico estadunidense], Bohr aprofundou a teoria da fissão, evidenciando o papel fundamental do urânio 235. Tais estudos permitiram prever também a existência de um novo elemento, descoberto pouco depois: o plutônio.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Niels Henrik David Bohr (1885-1962). Departamento de Biofísica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, [20--]. Disponível em: https://www.ufrgs.br/fismed/bohr.htm. Acesso em: 11 out. 2024.

1. A pesquisa sobre a fissão nuclear trouxe conhecimentos que possibilitaram o uso da energia nuclear, que se tornou uma fonte de energia importante em vários países. Pesquise quais são os prós e os contras da energia nuclear.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CRITÉRIOS PARA PREVER A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

Alguns critérios determinam a distribuição dos elétrons nas eletrosferas de átomos e de íons dos elementos que constituem a grande maioria das substâncias conhecidas.

Inicialmente, é preciso considerar que cada camada eletrônica ou nível de energia comporta um número máximo de elétrons, apresentados na tabela a seguir.

Camada eletrônica	K	L	M	N	O	P	Q
Número máximo de elétrons	2	8	18	32	32	18	8

Antes de efetuar a distribuição eletrônica, deve-se conhecer o número de elétrons do átomo. Para isso, devemos consultar a Tabela Periódica (disponível na página 58) e verificar o **número atômico**, que corresponde ao número de prótons presentes no núcleo do átomo. Quando o átomo é neutro, o número de elétrons é igual ao número atômico. No caso de íons, é preciso verificar a carga deles. Observe que os íons Na^+ e Mg^{2+} são **isoeletrônicos**, isto é, apresentam o mesmo número de elétrons, ou seja, 10.

Os elétrons ocupam primeiramente as camadas eletrônicas mais próximas do núcleo, que correspondem aos níveis de menor energia. Quando uma camada está preenchida, eles passam a ocupar a seguinte. Verifique na tabela da página anterior as distribuições eletrônicas dos átomos de H, He, Li, C, Na, Mg, P e Cℓ e dos íons Na^+, Mg^{2+} e $Cℓ^-$.

A última camada eletrônica de um átomo comporta, no máximo, 8 elétrons. Assim, se a última camada contiver um número de elétrons entre 9 e 18, deve-se deixar 8 elétrons nessa camada e passar os demais para as camadas seguintes.

	Camadas eletrônicas			
Elemento	K	L	M	N
^{19}K	2	8	8	1
^{20}Ca	2	8	8	2

Se a última camada contiver entre 19 e 32 elétrons, deve-se deixar 18 elétrons nessa camada e passar os demais para as camadas seguintes.

	Camadas eletrônicas					
Elemento	K	L	M	N	O	P
^{38}Sr	2	8	18	8	2	//////////
^{56}Ba	2	8	18	18	8	2

A regra para a distribuição eletrônica em camadas, apesar de ser válida para os átomos e os íons que formam a grande maioria das substâncias conhecidas atualmente, não consegue prever a distribuição de elétrons em todas as espécies químicas. O átomo de ferro ($_{26}Fe$) é uma delas.

De acordo com esses critérios, sua distribuição seria:

2 – 8 – 8 – 8.

De fato, se o átomo de ferro tivesse essa configuração eletrônica, a substância simples formada por esse átomo teria propriedades de um gás nobre (baixa reatividade), o que não ocorre.

A configuração eletrônica aceita atualmente para o átomo de ferro é:

2 – 8 – 14 – 2.

Por que alguns objetos emitem luz no escuro?

Alguns tipos de interruptores de luz, pulseiras e colares distribuídos em festas e determinados brinquedos parecem brilhar como se tivessem luz própria.

Duncan L/iStock/Getty Images

Pulseiras quimioluminescentes, como essas da foto, são exemplos de objetos que brilham no escuro.

Trata-se do fenômeno da **luminescência**. O que acontece é um processo de excitação eletrônica seguido da emissão de luz na faixa do espectro visível.

A excitação eletrônica pode ser provocada por uma reação química espontânea ou por uma fonte de energia externa. Ao retornar ao estado fundamental, pode ocorrer a emissão de luz na forma de **quimioluminescência**, de **fluorescência** ou de **fosforescência**.

A quimioluminescência ocorre por reação química espontânea; já a fluorescência e a fosforescência utilizam uma fonte de energia externa. De maneira simplificada, pode-se dizer que a diferença entre o fenômeno de fluorescência e o de fosforescência reside no tempo de emissão de luz.

Na fluorescência, a emissão de luz cessa quando a fonte de energia é desligada. Na fosforescência, essa emissão pode durar horas (é o que acontece com o interruptor de luz no qual a luz visível tem energia suficiente para promover a excitação eletrônica).

Teste de chama

Quais são as características dos átomos que fazem uma substância emitir uma luz colorida ao ser colocada em contato com uma chama? Nesta atividade, você e os colegas vão observar o comportamento de diferentes substâncias ao entrarem em contato com uma chama e relacioná-lo a um modelo atômico.

Material

- pedaços de fio de níquel-cromo (encontrados também em resistores elétricos) de 10 cm de comprimento, fixados em cabos de madeira
- pinça de madeira
- cristais de sulfato de cobre(II), de cloreto de cálcio e de cloreto de sódio
- 3 vidros de relógio ou pires de vidro
- fonte de calor que tenha chama azul (bico de Bunsen ou chama de fogão ou de lamparina a álcool gel)
- fósforos
- esponja de aço
- béquer com ácido clorídrico diluído

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Material utilizado nesta atividade.

Equipamentos de segurança

- Avental de algodão com mangas compridas e óculos de segurança.

ATENÇÃO!

Para sua segurança, mantenha os cabelos presos ao realizar esta atividade e siga cuidadosamente as orientações do(a) professor(a).

Como fazer

1. Limpe cuidadosamente o fio de níquel-cromo com uma esponja de aço em água corrente e, em seguida, prenda-o no cabo de madeira.
2. Acenda o bico de Bunsen seguindo as orientações do(a) professor(a).
3. Em seguida, introduza o fio no béquer com ácido clorídrico diluído. Depois disso, encoste-o em um dos sais e coloque-o na chama. Observe e anote o comportamento do sal.
4. Esses procedimentos devem ser repetidos com os demais sais.

1. A chama do bico de Bunsen adquire as seguintes cores de acordo com o sal analisado: verde brilhante (cobre), vermelho (cálcio) e amarelo (sódio).

2. Para evitar que resíduos do sal examinado passem para o ácido clorídrico.

3. Quando aquecidos, os átomos absorvem energia, e seus elétrons mais externos passam para níveis eletrônicos de maior energia. Quando esses elétrons retornam ao estado fundamental, emitem energia correspondente à luz visível.

4. Quando adicionados à pólvora, alguns sais absorvem energia durante a queima e depois a liberam em forma de luz visível e específica para cada sal.

Resíduos

Os sólidos que não foram utilizados podem ser guardados em potes rotulados e usados em futuros experimentos. Limpe com cuidado o fio de níquel-cromo antes de guardá-lo. A esponja de aço pode ser descartada no lixo comum.

Para concluir

1 **Descreva o que ocorre quando os compostos sólidos são aquecidos na chama do bico de Bunsen. Se julgar necessário, elabore uma tabela correlacionando as substâncias aquecidas com as observações experimentais.**

2 **Por que é necessário limpar o fio com a esponja de aço e lavá-lo com água antes de passá-lo pelo ácido a cada troca de substância?**

3 **Analise os modelos atômicos estudados e discuta qual deles justifica as observações realizadas neste experimento. Com base no modelo, sugira uma explicação para o fenômeno observado.**

4 **Correlacione os princípios envolvidos nas cores produzidas por fogos de artifício às observações feitas com base nesta atividade experimental.**

Não escreva no livro.

ATIVIDADES

5. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia associada à órbita do elétron. Assim, para passar do nível de menor energia para o de maior energia, o elétron absorve energia. Ao passar do nível 3 para o 1, há emissão de energia.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, correspondendo a cerca de 28% da massa da crosta. Presente no quartzo e muito utilizado em dispositivos como diodos e microprocessadores, esse elemento é encontrado na natureza na forma de três isótopos contendo 14, 15 ou 16 nêutrons em seu núcleo. Consulte a Tabela Periódica e faça o que se pede.

a) Represente o símbolo adequado de cada isótopo natural do silício.

b) Represente a distribuição eletrônica de um átomo neutro de silício.

Resolução

a) ^{28}Si, ^{29}Si, ^{30}Si.

b) K → 2, L → 8, M → 4

2 Relembre os dados e as hipóteses levantados por Rutherford em seu experimento com a lâmina de ouro:

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Dados experimentais

I. A maioria das partículas (99%) atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios.

II. Grandes desvios foram observados em apenas 1% das partículas.

III. Apenas 1 em cada 10 mil partículas se chocava com a lâmina e voltava.

Hipóteses

a) As partículas passavam muito próximo ao núcleo.

b) Isso ocorria devido à colisão de partículas com o núcleo atômico.

c) As partículas atravessavam a eletrosfera, constituída, predominantemente, de espaços vazios.

- Associe os dados com as hipóteses.

3 Pesquise em *sites* confiáveis quais são algumas das limitações do modelo atômico de Bohr e escreva um texto breve comentando essas limitações. Depois, troque seu texto com o de um colega e discutam os resultados encontrados.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 Analise a tabela a seguir.

Espécies	Número de prótons	Número de nêutrons	Número de elétrons
I	1	0	0
II	9	10	10
III	11	12	11
IV	20	20	18

- Há isótopos entre essas espécies? Justifique.

4. Não, pois não há duas espécies com o mesmo número de prótons, o que as caracterizaria como o mesmo elemento químico.

5 Segundo a teoria de Rutherford-Bohr, para um elétron do átomo de hidrogênio passar do primeiro para o terceiro nível de energia, ele deve absorver ou liberar energia? E para fazer o caminho inverso, do terceiro para o primeiro nível?

6. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6 A representação a seguir está relacionada com uma questão que intrigava os cientistas quanto ao modelo de Bohr. Qual era essa questão? Explique resumidamente. Depois, explique como o modelo de Bohr resolveu essa questão.



ID/BR

7 A figura a seguir é obtida quando se clica em um elemento da Tabela de Abundâncias Isotópicas e Massas Atômicas, organizada por uma comissão de mesmo nome sob a direção da Iupac.



ID/BR

7. a) O número atômico do cádmio é 48.
b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
c) De acordo com o gráfico, o isótopo mais abundante é o $^{114}_{48}Cd$, que apresenta 48 prótons e 66 nêutrons.

Fonte de pesquisa: Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW). Disponível em: http://www.ciaaw.org/. Acesso em: 19 jun. 2024.

Observe a figura e faça o que se pede a seguir.

a) Qual é o número atômico desse elemento?

b) Quantos isótopos podem ser identificados?

c) Quantos prótons e nêutrons há no núcleo do isótopo mais abundante?

8 Um íon positivamente carregado apresenta a seguinte distribuição eletrônica:

Camada	K	L
Número de elétrons	2	8

a) Quantos prótons há no núcleo desse íon? 11 prótons.

b) Qual é o símbolo e qual é o nome dele?
O elemento com 11 prótons é o sódio e o símbolo é Na.

9 Quando a luz proveniente de uma lâmpada de neônio é dispersa através de um prisma, obtém-se um espectro descontínuo com diferentes linhas descontínuas. Explique, em termos gerais, como se produz uma linha do espectro.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

1. Observe se os estudantes sabem que os átomos formam três tipos de ligações químicas: ligação iônica, molecular e metálica.

2. Espera-se que os estudantes se lembrem de que, na camada de valência, são os elétrons que participam das ligações químicas.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

LIGAÇÕES QUÍMICAS

PARA COMEÇAR

1. Quais são os modelos utilizados para explicar as diferentes formas como os átomos se ligam?
2. Qual é o papel da camada de valência na formação das ligações químicas?
3. É possível prever o tipo de ligação química que dois átomos podem formar? Explique.
4. Qual é a relação entre as ligações químicas e os estados físicos da matéria?

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS LIGAÇÕES QUÍMICAS

Os diferentes materiais podem ser caracterizados de acordo com suas propriedades, como temperatura de fusão e de ebulição, estado físico à temperatura ambiente, capacidade de conduzir corrente elétrica em estado sólido ou líquido, ser solúvel em água ou não, entre outras.

O sal de cozinha (cloreto de sódio) e o açúcar (sacarose) apresentam algumas propriedades em comum: à temperatura ambiente são sólidos, brancos e solúveis em água. No entanto, o sal de cozinha funde-se quando exposto a temperaturas superiores a 800 °C. Já o açúcar sofre fusão quando aquecido a 185 °C, produzindo, inicialmente, caramelo; depois, quando decomposto, produz carvão e vapor de água.

O alumínio, em razão de algumas de suas propriedades, como condutibilidade térmica e elétrica, maleabilidade e baixa densidade, é um metal muito utilizado na produção de diversos objetos de uso cotidiano, como panelas.

Os químicos associam as propriedades dos materiais às ligações entre os átomos que constituem suas unidades fundamentais. Além disso, utilizam modelos para associar às propriedades e, assim, explicar as diferentes formas como os átomos se ligam.

São as ligações químicas que mantêm os átomos unidos. Com exceção dos gases nobres, encontrados como átomos isolados na natureza, os átomos dos demais elementos químicos geralmente se encontram combinados, dando origem a inúmeras substâncias químicas.



Os semicondutores são materiais que apresentam condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Por suas características particulares, eles são empregados na fabricação de componentes eletrônicos, como microprocessadores. Na foto, vê-se uma placa de circuito eletrônico.

Ratpov/Shutterstock.com/ID/BR

Não escreva no livro.

Modelo do octeto e estabilidade dos gases nobres

Os únicos átomos que podem ser encontrados isolados na natureza são os gases nobres. A tabela a seguir apresenta a distribuição eletrônica desses elementos.

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DOS GASES NOBRES

Gás nobre	Número atômico	Distribuição dos elétrons por camada					
		1ª (K)	2ª (L)	3ª (M)	4ª (N)	5ª (O)	6ª (P)
He	2	2	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Ne	10	2	8	//////////	//////////	//////////	//////////
Ar	18	2	8	8	//////////	//////////	//////////
Kr	36	2	8	18	8	//////////	//////////
Xe	54	2	8	18	18	8	//////////
Rn	86	2	8	18	32	18	8

Fonte de pesquisa: Periodic Table of Elements (Tabela Periódica dos Elementos). Iupac, 4 maio 2022. Disponível em: https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Acesso em: 30 jul. 2024.

É possível observar que os elementos desse grupo apresentam oito elétrons na última camada eletrônica (com exceção do hélio, com dois elétrons), chamada de **camada de valência**. Essa configuração é extremamente estável, por isso esses átomos não se ligam a outros.

Esse é o **modelo do octeto**, que estabelece que os átomos se tornam mais estáveis quando têm oito elétrons na última camada. Essa tendência é observada em vários átomos que, quando formam substâncias, apresentam oito ou dois elétrons na última camada eletrônica.

Valência

O termo **valência** foi introduzido em meados do século XIX para explicar, com base em regras empíricas, a capacidade de combinação dos elementos. Em linhas gerais, segundo o conceito clássico de valência:

- os elementos químicos eram descritos como mono, di, tri ou tetravalentes, em razão de sua capacidade de se unir a um, dois, três ou quatro átomos monovalentes, respectivamente. A valência de um elemento era tradicionalmente relacionada ao número de átomos de hidrogênio (classificado como monovalente) com os quais o elemento podia se combinar. O carbono, por exemplo, forma o metano (CH_4), que apresenta quatro átomos de hidrogênio e, por isso, é classificado como tetravalente; já o oxigênio, que forma a água (H_2O), é classificado como divalente por se combinar com dois átomos de hidrogênio.



ID/BR



ID/BR

(**A**) O carbono é um elemento tetravalente, portanto, pode se ligar a quatro átomos de hidrogênio, formando o metano (CH_4). (**B**) O oxigênio é um elemento divalente, liga-se a dois átomos de hidrogênio, formando a água (H_2O). Representações em cores-fantasia.

- alguns elementos químicos apresentam valência variável, como o nitrogênio (N) e o fósforo (P), que podem apresentar valências 3 e 5. O cloro (Cℓ), por sua vez, pode apresentar valências 1, 3, 5 e 7 em diferentes compostos.

DE OLHO NO CONCEITO

Tabela Periódica

Na Tabela Periódica, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, como é possível perceber na Tabela Periódica da página a seguir. Cada linha da classificação é denominada período, e cada coluna corresponde a um grupo de elementos químicos que apresentam uma regularidade na variação de propriedades físicas e químicas e, no caso dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência.

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS



- metais alcalinos
- metais alcalinoterrosos
- metais de transição
- lantanídeos
- actinídeos
- outros metais
- não metais
- gases nobres
- hidrogênio

1 (1A)	2 (2A)	3 (3B)	4 (4B)	5 (5B)	6 (6B)	7 (7B)	8 (8B)	9 (8B)	10 (8B)	11 (1B)	12 (2B)	13 (3A)	14 (4A)	15 (5A)	16 (6A)	17 (7A)	18 (8A)
1 **H** Hidrogênio 1,008																	2 **He** Hélio 4,003
3 **Li** Lítio 6,967	4 **Be** Berílio 9,012											5 **B** Boro 10,81	6 **C** Carbono 12,01	7 **N** Nitrogênio 14,01	8 **O** Oxigênio 16,00	9 **F** Flúor 19,00	10 **Ne** Neônio 20,18
11 **Na** Sódio 22,99	12 **Mg** Magnésio 24,31											13 **Aℓ** Alumínio 26,98	14 **Si** Silício 28,08	15 **P** Fósforo 30,97	16 **S** Enxofre 32,07	17 **Cℓ** Cloro 35,45	18 **Ar** Argônio 39,95
19 **K** Potássio 39,10	20 **Ca** Cálcio 40,08	21 **Sc** Escândio 44,96	22 **Ti** Titânio 47,87	23 **V** Vanádio 50,94	24 **Cr** Cromo 52,00	25 **Mn** Manganês 54,94	26 **Fe** Ferro 55,85	27 **Co** Cobalto 58,93	28 **Ni** Níquel 58,69	29 **Cu** Cobre 63,55	30 **Zn** Zinco 65,38	31 **Ga** Gálio 69,72	32 **Ge** Germânio 72,63	33 **As** Arsênio 74,92	34 **Se** Selênio 78,97	35 **Br** Bromo 79,90	36 **Kr** Criptônio 83,80
37 **Rb** Rubídio 85,47	38 **Sr** Estrôncio 87,62	39 **Y** Ítrio 88,91	40 **Zr** Zircônio 91,22	41 **Nb** Nióbio 92,91	42 **Mo** Molibdênio 95,95	43 **Tc** Tecnécio	44 **Ru** Rutênio 101,1	45 **Rh** Ródio 102,9	46 **Pd** Paládio 106,4	47 **Ag** Prata 107,9	48 **Cd** Cádmio 112,4	49 **In** Índio 114,8	50 **Sn** Estanho 118,7	51 **Sb** Antimônio 121,8	52 **Te** Telúrio 127,6	53 **I** Iodo 126,9	54 **Xe** Xenônio 131,3
55 **Cs** Césio 132,9	56 **Ba** Bário 137,3	57-71 **Lantanídeos**	72 **Hf** Háfnio 178,5	73 **Ta** Tantálio 180,9	74 **W** Tungstênio 183,8	75 **Re** Rênio 186,2	76 **Os** Ósmio 190,2	77 **Ir** Irídio 192,2	78 **Pt** Platina 195,1	79 **Au** Ouro 197,0	80 **Hg** Mercúrio 200,6	81 **Tℓ** Tálio 204,4	82 **Pb** Chumbo 207,2	83 **Bi** Bismuto 209,0	84 **Po** Polônio	85 **At** Astato	86 **Rn** Radônio
87 **Fr** Frâncio	88 **Ra** Rádio	89-103 **Actinídeos**	104 **Rf** Rutherfórdio	105 **Db** Dúbnio	106 **Sg** Seabórgio	107 **Bh** Bóhrio	108 **Hs** Hássio	109 **Mt** Meitnério	110 **Ds** Darmstádtio	111 **Rg** Roentgênio	112 **Cn** Copernício	113 **Nh** Nipônio	114 **Fℓ** Flerávio	115 **Mc** Moscóvio	116 **Lv** Livermório	117 **Ts** Tenesso	118 **Og** Oganessônio

57 **La** Lantânio 138,9	58 **Ce** Cério 140,1	59 **Pr** Praseodímio 140,9	60 **Nd** Neodímio 144,2	61 **Pm** Promécio	62 **Sm** Samário 150,4	63 **Eu** Európio 152,0	64 **Gd** Gadolínio 157,3	65 **Tb** Térbio 158,9	66 **Dy** Disprósio 162,5	67 **Ho** Hólmio 164,9	68 **Er** Érbio 167,3	69 **Tm** Túlio 168,9	70 **Yb** Itérbio 173,0	71 **Lu** Lutécio 175,0
89 **Ac** Actínio	90 **Th** Tório 232,0	91 **Pa** Protactínio 231,0	92 **U** Urânio 238,0	93 **Np** Netúnio	94 **Pu** Plutônio	95 **Am** Amerício	96 **Cm** Cúrio	97 **Bk** Berquélio	98 **Cf** Califórnio	99 **Es** Einstênio	100 **Fm** Férmio	101 **Md** Mendelévio	102 **No** Nobélio	103 **Lr** Laurêncio

Fonte de pesquisa: Periodic Table of Elements (Tabela Periódica dos Elementos). Iupac, 4 maio 2022. Disponível em: https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Acesso em: 18 jun. 2024.

ID/BR

Não escreva no livro.

SUBSTÂNCIAS IÔNICAS, MOLECULARES E METÁLICAS

Observar as propriedades das substâncias fornece ferramentas para a elaboração de modelos que permitem correlacionar a estrutura dessas substâncias com as propriedades dos materiais.

A tabela a seguir apresenta os dados sobre a condutibilidade elétrica de algumas substâncias, propriedade que está associada à existência de cargas elétricas em movimento.

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DAS SUBSTÂNCIAS					
Substância	Fórmula	TF (°C) a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa	TE (°C) a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa	Condutibilidade elétrica	
				Sólido	Líquido
Ouro	Au	1064	2836	bom condutor	bom condutor
Cobre	Cu	1084	2560	bom condutor	bom condutor
Mercúrio	Hg	−39	357	bom condutor	bom condutor
Cloreto de sódio	$NaC\ell$	802	1465	mau condutor	bom condutor
Cloreto de cálcio	$CaC\ell_2$	775	1935	mau condutor	bom condutor
Sacarose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	181	(decompõe-se)	má condutora	má condutora
Água	H_2O	0	100	má condutora	má condutora
Cloro	$C\ell_2$	−101	−34	mau condutor	mau condutor

TF – temperatura de fusão
TE – temperatura de ebulição

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Pelos dados da tabela, pode-se identificar três grupos distintos de materiais: o dos bons condutores nos estados sólido e líquido, o dos bons condutores apenas no estado líquido e o dos maus condutores tanto no estado líquido quanto no estado sólido.

Esses três grupos podem ser classificados em: **substâncias iônicas**, **substâncias moleculares** e **substâncias metálicas**.

Substâncias iônicas

Nessa tabela, há duas substâncias iônicas: o cloreto de sódio ($NaC\ell$) e o cloreto de cálcio ($CaC\ell_2$). Elas são formadas por cátions e ânions que se atraem mutuamente, constituindo ligações iônicas.

As substâncias iônicas geralmente são sólidas a 25 °C e apresentam altas temperaturas de fusão (TF) e de ebulição (TE). No estado sólido, são más condutoras de corrente elétrica; porém, quando fundidas ou quando dissolvidas em água, são boas condutoras de eletricidade.

Substâncias moleculares

As substâncias moleculares apresentadas na tabela são a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), a água (H_2O) e o cloro ($C\ell_2$). Elas são más condutoras de eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido.

Ao contrário das substâncias iônicas, que geralmente são sólidas à temperatura ambiente, as substâncias moleculares podem ser encontradas nos estados sólido, líquido ou gasoso a 25 °C.

Substâncias metálicas

Na mesma tabela, são exemplos de substâncias metálicas: o ouro (Au), o cobre (Cu) e o mercúrio (Hg). As substâncias metálicas têm boa condutibilidade elétrica nos estados sólido e líquido. Com exceção do mercúrio, que é líquido, os metais são sólidos a 25 °C.

LIGAÇÃO IÔNICA

A ligação iônica ocorre entre um íon positivo (cátion) e um íon negativo (ânion). O cloreto de sódio, por exemplo, é formado pela união de cátions Na^+ e ânions Cl^-.

A ligação iônica é, portanto, resultado da atração eletrostática entre espécies de cargas opostas. Um sólido iônico é constituído de cátions e ânions dispostos em arranjos organizados com formas geométricas bem definidas, denominados **retículos cristalinos** (imagens **A** e **B**). O modelo proposto para a estrutura dos sólidos iônicos é capaz de explicar as propriedades dessas substâncias, resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS IÔNICOS	
Propriedade	**Explicação**
Em condições ambientes, são sólidos cristalinos com temperaturas de fusão e de ebulição elevadas.	Há forte atração entre cátions e ânions. Para romper o retículo cristalino e provocar a passagem para o estado líquido, é necessária muita energia.
No estado sólido, são maus condutores; porém, no estado líquido, conduzem bem a corrente elétrica.	A estrutura rígida do retículo cristalino não permite a livre movimentação dos íons. No estado líquido, os cátions e os ânions adquirem liberdade de movimento e podem conduzir corrente, se submetidos à ação de uma tensão elétrica.



AMj Studio/ID/BR



AMj Studio/ID/BR

Retículo cristalino do cloreto de sódio ($NaC\ell$) (imagem **A**) e do fluoreto de cálcio (CaF_2) (imagem **B**). Representações em cores-fantasia.

Fórmula e nomenclatura de substâncias iônicas

A fórmula química de um composto iônico representa a proporção expressa pelos menores números possíveis de cátions e ânions que compõem o retículo cristalino.

Por exemplo, o cloreto de sódio é formado por cátions Na^+ e ânions $C\ell^-$, e sua fórmula química é $NaC\ell$. O fluoreto de cálcio é formado pelos íons Ca^{2+} e F^-, e sua fórmula é CaF_2. Essas fórmulas indicam a proporção entre os íons positivos e os íons negativos que compõem o retículo cristalino.

Um composto iônico é eletricamente neutro, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Isso explica a fórmula do CaF_2: como o Ca^{2+} tem duas cargas positivas, são necessárias duas cargas negativas (dois íons F^-) para neutralizá-las.

Os cátions recebem o nome do próprio elemento dos quais derivam: cátion sódio (Na^+), cátion cálcio (Ca^{2+}), etc.

A nomenclatura dos ânions simples (formados por um único elemento químico) deriva do nome do elemento acrescido da terminação **eto**. Exemplos: fluoreto (F^-) é "flúor + **eto**", cloreto ($C\ell^-$) é "cloro + **eto**". A exceção é o óxido (O^{2-}).

Os nomes dos compostos iônicos são dados da seguinte forma:

nome do ânion + de + nome do cátion

Assim, a substância cloreto de magnésio é formada pelos íons Mg^{2+} e $C\ell^-$. Logo, sua fórmula é $MgC\ell_2$.



AMj Studio/ID/BR

A lâmpada acende porque os eletrodos estão imersos em solução iônica, que conduz eletricidade. Representação em cores-fantasia.

Dissolução de substâncias iônicas em água

Muitas substâncias iônicas, quando colocadas em água, dissolvem-se com a quebra do retículo cristalino e a separação dos íons. Esse processo é chamado **dissociação iônica**, e a solução obtida – denominada **solução iônica** – conduz eletricidade, pois, nessa situação, os íons apresentam maior liberdade de movimento do que quando estão unidos no retículo cristalino.

Não escreva no livro.

Quando, por exemplo, o cloreto de sódio é adicionado à água, sofre dissociação iônica e os íons que se separam do aglomerado iônico são cercados por várias moléculas de água. Esse processo é denominado **solvatação**.



Representação da dissociação iônica, os íons ficam rodeados por moléculas de água, em um processo de solvatação. Cores-fantasia.

O processo de dissociação iônica do cloreto de sódio (NaCℓ) em água pode ser representado pela seguinte equação:

$$NaC\ell(\text{sólido}) \xrightarrow{H_2O} Na^+(\text{aquoso}) + C\ell^-(\text{aquoso})$$

O processo de dissociação iônica em água do cloreto de magnésio ($MgC\ell_2$), substância que apresenta dois átomos de cloro para cada átomo de magnésio, pode ser representado pela equação a seguir.

$$MgC\ell_2(s) \xrightarrow{H_2O} Mg^{2+}(aq) + 2\ C\ell^-(aq)$$

Ao lado do símbolo dos íons escreve-se (aq) – abreviação de aquoso –, que indica que os íons estão dissolvidos em água.

1. a) MgO e $A\ell_2O_3$.
b) As cargas são 2+ para o FeO e 3+ para o Fe_2O_3.
c) O cátion magnésio substitui o cátion ferro (ambos têm carga 2+), e o cátion alumínio substitui o cátion crômio (ambos têm carga 3+).

ROTEIRO

1. A magnetita (Fe_3O_4) é um minério de ferro que apresenta propriedades magnéticas. Sua exploração está relacionada à confecção de ímãs naturais, à produção de ferro metálico e à obtenção de pedras ornamentais. Um minério análogo à magnetita é a cromita ($FeO \cdot Cr_2O_3$), principal minério de crômio. A cromita apresenta muitas impurezas, como o óxido de magnésio e o óxido de alumínio.

a) Sabendo que o ânion óxido tem fórmula O^{2-}, determine as fórmulas dos óxidos de magnésio e de alumínio.

b) A magnetita é um óxido misto de ferro – uma associação de óxidos iônicos de ferro com cargas distintas. Determine a carga de cada cátion Fe na magnetita.

c) No caso da estrutura da cromita, o cátion magnésio deve substituir o cátion de ferro ou o de crômio? E o cátion alumínio deve substituir qual íon na cromita?

ATIVIDADE RESOLVIDA

Escreva a equação que representa o que ocorre quando o KCℓ é adicionado à água e represente o modelo que ilustra o processo.

Resolução

Por se tratar de uma substância iônica, o KCℓ sofre dissociação iônica quando é adicionado à água. Esta é a equação que representa o processo:

$$KC\ell(s) \xrightarrow{H_2O} K^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

No modelo que representa o processo, os íons $K^+(aq)$ e $C\ell^-(aq)$ ficam rodeados por moléculas de água à medida que o retículo cristalino se desfaz.



LIGAÇÃO COVALENTE

As substâncias moleculares são formadas por átomos unidos por **ligação covalente**. Esse tipo de ligação química se forma por compartilhamento de um ou mais pares de elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos. Os elétrons compartilhados são atraídos pelos núcleos dos dois átomos participantes da ligação. É essa força de atração que os mantém unidos.

Na molécula de gás hidrogênio (H_2), por exemplo, cada átomo de hidrogênio (H) compartilha seu único elétron para formar a ligação covalente.



ID/BR

Na ligação covalente entre os átomos de H, o elétron de cada átomo é compartilhado pelos dois núcleos e se movimenta por uma região que engloba os dois átomos. Cores-fantasia.

Segundo o modelo do octeto, os átomos pertencentes aos grupos 14, 15, 16 e 17 da Tabela Periódica tendem a compartilhar elétrons da camada mais externa com outros átomos até atingir oito elétrons na camada de valência.

Assim, átomos do grupo 14, como o carbono (C), podem receber mais quatro elétrons para se estabilizar; os átomos do grupo 15 podem receber três elétrons; os átomos do grupo 16 podem receber dois elétrons, e os átomos do grupo 17 recebem apenas um elétron.

Eletronegatividade e as ligações químicas

Quando dois átomos estão ligados, há interação elétrica de atração entre os núcleos desses átomos e os elétrons da última camada de ambos. A eletronegatividade está relacionada à tendência do núcleo de um átomo em atrair os elétrons envolvidos em uma ligação. Quanto maior for essa tendência de atração, maior será a eletronegatividade do elemento.

O conceito de eletronegatividade foi desenvolvido pelo químico estadunidense Linus Pauling (1901-1994) e possibilitou uma classificação mais abrangente das substâncias. A **eletronegatividade** é, portanto, uma grandeza que corresponde à capacidade que o átomo de um elemento tem de atrair elétrons da ligação, quando combinado com outro átomo. O átomo que atrai esses elétrons com mais intensidade é mais eletronegativo. Aquele que os atrai com menos intensidade é menos eletronegativo.

Pauling sugeriu que as ligações entre átomos de elementos com baixa eletronegatividade apresentam elevado caráter metálico. Nessas ligações, a baixa atração pelos elétrons justificaria a presença de elétrons livres. É o que ocorre nas substâncias metálicas, como o magnésio, o cálcio, o cobre, entre outras.

Ligações entre átomos de eletronegatividade mais alta apresentam forte caráter covalente. Como esses átomos têm maior tendência a atrair os elétrons, estes são compartilhados, ficando fortemente ligados aos núcleos. Ligações covalentes estão presentes, por exemplo, na água (H_2O), no dióxido de carbono (CO_2) e no gás oxigênio (O_2). As ligações entre átomos de alumínio e átomos de cloro no cloreto de alumínio sólido anidro ($A\ell_2C\ell_6$), por exemplo, mesmo contendo um elemento metálico, apresentam acentuado caráter covalente. O cloreto de alumínio, portanto, é considerado uma substância molecular.

Se um átomo de um elemento de eletronegatividade muito baixa se ligar a um átomo de um elemento de eletronegatividade muito alta, essa interação tende a ter alto caráter iônico, pois o par de elétrons da ligação é atraído pelo átomo mais eletronegativo. Nesse caso, o átomo do elemento menos eletronegativo pode ser considerado cátion, e o do mais eletronegativo, ânion. Um exemplo desse tipo de ligação está presente no cloreto de sódio ($NaC\ell$).

Não escreva no livro.

LIGAÇÃO METÁLICA

Os metais são substâncias simples de elementos metálicos ou misturas homogêneas dessas substâncias – as ligas metálicas.

Os núcleos dos átomos de elementos metálicos apresentam, geralmente, baixa atração pelos elétrons da camada de valência.

Supõe-se que os átomos com essas características, quando se unem, formem uma estrutura em que os elétrons da última camada não ficam restritos ao respectivo átomo, mas circulam por todo o material. Os núcleos dos átomos exercem pequena atração nos elétrons da camada de valência dos átomos vizinhos, deixando esses elétrons mais "soltos".

As principais características comuns dos metais podem ser explicadas por esse modelo, no qual os cátions dos elementos metálicos estão dispostos em um retículo cristalino, e os elétrons da camada de valência circulam livremente entre eles. Esse modelo de ligação é conhecido como modelo de "**nuvem de elétrons**" ou "**mar de elétrons livres**".



AMJ Studio/ID/BR

Modelo de ligação metálica: "nuvem de elétrons". Representação em cores-fantasia.

As principais características dos metais são a condutibilidade térmica e elétrica, a maleabilidade, a ductibilidade e o brilho.

A livre movimentação dos elétrons explica a condução de eletricidade (movimentação ordenada de carga) decorrente da aplicação de um potencial elétrico.

O movimento dos elétrons pelo material aumenta a eficiência da condução de calor, facilitando a transferência de movimento entre os átomos. Já a maleabilidade pode ser explicada pelo rearranjo do retículo metálico devido à tensão mecânica: a aproximação dos cátions provoca repulsões, amenizadas pelo movimento dos elétrons, não ocorrendo ruptura do material, mas, sim, um deslizamento dos átomos e o rearranjo do retículo.

A ductibilidade consiste em transformar os metais em fios ou em lâminas. Isso pode ser feito ao aplicar adequada pressão em determinadas regiões da superfície do metal.

O brilho característico dos metais polidos pode ser percebido, pois os elétrons livres na superfície do metal absorvem e irradiam a luz.



Van Rossen/Shutterstock.com/ID/BR

FactoryTy/iStock/Getty Images

A prata (**A**) e o fio de cobre (**B**) apresentam maleabilidade e ductibilidade, características dos metais.

2. a) Não, pois existem substâncias metálicas e covalentes formadas por um único elemento químico.
b) Pode-se verificar a maleabilidade e a condutibilidade elétrica da substância, pois substâncias covalentes maleáveis não conduzem corrente elétrica. A única substância covalente que conduz corrente elétrica é a grafita, que não é maleável. Apenas substâncias metálicas conduzem corrente elétrica e são maleáveis ao mesmo tempo.

ROTEIRO

2. Leia a afirmação a seguir e responda às questões.

A análise de uma substância sólida indicou que ela é formada por somente um elemento químico.

a) Diante dessa afirmação, é possível descobrir o tipo de ligação dessa substância? Por quê?

b) Quais procedimentos você faria para comprovar que essa substância apresenta o(s) tipo(s) de ligação apontado(s) na resposta do item **a**? Informe também quais resultados seriam esperados para esse procedimento.

A liga de bismuto apresenta baixa temperatura de fusão; por isso, é usada em fusíveis, que protegem o circuito quando há sobrecarga.

PARA EXPLORAR

Leia

Tipos de aço inox

O texto, publicado pela Associação Brasileira do Aço Inoxidável (Abinox), descreve os vários tipos de aço inoxidável e explica o grande número de aplicações dessas ligas metálicas.

Disponível em: https://abinox.org.br/tipos-de-aco-inox/. Acesso em: 18 jun. 2024.

Ligas metálicas

As ligas metálicas são conhecidas desde a Antiguidade. O bronze (liga de cobre e estanho) e ligas de ouro já eram usados para a fabricação de armas e joias, por exemplo.

Ligas metálicas são misturas homogêneas sólidas, formadas principalmente por dois ou mais metais, em proporções variáveis, podendo apresentar também certos elementos não metálicos em sua composição.

A natureza da ligação metálica explica a possibilidade de interação entre metais de diferentes elementos.

Conhecido pela inércia química e maleabilidade, o ouro é, na verdade, um metal mole ou de baixa dureza, que pode ser facilmente riscado. Para a confecção de joias, utiliza-se uma liga contendo 75% (em massa) de ouro e o restante de cobre e prata – essa é a composição do ouro 18 quilates, uma liga que apresenta a dureza adequada para a joia, mas mantém o brilho e a durabilidade do ouro.

Metal de maior produção na atualidade, o ferro tem baixíssima aplicação quando apresenta elevada pureza. Entretanto, o aço, uma liga de ferro contendo 0,2% a 1,5% (em massa) de carbono, apresenta uma extensa gama de aplicações. É a adição de outros metais, por exemplo, que confere ao aço certas características, como dureza (aço usado em objetos de corte), resistência à oxidação (aço inoxidável), resistência à tração (cabos de aço) e resistência mecânica.

Algumas ligas metálicas se destacam por sua baixa temperatura de fusão. É o caso de uma das ligas presentes em certos fusíveis especiais, denominada *metal wood*, formada por bismuto, chumbo, estanho e cádmio. Como essa liga se funde a 70 °C, seu emprego é adequado à proteção de circuitos elétricos, pois, caso haja sobrecarga, o fusível derrete, interrompendo o circuito e protegendo os demais componentes do sistema.

CIÊNCIA SE DISCUTE

Linus Pauling e a descoberta da estrutura do DNA

No início da década de 1950, Linus Pauling era amplamente conhecido e respeitado no meio científico por seus trabalhos sobre ligações químicas e a estrutura das moléculas. Foi nessa época que Pauling resolveu direcionar seus esforços para a compreensão das moléculas biológicas. Seus estudos com as proteínas desvendaram a estrutura dessas moléculas, e o próximo passo seria desvendar a estrutura da molécula de DNA.

Além dele, o biólogo e geneticista estadunidense James Watson (1928-), o biólogo britânico Francis Crick (1916-2004), o fisiologista neozelandês Maurice Wilkins (1916-2004) e a química britânica Rosalind Franklin (1920-1958) também estavam na corrida para desvendar a estrutura do DNA.

Pauling já sabia que a molécula do DNA era helicoidal, mas faltavam mais informações, como as imagens de raio X do DNA que Maurice Wilkins e Rosalind Franklin produziram.

Em 1951, Pauling soube dessas imagens e pediu para vê-las. Wilkins, porém, se recusou a mostrá-las. Em 1953, Pauling publicou um artigo com seu colaborador, o bioquímico estadunidense Robert Corey (1897-1971), no qual descrevia uma estrutura de tripla hélice, com as bases A, C, G e T apontadas para fora. O fosfato formava a espinha dorsal da molécula. A coesão da molécula dependia de ligações de hidrogênio entre os grupos fosfatos. O problema é que não podia haver hidrogênio na estrutura, pois os fosfatos perdem hidrogênio em pH usual dentro das células, ou seja, a estrutura proposta por Pauling era energeticamente instável.

A estrutura do DNA foi revelada em 1954 pelos pesquisadores Watson e Crick, com a utilização das imagens de raio X produzidas por Rosalind Franklin.

Apesar de não ter decifrado essa estrutura, Pauling recebeu dois prêmios Nobel: o de Química, por seu trabalho sobre a natureza das ligações químicas, e o da Paz, por sua atuação como pacifista e contra os testes nucleares.

1. **De acordo com o texto, qual era o problema na estrutura proposta por Linus Pauling e Robert Corey para o DNA?** O problema era a estrutura interna do fosfato, que dependia de ligações entre os hidrogênios para se manter estável.

2. **Watson, Crick e Wilkins receberam um prêmio Nobel pela descoberta da estrutura do DNA, porém não é possível afirmar que eles tenham chegado sozinhos a esse resultado. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta.** Espera-se que os estudantes reconheçam que, para chegar à estrutura correta do DNA, foi preciso o trabalho de diversos cientistas, como Erwin Chargaff (1905-2002) e Rosalind Franklin (1920-1958).

Não escreva no livro.

QUÍMICA E SOCIOLOGIA

A IMPORTÂNCIA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA RECICLAGEM DO ALUMÍNIO

A reciclagem do alumínio emerge como um dos pilares essenciais da sustentabilidade ambiental e econômica no contexto brasileiro. Dentro dessa dinâmica, os catadores de materiais recicláveis desempenham um papel central na cadeia da reciclagem, atuando como protagonistas na coleta (recolhendo latas em eventos, ruas, terrenos baldios, lixões, etc.), na triagem e no encaminhamento dos resíduos de alumínio para os processos de reciclagem e posterior reintrodução na cadeia produtiva.

Historicamente, a reciclagem no Brasil se tornou viável em grande escala quando o recolhimento e a separação dos resíduos se mostraram uma tarefa viável e de baixo custo. Isso permitiu a expansão do negócio da reciclagem no país, que tem o trabalho dos catadores como base de sustentação do setor. Com o aumento da produção anual de resíduos no Brasil, esses profissionais alcançaram importância crescente na sociedade. Segundo estimativas do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, existem cerca de um milhão de catadores no país, o que contribui muito para que o ciclo da reciclagem de uma lata de alumínio, por exemplo, ocorra em menos de 60 dias (considerando desde a compra do produto, o uso, a coleta, a reciclagem, até o retorno ao ponto de venda).

Entretanto, a atuação dos catadores de materiais recicláveis revela dinâmicas complexas de inclusão social, preservação ambiental e otimização de recursos. A figura do catador reflete as desigualdades sociais e econômicas presentes na sociedade brasileira. A grande maioria deles enfrenta condições precárias de trabalho, atua em ambientes insalubres, na informalidade, sem equipamentos de proteção individual, recebendo uma remuneração muitas vezes insuficiente pelo seu trabalho, além de conviver com o estigma e a discriminação sociais relacionados à sua ocupação.

É necessário valorizar esses trabalhadores e promover a implantação de políticas públicas condizentes com a sua importância na cadeia da economia sustentável, em especial programas de assistência, promoção social e de saúde. A organização desses profissionais em cooperativas e associações tem sido uma alternativa para reivindicação de direitos, inclusão social e luta por condições dignas de trabalho. Nas cooperativas, o trabalho dos catadores ganha maior proporção, com a possibilidade de coleta e de tratamento de grandes quantidades de material reciclável e, consequentemente, sua venda com a geração de maior renda para cada cooperado. Cooperativas, movimentos e organizações não governamentais devem pressionar pela efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), buscando também soluções para que os catadores abandonem o serviço de tração, feito de forma braçal, para o transporte dos materiais recolhidos.

Lucas Lacaz Ruiz/Fotoarena

Em 2022, o Brasil conquistou uma marca notável ao reciclar praticamente 100% das latas de alumínio usadas em bebidas.

Rogério Reis/Pulsar Imagens

Alguns catadores chegam a transportar de 1 a 2 toneladas de materiais recolhidos nos grandes centros e cidades.

Conecte as ideias

1 **Atualmente, diversos produtos recebem embalagens de alumínio e *designs* inovadores, enquanto a extração desse minério segue em todo o planeta com um custo permanente para o ambiente. Considerando a reciclagem do alumínio, como a coleta seletiva realizada pelos catadores contribui para a preservação dos recursos naturais e para a redução da poluição?**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Discuta com os colegas sobre os desafios sociais enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil. Como as condições de trabalho, a informalidade e os estigmas sociais afetam esses profissionais? Qual é o papel das cooperativas na melhoria das condições de vida desses trabalhadores?**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Pesquise e discuta com os colegas sobre como as políticas públicas municipais podem promover a integração dos catadores na economia circular, considerando os compromissos com o desenvolvimento sustentável.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

FÓRMULAS DAS SUBSTÂNCIAS MOLECULARES: AS REPRESENTAÇÕES DE LEWIS

O químico estadunidense Gilbert Lewis (1875-1946) propôs uma teoria segundo a qual os átomos compartilham pares de elétrons para formar o octeto ou o dueto (oito elétrons e dois elétrons, respectivamente, na camada de valência), no caso específico do hidrogênio. No desenho das estruturas de Lewis, cada elétron da camada de valência é representado por um ponto. Essa representação ficou conhecida como **fórmula ou representação de Lewis** ou **fórmula eletrônica**.

ID/BR



Representação de átomos de alguns elementos. Os números no topo indicam os grupos da Tabela Periódica.

As ligações covalentes entre os átomos podem ser representadas por meio dessa fórmula. Cada par de elétrons compartilhado representa uma ligação química, ou seja, os elétrons pertencem à região da eletrosfera comum a cada par de átomos unidos.

Além da fórmula de Lewis, é comum representar as moléculas pela **fórmula estrutural**, em que cada ligação covalente equivale a um traço.

No quadro a seguir estão representadas as fórmulas de algumas moléculas comuns.

ID/BR



Moléculas representadas pelas fórmulas de Lewis (parte superior da imagem **B**) e pelas fórmulas estruturais (parte central).

LIGAÇÕES SIMPLES, DUPLAS E TRIPLAS

Dois átomos podem compartilhar até três pares de elétrons entre si.

A ligação simples entre átomos ocorre quando eles compartilham um único par de elétrons. Se a ligação envolver dois ou três pares de elétrons, ela é denominada ligação dupla ou ligação tripla, respectivamente.

Observe os exemplos.

ID/BR



Fórmulas (de Lewis e estruturais) com os três tipos de ligação.

Fontes de pesquisa das imagens A, B e C: IUPAC. *Iupac compendium of chemical terminology* (Compêndio de terminologia química) (Gold Book). 2. ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Versão *on-line* (2019-). Disponível em: https://goldbook.iupac.org/terms/view/L03513. PERIODIC Table of Elements (Tabela Periódica dos Elementos). Iupac. Disponível em: https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Acessos em: 18 jun. 2024.

Nas fórmulas eletrônicas apresentadas nas figuras **B** e **C**, todos os átomos respeitam a regra do octeto. Os átomos de hidrogênio apresentam dois elétrons e os demais átomos, oito elétrons na camada de valência – o número máximo de elétrons que suas camadas de valência comportam.

Não escreva no livro.

A POLARIDADE DAS LIGAÇÕES E DAS MOLÉCULAS

Muitas das propriedades das substâncias moleculares, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade, podem ser interpretadas com base na polaridade das ligações entre os átomos que as formam.

Ligações apolares e ligações polares

Considere as moléculas dos gases oxigênio (O_2), nitrogênio (N_2), e cloro ($C\ell_2$). Segundo o modelo estabelecido para as ligações covalentes, os átomos envolvidos nessas ligações compartilham elétrons.

Quando esse compartilhamento ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade, ambos exercem a mesma força de atração sobre os elétrons da ligação. Logo, a distribuição de cargas no espaço é simétrica, ou seja, não há formação de polos elétricos na molécula, e a ligação química é classificada como **apolar**.

Ligações covalentes apolares, portanto, são aquelas em que os elétrons são igualmente compartilhados entre os átomos da ligação.

Nas ligações covalentes entre átomos de diferentes eletronegatividades, o átomo mais eletronegativo atrai com maior intensidade os elétrons da ligação, deslocando para si maior densidade de carga negativa. Essa ligação é denominada **covalente polar**.

Em uma ligação covalente polar, os dois átomos formam um dipolo elétrico, que resulta em uma carga parcial positiva e em uma carga parcial negativa de mesma intensidade. Na molécula de cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), por exemplo, os elétrons da ligação são mais fortemente atraídos pelo cloro, cuja eletronegatividade é maior.

Ligações covalentes polares são, portanto, aquelas em que os pares de elétrons compartilhados estão mais próximos de um dos átomos da ligação (átomo mais eletronegativo). A região da ligação que apresenta maior densidade de elétrons é representada por δ^- (carga parcial negativa). A região com menor densidade eletrônica é representada por δ^+ (carga parcial positiva).



AMj Studio/D/BR

Representação da distribuição eletrônica que envolve dois átomos de oxigênio (molécula diatômica com ligação apolar). Cores-fantasia.



AMj Studio/D/BR

Representação da distribuição eletrônica que mostra a interação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro (molécula diatômica com ligação polar). Cores-fantasia.

Momento de dipolo e polaridade das moléculas

A polaridade de uma ligação é uma consequência da simetria, ou não, com que os elétrons da ligação se distribuem em torno dos átomos envolvidos. Uma molécula apolar é aquela em que os elétrons estão simetricamente distribuídos. Já uma molécula polar, por outro lado, tem uma de suas extremidades com maior densidade eletrônica, ou seja, a distribuição de cargas não é uniforme (assimétrica).

As ligações polares apresentam dipolos elétricos. A intensidade de um dipolo elétrico, que indica a intensidade das cargas parciais, é chamada **momento de dipolo** ou **momento dipolar** e é representada por $\vec{\mu}$.

O momento dipolar resultante de uma molécula ($\vec{\mu}_R$) é dado pela soma vetorial dos momentos de dipolo de todas as suas ligações.

Uma molécula classificada em apolar apresenta momento de dipolo resultante igual a zero ($\vec{\mu}_R = 0$); na molécula polar, o momento de dipolo resultante é diferente de zero ($\vec{\mu}_R \neq 0$).

GEOMETRIA MOLECULAR E POLARIDADE DE MOLÉCULAS

Grande parte das propriedades físicas e químicas das substâncias depende não só das características dos elementos que as constituem, mas também da geometria de suas moléculas. É o que ocorre, por exemplo, com a molécula do dióxido de enxofre (SO_2), cuja geometria faz com que ele seja polar. A soma vetorial dos momentos de dipolo dessa molécula resulta em $\vec{\mu}_R \neq 0$, como representado na figura **A**. A molécula de SO_2 é angular, a de $CHC\ell_3$ é tetraédrica e a de NH_3, piramidal triangular. A seta roxa indica o momento dipolar resultante das moléculas.

Já a distribuição simétrica de dipolos elétricos ao redor de um átomo central resulta em $\vec{\mu}_R = 0$. A classificação das moléculas em apolares é observada no dióxido de carbono (CO_2), de geometria linear; no tetracloreto de carbono ($CC\ell_4$), de estrutura tetraédrica; e no trifluoreto de boro (BF_3), na forma trigonal plana (figura **B**).



ID/BR

Geometrias variadas de moléculas polares. Representação em cores-fantasia.

Representação sem proporção de tamanho.



ID/BR

Geometrias variadas de moléculas apolares. Representação em cores-fantasia.

Visão espacial das geometrias moleculares mais comuns

Para prever a geometria de uma molécula, pode-se proceder do seguinte modo: escreva a fórmula eletrônica da molécula e identifique o átomo central; faça a distribuição espacial dos pares de elétrons da camada de valência ao redor do átomo central; garanta que os pares de elétrons estejam com a máxima distância possível entre eles. Para definir a geometria, observe a distribuição espacial dos átomos envolvidos.

O quadro a seguir apresenta alguns exemplos.

Fórmula eletrônica	Distribuição dos pares de elétrons ao redor do átomo central	Geometria molecular	Distribuição espacial (em cores-fantasia)
:Ö: :C: :Ö: 2 pares	O=C=O	O=C=O linear	
H–C(=O)–H 3 pares		trigonal plana	
3 pares		angular	
4 pares		tetraédrica	
4 pares		piramidal	
4 pares		angular	

Ilustrações: ID/BR

ROTEIRO

3. Indique se as moléculas a seguir são polares ou apolares. Justifique suas respostas.

a) H—Cℓ
linear

b) O=C=O
linear

c)
trigonal plana

d)
piramidal

e)
angular

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Representação sem proporção de tamanho.

Não escreva no livro.

ESTADO FÍSICO DAS SUBSTÂNCIAS E AS FORÇAS INTERMOLECULARES

De forma geral, em nosso cotidiano, a matéria se apresenta em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

No estado gasoso, as moléculas encontram-se muito separadas umas das outras e praticamente não existem forças atrativas entre elas; por isso, os gases tendem a ocupar totalmente o recipiente que os contém. Já nos estados líquido e sólido, as forças atrativas entre as moléculas impedem que elas se difundam por todo o recipiente. Essas forças são denominadas **forças intermoleculares**, forças de Van der Waals ou interações de Van der Waals, em homenagem ao físico holandês Johannes Diederik van der Waals (1837-1923).



AMJ Studio/ID/BR

Nas moléculas no estado gasoso, as forças intermoleculares são muito fracas, por isso elas se encontram bastante separadas; já nos estados líquido e sólido, as forças intermoleculares mantêm as moléculas unidas. Representação em cores-fantasia.

Representação sem proporção de tamanho.

As interações de Van der Waals explicam por que a maior parte das substâncias moleculares pode ser encontrada na natureza nos três estados físicos da matéria. Caso não houvesse atração entre as moléculas, todas as substâncias moleculares seriam encontradas somente no estado gasoso. Essas interações também explicam a solubilidade de alguns materiais em determinados solventes.

Essas forças podem ser intensas o suficiente, por exemplo, para manter muitas substâncias moleculares em estado sólido ou líquido, porém são bem mais fracas que as ligações iônicas e as covalentes.



Historic Collection/Alamy/Fotoarena

O físico holandês Johannes Diederik van der Waals recebeu o Nobel de Física de 1910 por seu trabalho sobre as forças intermoleculares nos gases. Foto do início do século XX.

Interações dipolo-dipolo

Como vimos, as moléculas polares não apresentam distribuição uniforme de cargas elétricas. Essa distribuição assimétrica é responsável pela geração de dipolos elétricos permanentes (momento dipolar diferente de zero, $\vec{\mu} \neq 0$), o que faz as moléculas interagirem umas com as outras por atração eletrostática entre dipolos. Em outras palavras, o polo positivo de uma atrai o negativo de outra.

Interações dipolo-dipolo ou interações entre dipolos permanentes são forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares.

É esse tipo de interação que mantém unidas as moléculas de cloreto de hidrogênio ($HC\ell$). Nesse caso, o polo positivo de uma molécula (H) atrai o negativo da outra ($C\ell$).

Quanto maior a polaridade de uma molécula, mais intensas as interações dipolo-dipolo na substância devido à atração entre dipolos permanentes.

Representação sem proporção de tamanho.



AMJ Studio/ID/BR

Interações dipolo-dipolo entre moléculas de cloreto de hidrogênio. Representação em cores-fantasia.

As interações íon-dipolo

Interações íon-dipolo são aquelas que ocorrem entre íons e moléculas polares, como as que se dão entre as moléculas de água e as de cloreto de sódio (NaCℓ, constituído de íons Na^+ e $Cℓ^-$).

A água é uma molécula polar, com carga parcial negativa sobre o átomo de oxigênio e com cargas parciais positivas sobre os átomos de hidrogênio. O NaCℓ, ao ser adicionado à água, sofre dissociação iônica em decorrência da forte atração entre os íons e o dipolo permanente presente nas moléculas de água – as chamadas interações íon-dipolo.

O arranjo espacial de uma solução aquosa de NaCℓ pode ser representado, no nível microscópico, por cátions e ânions circundados por moléculas de água, com o polo positivo da água sendo atraído pelo ânion, e o negativo, pelo cátion.

Diz-se que o íon metálico atraído pelas moléculas de água está hidratado.



AMj Studio/ID/BR

Atração entre polos positivos e negativos das substâncias água e cloreto de sódio. Representação em cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Interações intermoleculares. UFJF, 2015. p.11. Disponível em: http://www.ufjf.br/quimica/files/2015/06/aula-14-quimica-fundamental-2019-3-Intera%C3%A7%C3%B5es-Intermoleculares.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024.

Ligações de hidrogênio

Quando as interações entre dipolos permanentes ocorrem em moléculas que têm um átomo de hidrogênio ligado a flúor (F), oxigênio (O) ou nitrogênio (N), essas interações recebem o nome de **ligações de hidrogênio**.

Um exemplo desse tipo de ligação é o fluoreto de hidrogênio (HF), que, no estado sólido, é constituído de cadeias em zigue-zague de HF unidas por ligações de hidrogênio.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Ligações de hidrogênio mantêm as moléculas de HF unidas. A interação da nuvem eletrônica do átomo de flúor atrai o H da molécula vizinha. A atração resulta na formação de uma cadeia de moléculas de HF. Cores-fantasia.

A temperatura de ebulição da água é excepcionalmente mais alta que a de outras substâncias moleculares formadas por outros elementos do grupo 16 e hidrogênio, conforme apresentado na tabela a seguir.

Substância	Temperatura de ebulição (°C)
H_2O	100
H_2Te	−2
H_2Se	−41,3
H_2S	59,5

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 4-65.

Não escreva no livro.

As ligações de hidrogênio estabelecidas entre as moléculas de água explicam sua alta temperatura de ebulição quando comparada com as demais moléculas do grupo que apresentam interação dipolo-dipolo.

Aliás, as ligações de hidrogênio estabelecidas entre moléculas de água também explicam a alta **tensão superficial** da água. A tensão superficial, como o próprio nome diz, é um fenômeno de superfície e pode ser explicada da seguinte forma: em um líquido, as forças de atração entre as moléculas de sua superfície são diferentes daquelas que atuam em seu interior. Enquanto no interior do líquido as moléculas se atraem mutuamente com as mesmas forças, as que ocupam a superfície são atraídas para o interior, pois não há moléculas de líquido acima da superfície, apenas o ar (a atração entre as moléculas do líquido é bem maior do que a interação deste com os componentes do ar). Como consequência, o líquido se comporta como se tivesse uma membrana elástica em sua superfície. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos andem sobre ela.

Katoosha/iStock/Getty Images

O fenômeno da alta tensão superficial da água explica por que alguns insetos são capazes de andar sobre sua superfície, como esse inseto da família *Gerridae* retratado nessa foto.

As ligações de hidrogênio também ocorrem entre moléculas de água (H_2O) e entre moléculas de álcool etílico ou etanol (C_2H_6O). Em ambos os casos, o hidrogênio (polo positivo) de uma das moléculas é atraído pelo oxigênio da outra.



AMj Studio/ID/BR

Moléculas que se atraem por meio de ligações de hidrogênio: água (H_2O), à esquerda, e etanol (C_2H_6O), à direita. Representação em cores-fantasia.

A alta solubilidade do álcool em água, que se dá em qualquer proporção, é explicada, entre outros fatores, pelo estabelecimento de ligações de hidrogênio entre as moléculas de ambas as substâncias. Nesse caso, as interações ocorrem entre moléculas de substâncias diferentes.

Interações entre moléculas apolares

Há evidências de que as moléculas de substâncias apolares estão associadas por meio de forças elétricas de baixa intensidade. O fato de ser possível liquefazer o gás nitrogênio (N_2) pode ser explicado a partir dessas interações. Essas forças de baixa intensidade também explicam a existência de substâncias apolares líquidas, entre elas os hidrocarbonetos presentes na gasolina (compostos formados por carbono e hidrogênio), e de substâncias apolares sólidas, como o iodo (I_2).

As atrações que ocorrem entre moléculas apolares são denominadas interações **dipolo induzido-dipolo induzido**, dipolo instantâneo-dipolo induzido, forças de dispersão de London ou, simplesmente, forças de London.

As interações de London – assim denominadas em homenagem ao físico alemão, naturalizado estadunidense, Fritz Wolfgang London (1900-1954), que as relacionou com o movimento de elétrons das moléculas – podem ser compreendidas da seguinte forma: quando duas moléculas apolares se aproximam, as atrações ou as repulsões eletrônicas entre seus elétrons e núcleos podem levar a deformações momentâneas em suas nuvens de elétrons. Essas deformações geram nas moléculas regiões com diferentes distribuições de cargas, chamadas dipolos instantâneos induzidos.

Os dipolos instantâneos podem induzir a polarização de moléculas adjacentes, resultando em forças atrativas.



AMj Studio/ID/BR

A flutuação dos elétrons periféricos de duas moléculas vizinhas resulta na formação de dipolos instantâneos induzidos. Representação em cores-fantasia.

Todas as moléculas, polares ou apolares, apresentam interações do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido. Nas moléculas apolares, contudo, esse é o único tipo de interação molecular presente.

A intensidade dessas forças varia muito, porém, em geral, é menos intensa do que as anteriores (dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio) e depende da superfície de contato entre as moléculas. Geralmente, quanto maior a superfície de contato entre moléculas apolares, maior a indução que uma exerce sobre a outra e maior a atração entre ambas. A polarização ocorre mais facilmente no I_2 (que apresenta uma nuvem ampla e extensa de elétrons) do que nos gases H_2 ou He.

ROTEIRO

4. O vinagre é formado por uma mistura contendo, aproximadamente, 5% de ácido acético em água. O ácido acético tem a seguinte fórmula estrutural:



- Que tipo de interação intermolecular ocorre entre o ácido acético e a água?

Ligações de hidrogênio.

Interações dipolo-dipolo induzido

As forças de London também podem ocorrer entre moléculas diferentes, sendo uma delas polar e a outra apolar. Nesse caso, o dipolo permanente de uma das moléculas (polar) induz um dipolo instantâneo na apolar.

Essa interação explica, por exemplo, a presença de oxigênio (O_2) dissolvido na água. Nesse caso, pode-se imaginar que, quando a extremidade negativa das moléculas de água se aproxima das moléculas de O_2, a nuvem eletrônica das moléculas apolares se afasta em virtude da repulsão entre elas e a carga negativa do dipolo da água. Como consequência, as moléculas de O_2 tornam-se momentaneamente polarizadas e interagem com as de H_2O, atraindo-se mutuamente.

O oxigênio dissolvido em ambientes aquáticos

A solubilidade do oxigênio em água (OD – oxigênio dissolvido) é pequena (cerca de 8,1 mg em 1 L, a 25 °C e $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa) devido à fraca interação dipolo-dipolo induzido que se estabelece entre ambas as moléculas (H_2O, polar, e O_2, apolar).

A presença de oxigênio dissolvido na água é essencial à vida de vários organismos aquáticos. Alguns microrganismos utilizam oxigênio para converter substâncias dissolvidas na água em moléculas ou em íons menores e mais simples, como dióxido de carbono, água, fosfato e nitrato. Nesses processos, denominados oxidativos, o oxigênio é removido do sistema aquático e pode ser reposto pela interface ar-água. A reposição natural se dá por meio de interações dipolo-dipolo induzido entre as moléculas de água da superfície (de um rio, por exemplo) e o oxigênio do ar. Além disso, também a fotossíntese da biota aquática tem um papel fundamental no processo de reposição do oxigênio dissolvido nos ambientes aquáticos.

Em águas muito poluídas, o excesso de matéria orgânica pode provocar séria diminuição do nível de OD e, consequentemente, a morte de peixes e de outros grupos de seres vivos.

A quantidade de oxigênio necessária para promover a oxidação da matéria orgânica em ambientes aquáticos é denominada demanda bioquímica de oxigênio (DBO). As águas muito poluídas apresentam, em geral, elevadas concentrações de matéria orgânica e, por isso, DBO elevada.

Não escreva no livro.

Moldando sólidos com um martelo

Materiais sólidos, apesar de estarem no mesmo estado físico, podem apresentar diferentes propriedades. Qual é a relação entre as propriedades de um material e o tipo de ligação química que o constitui? O que acontece ao se utilizar um martelo para moldar diferentes sólidos? É possível, com base nas propriedades observadas de um material, determinar o tipo de ligação química que o constitui?

Nesta atividade, você e os colegas vão investigar a maleabilidade de alguns materiais atingidos por uma martelada e fazer suposições sobre o tipo de interação entre seus átomos.

Material

- sal grosso (cristais de cloreto de sódio)
- lâmina de cobre
- vela de parafina
- martelo
- tábua de madeira

Davi Augusto Studio/ID/BR

Como fazer

1. Com a ajuda do(a) professor(a), organizem-se em duplas. Cada dupla vai receber uma amostra dos materiais.
2. Observem os materiais que serão submetidos à martelada: o sal grosso, a lâmina de cobre e a vela de parafina. Manuseiem esses materiais e anotem no caderno o que vocês esperam que aconteça com cada um deles depois de serem submetidos à martelada.
3. Observem o(a) professor(a) bater moderadamente com um martelo em cada um dos materiais.
4. Você e o colega de dupla vão descrever, no caderno, o que aconteceu com a estrutura de cada um dos materiais após a martelada.
5. Identifiquem quais materiais foram moldados pelo martelo e quais se quebraram. Construam uma tabela no caderno para anotar essas informações.
6. Considerando apenas as características dos três sólidos e a forma como reagiram à martelada, classifiquem-nos em maleáveis e não maleáveis. Com base nessa classificação, façam suposições sobre os tipos de ligação química que os constituem. Anotem essa classificação no caderno.
7. Pesquisem quais são os elementos químicos que compõem majoritariamente os materiais testados. Qual tipo de ligação química forma cada um desses materiais?
8. Relacionem o tipo de ligação química que constitui cada um dos materiais com o comportamento deles após a martelada. Anotem suas conclusões no caderno.
9. Apresentem seus resultados às demais duplas. Todas as hipóteses apresentadas serão discutidas e analisadas pela turma. Depois, construam uma hipótese coletiva que explique a relação entre o tipo de ligação química e as propriedades dos materiais testados.
10. Consultem no texto do tópico "Ligações metálicas" que hipótese mais aceita cientificamente pode explicar a relação entre os tipos de ligação química e as propriedades dos materiais.

Para concluir

1 **Os materiais submetidos à martelada se comportaram da forma que vocês previram no início da atividade? Expliquem quais foram as diferenças observadas.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Além de observar e de manusear os materiais testados, que outras estratégias podem ser adotadas para identificar os tipos de ligação química que formam cada um deles?**

3 **A hipótese que vocês elaboraram se aproximou da hipótese mais aceita cientificamente? Expliquem.** Resposta variável, que vai depender das hipóteses elaboradas pelas duplas.

4 **Alguma dupla teve ideias diferentes das suas e que vocês julgaram interessantes? Em caso positivo, qual(is)? Expliquem sua resposta.** Resposta variável, que vai depender da hipótese elaborada pelas duplas.

5 **Quais dificuldades vocês tiveram ao tentar elaborar uma hipótese para explicar o experimento?** Resposta pessoal. Incentive os estudantes a elaborar as etapas de construção da hipótese e discuta qual foi a dificuldade apresentada em cada etapa, incentivando-os a refletir sobre como se deve elaborar uma hipótese científica. Será que difere muito do processo de construção da hipótese deles? Pode-se extrapolar a discussão com algumas questões: Como é o fazer científico? Na opinião de vocês, como é o trabalho de um cientista?

2. Espera-se que os estudantes respondam que é possível testar os materiais quanto à temperatura de fusão e de ebulição, à solubilidade em água e à capacidade de conduzir corrente elétrica.

2. O plástico é formado por elementos não metálicos, unidos por ligações covalentes; logo, a condução de calor é menor nesse material, o que facilita o manuseio desse tipo de panela. A segunda é toda de alumínio, o que dificulta seu manuseio, já que o metal é um bom condutor de calor.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **O GNV (Gás Natural Veicular) é um combustível veicular gasoso, alternativo aos combustíveis tradicionais, como o óleo *diesel* e a gasolina. O metano (CH_4) representa cerca de 90% da composição do GNV, enquanto os 10% restantes podem incluir outros gases, como o etano (C_2H_6) e o propano (C_3H_8).**

Outro combustível alternativo aos tradicionais é o etanol (C_2H_6O), que é produzido de fontes renováveis como a cana-de-açúcar e o milho.

As temperaturas de ebulição das substâncias citadas são apresentadas na tabela a seguir.

Substância	Temperatura de ebulição (°C)
CH_4 (metano)	−161,5
C_2H_6 (etano)	−88,6
C_3H_8 (propano)	−42,1
C_2H_6O (etanol)	782

Fonte de pesquisa: HAYNES, W. M. (ED.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 3-244-3-464.

a) Na molécula do etanol, os dois átomos de carbono estão ligados por meio de uma ligação covalente simples, e o átomo de oxigênio está ligado a um desses átomos de carbono. Represente a fórmula estrutural do etanol.

b) Explique por que o propano possui temperatura de ebulição maior do que a do etano, que, por sua vez, apresenta temperatura de ebulição maior do que a do metano.

c) Explique por que existe uma diferença tão acentuada entre as temperaturas de ebulição do etano e do etanol.

Resolução

a) O oxigênio é divalente e o carbono é tetravalente. Portanto, os seis átomos de hidrogênio que completam a fórmula do etanol são distribuídos de modo a completar as ligações para que os átomos de carbono e oxigênio se tornem estáveis:



b) O metano, o etano e o propano são apolares. A principal força de interação entre suas moléculas é a do tipo dipolo induzido-dipolo induzido. Quanto maior é o tamanho da molécula, maior sua temperatura de ebulição, por causa do aumento da superfície de contato entre moléculas maiores em comparação às menores.

c) O etano e o etanol apresentam dois átomos de carbono em sua estrutura. Contudo, o etano é um composto apolar, e suas moléculas se atraem mutuamente por interações fracas do tipo dipolo induzido-dipolo induzido. Já o etanol é polar e tem em sua estrutura um átomo de hidrogênio ligado ao átomo de oxigênio, o que faz suas moléculas se atraírem mediante ligações de hidrogênio, interações moleculares muito intensas. As diferentes forças atrativas entre os dois tipos de molécula explicam temperaturas de ebulição tão distintas.

2 **As fotos a seguir são de duas panelas comumente encontradas em lojas de utensílios domésticos.**

Horiyan/iStock/Getty Images

Maryia_K/Shutterstock.com/ID/BR

- Qual é a comodidade oferecida pela panela de alças de plástico em relação à de alças de alumínio? Justifique sua resposta.

3 **Os cabos elétricos de diversos aparelhos eletrônicos, como televisão, computador, geladeira e máquina de lavar, são formados por fios de cobre metálico recobertos por plástico ou borracha.**

Artisteer/iStock/Getty Images

- Explique por que é necessário utilizar plástico ou borracha para envolver o fio metálico.

4. b) Respectivamente os polos positivo e negativo da molécula de água.

4 **O modelo representado a seguir ilustra um fenômeno.**



Reinaldo Vignati/ID/BR

a) Que nome é dado ao fenômeno representado? Dissociação iônica.

b) Qual é o significado dos símbolos δ^+ e δ^-, representados junto aos átomos de hidrogênio e oxigênio, respectivamente, nas moléculas de água?

c) Dê o nome da propriedade que pode ser explicada pelo modelo representado. Condutibilidade elétrica.

3. Tanto a borracha quanto o plástico são materiais não condutores elétricos, servindo, dessa forma, como isolantes elétricos. Eles são usados como revestimentos de fios metálicos para evitar que as pessoas tomem choques.

Não escreva no livro.

6. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 **O quadro a seguir ilustra as propriedades de três substâncias de uso doméstico: cloreto de sódio, bicarbonato de sódio e sacarose.**

5. a) Cloreto de sódio e bicarbonato de sódio: iônicas. Sacarose: molecular.

Substância	Cloreto de sódio	Bicarbonato de sódio	Sacarose
Fórmula química	$NaC\ell$	$NaHCO_3$	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Nome comum	sal de cozinha	bicarbonato de sódio	açúcar
Estado físico à temperatura ambiente	sólido branco cristalino	sólido branco cristalino	sólido branco cristalino
Aplicações	temperar e conservar alimentos	culinária, limpeza doméstica, cuidados pessoais	adoçar e conservar alimentos
Solubilidade em água	altamente solúvel	solúvel	altamente solúvel

a) Classifique as substâncias listadas no quadro como iônicas ou moleculares.

b) Sem testar os sabores, sugira um experimento para distinguir a(s) substância(s) iônica(s) da(s) molecular(es).

6 **O esquema a seguir é de um experimento que testa a condutibilidade elétrica de duas soluções aquosas de substâncias moleculares: o ácido nítrico (HNO_3) e o etanol (C_2H_6O).**



Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Representações em cores-fantasia.

Representações sem proporção de tamanho.

a) Sabendo que o ácido nítrico sofre ionização em solução aquosa, e o etanol não, equacione os dois processos de dissolução.

b) Quais substâncias compõem a solução **A** e quais compõem a solução **B**? Explique como ocorre condução de corrente elétrica na solução **B**.

7. a) Ligações de hidrogênio. O hidrogênio (polo positivo) atrai o oxigênio (polo negativo) de outra molécula, o que configura a interação denominada ligação de hidrogênio.

7 **A maioria dos sólidos, quando comparados às suas substâncias no estado líquido, apresenta maior densidade; porém, quando a água congela, o sólido que se forma tem menor densidade. Por essa razão, o gelo flutua sobre a água.**

A ilustração a seguir apresenta os modelos utilizados para representar a água nos estados sólido e líquido.

7. b) Na estrutura da água no estado sólido observam-se espaços vazios, o que faz com que a mesma massa de água ocupe um volume maior em comparação ao estado líquido. Logo, a densidade do gelo é menor que a da água líquida.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Cores-fantasia.

a) Que tipo de forças atrativas ocorre entre as moléculas de água? Explique.

b) Como o modelo ilustrado para a água no estado sólido é capaz de explicar a menor densidade do gelo em comparação à água líquida?

8 **A foto a seguir é de um frasco que contém bromo (Br_2) nos estados líquido e gasoso.**

8. a) O bromo é uma molécula apolar; portanto, as interações formadas são do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.



Charles D. Winters/Science Source/Fotoarena

AMj Studio/ID/BR

AMj Studio/ID/BR

Representações em cores-fantasia.

a) Que tipo de interação ocorre entre as moléculas de bromo no estado líquido?

b) No nível molecular, o que diferencia o estado líquido do gasoso? No estado gasoso, as interações intermoleculares que existiam no estado líquido foram rompidas.

9 **Para se obter amoníaco, borbulha-se amônia (NH_3) gasosa – substância que apresenta odor desagradável – em água.**

- Que tipo de interação existe entre as moléculas da amônia e da água? Ligação de hidrogênio.

5. b) Transferir uma pequena quantidade de cada um dos sólidos para três recipientes distintos e adicionar água a cada um deles, até completa dissolução. Utilizando um condutivímetro, medir a condutibilidade elétrica das soluções. As soluções iônicas devem conduzir eletricidade. Não deve ser observada condução de corrente elétrica na solução aquosa de água com açúcar.

Não escreva no livro.

PENSANDO CIÊNCIAS

Enchanted_fairy/Shutterstock.com/ID/BR

Estatueta do Oscar, prêmio concedido anualmente às melhores produções cinematográficas.

COMO SABER SE É OURO MESMO?

Considerando que a maioria dos objetos ditos de ouro é feita de uma mistura de ouro e outros metais, você e os colegas vão se reunir em grupos para refletir sobre a seguinte situação-problema: "Um ourives quer vender uma estátua dourada e alega que ela é feita de ouro 18 quilates. Como descobrir se a estátua tem mesmo essa composição?".

Decompondo o problema

Dada a situação-problema – "Como determinar se a estátua é de ouro 18 quilates?" –, é preciso decompô-la em problemas mais simples, que envolvem a compreensão de assuntos como a fabricação de ligas metálicas, o grau de pureza do ouro, as propriedades da matéria, entre outros. Assim, pesquisem respostas às seguintes perguntas:

- Que metais, além do ouro, compõem a liga de ouro 18 quilates?
- Qual é a porcentagem de ouro usada nessa liga?
- Como o ouro é misturado a outros metais?
- De que maneira as propriedades da matéria ajudam a identificar um material?

Reconhecendo padrões

Nesta etapa, vocês devem identificar características comuns entre diferentes problemas e suas soluções. Considerem uma das perguntas sugeridas na etapa anterior: De que maneira as propriedades da matéria ajudam a identificar um material? Agora, leiam a seguir uma abordagem dessa questão, envolvendo materiais diferentes daqueles que o grupo deve investigar.

Uma das propriedades da matéria é a densidade, que é a relação entre a massa (m) e o volume (v) de um material, única para cada substância. A densidade do alumínio, por exemplo, é igual a 2,7 g/cm^3. Assim, ao colocar um bloco de 1 kg de alumínio em uma bacia com água, ele vai afundar e deslocar 370 mL de água, aproximadamente. Se um bloco de 1 kg de outro metal fosse colocado nessa bacia, o volume de água deslocado seria diferente.

Realizem esta etapa para as demais questões levantadas anteriormente.

Abstraindo o problema

A proposta, nesta etapa, é identificar os pontos relevantes para solucionar o problema. Tendo reconhecido os padrões, pensem nesta questão: De que maneira a densidade ajuda a identificar um material?

Como vimos, para determinar a densidade de um material, é necessário, antes, saber sua massa e seu volume. A massa de um objeto, como uma estátua, pode ser aferida com uma balança. Já o volume pode ser determinado pelo **princípio de Arquimedes**, segundo o qual o volume de água deslocado por um sólido é exatamente igual ao volume do próprio sólido.

Procurem identificar aspectos que realmente importam para chegar a uma solução, descartando os demais. Por exemplo: Importa quem vai aferir a massa e o volume? (As diferenças de medição entre um observador e outro podem ser insignificantes, dependendo da dimensão dos objetos.).

Não escreva no livro.

Outras questões, porém, são extremamente importantes, como: É preciso submergir completamente o material na água? Que tipo de recipiente pode ser usado para determinar o volume de água deslocado pelo objeto?

Pesquisem as informações necessárias para responder às questões levantadas e, depois, realizem uma simulação prática para testar o princípio de Arquimedes com algum objeto. Outros questionamentos também devem ser feitos a partir dos demais problemas levantados.



Setup Bureau/ID/BR

O esquema mostra como calcular o volume de um objeto pelo princípio de Arquimedes. Representação em cores-fantasia.

Buscando soluções

Este é o momento em que se elabora uma possível solução para o problema, deixando claro como deve ser feito o procedimento, qual é a sequência de cálculos, quais são os valores esperados para determinar se o objeto é feito, ou não, de ouro 18K, entre outros aspectos.

Elaborando o algoritmo

O algoritmo se refere a todo o processo necessário para instruir alguém ou alguma máquina a realizar determinada tarefa. Foquem no que é essencial para a correta execução do que está sendo instruído. Um exemplo de algoritmo é o passo a passo de uma receita de bolo.

O algoritmo para a preparação de um bolo deve informar tudo o que deve ser feito, como a separação e a quantidade dos ingredientes, os processos de execução, etc. Por exemplo:

1. Organizar os utensílios que serão utilizados no preparo: forno, liquidificador, copo medidor, colher medidora e uma fôrma para assar o bolo.
2. Separar os ingredientes: farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, óleo, sal, fermento em pó, essência de baunilha e manteiga.
3. Medir as quantidades de ingredientes: duas xícaras (chá) de farinha de trigo, duas xícaras (chá) de açúcar, uma xícara (chá) de leite, dois ovos, quatro colheres (sopa) de óleo, 0,5 g de sal, uma colher (sopa) de fermento em pó, duas gotas de essência de baunilha, uma colher (café) de manteiga e meia xícara (café) de farinha de trigo para untar a fôrma.
4. Realizar o processo de mistura dos ingredientes para fazer a massa do bolo seguindo orientações: Quebre, com cuidado, a casca dos ovos, colocando as claras e as gemas no interior do copo do liquidificador; adicione às claras e às gemas o açúcar, a farinha de trigo, o leite, o óleo, o sal, o fermento e a essência de baunilha reservados para o preparo. Feche o copo do liquidificador e bata tudo em velocidade média até que a massa fique homogênea e bem líquida (cerca de 2 minutos) e, então, desligue o liquidificador.
5. Preparar a fôrma: Unte a fôrma com a manteiga e a farinha de trigo. Depois, despeje nela a massa do interior do copo do liquidificador.
6. Levar ao forno para assar: Preaqueça o forno a 200 °C por 15 minutos; coloque a fôrma no interior do forno e deixe assar por 40 minutos, na mesma temperatura. Com cuidado, retire a fôrma do forno.

Agora, com base nas informações pesquisadas e discutidas, troquem ideias e elaborem um algoritmo para determinar se a estátua do ourives é de ouro 18 quilates.

Para discutir

2. Respostas variáveis. Espera-se que a discussão permita aos estudantes perceber que há mais de uma solução possível para o mesmo problema e que algumas delas oferecem uma resposta mais adequada do que outras. É possível ainda que a solução mais adequada surja dessa troca de ideias e não de um grupo em particular.

1 **Compartilhem com os demais grupos o algoritmo que desenvolveram e respondam: Há diferenças entre eles? Em caso positivo, quais?**

1. Respostas variáveis. Espera-se que haja diferenças entre os algoritmos produzidos pelos grupos. Oriente-os a anotar as diferenças encontradas, discutindo-as e vendo quais podem ser mais precisas e quais podem gerar mais imprecisões.

2 **Essas eventuais diferenças poderiam ser utilizadas para melhorar o algoritmo que seu grupo produziu? Ou o algoritmo de vocês poderia ser útil aos demais grupos? Discutam de que maneira essas trocas de informações e experiências podem ser feitas.**

3 **Algum dos algoritmos apresentados previu uma maneira de determinar a composição precisa da estátua? Se não, de que maneira isso deve ser feito?**

3. Respostas variáveis. Aproveite para ressaltar que a porcentagem de cada metal presente na estátua altera o valor de sua densidade e discuta com os estudantes de que maneira isso pode ser calculado. Para facilitar, considere uma composição específica de ouro 18 quilates, como 75% de ouro e 25% de prata.

Não escreva no livro.

QUESTÕES GLOBAIS

5. b) Na higienização com álcool 70%, haverá a desidratação por causa das ligações de hidrogênio; com o uso de água e sabão, ocorrerá a remoção da gordura pela interação dipolo induzido-dipolo induzido.

1 **(Enem)** Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha (NaCℓ), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais.

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela

a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.

b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.

c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.

d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.

e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela. Alternativa **b**.

2 **O átomo de um elemento químico, ao perder dois elétrons, forma um cátion contendo 36 elétrons.**

a) Qual é a carga elétrica do cátion formado? +2

b) Dê a distribuição eletrônica do cátion formado. 2 — 8 — 18 — 8

c) Quantos prótons há no núcleo desse elemento? 38

d) Dê o nome e o símbolo do cátion formado. cátion estrôncio; Sr^{2+}

3 **Observe as espécies a seguir.**

$^{16}_{8}O$ $^{23}_{11}Na$ $^{24}_{12}Mg$ $^{25}_{12}Mg$

Sobre elas, é correto afirmar que

a) $^{23}_{11}Na$ e $^{24}_{12}Mg$ são isótopos, pois há 12 nêutrons em ambos os núcleos atômicos.

b) há 16 elétrons distribuídos em três camadas eletrônicas ao redor do núcleo atômico do ^{16}O.

c) ao ganhar um elétron, o átomo de sódio se transforma no cátion Na^+.

d) $^{24}_{12}Mg$ e $^{25}_{12}Mg$ são isótopos.

e) na eletrosfera do ^{25}Mg há um elétron a mais do que na do ^{24}Mg. Alternativa **d**.

4 **Em relação às estruturas geométricas representadas a seguir, classifique-as em polares ou apolares.**

A e **B** são polares. **C** e **D** são apolares.



Representação em cores-fantasia.

5 **(Unicamp-SP)** Uma das formas de se prevenir a transmissão do vírus H1N1, causador da gripe suína, é usar álcool 70% para higienizar as mãos. É comum observar pessoas portando álcool gel na bolsa ou encontrá-lo em ambientes públicos, como restaurantes, consultórios médicos e hospitais. O álcool 70% também possui ação germicida contra diversas bactérias patogênicas. A tabela abaixo mostra a ação germicida de misturas álcool/água em diferentes proporções contra o *Streptococcus pyogenes*, em função do tempo de contato.

Concentração do etanol (%)	Tempo (segundos)				
	10	20	30	40	50
100	–	–	–	–	–
90	+	+	+	+	+
80	+	+	+	+	+
70	+	+	+	+	+
60	+	+	+	+	+
50	–	–	+	+	+
40	–	–	–	–	–

– ausência da ação germicida (crescimento bacteriano)
+ ação germicida (ausência de crescimento bacteriano)

(Adaptado de: G. H. Talbot e outros. 70% alcohol disinfection of transducer heads: experimental trials. *Infect. Control*, v. 6, n. 6, p. 237-239, jun. 1985.)

a) Recomenda-se descartar uma garrafa com álcool 70% deixada aberta por um longo período, mesmo que ela esteja dentro do prazo de validade. Justifique essa recomendação levando em conta os dados da tabela e considerando o que pode acontecer à solução, do ponto de vista químico.

b) Além da higienização com álcool 70%, também estamos acostumados a utilizar água e sabão. Ambos os procedimentos apresentam vantagens e desvantagens. As desvantagens seriam a desidratação ou a remoção de gorduras protetoras da pele. Correlacione cada procedimento de higienização com as desvantagens citadas. Explique a sua resposta explicitando as possíveis interações químicas envolvidas em cada caso.

6 **(Enem)** Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos (HX) com base NH_3, de forma natural ou

5. a) O etanol é volátil. Assim, ao se deixar a embalagem aberta, ocorre a evaporação de parte do etanol, diminuindo sua concentração. De acordo com a tabela, menores concentrações de etanol podem não inibir o crescimento bacteriano, ou seja, têm ação germicida reduzida.

Não escreva no livro.

antropogênica, dando origem a sais de amônio (NH_4X), de acordo com a equação química genérica:

$$HX(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4X(s)$$

FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. *Química Nova na Escola*, n. 21, maio 2005 (adaptado).

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por Alternativa **d**.

a) ligações iônicas.
b) interações dipolo-dipolo.
c) interações dipolo-dipolo induzido.
d) interações íon-dipolo.
e) ligações covalentes.

7 (**Unesp**) Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela.

Substância	Conduz corrente elétrica no estado	
	sólido?	líquido?
X	Sim	Sim
Y	Não	Sim
Z	Não	Não

Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s) Alternativa **d**.

a) Y e Z, apenas.
b) X, Y e Z.
c) X e Y, apenas.
d) Y, apenas.
e) X, apenas.

8 (**Udesc**) A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação química da qual o material é formado e do estado físico em que este se encontra. Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana (sacarose) e sal de cozinha (cloreto de sódio) apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condutividade elétrica, assinale a alternativa **correta**. Alternativa **d**.

a) O açúcar é uma substância iônica que não conduz bem a eletricidade.
b) O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui cargas livres em seu retículo cristalino molecular.
c) O cloreto de sódio fundido não conduz corrente elétrica.
d) Um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino metálico.
e) O cloreto de sódio é bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão.

9 (**Enem**) A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Alternativa **b**.

a) Coagulação.
b) Decantação.
c) Filtração.
d) Desinfecção.
e) Fluoretação.

10 (**Enem**) O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico — o urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio-235 e de urânio-238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Alternativa **b**.

ATKINS, P.; JONES, L. *Princípios de química*: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade?

a) Peneiração.
b) Centrifugação.
c) Extração por solvente.
d) Destilação fracionada.
e) Separação magnética.

11 (**Enem**) A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. Alternativa **c**.



TAVARES, K. Estações de tratamento de esgoto individuais permitem a reutilização da água. Disponível em: https://extra.globo.com.* Acesso em: 18 nov. 2014 (adaptado).

*Fonte de pesquisa atualizada: https://oglobo.globo.com/arquivos/estacao-individual.jpg. Acesso em: 2 maio 2025.

Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 6

O MACRO E O MICRO

Após experimentos com colisões entre feixes de partículas a altas velocidades, em 2012, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern) divulgou a detecção de traços deixados por uma partícula subatômica denominada bóson de Higgs, postulada em 1964. A detecção dessa partícula abriu caminho para validar o chamado Modelo-Padrão de partículas, que procura explicar como as partículas ganham massa e prevê a existência de outras partículas subatômicas.

A confirmação desse modelo hipotético constitui um exemplo de como a ciência é uma construção humana em constante processo de desenvolvimento. Durante cerca de um século se pensou nos átomos como partículas fundamentais da matéria. Hoje, a comunidade científica reconhece a existência de prótons, nêutrons, elétrons e partículas ainda menores.

Nesta unidade, você vai estudar como foram estabelecidas as relações entre as massas dos átomos e sua importância para o desenvolvimento científico e tecnológico.

OBJETIVOS

- Compreender a relação entre átomos e massa e o raciocínio para determinar a massa dos átomos.
- Compreender o conceito de mol e relacioná-lo ao número de espécies químicas e à constante de Avogadro.
- Relacionar os conceitos de mol, massa molar e quantidade de partículas.
- Realizar cálculos estequiométricos.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. Por que você acha que a confirmação experimental da existência do bóson de Higgs ocorreu somente em 2012?
2. Qual é a relação entre as investigações sobre partículas subatômicas e a determinação das massas atômicas?
3. Como as estimativas das quantidades de espécies químicas podem ser usadas tanto nos processos produtivos quanto na detecção de quantidades de contaminantes na água, por exemplo?

2. O desenvolvimento científico e tecnológico obtido na busca de uma descoberta pode facilitar a elucidação de outros problemas científicos correlatos.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.



Visão parcial do maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hádrons (do inglês *Large Hadron Collider* – LHC), localizado entre as fronteiras da Suíça e da França. Foto de 2019. ▸

1. Porque a confirmação requer a comprovação experimental da existência dessa partícula e, na época em que foi prevista, os equipamentos necessários não estavam disponíveis.

Belish/Shutterstock.com/ID/BR

UNIDADE 2

1 Relações entre massas de átomos e moléculas

2 Quantidade de matéria

3 Reações químicas e cálculo estequiométrico

CAPÍTULO 1

RELAÇÕES ENTRE MASSAS DE ÁTOMOS E MOLÉCULAS

PARA COMEÇAR

1. O que é massa atômica?
2. O que é número de massa?
3. O que são isótopos?

1. Massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica; 1 u equivale a $\frac{1}{12}$ da massa do átomo de carbono-12.
2. O número de massa é calculado pela soma do número de prótons e o número de nêutrons de um átomo.
3. Isótopos são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, mas diferem quanto à quantidade de nêutrons.

O MODELO-PADRÃO E A MASSA DOS ÁTOMOS

Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que os átomos fossem as partículas elementares da matéria. Tempos depois, descobriu-se a existência de partículas menores que comporiam os átomos: os prótons, nêutrons e elétrons. Hoje sabe-se que mesmo os prótons e nêutrons podem ser divididos em partículas ainda menores.

A teoria do Modelo-Padrão de partículas foi formulada na segunda metade do século XX e descreve as forças fundamentais forte, fraca e eletromagnética, bem como as partículas fundamentais que constituem a matéria.

Esse modelo, no entanto, apresentava um problema: não explicava por que algumas partículas, como os elétrons, têm massa e outras, como os fótons, não. É aí que entra o trabalho dos físicos teóricos, que, por meio de modelos matemáticos, previram a existência de um campo invisível (campo de Higgs, do qual o bóson faz parte) que afetaria algumas partículas, como os elétrons, e não afetaria outras, como os fótons. As partículas afetadas por esse campo experimentariam resistência ao movimento (inércia), o que explicaria sua massa.

Atualmente, o Modelo-Padrão considera que existam 17 partículas fundamentais: o bóson de Higgs, 6 *quarks*, 6 léptons e 4 partículas mediadoras. Segundo esse modelo, os elétrons são partículas elementares, do tipo lépton, enquanto os prótons e os nêutrons são formados por *quarks*.

Neste capítulo, você verá como foram estabelecidas as relações entre as massas dos átomos dos elementos químicos e a importância dessas relações para o desenvolvimento científico e tecnológico.



Simulação em computador de uma colisão entre partículas em alta velocidade, liberando vários conjuntos de partículas diferentes. Cores-fantasia.

vchal/Shutterstock.com/ID/BR

Não escreva no livro.

MASSA ATÔMICA

O modelo de Dalton já sugeria um método para a determinação das massas relativas dos átomos.

Com base nessa teoria atômica, três proporções podem ser aplicadas para uma mesma substância: a relação das massas dos elementos (lei das proporções constantes), a quantidade de átomos de cada elemento químico na substância (fórmula química) e a relação entre as massas de cada átomo (massa atômica relativa).

Observe, a seguir, um exemplo do raciocínio para comparar as massas atômicas dos elementos químicos de uma substância, utilizando a reação de síntese da água.

Dados experimentais indicam que, para a síntese de 18 g de água, são consumidos 2 g de gás hidrogênio e 16 g de gás oxigênio.

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

ID/BR



Pela análise desse esquema, pode-se concluir que o átomo de oxigênio apresenta massa 16 vezes maior que o átomo de hidrogênio.

Dessa forma, pode-se estabelecer uma relação entre a lei das proporções constantes, as massas atômicas e as fórmulas das substâncias, como resumido a seguir.

$$\underbrace{\frac{\text{número de átomos de X}}{\text{número de átomos de Y}}}_{\text{fórmula molecular}} \cdot \underbrace{\frac{\text{massa atômica de X}}{\text{massa atômica de Y}}}_{\text{Tabela Periódica}} = \underbrace{\frac{\text{massa do elemento X}}{\text{massa do elemento Y}}}_{\text{lei das proporções constantes}}$$

Para criar uma escala de massas atômicas, é necessário escolher um elemento como padrão e atribuir determinado valor à sua massa atômica. Desse modo, as massas dos átomos de outros elementos químicos adquirem valores relativos a esse padrão.

No século XIX, foram sugeridos diversos padrões. Inicialmente, foi utilizado o átomo de oxigênio, devido à sua facilidade de combinar-se com outros elementos, formando os respectivos óxidos. Posteriormente, convencionou-se que o átomo de hidrogênio, por ser o mais leve, teria massa relativa igual a 1,0.

Atualmente, para uma comparação mais adequada das massas atômicas dos elementos, adota-se a massa do isótopo C-12 (^{12}C) como padrão. A massa desse átomo é exatamente 12,0 u ($1\ u = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg).

Logo, a unidade de massa atômica (u) equivale a $\frac{1}{12}$ (um doze avos) da massa do isótopo ^{12}C.

Conhecendo a composição centesimal do agregado e a razão entre as massas atômicas de seus átomos constituintes, é possível determinar sua fórmula.

DE OLHO NO CONCEITO

Leis ponderais

A matéria é constituída de átomos, os quais são caracterizados pela massa atômica. Nas transformações da matéria, ocorrem rearranjos de átomos, gerando novas espécies químicas.

Todos os átomos presentes em um sistema inicial permanecem no sistema final. Assim, pode-se concluir que a massa do sistema se conserva, pois, em última instância, a massa de um corpo é a soma das massas de todos os seus átomos constituintes.



ID/BR

O isótopo ^{12}C apresenta 6 prótons e 6 nêutrons. Sua massa é 12,0 u. Uma unidade de massa atômica (u) corresponde, então, a $\frac{1}{12}$ da massa do ^{12}C.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Óxidos de enxofre são formados na queima de combustíveis fósseis. Sabendo que o átomo de enxofre (S) apresenta o dobro da massa do átomo de oxigênio (O), qual é a fórmula do óxido de enxofre formado por 60% em massa de oxigênio e 40% em massa de enxofre?

Dado: Massa atômica: S = 32 u e O = 16 u.

Resolução

Como a massa do S é o dobro da massa do O, para a mesma quantidade de átomos, a cada 4 g de S deve haver 2 g de O. Entretanto, pela proporção em massa indicada no enunciado, nota-se que, para 4 g de S, há 6 g de O, o triplo do que seria esperado se a quantidade de átomos desses elementos fosse igual. Pela proporção, conclui-se que o óxido apresenta 3 átomos de O para cada átomo de S, o que é coerente com a fórmula do SO_3 (trióxido de enxofre).

Número de massa e massa do átomo

Desde o início do século XX, a definição de elemento químico deixou de ser dada pela massa atômica, e o número atômico (*Z*), que representa o número de prótons no núcleo do átomo, tornou-se a base para a definição de elemento. Portanto, **elemento químico** é o conjunto de átomos de mesmo número atômico.

O desenvolvimento dos modelos atômicos e dos aparatos experimentais possibilitou a detecção dos nêutrons no núcleo, e o átomo de cada elemento passou a ser representado da seguinte forma:

número de massa – ^{A}E – símbolo do elemento
número atômico – Z



Laboratório de Geocronologia e Geoquímica Isotópica - Instituto de Geociências - Universidade de Brasília

Espectrômetro de massas de razão isotópica (IRMS) (sigla em inglês para *Isotope Ratio Mass Spectrometer*), utilizado para detectar a abundância relativa de um isótopo em uma dada amostra. Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (DF).

Como os prótons e os nêutrons apresentam massas aproximadamente iguais e próximas a 1,0 u (1 u = 1,67 · 10^{-27} kg) e como o elétron apresenta massa muito pequena em relação a eles, podem ser utilizados o número de prótons e o de nêutrons para estimar a massa do átomo. Trata-se, portanto, de uma aproximação, que não corresponde à massa precisa do átomo.

Para determinar com boa precisão a massa de um átomo, passou-se a utilizar um equipamento denominado **espectrômetro de massas**, o qual permitiu a descoberta de um grande número de isótopos de elementos não radioativos.

Atualmente, as massas dos isótopos são conhecidas com exatidão de nove ou mais algarismos significativos. Na tabela a seguir são apresentados alguns exemplos com valores aproximados com seis algarismos significativos.

MASSA DE ALGUNS ISÓTOPOS (EM u)

Isótopo	Massa	Isótopo	Massa
^{1}H	1,007825	^{31}P	30,973762
^{12}C	12,0 (exatos)	^{35}Cℓ	34,968853
^{16}O	15,994915	^{37}Cℓ	36,965903
^{19}F	18,998403	^{127}I	126,904472
^{27}Aℓ	26,981538	^{197}Au	196,966569

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 1-15.

Porém, essa precisão não se justifica para a maioria das aplicações mencionadas nesta obra. Por isso optou-se por adotar valores aproximados, que correspondem ao número de massa dado, expresso em unidade de massa atômica (u).

É importante, contudo, não confundir o conceito de número de massa com o de massa do átomo. O número de massa não tem unidade, pois indica a soma dos números de prótons e de nêutrons presentes em determinado átomo.

A massa de um átomo não corresponde exatamente ao número de massa, pois a massa do próton e a do nêutron não são exatamente iguais, e a massa do elétron, embora ínfima, não pode ser desprezada nesse caso. A massa do átomo é determinada experimentalmente, constituindo uma propriedade física de certo corpo. Dependendo da exatidão adotada, a massa de um íon é ligeiramente distinta da massa do átomo eletricamente neutro.

Partícula subatômica	Massa (u)
Elétron	5,485799 · 10^{-4}
Nêutron	1,008665
Próton	1,007276

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 1-4.

Além disso, a massa do núcleo atômico é ligeiramente inferior à soma das massas dos prótons e dos nêutrons que o compõem. Esse fenômeno é conhecido como defeito de massa.

Esse defeito de massa está relacionado às forças nucleares que explicam a atração entre prótons e nêutrons no núcleo e entre os *quarks* para a formação de nêutrons e prótons. Assim, a Física Nuclear consegue explicar a não conservação da massa em processos nucleares que ocorrem nas bombas atômicas, reatores nucleares ou ainda no núcleo das estrelas.

A famosa equação do físico Albert Einstein, $E = mc^2$, sugere que massa pode se converter em energia e vice-versa, tendo a constante velocidade da luz ao quadrado como fator de conversão entre essas duas grandezas.

De todo modo, para os propósitos desta obra, considera-se que as massas dos átomos correspondem ao respectivo número de massa do isótopo analisado, e a massa dos elétrons é desprezada.

Não escreva no livro.

ISÓTOPOS E MASSA ATÔMICA

Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, isto é, apresentam o mesmo número de prótons no núcleo (número atômico), porém possuem quantidades diferentes de nêutrons, o que acarreta diferentes números de massa.

Esse fenômeno é bastante comum na natureza e somente 21 elementos apresentam apenas um isótopo natural:

^{9}Be, ^{19}F, ^{23}Na, $^{27}A\ell$, ^{31}P, ^{45}Sc, ^{55}Mn, ^{59}Co, ^{75}As, ^{89}Y, ^{93}Nb, ^{103}Rh, ^{127}I, ^{133}Cs, ^{141}Pr, ^{159}Tb, ^{165}Ho, ^{169}Tm, ^{197}Au, ^{209}Bi e ^{231}Pa.

Para esses elementos, a massa atômica corresponde à massa do seu único isótopo natural.

Os isótopos de um mesmo elemento químico apresentam comportamento químico igual, pois tal comportamento depende unicamente do número atômico. Cada substância é formada por elementos químicos que contam com certa composição de isótopos. Como a reatividade dos isótopos é a mesma, a composição isotópica geralmente se mantém em diversos materiais.

Desse modo, quando se avalia a massa atômica de determinado elemento químico, considera-se a média ponderada da massa de cada isótopo natural proporcionalmente à sua abundância.

Por exemplo, a massa atômica do elemento boro (≅ 10,8 u) é dada pela média da ocorrência de seus isótopos na natureza: aproximadamente 20% de ^{10}B e 80% de ^{11}B.

Observe que, conhecendo a massa atômica, é possível determinar a abundância relativa de alguns isótopos.

Representação sem proporção de tamanho.



ID/BR

Representação dos isótopos do boro, ^{10}B e ^{11}B. A abundância isotópica relativa (20% e 80%, respectivamente) é considerada no cálculo da massa atômica. Cores-fantasia.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Determine a abundância relativa de cada isótopo (porcentagem isotópica) do elemento gálio, cuja massa atômica é, aproximadamente, 69,7 u. Os isótopos naturais desse elemento são: ^{69}Ga e ^{71}Ga.

Resolução

Sendo x e y as abundâncias relativas dos isótopos, tem-se:

$$\begin{cases} 69x + 71y = 69{,}7 \\ x + y = 1 \text{ (a soma corresponde a 100\%); logo, } x = 1 - y. \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos: $x = 65\%$ de ^{69}Ga e $y = 35\%$ de ^{71}Ga.

ROTEIRO

1. O físico e químico britânico Francis W. Aston (1877-1945) utilizou a espectrometria de massas para comprovar a existência de um grande número de isótopos de elementos não radioativos. A figura a seguir mostra o espectro de massa do antimônio (Sb).



ID/BR

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M. *Chemistry and chemical reactivity*. 3. ed. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1996. p. 72.

O eixo das abscissas indica as massas atômicas dos isótopos; o das ordenadas mostra as abundâncias relativas dos isótopos.

Analise o espectro do antimônio e faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Como são representados os símbolos dos dois isótopos do Sb? ^{121}Sb e ^{123}Sb

b) Qual é a massa atômica do antimônio? 121,855 u

PARA EXPLORAR

Acesse

Simulador de isótopos e massa atômica

Neste simulador do projeto PhET Simulações Interativas, da Universidade do Colorado Boulder, é possível testar a estabilidade dos átomos adicionando ou retirando nêutrons e, assim, identificar os isótopos de cada elemento. Além disso, pode-se verificar a relação entre número atômico e massa atômica e a abundância de cada isótopo na natureza.

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/isotopes-and-atomic-mass. Acesso em: 2 out. 2024.

MASSAS MOLECULARES

Neste tópico, você vai entender como foi possível determinar as massas moleculares a partir de experimentos envolvendo substâncias no estado gasoso.

Lei volumétrica de Gay-Lussac

O cientista francês Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850) investigou, entre outras reações, as que envolviam a síntese do cloreto de hidrogênio gasoso ($HC\ell$), da água (H_2O) e da amônia (NH_3).

Ele observou que, na síntese do cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), a partir dos gases hidrogênio (H_2) e cloro ($C\ell_2$), 10 L de H_2 reagem com 10 L de $C\ell_2$, produzindo 20 L de $HC\ell$.



Volumes iguais de H_2 e $C\ell_2$ reagem para formar o dobro do volume em $HC\ell$. Cores-fantasia.

Independentemente dos volumes de gases hidrogênio (H_2) e cloro ($C\ell_2$) utilizados, a proporção desses gases que reagem formando o cloreto de hidrogênio ($HC\ell$) se mantém, desde que as condições de temperatura e pressão permaneçam inalteradas. Assim, como a proporção dos reagentes é de 1 L de H_2 para 1 L de $C\ell_2$, se for realizada a reação com 5 L de H_2 e 3 L de $C\ell_2$, serão consumidos 3 L de cada gás, formando 6 L de $HC\ell$, e havendo um excesso de H_2, correspondente a 2 L, que não reagirá.

Na reação de obtenção de vapor de água (H_2O), foi observado que a proporção entre o volume de gás hidrogênio (H_2) e o de gás oxigênio (O_2) necessária para a reação era de 2 L de H_2 para cada 1 L de O_2, gerando 2 L de água no estado gasoso.



Na síntese da água, é utilizado o dobro do volume de H_2 em relação ao de O_2. Cores-fantasia.

Note que, como a água é obtida no estado gasoso, o volume final é igual ao volume de H_2 consumido. Se fossem utilizados volumes iguais de gás hidrogênio e gás oxigênio, haveria um excesso de gás oxigênio equivalente à metade da quantidade colocada para reagir.

Na reação de síntese da amônia (NH_3), observa-se que a proporção entre os volumes dos gases hidrogênio (H_2), nitrogênio (N_2) e amônia (NH_3) é de 3 : 1 : 2, ou seja, 3 L de H_2 reagem com 1 L de N_2, resultando em 2 L de NH_3. Logo, o volume de amônia gerado será sempre o dobro do volume de N_2 consumido.



Na síntese da amônia, o volume de H_2 consumido é sempre o triplo do volume de N_2. Cores-fantasia.

Como decorrência dessas observações, Gay-Lussac formulou, em 1808, a **lei das combinações gasosas** (ou lei volumétrica): os volumes de gases envolvidos em uma determinada reação química apresentam uma proporção constante entre si, desde que medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão.

Não escreva no livro.

O princípio de Avogadro

Considerando a lei volumétrica de Gay-Lussac, nota-se que há uma relação entre as proporções dos volumes dos gases e as proporções entre o número de moléculas dos gases envolvidos nas reações. Observe os exemplos a seguir.



Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

Para explicar essa relação entre o número de moléculas de um gás e o volume ocupado, independentemente da substância envolvida, o cientista italiano Amedeo Avogadro (1776-1856), com base no trabalho sobre gases de Gay-Lussac, propôs, em 1811, uma hipótese, conhecida hoje como **princípio de Avogadro**.

Avogadro sugeriu que, não importa qual seja o gás, o volume que ele ocupa é diretamente proporcional ao número de moléculas, desde que mantidas constantes as condições de temperatura e pressão. Essa hipótese baseia-se na ideia de que as distâncias entre as moléculas das substâncias no estado gasoso são muito maiores que o tamanho dessas moléculas (o tamanho pode ser considerado desprezível).

Desse modo, independentemente do tamanho da molécula, o volume que o gás ocupa é proporcional ao número de suas moléculas presentes no frasco.

O **princípio de Avogadro** pode ser enunciado da seguinte forma: volumes iguais de quaisquer gases medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas (ou átomos, se o gás for monoatômico).

Na prática, o princípio de Avogadro não é válido em condições de temperaturas próximas à temperatura de ebulição da substância e em altas pressões, quando as moléculas estão muito próximas.

No esquema a seguir, embora o frasco **A** e o frasco **B** contenham o mesmo número de moléculas, a massa do frasco **B** é maior em função de a massa da molécula de CO_2 ser maior que a da molécula de H_2. Os frascos **C**, **D** e **E** têm o dobro de moléculas dos frascos **A** e **B**, uma vez que o volume desses dois frascos é a metade dos demais. O frasco **C**, porém, apresenta o dobro de átomos do frasco **D**, uma vez que cada molécula de NH_3 tem 4 átomos, enquanto as de O_2 têm somente 2.

AMj Studio/ID/BR



Amedeo Avogadro, que tinha formação em Direito e em Física, foi professor de Física e Química na Universidade de Turim, Itália, onde nasceu.

Em 1811, suas ideias para explicar a lei volumétrica proposta por Gay-Lussac foram desacreditadas, pois para que o Princípio de Avogadro pudesse explicá-la, era preciso considerar que substâncias simples como os gases hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e cloro fossem formadas por moléculas diatômicas: H_2, O_2, N_2 e $C\ell_2$.

Na época, essa ideia foi considerada absurda por Dalton e Berzelius, químicos de renome no meio científico, pois, segundo eles, as substâncias simples seriam monoatômicas.

Os trabalhos de Avogadro só foram reconhecidos pela comunidade científica depois de sua morte, quando foram retomados pelo químico italiano Stanislao Cannizzaro (1826-1910), cinquenta anos depois, possibilitando a uniformização das massas atômicas e fórmulas moleculares conhecidas na época.

ROTEIRO

2. Sabendo que os volumes dos gases foram determinados nas mesmas condições de temperatura e pressão, copie este quadro no caderno e complete-o adequadamente.

2A + B → C + 3D				Excesso
2 L	1 L	1 L	3 L	—
/////	2 L	/////	/////	1 L de A
/////	/////	/////	15 L	—
/////	30 L	/////	84 L	2 L de B

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Considere $T = 25$ °C e $p = 1{,}0 \cdot 10^5$ Pa para todos os frascos. O volume de gases nos frascos **A** e **B** é igual a 10 L, e nos frascos **C**, **D** e **E** é igual a 20 L. Cores-fantasia.

Determinação das massas moleculares

Uma vez conhecidas as fórmulas químicas das moléculas e as massas dos átomos que as compõem, é possível determinar as massas das moléculas (e das outras espécies químicas), denominadas **massas moleculares**.

Nesse cálculo, somam-se as massas dos átomos que compõem a espécie química.

A determinação da massa molecular do ácido sulfúrico, por exemplo, cuja fórmula é H_2SO_4, pode ser realizada da seguinte forma:

2 átomos de hidrogênio: 1 u · 2 = 2 u
1 átomo de enxofre: 32 u · 1 = 32 u
4 átomos de oxigênio: 16 u · 4 = 64 u

massa molecular do H_2SO_4 = 2 + 32 + 64 = 98 u

(os valores de massa atômica são obtidos da Tabela Periódica)

Lembre-se de que a unidade de massa atômica (u) equivale a $\frac{1}{12}$ da massa do isótopo de ^{12}C, ou seja, a molécula de H_2SO tem massa 98 vezes maior que $\frac{1}{12}$ da massa do isótopo de ^{12}C. Se, por algum motivo, o padrão de medida adotado se alterar, os valores de massa precisarão ser corrigidos.

Atenção: Os valores determinados para as massas moleculares não correspondem a valores absolutos de massas das espécies químicas. Na realidade, quando se efetua a soma das massas atômicas, compara-se a massa da espécie química com a unidade de massa u.

Massa molecular é a soma das massas atômicas de determinada espécie química. Ela indica quantas vezes a massa dessa espécie química é maior que $\frac{1}{12}$ da massa do isótopo do carbono-12.

AÇÃO E CIDADANIA

O que é o Inmetro e qual é sua importância

O Inmetro [Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia] é uma autarquia federal vinculada [...] ao Ministério da Economia. Criado em 1973, o instituto tem as funções de executar as políticas nacionais de qualidade e metrologia (ciência de medição), além de fiscalizar o respeito às determinações técnicas de medição.

Na prática, isso significa que o órgão tem a função técnica de garantir que, em todo o Brasil, os padrões de medida estejam sendo seguidos.

Além de fiscalizar, o Inmetro também elabora regulamentos técnicos, com base em critérios como a segurança e a qualidade de bens e serviços oferecidos à população.

[...]

A atuação do Inmetro é importante porque, em uma economia complexa, as normas técnicas devem ser padronizadas. Se cada um seguir seus próprios métodos ou critérios de medição, fica impossível garantir a qualidade dos bens produzidos no país.

[...] A atuação do Inmetro, portanto, vai no sentido de garantir um padrão de qualidade e segurança, e de garantir condições justas de competição no setor produtivo brasileiro.

[...]

O Inmetro é um dos órgãos responsáveis pela emissão da etiqueta de eficiência energética em geladeiras e congeladores. A avaliação do órgão em notas alfabéticas de A (mais eficiente) a E (mais ineficiente) costuma estar estampada em locais visíveis nesse tipo de eletrodoméstico.

[...]

O Inmetro também é responsável pela regulação de brinquedos comercializados no Brasil. O órgão tem a função de garantir que os objetos são seguros para a manipulação de crianças, além de indicar a partir de que idade um brinquedo é considerado seguro.

[...]

Roubicek, M. O que é o Inmetro. *Nexo*, São Paulo, 28 dez. 2023. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/24/O-que-%C3%A9-o-Inmetro.-E-quais-mudan%C3%A7as-Bolsonaro-fez-no-%C3%B3rg%C3%A3o. Acesso em: 2 out. 2024.

1. **Segundo o texto, qual é a importância do Inmetro? Por que é necessário um órgão de fiscalização de pesos e medidas?** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. **Discuta com os colegas o que ocorreria se não existisse um controle de pesos e medidas.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Determinação de um padrão de massa

O padrão de massa utilizado para a massa atômica ($\frac{1}{12}$ da massa do isótopo de ^{12}C) foi determinado para que fosse possível comparar as massas atômicas dos elementos. Mas você compreende o que é um padrão de massa? Nesta atividade, você e os colegas vão definir um padrão de massa e utilizá-lo para determinar a massa de diversos materiais.

Material

- $\frac{1}{2}$ copo pequeno (de café) de cada um destes grãos: feijão, lentilha, milho e arroz
- plataforma de madeira
- 2 m de barbante
- pedaço de cabo de vassoura
- ripa de madeira
- 2 pratos de plástico ou de papelão
- pregos

Equipamentos de segurança

Óculos de segurança e avental de algodão com mangas compridas.

Como fazer

Parte A

1. Em grupo, elaborem um projeto, realizem pesquisas e discutam entre si como construir uma balança de pratos artesanal.
2. Cada grupo vai apresentar à turma o projeto que elaborou, e a turma vai eleger o projeto que será utilizado para realizar a atividade experimental.
3. Com a ajuda do(a) professor(a), toda a turma vai trabalhar na construção da balança mais votada.

Parte B

1. Mantendo os grupos de trabalho, coloquem 10 grãos de feijão em um dos pratos da balança.
2. No outro prato, depositem lentilhas, uma a uma, até a balança ficar equilibrada.
3. Elaborem, no caderno, uma tabela para registrar os dados obtidos. Ao construírem a tabela, planejem como vão registrar a comparação da massa dos diversos materiais com a dos grãos de feijão.
4. Repitam o passo **2** da **parte B**, substituindo as lentilhas por grãos de milho e, depois, de arroz.
5. Registrem as observações na tabela elaborada no passo **3** da **parte B**.
6. Determinem um padrão de massa entre os grãos de feijão e os grãos de lentilha, de milho e de arroz.
7. Compartilhem com os outros grupos o padrão determinado por vocês. Verifiquem se os outros grupos chegaram a resultados semelhantes e discutam as possíveis diferenças encontradas.

Resíduos

Os grãos e demais materiais podem ser guardados para atividades experimentais posteriores ou descartados no lixo comum, com exceção dos pratos e pregos, que podem ser reciclados.

Davi Augusto Studio/ID/BR

Para concluir **1**, **2**, **3** e **5**. Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1 **Que proporção há entre a massa de um grão de feijão e a de um grão de lentilha? E entre a massa de um grão de feijão e a de um grão de milho? E entre a de um grão de feijão e a de um grão de arroz?**

2 **Com base nas anotações da tabela, é possível saber a relação de massa entre um grão de lentilha e um grão de milho? E entre um grão de milho e um grão de arroz?**

3 **Admitindo, por convenção, que a massa de um grão de arroz equivalha a 1,0 u.i. (unidade inventada), calcule a massa de um grão de lentilha, de um grão de milho e de um grão de feijão utilizando essa mesma unidade.**

4 **Admitindo que a massa média de um grão de feijão seja 0,3 g e considerando um pacote de 1 kg (1000 g) desses grãos, quantas unidades de feijão, aproximadamente, há no pacote?** 3 333 grãos

5 **Utilizando a massa de uma unidade de feijão do exercício anterior, quantos grãos de arroz há em um saco de arroz de 1 kg (1000 g)?**

6 **É possível, na prática, determinar a massa de um grão de açúcar em u.i.?**

Não é possível determinar a massa de um grão de açúcar em u.i., pois a massa de um grão de açúcar é muito menor que o padrão estabelecido.

5. a) Sim, porque, se apresentam o mesmo volume nas mesmas condições de pressão e temperatura, os gases devem ter o mesmo número de moléculas.

ATIVIDADES

5. b) No frasco contendo CH_4, pois cada molécula é constituída de 5 átomos, enquanto as moléculas de O_2 e CO_2 são constituídas, respectivamente, de 2 e de 3 átomos.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **A hematita é o principal minério de ferro e a partir dela as indústrias siderúrgicas produzem o ferro metálico e as ligas de aço. O óxido de ferro(III), Fe_2O_3, é o principal componente da hematita e apresenta 7,0 g do elemento Fe para cada 10,0 g de óxido. Determine:**

a) A massa do elemento ferro presente em 1000 kg de hematita com teor de 60% em óxido de ferro(III).

b) A massa do elemento oxigênio presente em 200 g de óxido de ferro(III).

c) A razão entre as massas do elemento ferro e do elemento oxigênio.

Resolução:

a) 60% de 1000 kg de hematita correspondem a 600 kg de Fe_2O_3.

Como cada 10 g de óxido contém 7 g de Fe, logo o teor desse elemento é de 70%.

70% de 600 kg de Fe_2O_3 correspondem a $0,7 \cdot 600 = 420$ kg de Fe.

b) Como cada 10 g de óxido contém 3 g de O (10 g − 7 g de Fe), logo o teor desse elemento é de 30%.

30% de 200 g de Fe_2O_3 correspondem a $0,3 \cdot 200 = 60$ g de O.

c) 7 g de Fe correspondem a 2 *n* átomos de Fe, logo *n* átomos de Fe correspondem a 3,5 g.

3 g de O correspondem a 3 *n* átomos de O, logo *n* átomos de O correspondem a 1,0 g.

Assim, 1 átomo de Fe apresenta a massa de 3,5 átomos de O.

2 **O tálio é um elemento químico utilizado em detectores de radiação infravermelha e na medicina nucelar. Determine a abundância relativa dos isótopos naturais do tálio (^{203}Tl e ^{205}Tl), considerando que a massa atômica desse elemento é de 204,4 u.**
$^{203}Tl = 30\%$ e $^{205}Tl = 70\%$

3 **O gás metano (CH_4) é constituído de 25% de hidrogênio em massa.**

a) Qual é a razão entre a massa de carbono e a de hidrogênio nesse gás? 3 : 1

b) Qual é a quantidade de hidrogênio necessária para reagir totalmente com 36 g de carbono e resultar em metano? 12 g

c) Sem consultar a Tabela Periódica, calcule quantas vezes a massa de um único átomo de carbono é superior à de um átomo de hidrogênio. 12 vezes

4 **Considere cinco balões de mesmo volume, contendo gases à mesma temperatura. Cada balão contém um gás diferente: monóxido de carbono (CO), metano (CH_4), hélio (He), oxigênio (O_2) e dióxido de carbono (CO_2). Em todos os balões, a pressão exercida por cada gás é a mesma.**



Reinaldo Vignati/ID/BR

4. a) É a mesma em todos os balões.

a) O que se pode afirmar em relação à quantidade de moléculas presentes em cada um dos balões?

b) Qual dos balões apresenta a menor massa? E a maior? Organize os balões em ordem crescente de massa. $He < CH_4 < CO < O_2 < CO_2$

5 **As representações a seguir são de moléculas dos gases H_2, CO_2 e CH_4, os quais estão armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão, em recipientes de mesmo volume.**

Representação sem proporção de tamanho.


ID/BR

Cores-fantasia.

a) Pode-se afirmar que as representações das moléculas em cada um dos recipientes obedecem ao princípio de Avogadro? Justifique.

b) Em qual dos recipientes há maior número de átomos? Justifique.

6 **Considere os frascos representados a seguir, contendo gases armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão.**



Reinaldo Vignati/ID/BR

6. a) Frasco 4. Maior volume nas mesmas condições de *T* e *P*, e maior número de moléculas.

a) Identifique o frasco que apresenta a maior quantidade de moléculas. Justifique.

b) Identifique o frasco que apresenta a maior quantidade de átomos. Justifique.

c) Identifique o frasco que contém a maior massa de gás. Justifique.

(**Dado:** Massa atômica dos elementos: H = 1,0 u; C = 12,0 u e O = 16,0 u).

6. b) e **c)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CAPÍTULO 2

QUANTIDADE DE MATÉRIA

PARA COMEÇAR

1. Você sabe o que significa a palavra mol? Discuta com os colegas.
2. As reações químicas seguem uma proporção definida em massa? Justifique.

1. Resposta pessoal. O mol é a unidade para quantidade de matéria que contém $6{,}02 \cdot 10^{23}$ entidades elementares.

QUANTIDADES DE SUBSTÂNCIAS

A imagem desta página mostra sete béqueres de diferentes tamanhos – um deles foi colocado em uma balança de precisão.

Pode-se afirmar que as substâncias contidas nos béqueres são diferentes umas das outras? A observação da imagem permite fazer essa constatação?

E em relação às suas massas, é possível afirmar qualitativamente, ou seja, sem realizar a medição, que elas são diferentes?

As massas das substâncias contidas nos béqueres e seus respectivos volumes, de fato, diferem entre si. No entanto, todas essas substâncias contêm o mesmo número de agregados atômicos: $6{,}02 \cdot 10^{23}$, o que não é possível constatar apenas visualmente.

Esse número corresponde a aproximadamente 600 sextilhões (número 6 seguido de 23 zeros). É uma quantidade tão grande que é difícil compará-la com informações que fazem parte de nosso dia a dia. Apesar dessa dificuldade, esse número está presente em nosso cotidiano mais do que se imagina.

Neste capítulo, você vai conhecer o significado dessa grandeza, a que esse número se refere, sua importância para os cálculos químicos, bem como a relação dele com a massa e o número de espécies químicas de uma determinada substância.

2. Sim, há uma relação entre as massas dos elementos envolvidos em uma reação química, pois os átomos não se modificam, apenas se rearranjam gerando novas espécies químicas.

A massa registrada na balança é a do conjunto formado pelo béquer mais a substância nele contida.

SPL/Fotoarena

Determinação da proporção entre átomos





Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Representações sem proporção de tamanho.

Considere uma bola azul e duas vermelhas, em que a massa de cada bola vermelha equivale à metade da massa da bola azul (figura **A**). Imagine agora duas caixas de mesma massa e tamanho: em uma delas há 1 kg de bolas azuis e, na outra, 1 kg de bolas vermelhas. Mesmo sem contá-las, podemos afirmar que, em uma das caixas, há o dobro de bolas vermelhas em relação à quantidade de bolas azuis.

Suponha agora que, em uma caixa na qual foram colocados 10 kg de bolas azuis, existam n bolas dessa cor. Qual massa de bolas vermelhas apresenta a mesma quantidade n de bolas? Como a massa de cada bola vermelha é metade da azul, a massa de n bolas vermelhas é igual a 5 kg (figura **B**).

Para átomos e moléculas (bem como para agregados atômicos, íons, etc.), a lógica de contagem é a mesma.

É possível determinar a quantidade de átomos ou de moléculas de uma amostra partindo do modelo atômico proposto por Dalton.

Apesar de Dalton e seus contemporâneos não terem conseguido determinar a massa dos átomos em unidades macroscópicas – como o quilograma (kg) –, a conservação e o rearranjo de átomos por ele propostos permitem comparar as massas das moléculas e dos átomos utilizando um raciocínio fundamental da Matemática: a proporção.

Na síntese da amônia, por exemplo, sabe-se que cada 28 g de N_2 reage com 6 g de H_2, resultando em 34 g de NH_3.

$$\underset{28\ g}{N_2(g)} + \underset{6\ g}{3\ H_2(g)} \rightarrow \underset{34\ g}{2\ NH_3(g)}$$

$$\frac{\text{massa de } x \text{ moléculas de } N_2}{\text{massa de } 3x \text{ moléculas de } H_2} = \frac{28\ g}{6\ g} \rightarrow \frac{\text{massa de 1 molécula de } N_2}{\text{massa de 1 molécula de } H_2} = 14$$

$$\frac{\text{massa de } 2y \text{ átomos de N}}{\text{massa de } 6y \text{ átomos de H}} = \frac{28\ g}{6\ g} \rightarrow \frac{\text{massa de 1 átomo de N}}{\text{massa de 1 átomo de H}} = 14$$

Representação sem proporção de tamanho.



AMj Studio/ID/BR

Representação da síntese da amônia. Cores-fantasia.

Assim, a exemplo do procedimento adotado para as bolas azuis e vermelhas, é possível estabelecer que, considerando-se dois conjuntos com a mesma quantidade de átomos de N e de H, o primeiro apresenta massa 14 vezes superior à do segundo.

Considere um conjunto que contenha x átomos de hidrogênio, cuja massa é igual a 1 g. Qual deve ser a massa de um conjunto contendo a mesma quantidade x de átomos de nitrogênio?

Como cada átomo de nitrogênio apresenta massa 14 vezes superior à do átomo de hidrogênio, o conjunto de átomos de nitrogênio apresenta massa de 14 g.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Durante um mês, foram consumidos 20 kg de abacaxi, 20 kg de manga e 10 kg de maçã no preparo de saladas de frutas em um restaurante.

Qual é a proporção em unidades de frutas na receita da sobremesa, sabendo que uma manga tem massa quatro vezes maior que a de uma maçã e que um abacaxi tem massa oito vezes maior que a de uma maçã?

Resolução

A massa de uma maçã é quatro vezes menor que a de uma manga. Como a proporção na receita é de duas vezes, temos o dobro de maçãs.

Um abacaxi tem o dobro da massa de uma manga, e, como são utilizadas massas iguais, são duas mangas para cada abacaxi.

Logo, para cada abacaxi são utilizadas quatro maçãs e duas mangas.

Não escreva no livro.

A UNIDADE MOL

A tabela a seguir relaciona as massas dos átomos de alguns elementos em unidades de massa atômica, as massas de 1 000 átomos de cada um desses elementos e a massa, em grama, de N_A átomos de cada um desses elementos.

Átomo	Massa atômica	Massa de 1 000 unidades	Massa de N_A unidades
H	1 u*	1 000 u	1,0 g
C	12 u	12 000 u	12,0 g
O	16 u	16 000 u	16,0 g
S	32 u	32 000 u	32,0 g

*1 u = $1,66 \cdot 10^{-27}$ kg. Tabela elaborada para fins didáticos.

Sendo a massa de um átomo de carbono (C) 12 vezes superior à de um de hidrogênio (H), a razão entre as massas de 1 000 átomos de C e 1 000 átomos de H será 12, pois em ambos os conjuntos haverá a mesma quantidade de átomos. Por sua vez, para 1 g de átomos de H, o conjunto que contém a mesma quantidade (N_A) de átomos de C apresenta massa de 12 g. É possível estabelecer também que as massas de conjuntos que contêm N_A átomos de O e N_A átomos de S apresentam massas iguais a 16 g e 32 g, respectivamente.

Observe que, para o estabelecimento das proporções entre as massas, é necessário trabalhar com um número fixo de átomos.

Conhecendo as massas atômicas de C e de H, é possível determinar a massa molecular do metano, CH_4, que é 16 u. Para 16 g de gás metano e 12 g de C, pode-se supor que, em ambos os conjuntos, há o mesmo número (N_A) de entidades.

É dessa forma que os químicos estabelecem relações entre as quantidades de átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Nessas relações, eles utilizam a grandeza denominada **quantidade de matéria**, cuja unidade de medida é o mol – uma das sete grandezas de base do Sistema Internacional (SI).

O **mol** é a unidade de quantidade de matéria que contém exatamente $6,02214076 \cdot 10^{23}$ entidades elementares (átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou grupo de partículas).

Assim, em 1 g de átomos de hidrogênio (H) há $6,02214076 \cdot 10^{23}$ átomos de H, ou seja, 1 mol de átomos. Da mesma forma, em 2 g de gás hidrogênio (H_2) há $6,02214076 \cdot 10^{23}$ moléculas de H_2, ou seja, 1 mol de moléculas.

Com essa definição, garante-se que a massa de 1 mol de átomos de qualquer elemento químico corresponda ao valor de sua massa atômica, expresso em grama. No caso de substâncias, a massa de 1 mol corresponde ao valor de sua massa molecular (soma das massas atômicas) expresso em gramas.

Massa de 1 mol de átomos do elemento **A** = massa atômica do elemento **A** em g
Massa de 1 mol de uma substância **B** = massa molecular da substância **B** em g

Observe alguns exemplos na tabela e no esquema a seguir.

Substância	Massa molecular (u)	Massa de 1 mol de moléculas (g)
H_2	2	2
O_2	32	32
H_2O	18	18
CO_2	44	44
$C_6H_{12}O_6$	180	180

Mol, a "dúzia" química



ID/BR

ROTEIRO

1. Com auxílio da Tabela Periódica, determine:

a) massa de 1,0 mol de átomos de enxofre (S). 32 g

b) massa de 0,5 mol de moléculas de dióxido de enxofre (SO_2). 32 g

DE OLHO NO CONCEITO

Conceito de Mol

Quando o mol foi adotado pela primeira vez como uma unidade base do SI, ele foi definido como o número de tantas entidades elementares quanto são os átomos em exatamente 12 g de carbono-12. Usando essa definição, a massa de 12 g para um mol de carbono-12 era uma grandeza definida (com um número infinito de algarismos significativos).

O número de Avogadro, por outro lado, era uma grandeza medida, determinada experimentalmente e que mudava ao longo do tempo conforme os experimentos forneciam valores mais precisos e exatos.

Em 20 de maio de 2019, a definição de mol foi oficialmente modificada pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que monitora as unidades base do SI. Na nova definição, o número de partículas em um mol é definido como sendo exatamente $6,02214076 \cdot 10^{23}$. O valor do número de Avogadro é agora uma grandeza definida. A massa do carbono-12 que corresponde a esse número é agora um valor medido experimentalmente, com precisão e exatidão limitadas.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C., *et al.* *Chemistry and Chemical Reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage Learning Inc., 2023. p. 100.

A constante de Avogadro

Qualquer amostra de qualquer substância contém um número extremamente grande de átomos, íons ou moléculas que a constituem.

Para estimar a dimensão do átomo e compreender sua contribuição para a estrutura da matéria, é importante determinar a quantas entidades (átomos, moléculas, íons e outras espécies) corresponde 1 mol.

O número de moléculas existente, por exemplo, em 18 g de água (H_2O), 32 g de gás oxigênio (O_2) ou 46 g de álcool etílico (C_2H_6O), ou seja, em 1 mol de entidades químicas – neste caso, moléculas –, é conhecido como **constante de Avogadro** (N_A).

A constante de Avogadro tem seu valor determinado experimentalmente, e o mais preciso é **$6{,}02214076 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}**, ou seja, em 18 g de água encontram-se $6{,}02214076 \cdot 10^{23}$ moléculas de água. Geralmente, arredonda-se esse valor para $6{,}02 \cdot 10^{23}$.

Esse valor é absurdamente grande e desafiador de imaginar, já que não é possível mensurar nenhum material do dia a dia com essa grandeza. Para se ter uma ideia, 1 mol de folhas de papel sulfite poderia ser dividido em 1 milhão de pilhas e ainda assim cada uma, colocada na superfície da Terra, teria altura suficiente para chegar ao Sol (na verdade, ultrapassaria um pouco). Um mol de grãos de arroz corresponde ao consumo mundial de arroz por cerca de 4 milhões de anos!

Esses dados reforçam a ideia de que o átomo é uma entidade muito pequena, pois, em um gole de água (18 g de água em temperatura ambiente correspondem a aproximadamente 18 mL), estão presentes $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas de água, ou $1{,}204 \cdot 10^{24}$ átomos de hidrogênio e $6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos de oxigênio.

ID/BR



CIÊNCIA SE DISCUTE

Você sabia que o quilograma, até 2018, tinha como referência um objeto físico? Leia o texto a seguir sobre esse assunto e responda às atividades propostas.

Comunidade científica põe fim ao padrão físico do quilograma

A comunidade científica mundial aprovou [...] a maior revisão do Sistema Internacional de Unidades (SI) desde sua instauração em 1960, com a redefinição de quatro de suas sete unidades e o abandono do padrão físico do quilograma.

[...]

A resolução foi aprovada por unanimidade pelos delegados dos 60 Estados-membros do Escritório Internacional de Pesos e Medidas com direito a voto no fechamento da 26ª Conferência Geral, após três dias de debates.

[...]

O quilograma era o último sobrevivente definido por um objeto físico, um cilindro de platina e irídio conhecido como o "Grande Quilo" que, segundo os cientistas, tinha perdido, por motivos desconhecidos, 50 microgramas.

A partir de agora, o quilo será definido em relação à constante de Planck, central na teoria da mecânica quântica e que deve o nome a um de seus pais, o físico e matemático alemão Max Planck.

[...]

A revisão adotada hoje fornecerá maior precisão em âmbitos como a administração de remédios, análises médicas, sistemas de navegação por satélite e competições esportivas e garantirá trocas comerciais mais equitativas no mercado mundial.

Comunidade científica põe fim ao padrão físico do quilograma. *Agência Brasil*, Brasília, DF, 16 nov. 2018. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-11/comunidade-cientifica-poe-fim-ao-padrao-fisico-do-quilograma#. Acesso em: 20 set. 2024.

1. Segundo o texto, qual era o problema de o padrão físico da unidade de massa ser um objeto físico?
Por ser um objeto físico, a unidade de massa sofre com imprecisões que não são consideradas toleráveis para pesquisas científicas que dependam de alto grau de precisão.

2. Qual é a relação entre o quilo e a constante de Avogadro?

3. De que forma pode-se utilizar a constante de Avogadro para determinar a unidade de massa?
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. A constante de Avogadro é um fator de conversão entre o número de entidades químicas e a massa dessas entidades expressa em gramas, ou seja, 0,001 kg.

Não escreva no livro.

RELAÇÃO ENTRE MOL, MASSA MOLAR E CONSTANTE DE AVOGADRO

Como em 1 mol de qualquer substância há um mesmo número (N_A) de entidades elementares, a massa de 1 mol dessas entidades é proporcional à massa de uma única entidade elementar.

Massa molar

Considere átomos dos elementos carbono (C) e oxigênio (O), cujas massas atômicas são, respectivamente, 12 u e 16 u. A razão entre as massas atômicas do oxigênio e do carbono é $\frac{12}{16}$, ou seja, a massa de um átomo de O é 1,33 vez maior que a de um átomo de C. Para 1 mol de átomos de cada um dos elementos C e O, a razão entre as massas é a mesma, pois o número de partículas ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$) é o mesmo em cada um dos conjuntos.

$$\frac{\text{massa de 1 átomo de O}}{\text{massa de 1 átomo de C}} = \frac{16\ u}{12\ u} \rightarrow \frac{\text{massa de 1 mol de O}}{\text{massa de 1 mol de C}} = \frac{N_A \cdot 16\ u}{N_A \cdot 12\ u} = \frac{16\ g}{12\ g}$$

$$N_A \cdot 16\ u = 6{,}02 \cdot 10^{23} \cdot 16 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kg = 0{,}016\ kg/mol = 16\ g/mol$$

Raciocínio semelhante pode ser aplicado se for considerada a razão entre as massas moleculares e as massas de 1 mol de moléculas de substâncias distintas, como dióxido de carbono (CO_2) e gás oxigênio (O_2).

$$\frac{\text{massa de 1 molécula de } CO_2}{\text{massa de 1 molécula de } O_2} = \frac{44\ u}{32\ u} \rightarrow \frac{\text{massa de 1 mol de } CO_2}{\text{massa de 1 mol de } O_2} = \frac{N_A \cdot 44\ u}{N_A \cdot 32\ u} = \frac{44\ g}{32\ g}$$

Em 12 g de carbono e 16 g de oxigênio há a mesma quantidade de átomos. Da mesma forma, em 44 g de dióxido de carbono há o mesmo número de moléculas que em 32 g de gás oxigênio.

A massa do conjunto que contém 1 mol de entidades elementares (átomos, moléculas, íons, etc.) é denominada **massa molar**. No primeiro caso, é numericamente igual à massa atômica; no segundo caso, é numericamente igual à massa molecular. Sua unidade de medida é **g/mol** ou **g · mol⁻¹**.

Assim, a massa molar do C é 12 g/mol e a do O é 16 g/mol. Já as massas molares do CO_2 e do O_2 são, respectivamente, 44 g/mol e 32 g/mol.

ATIVIDADE RESOLVIDA

O clorato de potássio ($KC\ell O_3$) é uma substância utilizada na fabricação de explosivos, fogos de artifício, propelente sólido para foguetes, etc. Essa substância, quando aquecida, decompõe-se formando cloreto de potássio ($KC\ell$) e gás oxigênio (O_2). A equação de decomposição está descrita a seguir.

$$2\ KC\ell O_3 \rightarrow 2\ KC\ell + 3\ O_2$$

Dados: massas atômicas: K = 39 u , Cℓ = 35,5 u e O = 16 u.

a) Considere que 1 mol de clorato de potássio seja usado em uma reação de decomposição. Quantos gramas de $KC\ell$ e de O_2 serão produzidos na reação?

b) Determine a quantidade em massa de $KC\ell O_3$ correspondente a 1,5 mol desse composto.

Resolução

a) $1\ KC\ell O_3 \rightarrow 1\ KC\ell + \frac{3}{2}\ O_2$

$KC\ell$: 1 mol = 39 g + 35,5 g = 74,5 g

O_2 : 1,5 mol = 1,5 · (16 g + 16 g) = 48 g

b) 1 mol de $KC\ell O_3$ = 39 g + 35,5 g + (3 · 16 g) = 122,5 g

1,5 mol = x

$$x = \frac{122{,}5\ g \cdot 1{,}5\ mol}{1\ mol} = 183{,}75\ g$$

O mol e a massa molar

Em Ciências da Natureza, é comum nos depararmos com conceitos abstratos, que podem estar relacionados a corpos muitos extensos, como planetas e suas órbitas, ou a partículas muito pequenas, como átomos e partículas subatômicas. Para entender esses conceitos, muitas vezes recorremos à imaginação, mas também podemos criar **analogias** para facilitar a compreensão.

Qual analogia você usaria para explicar o que é um mol? Nesta atividade, você e os colegas vão elaborar uma analogia que possibilite compreender os conceitos de mol e de massa molar.

Material

- computador com acesso à internet
- celular com câmera ou câmera digital

analogia: figura de linguagem que compara diferentes entidades (partículas, seres, objetos, conceitos, fenômenos, experiências, etc.) com o objetivo de estabelecer uma relação de similaridade entre elas.

Como fazer

1. Em duplas, discutam as seguintes questões:
   - O que é um mol?
   - O que significa massa molar?
2. Agora, com base nas respostas, procurem elaborar uma analogia para explicar os conceitos de mol e de massa molar. Se preciso, façam uma pesquisa. Escrevam, no caderno, a explicação que elaboraram.
3. Cada dupla deverá apresentar a explicação elaborada. A turma vai selecionar, por votação, a analogia mais adequada.
4. A analogia selecionada deverá ser utilizada para a criação de um recurso digital que ajude outros jovens a compreender os conceitos de mol e de massa molar. Vocês podem produzir uma animação, um vídeo, um infográfico, um documento com texto e imagens ou outro recurso que julgarem adequado. Apresentem a ideia de vocês ao(à) professor(a).

   É importante que a linguagem seja acessível a outros estudantes e que o material produzido possa ser veiculado nas redes sociais.
5. Em um dia determinado pelo(a) professor(a), a turma deverá apresentar o recurso produzido. Após a apresentação, disponibilizem, na internet, esse recurso.

Davi Augusto/Studio/D/BR

Para concluir

2. Resposta variável. Espera-se que os estudantes avaliem se a analogia escolhida, mesmo reconhecendo seus limites como modelo, comunicava de forma clara os conceitos de mol e massa molar, facilitando a compreensão desses conceitos e mantendo a correção conceitual.

1 Qual foi a analogia escolhida pela turma? Em seu ponto de vista, por que ela foi eleita a mais adequada? Quais são as limitações da analogia escolhida?

1. Resposta variável. A resposta da atividade depende da analogia criada pelos integrantes da dupla.

2 Em sua opinião, o recurso digital produzido pela turma apresentou de modo satisfatório e correto os conceitos de mol e de massa molar? Explique sua resposta.

3 A atividade auxiliou o seu entendimento sobre os conceitos de mol e de massa molar? Explique.

3. Resposta pessoal. As respostas dos estudantes vão depender da qualidade do recurso desenvolvido, porém espera-se que eles associem a qualidade do material produzido à clareza e à precisão dos conceitos explicados, e não somente à qualidade técnica do recurso criado.

Não escreva no livro.

A massa molar e a constante de Avogadro

Quando se atribui à massa de 1 mol de partículas um valor numérico igual ao da massa atômica ou molecular, expressa em grama, é possível explicar por que a conversão da unidade massa atômica, em u, para unidades SI (quilograma ou grama) é:

$$1\ u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kg \text{ ou } 1\ u = 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g$$

Com base na definição de mol, entende-se que a massa molar do hidrogênio é 1 g/mol, o que significa que $6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos (1 mol de átomos) de hidrogênio apresentam massa de 1 g. Para definir a massa, em grama, de um único átomo de hidrogênio, pode-se fazer o seguinte cálculo:

$$\frac{6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{átomos}}{1\ \text{átomo}} = \frac{1\ g}{x} \rightarrow x = \frac{1\ g}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g$$

Em geral, supõe-se que 1 g (massa molar do hidrogênio) equivale à constante de Avogadro (N_A) de unidades de massa atômica, pois a massa atômica do hidrogênio é igual a 1 u.

$$\text{Logo, } 1\ g = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ u \text{ ou } 1\ u = 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g$$



AMj Studio/ID/BR

Relação entre a massa molar e a constante de Avogadro. Massas de 1 mol de diferentes substâncias contêm o mesmo número de entidades elementares (N_A). Cores-fantasia.

Volume molar e o princípio de Avogadro

Avogadro acreditava que os gases eram formados por agrupamentos chamados de moléculas. Ele constatou que um mesmo número de moléculas de dois ou mais gases, desde que medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, ocupam o mesmo volume. A generalização dessa constatação, conforme apresentado anteriormente, foi denominada **princípio de Avogadro**.

Para uma mesma pressão, o volume de um gás está relacionado com sua quantidade de matéria e é independente do gás analisado.

À temperatura de 0 °C (273,15 K) e pressão de $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa (condições normais de temperatura e pressão – CNTP), 1 mol de gás ocupa o volume de 22,7 L.

É importante também relacionar o volume de 1 mol de gás com as condições ambientes de temperatura e pressão (CATP), que corresponde a 25 L, pois várias tabelas fornecem dados nessas condições.

Sigla	Denominação	Temperatura	Pressão
CATP	Condições ambientes de temperatura e pressão	25 °C (≅ 298 K)	1 bar (≅ 1 atm) (= 101 325 Pa)

Relação entre massa e quantidade de matéria

Nesta foto, são apresentadas amostras que contêm 1 mol de diferentes substâncias simples: enxofre (S), mercúrio (Hg), carbono (C), alumínio (Aℓ) e cobre (Cu).

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Cada amostra contém 1 mol de átomos de diferentes substâncias simples: enxofre (**A**), mercúrio (**B**), carbono (**C**), alumínio (**D**) e cobre (**E**).

Apesar de haver a mesma quantidade de partículas em todas as amostras ($6{,}02 \cdot 10^{23}$), as massas das amostras são distintas: há 32 g de enxofre, 201 g de mercúrio, 12 g de carbono, 27 g de alumínio e 64 g de cobre. Essa variação decorre das diferentes massas molares dos materiais que constituem as amostras.

Considere uma amostra de mercúrio contendo $1{,}20 \cdot 10^{25}$ átomos do metal. A quantidade de matéria (x), em mol, e a massa (y) da amostra, em grama, podem ser calculadas da seguinte forma:

$$\frac{1\ \text{mol de Hg}}{x} = \frac{201\ g}{y} = \frac{6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{átomos}}{1{,}20 \cdot 10^{25}\ \text{átomos}}$$

$$x = 20\ \text{mol},\ y = 4020\ g$$

Observe que as determinações de x e y implicam o estabelecimento de relações de proporcionalidade com o número de átomos presentes na amostra.

Professor(a), segundo a IUPAC, deve ser descontinuado o raciocínio e cálculos em pressão de 1 atm a 0 °C (273,15 K), o que implicaria um volume molar de 22,4 L.

Relação entre mol, massa molar e quantidade de partículas

O mol é a unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional de Unidades (desde 1971) para a grandeza quantidade de matéria.

Por isso, é comum, em textos e problemas que envolvem cálculos químicos, a expressão das quantidades dos materiais em mol, por exemplo: 10 mol de H_2O, 2 mol de CO_2, 5 mol de H_2. A conversão de quantidade de matéria, em mol, para massa, em grama, implica o estabelecimento da relação a seguir.

> Em 1 mol há aproximadamente $6{,}02 \cdot 10^{23}$ entidades elementares, sendo a massa do conjunto correspondente ao valor numérico da sua massa molar, expresso em grama.

Portanto, 2 mol de H_2O correspondem a 36 g (pois 1 mol de moléculas de água tem massa igual a 18 g) e contêm $1{,}2 \cdot 10^{24}$ moléculas ($2 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas). Em 1 mol de NaCℓ há 1 mol de íons Na^+ e 1 mol de íons $Cℓ^-$ ou 1 mol de pares NaCℓ.

Quantidade de matéria de átomos e de moléculas – fórmulas

A fórmula H_2O indica que a molécula de água é constituída de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio e apresenta massa molecular de 18 u.

Com base nas relações estabelecidas entre mol, massa molar e a constante de Avogadro, definiu-se que 1 mol de moléculas de água é constituído de $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas com massa igual a 18 g.

Pode-se também afirmar que em 1 mol de moléculas de água há 2 mol de átomos de hidrogênio ($1{,}2 \cdot 10^{24}$ átomos) e 1 mol de átomos de oxigênio ($6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos). É possível estabelecer, ainda, que 1 mol de H_2O é constituído de 2 g de átomos de H e 16 g de átomos de O.

Observe o esquema a seguir.



Essas relações possibilitam a determinação de fórmulas quando conhecidas as massas ou as quantidades de átomos que compõem certa quantidade de matéria de uma espécie química específica.

Considere, por exemplo, a sacarose – açúcar comum – na atividade a seguir.

ROTEIRO

2. A análise de determinado composto orgânico indicou que, em 0,5 mol da substância, há 78 g de carbono, $5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Determine a fórmula molecular do composto e sua massa molar, em g/mol.
$C_{13}H_{18}O_2$ e massa molar 206 g/mol.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Sabendo que, em 1 mol de moléculas de sacarose, há 144 g de átomos de carbono, 22 mol de átomos de hidrogênio e $6{,}6 \cdot 10^{24}$ átomos de O, para determinar a fórmula da sacarose ($C_xH_yO_z$), é preciso determinar x, y e z, os quais correspondem à quantidade de matéria, em mol, de cada um dos átomos que compõem a molécula.

Resolução

Como em 1 mol de moléculas de sacarose há 22 mol de átomos de H, $y = 22$. Para a determinação de x e z, são montados os algoritmos representados a seguir.

$$\frac{1 \text{ mol de átomos de C}}{x} = \frac{12 \text{ g}}{144 \text{ g}} \rightarrow 12 \text{ g} \cdot x = 1 \text{ mol} \cdot 144 \text{ g} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{144 \text{ g} \cdot \text{mol}}{12 \text{ g}} = 12 \text{ mol de C}$$

$$\frac{1 \text{ mol de átomos de O}}{z} = \frac{6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{6{,}6 \cdot 10^{24} \text{ átomos}} \rightarrow$$

$$\rightarrow 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ átomos} \cdot z = 1 \text{ mol} \cdot 6{,}6 \cdot 10^{24} \text{ átomos} \rightarrow$$

$$\rightarrow z = \frac{1 \text{ mol} \cdot 6{,}6 \cdot 10^{24} \text{ átomos}}{6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ átomos}} = 11 \text{ mol de O}$$

Logo, a sacarose apresenta fórmula molecular $C_{12}H_{22}O_{11}$ e massa molar 342 g/mol.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE AVOGADRO

Você já sabe que em 1 mol de moléculas ou átomos existem $6{,}02214076 \cdot 10^{23}$ moléculas ou átomos. Mas de onde vem esse valor? E por que ele é chamado de constante de Avogadro?

Na verdade, não foi Avogadro quem determinou esse valor – ele nem o conheceu.

Amedeo Avogadro foi um advogado italiano que se interessou por Física, Química e Matemática e, em 1820, se tornou o primeiro professor de Física da Itália. A hipótese mais famosa de Avogadro é a de que volumes iguais de gases diferentes, sob iguais condições de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de partículas.

Porém, a primeira pessoa a estimar o número de partículas em determinada quantidade de uma substância foi o professor austríaco Josef Loschmidt (1821-1895). Em 1865, Loschmidt usou a teoria da cinética molecular para estimar o número de partículas em 1 cm^3 de gás nas condições-padrão de temperatura e pressão.

O termo "número de Avogadro" foi usado pela primeira vez pelo físico francês Jean-Baptiste Perrin (1870-1942). Em 1909, Jean Perrin realizou a primeira determinação precisa da constante de Avogadro (N_A), obtendo um valor entre $6{,}5 \cdot 10^{23}$ e $7{,}2 \cdot 10^{23}$ entidades por mol. Ele contou o número de partículas coloidais por unidade de volume em uma suspensão e mediu, simultaneamente, suas massas.

No entanto, foi o trabalho desenvolvido pelo radioquímico estadunidense Bertram Boltwood (1870-1927) e pelo físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) que permitiu a determinação mais precisa da constante de Avogadro. De maneira simplificada, o experimento consistia na contagem de partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa e na determinação do volume de gás hélio obtido. Há que salientar, contudo, que os cientistas não determinaram o valor da constante de Avogadro, pois não era esse o objetivo de sua investigação. O físico escocês James Dewar (1842-1923), utilizando esse método, chegou ao valor da N_A igual a $6{,}04 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

Ainda no início do século XX, com o experimento do físico estadunidense Robert A. Millikan (1868-1953) para determinar a carga de um elétron ($1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C), já sendo então conhecida a carga de 1 mol de elétrons (96 500 C), foi possível calcular a constante de Avogadro. O valor obtido para essa constante foi $6{,}03 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

Atualmente, o valor da constante de Avogadro é obtido mediante a difração de raios X. A técnica consiste na determinação do volume de alguns átomos de um retículo cristalino, em que a massa de 1 mol de átomos e a densidade da amostra sejam conhecidas.

O termo "constante de Avogadro" é, portanto, uma homenagem ao físico italiano, e seu valor é uma decorrência da definição de mol e da unidade grama.

GL Archive/Alamy/Fotoarena

Retrato do advogado e físico Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856).

PARA EXPLORAR

Leia

Tradução comentada de artigo de Avogadro

Para saber mais sobre a contribuição de Avogadro para o desenvolvimento da Química, leia o texto publicado na *Revista Brasileira de História da Ciência*, em dezembro de 2020. Ele trata da tradução comentada de um de seus artigos.

Disponível em: https://www.sbhc.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=2899. Acesso em: 20 set. 2024.

Para discutir

1 **Qual é a importância da constante de Avogadro para a ciência?**

2 **De que forma a determinação dessa constante corroborou a hipótese proposta por Avogadro de que volumes iguais de gases diferentes, sob condições iguais de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de partículas?**

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Caso o número da constante de Avogadro fosse diferente, isso alteraria de algum modo sua aplicação?**

1. A constante de Avogadro permite relacionar o número de partículas à massa e ao volume de uma substância. É importante que os estudantes consigam relacionar a constante de Avogadro à capacidade de quantificar átomos e moléculas.

3. Espera-se que os estudantes percebam que o uso da constante não se alteraria caso seu valor fosse diferente de $6{,}02 \cdot 10^{23}$, pois as relações entre número de partículas e massa se manteriam. Nessa questão, o ponto principal é que os estudantes compreendam que o mais importante da constante de Avogadro é a relação que ela estabelece entre número de partículas e massa, e não o número em si.

5. b) O número de átomos no cubo **D** é o dobro do número de átomos no cubo **A**. Ambos os cubos são formados por átomos do mesmo elemento. O número de átomos, portanto, é diretamente proporcional à massa.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 No processo industrial de produção de alumínio metálico, a substância alumina é extraída do minério bauxita. A alumina passa pelo processo de eletrólise ígnea para formar o metal alumínio em um processo que envolve consumo de energia elétrica. Sabendo que uma amostra de 5,1 g de alumina apresenta 2,7 g de alumínio e 2,4 g de oxigênio, determine a fórmula mínima (menor proporção entre os átomos dos elementos) dessa substância. **5. a)** Não. Como os átomos desses elementos têm massas diferentes, o fato de esses cubos apresentarem a mesma massa significa que eles não têm o mesmo número de átomos.

Resolução

Consultando a Tabela Periódica, temos que 27 g de Aℓ correspondem a 1,0 mol de átomos de Aℓ, assim, uma amostra de 2,7 g de alumínio contém 0,10 mol de átomos de Aℓ.

Já 16 g de O correspondem a 1,0 mol de átomos de O, assim, uma amostra de 2,4 g de oxigênio contém 0,15 mol de átomos de O.

Portanto, para cada 0,10 mol de Aℓ encontramos 0,15 mol de O, então a proporção é de 2 átomos de A, para 3 átomos de O, e a fórmula mínima é $A\ell_2O_3$.

2 As substâncias oxigênio (O_2) e ozônio (O_3) são formas alotrópicas do elemento oxigênio. Considere um frasco **A** contendo 96 g de gás oxigênio e um frasco **B**, de mesmo volume, que contém apenas ozônio, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão do frasco **A**.



Cores-fantasia.

Determine:

a) a quantidade de matéria presente no frasco **A**; 3 mol de O_2.

b) a massa de ozônio presente no frasco **B**; 144 g de O_3.

c) a quantidade de átomos de oxigênio presente em cada frasco; Frasco **A**: $3{,}6 \cdot 10^{24}$ átomos de O; Frasco **B**: $5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de O.

d) a massa de O_2, o número de átomos e o número de moléculas presentes no frasco **B** ao final da transformação, considerando que todo o gás ozônio contido no frasco **B** se transforme em gás oxigênio. 144 g de O_2; $5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de O; $2{,}7 \cdot 10^{23}$ moléculas de O_2.

3 O gás metano (CH_4) é o principal gás componente do processo digestivo de bovinos, enquanto o butano (C_4H_{10}) é o principal componente do gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha. Ambos são combustíveis que liberam dióxido de carbono (CO_2) como principal produto de suas queimas, além de vapor de água. Sabendo que a quantidade de moléculas de dióxido de carbono liberada é a mesma do número de átomos de carbono presentes no combustível, determine qual dos dois gases libera menor quantidade de CO_2 por quilograma de combustível. Gás metano.

Dados: massa molar do metano = 16 g/mol; massa molar do butano = 58 g/mol.

4 Fertilizantes são utilizados para recompor o solo com nutrientes essenciais para as plantas. Considerando o elemento nitrogênio (N), muitas substâncias podem fazer parte da fórmula do fertilizante. Entre as substâncias estão o nitrato de cálcio ($Ca(NO_3)_2$), o nitrato de potássio (KNO_3) e a ureia (CH_4N_2O). Determine o composto que apresenta maior massa de nitrogênio por massa de substância. Ureia.

5 Em um laboratório, há quatro cubos metálicos (**A**, **B**, **C** e **D**) feitos de titânio, alumínio, prata e titânio, respectivamente. Os cubos **A** e **B** têm 240 g de massa, e os cubos **C** e **D**, 480 g. Analise o esquema a seguir e faça o que se pede.

Representações sem proporção de tamanho.

A	B	C	D
Ti	Aℓ	Ag	Ti
m = 240 g	m = 240 g	m = 480 g	m = 480 g

Cores-fantasia.

a) Os cubos **A** e **B** têm a mesma quantidade de átomos? Explique.

b) Compare a quantidade de átomos entre os cubos **A** e **D**. Explique.

c) Compare a quantidade de átomos entre os cubos **B** e **C**. Explique.

d) A massa de um corpo pode, isoladamente, indicar sua quantidade de matéria? Explique.

6 A quinina é uma substância utilizada contra a malária. Um mol dessa molécula apresenta 240 g de carbono (C), 24 mol de átomos de hidrogênio (H), 28 g de nitrogênio (N) e $1{,}2 \text{ g} \cdot 10^{24}$ átomos de oxigênio (O). Determine a fórmula molecular e a massa molar da quinina. $C_{20}H_{24}N_2O_2$; massa molar: 324 g/mol.

7 A sucralose é um edulcorante artificial, utilizado para adoçar alimentos industriais ou até para substituir o açúcar em preparos culinários domésticos. Como não é metabolizada pelo organismo, é utilizada em dietas de restrição calórica ou para pessoas que apresentam diabetes.

Uma molécula de sucralose adoça cerca de 600 vezes mais do que uma molécula de sacarose,

5. c) O cubo **C** apresenta cerca de oito vezes menos átomos que o cubo **B**. A massa do Ag (128 u) é quatro vezes maior que a do Aℓ (27 u). Logo, ao se ter o dobro de massa de alumínio, deve-se ter cerca de oito vezes mais átomos. **5. d)** Somente no caso de ele ser formado por substância pura. Só assim se pode estabelecer uma relação entre a massa e a quantidade de matéria da substância presente em um corpo.

Não escreva no livro.

10. b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

o açúcar comum. Compare quanto 1 g de sucralose deve adoçar mais do que a mesma massa de sacarose. 510 vezes mais.

Dados: massa molar da sucralose = 400 g/mol; massa molar da sacarose = 340 g/mol.

8 **O rótulo de um isotônico, bebida utilizada por atletas para manter as concentrações de sais minerais e de carboidratos no organismo, traz, entre outras, as seguintes informações:**

a) $3,9 \cdot 10^{-3}$ mol de Na^+; $6,4 \cdot 10^{-4}$ mol de K^+; $2,4 \cdot 10^{-3}$ mol de $C\ell^-$.

Quantidade presente em 200 mL	
sódio (Na^+)	90 mg
potássio (K^+)	25 mg
cloreto ($C\ell^-$)	84 mg

b) $1,95 \cdot 10^{-2}$ mol de Na^+; $3,0 \cdot 10^{-3}$ mol de K^+; $1,2 \cdot 10^{-2}$ mol de $C\ell^-$.

a) Caso as quantidades fossem expressas em mol, quais seriam os valores indicados no rótulo?

b) Determine a quantidade de íons sódio, potássio e cloreto presentes em 1 L da bebida.

9 **Determine a fórmula molecular de uma substância que apresenta massa molar 92 g/mol e que, em um experimento de análise elementar, 8,0 g da substância apresentam 7,3 g de carbono e 0,7 g de hidrogênio.** C_7H_8

10 **Leia, a seguir, trechos de uma reportagem e, depois, responda às questões.**

Já pensou se você fizesse uma descoberta científica que deixasse seus amigos e professores de queixo caído? Foi exatamente o que aconteceu com uma menina chamada Clara Lazen: em uma aula de química, ela usou a criatividade para montar, usando bolinhas coloridas, uma combinação de átomos completamente nova para ciência [...].

Essa história aconteceu numa escola do Kansas, nos Estados Unidos. O professor de química Kenneth Boehr deu aos alunos bolinhas com encaixes, representando átomos, para montar qualquer estrutura que inventassem.

Quando não conseguiu identificar a molécula misteriosa criada por Clara, o professor pediu ajuda ao amigo Robert Zoellner, químico de uma universidade na Califórnia. Eles confirmaram a descoberta e deram à molécula um nome que parece uma sopa de letrinhas: tetranitratoxicarbono.

Foi assim que, com apenas 10 anos, Clara se tornou uma das mais jovens autoras de um artigo científico, publicado em parceria com os dois cientistas. Até agora, no entanto, a molécula só foi confirmada na teoria. Se for possível produzi-la na prática, em laboratório, ela poderá ser usada para armazenar energia ou até como explosivo. [...]

Garcia, M. A menina que inventava moléculas. *Ciência Hoje das Crianças*, Rio de Janeiro, 12 mar. 2012. Disponível em: http://chc.org.br/a-menina-que-inventava-moleculas/. Acesso em: 20 set. 2024.

a) Considerando que a fórmula molecular do tetranitratoxicarbono é $C_5N_4O_{12}$, determine a massa molar dessa substância. 308 g/mol

b) Pesquise, em *sites* ou em livros, descobertas que ocorreram nas ciências por acidente. Escreva um resumo sobre uma delas.

c) Louis Pasteur disse uma frase que se tornou famosa: "O acaso só favorece a mente preparada". Discuta com os colegas o que essa frase quer dizer e qual sua relação com a profissão de cientista. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

11 **A pirolusita é um minério do qual se obtém o metal manganês (Mn), muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês (MnO_2). Para se obter o manganês metálico com elevada pureza, utiliza-se a aluminotermia, processo no qual o óxido reage com o alumínio metálico, segundo a equação não balanceada:**

$$MnO_2(s) + A\ell(s) \rightarrow A\ell_2O_3(s) + Mn(s)$$

a) Dê as massas molares, em g/mol, de reagentes e produtos da reação. Massas molares: MnO_2 = 87 g/mol; $A\ell$ = 27 g/mol; $A\ell_2O_3$ = 102 g/mol; Mn = 55 g/mol.

b) Determine a quantidade de átomos de alumínio e de oxigênio presentes em 204 g de óxido de alumínio. $2,4 \cdot 10^{24}$ átomos de $A\ell$; $3,6 \cdot 10^{24}$ átomos de O.

c) Calcule a porcentagem, em massa, de manganês presente no dióxido de manganês MnO_2. 63,2%

12 **O ácido acetilsalicílico ($C_9H_8O_4$) é o princípio ativo de muitos medicamentos destinados ao alívio da dor, da febre e de inflamações. Considere um comprimido de 500 mg contendo 36% em massa de ácido acetilsalicílico. Determine:**

a) a massa, em grama, de ácido acetilsalicílico presente no comprimido; 0,18 g

b) a massa molar desse ácido; 180 g/mol

c) a quantidade de matéria, em mol, de ácido acetilsalicílico presente no comprimido; 0,001 mol

d) o número de moléculas desse ácido presente no comprimido. $6,0 \cdot 10^{20}$ moléculas.

13 **O carbonato de cálcio ($CaCO_3$) é o principal componente do mármore. Sobre uma amostra contendo 20 g de carbonato de cálcio, responda:**

a) Qual é a massa do elemento cálcio presente na amostra? 8,0 g

b) Determine, em mol, a quantidade de átomos de oxigênio presente na amostra. 0,6 mol

CAPÍTULO 3

CONTANDO ÁTOMOS E MOLÉCULAS

PARA COMEÇAR

1. Como os átomos, os íons e as moléculas reagem entre si?
2. Quais são os tipos de reações químicas e como podemos representá-las?
3. A quantidade dos reagentes interfere em uma reação? De que forma?

1. Átomos e moléculas reagem quando são quebradas as ligações existentes e formadas novas ligações, produzindo substâncias diferentes das originais.

2. Neste capítulo, serão abordadas reações de metátese, decomposição, síntese e oxirredução. Mesmo que os estudantes não utilizem esses nomes, observe se reconhecem que, nas reações, os átomos de diferentes substâncias podem se rearranjar em novas configurações.

3. A quantidade de reagentes influencia na quantidade de produtos que poderão ser formados. Utilize essas perguntas e, se julgar necessário, faça outras para sondar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os temas que serão abordados neste capítulo.

REAÇÕES QUÍMICAS

Em todo o Universo, reações químicas ocorrem a cada momento. A vida humana, por exemplo, não seria possível sem a ocorrência de reações químicas dentro e fora de nosso organismo. O suprimento de energia de que necessitamos para sobreviver depende de interações que se realizam continuamente entre inúmeras substâncias, com ou sem nosso conhecimento.

Algumas dessas reações podem ocorrer de forma mais lenta em razão da interferência humana. É o que se verifica quando uma peça metálica é revestida com uma camada de tinta para que não fique em contato com o ar, por exemplo. Outras reações químicas, como a combustão, podem se propagar rapidamente, como acontece em queimadas de florestas, reduzindo a biodiversidade.

Um exemplo de ousadia e determinação demonstra que é possível recuperar áreas que foram devastadas pela exploração inadequada dos recursos naturais e pelo desmatamento. As fotos a seguir demonstram o trabalho do Instituto Terra, criado pelo casal Lélia Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado, em 1998. Pela sua atuação, a área degradada da fazenda de gado da família de Sebastião Salgado transformou-se em uma floresta com grande diversidade de espécies da flora da Mata Atlântica, com o ressurgimento de nascentes e de vários exemplares da fauna brasileira, incluindo alguns em risco de extinção. No processo de reflorestamento, as plantas consomem gás carbônico e liberam gás oxigênio por meio da fotossíntese.

Neste capítulo, você vai estudar a reatividade das substâncias, aprender a representar uma reação química e a realizar cálculos que envolvem as quantidades de reagentes e produtos.

Vista aérea de uma antiga fazenda em Aimorés (MG). À esquerda, em 2001, e à direita, em 2019, após o reflorestamento.

Arquivo/Instituto Terra



Arquivo/Instituto Terra

Não escreva no livro.

EQUAÇÕES QUÍMICAS

Quando o motor de um automóvel movido a álcool é acionado, esse combustível se transforma (reage), formando outras substâncias.

Nesse processo, o etanol (C_2H_6O), substância combustível, reage com o oxigênio do ar (O_2), comburente, e forma, principalmente, dióxido de carbono (CO_2) e vapor de água (H_2O), ambos incolores. A liberação de fumaça ocorre quando a água na forma de vapor se condensa ao encontrar o ar mais frio ou quando o motor do veículo está defeituoso, queimando óleo de lubrificação.

A seguir é apresentada uma possível representação para a combustão do etanol.

$$\underset{\text{reagentes}}{C_2H_6O(\ell) + O_2(g)} \longrightarrow \underset{\text{produtos}}{CO_2(g) + H_2O(g)}$$

Valery Ambartsumian/iStock/Getty Images

Pelo escapamento de veículos, há liberação de fuligem, vapor de água e outros gases.

Observe que, nessa representação, o número de átomos de carbono, por exemplo, não é o mesmo nos reagentes e nos produtos. Essa desigualdade contraria a lei da conservação de massas. Para se fazer o ajuste do número de átomos de cada elemento, é necessário realizar um **balanceamento**, o qual consiste em demonstrar a conservação da massa nas reações químicas. Para isso, quando necessário, números são colocados do lado esquerdo da fórmula de cada substância para que o total de átomos de cada elemento representado seja o mesmo nos reagentes e nos produtos. Esses números são denominados **coeficientes estequiométricos**.

A equação química balanceada é expressa da seguinte forma:

$$C_2H_6O(\ell) + 3\ O_2(g) \longrightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(\ell)$$

Equação química é a forma simbólica de representação de uma reação química. Essa equação representa as composições das substâncias envolvidas e a relação de igualdade entre as quantidades de átomos dos elementos químicos presentes nos reagentes, indicados à esquerda da seta, e nos produtos do processo, indicados à direita.

ROTEIRO

1. Reação química e equação química são sinônimos? Justifique sua resposta.

Não. Reação química é a interação que ocorre entre substâncias denominadas "reagentes" para a formação de outras substâncias denominadas "produtos". Para que ocorra uma reação química, é necessário que os reagentes tenham tendência a reagir entre si e que estejam em condições adequadas, como contato, temperatura, pressão, etc. Equação química, por sua vez, é a forma de representação de uma reação química.

DE OLHO NO CONCEITO

Lei da conservação de massas

A **lei da conservação de massas**, também conhecida como lei de Lavoisier, foi proposta pelo cientista francês Antoine Lavoisier (1743-1794), e determina que, em transformações químicas realizadas em sistemas fechados, a massa total dos produtos é igual à massa total das substâncias reagentes. Portanto, quando acontece uma reação química não há ganho nem perda de massa, apenas a transformação de substâncias.

Verifique a aplicação dessa lei na reação entre os gases nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2) produzindo amônia (NH_3).

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \longrightarrow 2\ NH_3(g)$$

Por meio da lei da conservação de massas, vamos determinar os valores de **A**, **B** e **C** da tabela.

Experimento	Massa de N_2	Massa de H_2	Massa de NH_3
1	28,0 g	**A**	34,0 g
2	**B**	12,0 g	68,0 g
3	140,0 g	30,0 g	**C**

Para determinar o valor de **A** no experimento **1**, considera-se que a soma das massas de gás nitrogênio e de gás hidrogênio deve ser igual à massa de amônia:

28,0 g + **A** = 34,0 g → **A** = 6,0 g de gás hidrogênio

Da mesma forma, pode-se calcular o valor de **B** no experimento **2**:

B + 12,0 g = 68,0 g → **B** = 56,0 g de gás nitrogênio

Como a amônia é o único produto da reação, para determinar o valor de **C** basta somar as massas dos reagentes:

C = 140,0 g + 30,0 g → **C** = 170,0 g de amônia

Tipos de reação

Evidências de reações químicas

Durante o desenvolvimento do estudo da ciência, as reações químicas foram classificadas para facilitar seu entendimento. Os critérios de classificação podem se basear no número de substâncias formadas, no número de reagentes, na presença ou não de substâncias simples, entre outros aspectos.

Os livros didáticos apresentam diferentes classificações para as reações. Nesta obra, a opção foi adotar o critério mais atualizado. Entretanto, esses critérios não são rígidos, ou seja, há casos em que uma mesma reação pode ser classificada em mais de um tipo.

Reação de metátese

A palavra "**metátese**" é de origem grega (*methatesis*) e significa transposição. Nesse tipo de reação, átomos ou grupos de átomos das substâncias reagentes são permutados (trocados).

Observe, por exemplo, o que ocorre quando se adiciona hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$) a uma solução aquosa de sulfato de alumínio ($A\ell_2(SO_4)_3$), substância usada para floculação no tratamento de água (figuras A a D).

As transformações que se verificam nesse caso podem ser equacionadas da seguinte forma:

$$\underset{\text{hidróxido de cálcio}}{3\ Ca(OH)_2(aq)} + \underset{\text{sulfato de alumínio}}{A\ell_2(SO_4)_3(aq)} \longrightarrow \underset{\text{hidróxido de alumínio}}{2\ A\ell(OH)_3(s)} + \underset{\text{sulfato de cálcio}}{3\ CaSO_4(aq)}$$

Perceba que, na representação dessa reação, nos produtos, o íon cálcio aparece ao lado do íon sulfato e o íon alumínio, ao lado do íon hidróxido, ou seja, as substâncias reagentes se transformaram em novas substâncias pela troca de íons entre elas. Também é possível que esse tipo de reação ocorra com a troca de radicais. Por fim, além da troca entre os íons, uma das condições para a reação de metátese é que os produtos apresentem baixa solubilidade ou alta volatilidade.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Soluções de hidróxido de cálcio (**A**) e de sulfato de alumínio (**B**).

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

A reação entre as soluções de sulfato de alumínio e de hidróxido de cálcio (**C**) origina um precipitado branco (**D**), o hidróxido de alumínio.

Reação de decomposição ou de análise

O carbonato de cálcio ($CaCO_3$) decompõe-se quando aquecido, formando óxido de cálcio (CaO) e dióxido de carbono (CO_2). O processo pode ser equacionado por:

$$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$$

Reações como essa, em que uma substância se transforma em duas ou mais, são chamadas de **reações de análise** ou **de decomposição**.

Há certos tipos especiais de reação de decomposição que recebem nomes específicos, de acordo com o processo verificado. Um exemplo disso é a **pirólise**, (do grego, *pyrós*, "fogo", e *lýsis*, "dissolução"), que seria, então, a dissolução de determinado composto pelo fogo ou, mais precisamente, a reação de decomposição que ocorre pela ação do calor.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Amostra de óxido de cálcio (CaO) (**E**).

Tipo de reação	Agente de decomposição	Exemplo
Pirólise	calor (Δ)	$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$
Eletrólise	eletricidade	$2\ NaC\ell(\ell) \xrightarrow{\text{eletricidade}} 2\ Na(s) + C\ell_2(g)$
Fotólise	luz	$H_2O_2(\ell) \xrightarrow{\text{luz}} H_2O(\ell) + \frac{1}{2}\ O_2(g)$

Não escreva no livro.

Reações de síntese ou de adição

Há reações em que um único produto é formado a partir de dois ou mais reagentes. Essas reações são chamadas **reações de síntese** ou **de adição**. Analise, por exemplo, a equação de síntese da amônia:

$$3\ H_2(g) + N_2(g) \longrightarrow 2\ NH_3(g)$$

Outro exemplo é a formação de cloreto de amônio:

$$HC\ell(aq) + NH_3(g) \longrightarrow NH_4C\ell(aq)$$

Um exemplo conhecido de reação química: a oxidação do ferro

Quando uma amostra de ferro metálico fica exposta em ambiente úmido por um certo tempo, observa-se a formação de um sólido poroso e alaranjado na superfície do metal. Na linguagem do dia a dia, costuma-se dizer que a peça metálica "enferrujou".

Na foto a seguir, você observa que a superfície das chaves de ferro não tem o brilho característico dos metais. Parte do ferro metálico reagiu com o gás oxigênio e o vapor de água presentes na atmosfera, formando a ferrugem (óxido de ferro(III) hidratado).

Pode-se representar o processo pela seguinte equação, em que ***n*** representa um **número indeterminado de moléculas**:

$$\underset{\text{ferro metálico}}{4\ Fe(s)} + 3\ O_2(g) + n\ H_2O(g) \longrightarrow \underset{\text{óxido de ferro(III) hidratado}}{2\ Fe_2O_3 \cdot n\ H_2O(s)}$$

Entretanto, objetos de ouro continuam com seu brilho característico e suas propriedades são mantidas mesmo após anos de sua produção, ou seja, o ouro não sofre oxidação como o ferro. Ferro e ouro diferem quanto à reatividade. A reatividade das substâncias depende de fatores como as condições em que elas se encontram e a estabilidade de suas eletrosferas. Por exemplo, os gases nobres são muito pouco reativos devido à estabilidade de seus átomos neutros.

DE OLHO NO CONCEITO

Energia de ionização

A **energia de ionização** é a energia mínima necessária para que um átomo (ou íon) isolado em fase gasosa perca um elétron.

O valor da energia de ionização é importante para a determinação do comportamento de um átomo ou íon.

Pat Moore/Shutterstock.com/ID/BR

Chaves de ferro oxidadas (enferrujadas).

John Dambik/Alamy/Fotoarena

Máscara mortuária do faraó Tutancâmon (c. 1341 a.C.-c. 1323 a.C.) feita de ouro maciço. Museu Egípcio, no Cairo, Egito.

Para os metais, a reatividade está relacionada à baixa energia de ionização. Quanto menor for a energia necessária para que o metal ionize, maior será a sua reatividade.

Para os elementos não metálicos, a reatividade associa-se a altos valores de energia de ionização (maior afinidade eletrônica). Quanto maior for a energia de ionização do ametal, maior será sua reatividade.

A seguir, serão estudadas algumas reações envolvendo metais e ametais.

Não escreva no livro.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Sérgio Dotta Jr./ID/BR



(**A**) O nitrato de prata em água (solução incolor) reage com o cobre metálico, resultando em (**B**) solução de nitrato de cobre(II), levemente azulada, representada por $Cu(NO_3)_2(aq)$. Na lâmina de cobre, ocorre formação de prata metálica.

ROTEIRO

2. **Quatro tubos de ensaio contêm uma solução de íons $A\ell^{3+}$. Em cada um deles, são inseridos os seguintes metais: Sr, K, Cr e Pb. O que deve acontecer em cada um dos tubos? E se os tubos contivessem íons Ba^{2+}?**

De acordo com a escala de reatividade, o Sr e o K reagem com o alumínio, mas o Cr e o Pb não reagem. Com o Ba^{2+}, reage apenas o K, enquanto o Sr, o Cr e o Pb não reagem.

Reatividade dos metais

Se uma lâmina de cobre metálico (que tem cor avermelhada) for colocada em uma solução aquosa de nitrato de prata ($AgNO_3(aq)$), incolor (figura **A**), haverá, com o tempo, deposição de prata metálica sobre a lâmina de cobre e formação de íons cobre(II) na solução aquosa (figura **B**).

Essa reação pode ser assim equacionada:

$$\underset{\text{sólido avermelhado}}{Cu(s)} + \underset{\text{solução incolor}}{2\,AgNO_3(aq)} \longrightarrow \underset{\text{solução azulada}}{Cu(NO_3)_2(aq)} + \underset{\text{sólido prateado}}{2\,Ag(s)}$$

Porém, se uma lâmina de prata metálica (Ag) for mergulhada em uma solução de nitrato de cobre(II), não haverá reação.

$$\underset{\text{sólido}}{Ag(s)} + \underset{\text{solução azulada}}{Cu(NO_3)_2(aq)} \longrightarrow \text{não há reação}$$

A diferença de reatividade entre o cobre e a prata metálicos explica os diferentes resultados desses dois experimentos. O metal cobre é mais reativo (reage mais facilmente) e, por esse motivo, ocorre reação com a solução aquosa de nitrato de prata. Já a prata é um metal menos reativo (mais nobre).

O esquema a seguir apresenta a tendência de reatividade dos metais. Nessa escala, à direita estão os metais menos reativos, e à esquerda, os metais mais reativos.

$\xleftarrow{\text{sentido de maior reatividade}}$

Li, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Aℓ, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au

Geralmente, um metal reage com uma substância formada por íons de qualquer metal de maior reatividade. Por exemplo, o cobre (mais à esquerda na escala) reage com íons de prata (situada mais à direita). Não ocorre o mesmo se a prata metálica (metal nobre, pouco reativo) for colocada para reagir com uma substância que contenha íons cobre(II).

O metal mais reativo, em geral, reage com substâncias iônicas cujos cátions são de metais menos reativos.

Reações de metais com soluções ácidas

Analisando o esquema da reatividade dos metais, observa-se a presença do hidrogênio (H), apesar deste não ser um metal. A inserção do hidrogênio na escala de reatividade dos metais permite comparar a reatividade entre ácidos e metais.

O hidrogênio é mais reativo do que os chamados metais nobres (metais pouco reativos: Cu, Hg, Ag, Pd, Pt e Au), indicando que esses metais normalmente não reagem espontaneamente com soluções ácidas, exceto em alguns casos especiais.

$$Pd(s) + HC\ell(aq) \longrightarrow \text{não há reação}$$

No entanto, o hidrogênio é menos reativo que vários metais. Por exemplo, o ferro reage quando em contato com uma solução de ácido clorídrico, e essa reação pode ser representada por:

$$\underset{\text{ferro metálico}}{Fe(s)} + \underset{\text{ácido clorídrico}}{2\,HC\ell(aq)} \longrightarrow \underset{\text{cloreto de ferro(II)}}{FeC\ell_2(aq)} + \underset{\text{gás hidrogênio}}{H_2(g)}$$

Não escreva no livro.

Durante essa reação, observa-se a formação de bolhas de gás hidrogênio (figura **A**). A rapidez da reação depende de alguns fatores, como a concentração do ácido, a superfície de contato entre o metal e a solução e a temperatura do sistema.

Um exemplo de reação entre metais e ácidos acontece em regiões poluídas, onde é comum a precipitação de chuva ácida. A maior acidez da chuva provoca a corrosão de estruturas de aço, liga cujo principal componente é o ferro metálico. Pode-se proteger essas estruturas da corrosão ácida colocando-as em contato com um metal mais reativo que o ferro. Isso é feito, por exemplo, em calhas de aço que, normalmente, são galvanizadas, ou seja, revestidas de zinco que, por ser mais reativo que o ferro, é corroído antes do que o ferro, protegendo-o.

Turtle Rock Scientific/Science Source/Fotoarena

Reação entre o ferro metálico e o ácido clorídrico, com formação de bolhas de gás hidrogênio.

Reatividade dos ametais

De forma análoga aos metais, é possível comparar a reatividade de alguns ametais:

$$\xleftarrow[\text{ametais: F, O, Cl, Br, I, S}]{\text{sentido de maior reatividade}}$$

Pela escala, nota-se que o cloro é mais reativo que o iodo. Assim, o gás cloro reage com ácido iodídrico, de acordo com a seguinte equação:

$$\underset{\text{gás cloro}}{Cl_2(g)} + \underset{\text{ácido iodídrico}}{2\,HI(aq)} \longrightarrow \underset{\text{ácido clorídrico}}{2\,HCl(aq)} + \underset{\text{iodo}}{I_2(s)}$$

O iodo formado apresenta coloração castanha e é insolúvel em água, formando um precipitado (figura **B**).



Martyn F. Chillmaid/SPL/Fotoarena

Reação em que se pode observar a precipitação do iodo sólido.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Em uma aula experimental, o(a) professor(a) de Química apresentou os materiais que seriam utilizados e pediu aos estudantes que anotassem as observações em um quadro. Os materiais utilizados foram: placas dos metais cobre (Cu), zinco (Zn) e prata (Ag); soluções aquosas de nitrato de cobre, nitrato de zinco, nitrato de prata e ácido clorídrico; tubos de ensaio; estante de tubos.

Após o experimento, foram registradas as seguintes observações:

Solução / Metal	Solução de nitrato de cobre	Solução de nitrato de zinco	Solução de nitrato de prata	Solução de ácido clorídrico
Cobre	———	Não ocorreu reação	A solução ficou azulada	Não ocorreu reação
Zinco	Houve formação de sólido avermelhado sobre a placa de zinco	———	Houve deposição de cristais brilhantes sobre a placa de zinco	Houve formação de gás
Prata	Não ocorreu reação	Não ocorreu reação	———	Não ocorreu reação

Determine a ordem crescente de reatividade dos elementos, Cu, Zn, Ag e H.

Resolução

Analisando o quadro observa-se, como esperado, que um metal não reage com a solução em que o cátion é o próprio metal (células com traço).

Podemos comparar a reatividade dos metais por meio da quantidade de reações das quais participa. O metal menos reativo é o que não reagiu com nenhuma das soluções: a prata.

O cobre reagiu apenas com a solução de nitrato de prata. Pelo fato de o cobre não reagir com a solução de ácido clorídrico, conclui-se que o hidrogênio é mais reativo que o cobre.

O metal mais reativo é o zinco por ter reagido com todas as soluções.

Portanto, a ordem crescente de reatividade dos elementos é Ag < Cu < H < Zn.

BALANCEAMENTO DE EQUAÇÕES

Em uma reação química, o núcleo dos átomos não sofre qualquer alteração e mantém suas características. O que ocorre é um rearranjo de átomos, íons ou substâncias, por meio da quebra de ligações nos reagentes e a formação de novas ligações nos produtos.

Como em uma reação química os átomos não são criados nem destruídos, deve haver uma igualdade entre o número de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos. Essa igualdade é obtida pelo **balanceamento da equação**, como foi visto no exemplo da combustão do etanol na introdução do capítulo.

O balanceamento consiste em acertar os coeficientes estequiométricos (números colocados à esquerda das fórmulas das substâncias) de uma equação para que o número de átomos seja igual nos dois lados da equação.

Suponha a seguinte equação, não balanceada:

$$FeS_2(s) + O_2(g) \longrightarrow Fe_3O_4(s) + SO_2(g)$$

Note que há três átomos de ferro (Fe) no lado direito da equação; logo, deve haver o mesmo número no lado esquerdo. Assim, coloca-se coeficiente 3 para o FeS_2.

$$3\ FeS_2(s) + O_2(g) \longrightarrow Fe_3O_4(s) + SO_2(g)$$

Agora, a quantidade total de átomos de enxofre (S) do lado esquerdo da equação é seis; logo, deve haver o mesmo número de átomos de enxofre no lado direito. Portanto, coloca-se o coeficiente 6 no SO_2.

$$3\ FeS_2(s) + O_2\ (g) \longrightarrow Fe_3O_4(s) + 6\ SO_2(g)$$

Como as quantidades de ferro e de enxofre já foram acertadas, deve-se agora ajustar a quantidade de oxigênio (O). Se a molécula de gás oxigênio (O_2) tem 2 átomos de oxigênio e do lado direito há um total de 16 átomos de O, devem existir 8 moléculas de O_2 do lado esquerdo para que haja igualdade do número de átomos de O nos dois lados da equação.

$$3\ FeS_2(s) + 8\ O_2\ (g) \longrightarrow Fe_3O_4(s) + 6\ SO_2(g)$$

Note que, ao balancear uma equação, deve-se manter inalteradas as fórmulas das substâncias envolvidas.

É conveniente iniciar o acerto de coeficientes pelos átomos dos elementos que aparecem menos vezes nos reagentes e nos produtos. No exemplo dado, seria muito desafiador iniciar o balanceamento pelo oxigênio, que aparece nas duas substâncias do produto.



Dani-G/Shutterstock.com/ID/BR

A pirita, mineral de dissulfeto de ferro (FeS_2) é conhecida como "ouro dos tolos" por seu brilho dourado.

Vitaly Raduntsev/Shutterstock.com/ID/BR

A magnetita, mineral magnético formado pelo óxido de ferro(II) e (III), de fórmula Fe_3O_4, era utilizada na fabricação de bússolas.

DE OLHO NO CONCEITO

Lei das proporções constantes

Segundo a **lei das proporções constantes**, proposta pelo químico francês Joseph Louis Proust (1754-1826), amostras de uma substância pura apresentam os mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa. A seguir, tem-se um exemplo de verificação dessa lei pela reação de formação da água a partir da reação entre o gás hidrogênio (H_2) e o gás oxigênio (O_2).

Gás hidrogênio (H_2)	+	Gás oxigênio (O_2)	$\longrightarrow$	Água (H_2O)
1 g		8 g		9 g
2 g		16 g		18 g
11,11 g		88,89 g		100 g

Observe que, dividindo a massa de gás oxigênio pela massa de gás hidrogênio consumidas nessas reações, obtemos um valor constante:

$$\frac{\text{Massa de } O_2}{\text{Massa de } H_2} = \frac{8\ g}{1\ g} = \frac{16\ g}{2\ g} = \frac{88{,}89\ g}{11{,}11\ g} = 8$$

Pode-se constatar que, em qualquer amostra de água, a proporção entre as massas de hidrogênio e oxigênio é a mesma, sendo a massa de oxigênio igual a 8 vezes a massa de hidrogênio.

Portanto, pelos dados observados, a lei das proporções constantes, a qual estabelece que quando duas ou mais substâncias se combinam para formar um composto sempre o fazem numa relação de massas definida, é verificada.

Não escreva no livro.

TIPOS DE FÓRMULA

A análise da composição de uma substância permite determinar os elementos que a constituem (análise qualitativa) e em que proporção (análise quantitativa).

Neste capítulo, o foco do estudo é a análise quantitativa, que leva à determinação das fórmulas **porcentual**, **mínima** e **molecular**.

Composição centesimal ou fórmula porcentual

Conforme a lei das proporções constantes, amostras de uma substância pura apresentam os mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa, o que possibilita determinar a **composição centesimal** (% em massa de cada elemento) pela análise de qualquer massa dessa substância.

Por exemplo, imagine que é preciso determinar a composição centesimal de um sal inorgânico, sabendo que a análise de uma amostra de 50 g dessa substância indicou a presença de 20 g de cálcio, 6 g de carbono e 24 g de oxigênio.

substância	massa de Ca
50 g	20 g
100 g	x

x = 40 g de Ca em 100 g da amostra ou 40% de Ca

substância	massa de C
50 g	6 g
100 g	y

y = 12 g de C em 100 g da amostra ou 12% de C

substância	massa de O
50 g	24 g
100 g	z

z = 48 g de O em 100 g da amostra ou 48% de O

Logo, a substância analisada apresenta as seguintes porcentagens em massa: 40% de cálcio, 12% de carbono e 48% de oxigênio. Essas porcentagens correspondem à sua composição centesimal, que também pode ser expressa pela fórmula porcentual $Ca_{40\%}C_{12\%}O_{48\%}$.

A composição centesimal (ou fórmula porcentual) indica, portanto, as porcentagens em massa dos atomos dos elementos formadores da substância analisada.

Fórmula mínima ou empírica

A **fórmula mínima** ou **empírica** indica a proporção em menores números inteiros entre os átomos dos elementos que formam a substância.

Uma vez conhecidos os elementos químicos que constituem uma substância, por meio de análises qualitativas e sua composição centesimal, é possível determinar a proporção entre os números de átomos de seus elementos constituintes, chegando à fórmula mínima (ou empírica) da substância.

Cálculo da fórmula mínima a partir da centesimal

A maneira mais simples de realizar esse cálculo é considerar uma amostra de 100 g, que corresponde a 100% da massa. Assim, a massa de cada elemento, em gramas, nessa amostra equivale diretamente à sua porcentagem em massa.

Para obter as quantidades de matéria de cada elemento, deve-se dividir o valor de massa, em gramas, pelas respectivas massas molares.

A fórmula mínima representa a proporção, com os menores valores inteiros, entre as quantidades de átomos de cada elemento que compõem a substância. Ela é calculada a partir da razão entre as quantidades de matéria de cada elemento na substância.

ROTEIRO

3. Considere a reação química:



ID/BR

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

$$A + B_2 \longrightarrow AB$$

a) Balanceie a equação.

b) Dado o esquema representativo dos reagentes, indique se estão na proporção correta.

4. **Determine a composição centesimal de carbono, de hidrogênio e de oxigênio na molécula de sacarose, $C_{12}H_{22}O_{11}$, açúcar extraído da cana-de-açúcar e da beterraba.**

3. a) $2\ A + B_2 \rightarrow 2\ AB$

b) Para estarem na proporção correta, é necessário haver duas vezes mais átomos de **A** que moléculas de B_2. No esquema, há seis moléculas de B_2 e seis átomos de **A**. Deveria haver doze átomos de **A**, o que indica que não estão na proporção correta.

4. $C_{42,11\%}H_{6,43\%}O_{51,46\%}$

Analise o exemplo da determinação da fórmula empírica de um composto que apresenta 40,00% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio.

Composição centesimal	Massa de cada elemento em 100 g da amostra	Quantidade de matéria, em mol $\left(n = \frac{\text{massa}}{\text{massa molar}}\right)$	Razão entre as quantidades de matéria (divisão pelo menor valor de *n*)
40,00% de C	40,00 g	$\frac{40}{12} = 3{,}33$	$\frac{3{,}33}{3{,}33} = 1$
6,67% de H	6,67 g	$\frac{6{,}67}{1} = 6{,}67$	$\frac{6{,}67}{3{,}33} = 2$
53,33% de O	53,33 g	$\frac{53{,}33}{16} = 3{,}33$	$\frac{3{,}33}{3{,}33} = 1$

Portanto, a fórmula mínima do composto é CH_2O.

Composição centesimal

A composição centesimal não é utilizada somente para quantificar os elementos químicos que constituem uma substância desconhecida. Ela também pode ser empregada em alimentos e em bebidas, por exemplo, para identificar e quantificar nutrientes, íons ou elementos, bem como em outros produtos.

É comum também a análise da composição de macronutrientes (carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e de micronutrientes (boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, sódio, silício e cobalto) do solo de uma plantação. Com essa informação, o agricultor pode decidir melhor sobre como proceder, pois, caso o solo não apresente quantidade suficiente de um desses nutrientes, é muito provável que ocorra algum prejuízo no desenvolvimento da planta.

Fórmula molecular

A **fórmula molecular** indica o número de átomos de cada elemento que compõe a molécula ou espécie química da substância, bem como a proporção entre eles.

A fórmula molecular de uma substância pode ser obtida pela determinação do número de fórmulas mínimas (***i***) necessárias para que se chegue à sua massa molar, de modo que:

- **fórmula molecular** = (fórmula mínima) · ***i***, em que ***i*** é número inteiro ⩾ 1;
- **massa molar** = (massa da fórmula mínima) · ***i***, em que ***i*** é número inteiro ⩾ 1.

Cálculo da composição centesimal a partir da fórmula molecular

A fórmula porcentual de uma substância pode ser facilmente calculada quando se conhece sua fórmula molecular. Analise, a seguir, o exemplo da determinação da fórmula porcentual do ácido nítrico, cuja fórmula molecular é HNO_3 (massas atômicas relativas: H = 1; N = 14; O = 16).

Cálculo da massa molar do HNO_3 = $(1 \cdot 1 + 1 \cdot 14 + 3 \cdot 16)$ = 63 g/mol

Cálculo das porcentagens de cada elemento por meio da regra de três entre massa e porcentagem:

$H = 1 \cdot 1$

massa — porcentagem

63 g —— 100%

$1 \cdot 1$ g —— x

$x = \frac{1 \cdot 1 \cdot 100}{63} = 1{,}6\%$ de H

$N = 1 \cdot 14$

massa — porcentagem

63 g —— 100%

$1 \cdot 14$ g —— y

$y = \frac{1 \cdot 14 \cdot 100}{63} = 22{,}2\%$ de N

$O = 3 \cdot 16$

massa — porcentagem

63 g —— 100%

$3 \cdot 16$ g —— z

$z = \frac{3 \cdot 16 \cdot 100}{63} = 76{,}2\%$ de O

Cálculo da fórmula molecular a partir da mínima

Para determinar a fórmula molecular de um composto a partir da fórmula mínima, basta calcular quantas fórmulas mínimas são necessárias para atingir a massa molecular.

Um exemplo é a determinação da fórmula molecular do ácido ascórbico (vitamina C), sabendo que sua fórmula mínima é $C_3H_4O_3$ e sua massa molar é 176 g/mol (massas atômicas relativas: H = 1; C = 12; O = 16).

Não escreva no livro.

Cálculo da massa dos átomos na fórmula mínima:

$$3 \cdot 12 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 16 = 88 \text{ g/mol}$$

Determinação da fórmula molecular:

$$\text{Fórmula molecular} = (\text{fórmula mínima}) \cdot i$$

$$i = \frac{176}{88} = 2$$

$$\text{Fórmula molecular} = (C_3H_4O_3) \cdot 2 = C_6H_8O_6$$

A fórmula mínima pode coincidir com a molecular, como ocorre, por exemplo, no caso da água e do ácido sulfúrico.

Substância	Água	Ácido sulfúrico	Peróxido de hidrogênio	Tetróxido de dinitrogênio
Fórmula molecular	H_2O	H_2SO_4	H_2O_2	N_2O_4
Fórmula mínima	H_2O	H_2SO_4	HO	NO_2

É importante salientar que a fórmula mínima não é suficiente para identificar uma substância. Há casos em que a fórmula mínima de uma substância corresponde à fórmula molecular de outra, e há ainda substâncias que podem ter a mesma fórmula mínima, o que se observa no quadro a seguir.

Substância	Fórmula molecular	Fórmula mínima
Glicose	$C_6H_{12}O_6$	CH_2O
Ácido acético	$C_2H_4O_2$	CH_2O
Ácido lático	$C_3H_6O_3$	CH_2O
Formaldeído	CH_2O	CH_2O

ATIVIDADE RESOLVIDA

O ferro está sujeito à corrosão ao se combinar com o oxigênio presente no ar atmosférico, podendo se transformar em dois diferentes óxidos, que chamaremos de óxido X e óxido Y. Esses óxidos apresentam, respectivamente, 77,8% e 70,0% em massa de ferro. Determine a fórmula mínima do óxido X e do óxido Y.

Dados: Massa molar do ferro (Fe) = 56 g/mol; massa molar do oxigênio (O) = 16 g/mol.

Resolução

Os óxidos de ferro são formados apenas pelos elementos ferro e oxigênio.

O óxido X apresenta 77,8% de ferro e 22,2% de oxigênio. Portanto, 100 g do óxido X contêm 77,8 g de ferro e 22,2 g de oxigênio. Para determinar a proporção entre átomos de ferro e oxigênio, calcula-se a quantidade de matéria (n) de cada elemento no óxido X dividindo a sua massa pela respectiva massa molar:

Ferro: $n = \frac{77,8}{56} = 1,39$

Oxigênio: $n = \frac{22,2}{16} = 1,39$

A proporção em quantidade de matéria é 1,39 : 1,39, ou seja, 1 : 1. Portanto, a fórmula mínima do óxido X é **FeO**.

Podemos usar o mesmo procedimento para determinar a fórmula mínima do óxido Y. Esse óxido apresenta 70,0% de ferro e 30,0% de oxigênio. Portanto, 100 g de óxido Y contêm 70,0 g de ferro e 30,0 g de oxigênio.

O próximo passo é calcular a quantidade de matéria de cada elemento no óxido Y:

Ferro: $n = \frac{70,0}{56} = 1,25$

Oxigênio: $n = \frac{30,0}{16} = 1,875$

A proporção em quantidade de matéria é 1,25 : 1,875. Como queremos determinar uma proporção entre números inteiros, divide-se ambos os valores pelo menor valor, isto é, por 1,25. Com isso, obtém-se a proporção de 1 : 1,5.

Como ainda não representam números inteiros, multiplica-se os valores por 2, obtendo-se a proporção de 2 : 3. Portanto, a fórmula mínima do óxido Y é $\mathbf{Fe_2O_3}$.

Queima da palha de aço

A maioria dos materiais presentes em nosso dia a dia é formada por uma mistura de diversas substâncias, ou seja, esses materiais não são puros. A palha de aço, por exemplo, é formada principalmente por ferro, mas também há certa quantidade de carbono. Para determinar a pureza de uma amostra, é possível utilizar a proporção em massa de reagentes e produtos em uma reação química. Nesta atividade, você vai calcular a porcentagem em massa de ferro em uma amostra de palha de aço.

Material

- balança analítica
- palha de aço
- palitos de fósforo longos
- pires de porcelana

ATENÇÃO! A queima da amostra deve ser acompanhada pelo(a) professor(a).

Como fazer

1. Copie a tabela abaixo no caderno.

Material	Massa, em grama
Pires de porcelana	//
Amostra de palha de aço	//
Pires de porcelana com o produto da combustão da palha de aço	//

2. Determine, separadamente, a massa do pires e a massa da amostra de palha de aço e registre-as na tabela.

3. Com os dedos, abra levemente a trama da palha de aço e coloque-a sobre o pires.

4. Acenda o fósforo e, com cuidado, aproxime-o da palha de aço até que se inicie a queima da amostra. Em seguida, afaste e apague o fósforo. Como você descreveria a reação de combustão da palha de aço? Você acha que a massa da palha de aço aumentará ou diminuirá após a combustão? Registre as respostas no caderno.

5. Após alguns segundos, toda a palha de aço terá queimado. Meça, usando a balança, a massa do pires junto com o produto da combustão e anote, completando a tabela. Descarte o produto da combustão em lixo comum.

1. $2\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$. Enquanto o ferro metálico (reagente) é cinza e brilhante, o óxido de ferro (produto) é cinza-escuro e opaco.

2. O produto da combustão completa do carbono é o gás carbônico. Por ser um gás, ele não está contabilizado na pesagem final.

Para concluir

1 **Escreva a equação balanceada da reação de combustão completa do ferro da palha de aço, sabendo que o produto formado é o óxido de ferro(III). Quais diferenças você observa entre o reagente e o produto dessa reação?**

2 **Na amostra de palha de aço, existiam átomos de carbono que também foram queimados. Qual é o produto formado na combustão completa do carbono? A massa desse produto está contabilizada na pesagem final? Por quê?**

3 **Qual é a massa de óxido de ferro produzida? Como você explica a diferença de massa da palha de aço antes e depois da combustão?**

4 **Com base nos dados e na equação da reação química, calcule a porcentagem em massa de ferro na palha de aço.**

Davi Augusto Studio/ID/BR

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO

Os **cálculos estequiométricos** correspondem aos cálculos de massa, de quantidade de matéria, de número de entidades químicas e, em alguns casos, de volume das substâncias envolvidas em uma reação química. Esses cálculos são feitos com base na proporção entre as quantidades, em mol, das substâncias que participam da reação. Essa proporção pode ser obtida a partir dos coeficientes estequiométricos da reação (proporção estequiométrica).

Relações entre grandezas

A quantidade de matéria de uma substância, em mol, está relacionada com outras grandezas e, portanto, com outras unidades.

As relações mais comuns são entre a quantidade de matéria e a massa, o volume molar (no caso de substâncias no estado gasoso) e o número de moléculas. Observe os exemplos a seguir.

a)

1 mol de CO
- contém → $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas (número de Avogadro)
- ocupa → 25 L nas CATP* (volume molar a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa e 25 °C)
- tem massa → 28 g (massa molar = 12 + 16 = 28 g/mol)

b)

1 mol de O_2
- contém → $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas (número de Avogadro)
- ocupa → 25 L nas CATP (volume molar a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa e 25 °C)
- tem massa → 32 g (massa molar = 16 · 2 = 32 g/mol)

c)

1 mol de CO_2
- contém → $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas (número de Avogadro)
- ocupa → 25 L nas CATP (volume molar a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa e 25 °C)
- tem massa → 44 g (massa molar = 12 + 2 · 16 = 44 g/mol)

Com base nesses exemplos, é possível interpretar, de forma mais ampla, a equação química que representa a reação de combustão do monóxido de carbono.

	2 CO(g) +	**1 O_2(g)** ⟶	**2 CO_2(g)**
Proporção molecular	2 moléculas	1 molécula	2 moléculas
Proporção em mol	2 mol	1 mol	2 mol
Proporção volumétrica	2 · 25 L = = 50 L (CATP)	1 · 25 L = = 25 L (CATP)	2 · 25 L = = 50 L (CATP)
Proporção em massa	2 · 28 g = 56 g	1 · 32 g = 32 g	2 · 44 g = 88 g

* Condições ambientes de temperatura e pressão. Nessas condições, é comum considerar o volume molar igual a 25 L/mol.

ROTEIRO

5. Mostre que a reação de combustão completa do CO(g) está de acordo com a lei de conservação de massas, a lei volumétrica e a lei das proporções constantes.

A soma das massas dos reagentes (56 g + 32 g) é igual à massa do produto (88 g), de acordo com a lei de conservação de massas.
A proporção em volume dos gases é de 50 L de CO: 25 L de O_2: 50 L de CO_2, podendo ser expressa por números inteiros e pequenos (2 : 1 : 2), de acordo com a lei volumétrica.
Ao multiplicar ou dividir a massa de qualquer substância participante da reação, as massas das demais serão alteradas em igual proporção, de acordo com a lei das proporções constantes.

Proporção entre as quantidades de matéria

Por meio da análise desses dados, nota-se que a proporção entre o número de moléculas, a quantidade de matéria e o volume na reação é a mesma (2 : 1 : 2). A proporção entre as massas, porém, é outra (56 : 32 : 88, ou seja, 7 : 4 : 11). Isso acontece porque os átomos dos elementos envolvidos na reação têm massas diferentes.

Note como essas relações definidas na página anterior podem ser empregadas para prever quantidades de substâncias envolvidas nas transformações químicas. Para tanto, serão demonstrados alguns casos de cálculos estequiométricos envolvendo, por exemplo, a fotossíntese, representada pela equação:

$$6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g)$$

A proporção entre as quantidades de matéria das substâncias corresponde àquela estabelecida pelos seus respectivos coeficientes. Observe os exemplos a seguir.

Exemplo 1

O cálculo de quanto gás oxigênio (O_2), em quantidade de matéria, é formado quando 15 mol de dióxido de carbono (CO_2) são consumidos na fotossíntese. A equação balanceada indica a proporção em mol das substâncias participantes do processo.

$$\underset{6\ mol}{6\ CO_2(g)} + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + \underset{6\ mol}{6\ O_2(g)}$$

6 mol ——— 6 mol

15 mol ——— x

$$x = \frac{6\ mol \cdot 15\ mol}{6\ mol}$$

x = 15 mol de O_2

Exemplo 2

A determinação da quantidade necessária de dióxido de carbono, em quantidade de matéria, para produzir 5 mol de glicose ($C_6H_{12}O_6$).

$$\underset{6\ mol}{6\ CO_2(g)} + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow \underset{1\ mol}{C_6H_{12}O_6(s)} + 6\ O_2(g)$$

6 mol ——— 1 mol

x ——— 5 mol

$$x = \frac{5\ mol \cdot 6\ mol}{1\ mol}$$

x = 30 mol de CO_2

Proporção entre números de moléculas

Neste caso, é possível fazer o cálculo estequiométrico em termos de quantidade de matéria e, depois, converter essa quantidade em número de moléculas ou realizar diretamente o cálculo, lembrando que 1 mol corresponde a $6{,}02 \cdot 10^{23}$ entidades elementares. Observe os exemplos a seguir.

Exemplo 1

O cálculo do número de moléculas de água consumidas na formação de 10 mol de oxigênio durante a fotossíntese.

Não escreva no livro.

$$6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g)$$

6 mol — 6 mol

6 mol ——— 6 mol

x ——— 10 mol

$x = 10$ mol

Número de moléculas de $H_2O = 10 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$

$x = 6{,}02 \cdot 10^{24}$ moléculas de H_2O

Exemplo 2

O cálculo de quantas moléculas de dióxido de carbono são consumidas na formação de $18{,}0 \cdot 10^{23}$ moléculas de glicose ($C_6H_{12}O_6$).

$$6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g)$$

6 mol — 1 mol

$6 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas ——— $1 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas

x ——— $18{,}0 \cdot 10^{23}$ moléculas

$$x = \frac{6 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas} \cdot 18{,}0 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas}}{6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas}}$$

$x = 108 \cdot 10^{23}$ ou $1{,}08 \cdot 10^{25}$ moléculas de CO_2

Proporção entre massas e quantidade de matéria

Para obter a proporção entre massas e quantidade de matéria, a conversão de unidades na proporção estequiométrica deve ser feita por meio das massas molares.

Observe a demonstração das etapas desses cálculos feita nos exemplos a seguir.

Exemplo 1

Determinação da massa, em grama, de dióxido de carbono consumida quando são formados 20 mol de glicose.

Massa molar do $CO_2 = 1 \cdot 12 + 2 \cdot 16 = 44$ g/mol

$$6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g)$$

6 mol — 1 mol

$6 \cdot 44$ g ——— 1 mol

x ——— 20 mol

$$x = \frac{20\ \text{mol} \cdot 6 \cdot 44\ \text{g}}{1\ \text{mol}}$$

$x = 5\,280$ g de CO_2

ou $x = 5{,}28$ kg de CO_2

Exemplo 2

Cálculo da massa de oxigênio formada durante a fotossíntese, quando o consumo de água é 360 g.

Massa molar do $H_2O = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18$ g/mol

Massa molar do $O_2 = 2 \cdot 16 = 32$ g/mol

$$6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g)$$

6 mol — 6 mol

$6 \cdot 18$ g ——— $6 \cdot 32$ g

360 g ——— x

$$x = \frac{6 \cdot 32\ \text{g} \cdot 360\ \text{g}}{6 \cdot 18\ \text{g}}$$

$x = 640$ g de O_2

Proporções entre volumes de gases e quantidade de matéria

A conversão de unidades na proporção estequiométrica é feita com a substituição de 1 mol do gás pelo seu volume molar, nas condições de temperatura e pressão em que ele se encontra. Se o sistema em estudo estiver nas condições ambientes de temperatura e pressão (CATP), é comum utilizar o volume molar igual a 25 L/mol, e, se estiver nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o volume molar é de 22,4 L/mol. Caso contrário, determina-se a quantidade de matéria pelo cálculo estequiométrico, e o volume pode ser obtido por meio da equação de estado dos gases ideais:

$$pV = nRT$$

em que $R = 0{,}082\ \text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ou $R = 62{,}3\ \text{mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Exemplo 1

Cálculo do volume de CO_2 consumido nas CNTP, em litro, na formação de 5 mol de glicose.

Substituindo 1 mol de CO_2 por 22,4 L (volume molar nas CNTP), tem-se:

$$\underset{6\ \text{mol}}{6\ CO_2(g)} + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow \underset{1\ \text{mol}}{C_6H_{12}O_6(s)} + 6\ O_2(g)$$

$$6 \cdot 22{,}4\ \text{L} \text{ ——— } 1\ \text{mol}$$

$$x \text{ ——— } 5\ \text{mol}$$

$$x = \frac{5\ \text{mol} \cdot 6 \cdot 22{,}4\ \text{L}}{1\ \text{mol}} = 672\ \text{L de } CO_2$$

Exemplo 2

Cálculo do volume, em litro, de CO_2 consumido na fotossíntese em que 5 mol de O_2 são formados, a 27 °C e 2 atm.

$$\underset{6\ \text{mol}}{6\ CO_2(g)} + 6\ H_2O(\ell) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(s) + \underset{6\ \text{mol}}{6\ O_2(g)}$$

$$6\ \text{mol} \text{ ——— } 6\ \text{mol}$$

$$x \text{ ——— } 5\ \text{mol}$$

$$x = 5\ \text{mol de } CO_2$$

$$pV = nRT$$

$$2\ \text{atm} \cdot V = 5\ \text{mol} \cdot 0{,}082\ \text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 300\ \text{K}$$

$$V = 61{,}5\ \text{L}$$

AÇÃO E CIDADANIA

Sequestro de carbono

Esse é o nome do processo de remoção de gás carbônico, CO_2, presente na atmosfera, que ocorre principalmente em oceanos e em florestas, onde algas e plantas, por meio de fotossíntese, capturam o CO_2 e lançam oxigênio na atmosfera.

Os maiores estoques de carbono são encontrados no mar, na vegetação terrestre e no solo. Na fase de crescimento, as árvores precisam de grande quantidade de carbono para se desenvolver, "retirando" esse elemento do ar.

Esse processo natural ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de CO_2 na atmosfera: cada hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver de 150 t a 200 t de carbono. Uma única árvore é capaz de absorver 180 kg de CO_2 em sua fase de crescimento.

1. Analise as informações do texto e explique por que é importante preservar as florestas existentes e promover projetos de reflorestamento de áreas desmatadas para controlar a quantidade de gás carbônico na atmosfera.

1. É importante preservar as florestas porque a vegetação terrestre possui uma grande quantidade de carbono. Quando essas plantas morrem ou são queimadas, esse carbono vai para a atmosfera, principalmente na forma de CO_2. O reflorestamento atua absorvendo o carbono presente na atmosfera durante a fase de crescimento das plantas.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal, cujas atividades de pesquisa fornecem suporte para a formulação de políticas públicas e de programas de desenvolvimento brasileiros. Uma pesquisa feita por esse instituto indicou que uma pessoa que se desloca sozinha em um carro particular emite cerca de 8 vezes mais gás carbônico na atmosfera do que se usasse um ônibus para o mesmo deslocamento. Apesar de os veículos de transporte público coletivo emitirem mais gases do efeito estufa (GEE) por quilômetro rodado, eles transportam maior quantidade de passageiros que os veículos privados, reduzindo a emissão *per capita* desses gases.

Avener Prado/Folhapress



Avener Prado/Folhapress

Comparação entre o espaço ocupado por 60 motoristas e seus carros e 60 passageiros e um ônibus.

Considerando que um dos principais constituintes da gasolina é o isoctano (C_8H_{18}) e que um carro obtém energia pela reação de combustão completa do isoctano, formando gás carbônico e vapor de água, determine:

a) a proporção, em quantidade de matéria, de isoctano e de gás oxigênio consumido nessa combustão.

b) a massa de gás carbônico emitido por um carro em um percurso de 50 quilômetros, para um carro que percorre 10 km com um litro de gasolina. Considere que a gasolina é formada apenas por isoctano e que a sua densidade é igual a 0,7 g/mL.

Dadas as massas molares: isoctano = 114 g/mol; gás oxigênio = 32 g/mol; gás carbônico = 44 g/mol; água = 18 g/mol.

Resolução

a) A proporção, em quantidade de matéria, entre os participantes da reação é igual à proporção entre os coeficientes estequiométricos da equação química balanceada.

$2\ C_8H_{18}(g) + 25\ O_2(g) \longrightarrow 16\ CO_2(g) + 18\ H_2O(g)$

Portanto, a proporção é de 2 mol de isoctano para 25 mol de gás oxigênio ou, ainda, 1 mol de isoctano para 12,5 mol de gás oxigênio.

b) Um carro que percorre 10 km com um litro de gasolina consome 5 L de combustível para percorrer 50 km. Como a densidade da gasolina é igual a 0,7 mg/mL, o equivalente a 700 g por litro, calcula-se a massa de gasolina em 5 litros:

$d = \frac{m}{V} \rightarrow m = d \cdot V$

$m = 700 \cdot 5 = 3\,500$ g de gasolina

Para calcular a massa formada de gás carbônico, utilizamos a proporção estequiométrica:

$2\ C_8H_{18}(g) + 25\ O_2(g) \longrightarrow 16\ CO_2(g) + 18\ H_2O(g)$

$2 \cdot 114$ g ——— $16 \cdot 44$ g

$3\,500$ g ——— x

$x = 10\,807$ g ou 10,8 kg

Portanto, ao percorrer 50 km, esse carro emitiu 10,8 kg de gás carbônico para a atmosfera.

REAGENTE EM EXCESSO E REAGENTE LIMITANTE

Em geral, na produção de um composto de interesse, os químicos desejam preparar a maior quantidade possível a partir de determinada quantidade de reagentes. Para isso, eles devem verificar as quantidades disponíveis de reagentes e fazer o cálculo do quanto utilizar de cada substância.

Considere, por exemplo, a reação entre os gases monóxido de carbono (CO) e oxigênio (O_2), representada pela equação química balanceada a seguir.

$$2\ CO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\ CO_2(g)$$

Representação sem proporção de tamanho.



Esquema da reação entre duas moléculas de monóxido de carbono e uma molécula de oxigênio. Cores-fantasia.

Quando moléculas de CO reagem com moléculas de O_2 formando moléculas de CO_2, a proporção entre elas é sempre 2 : 1 : 2.

Do ponto de vista macroscópico, pode-se afirmar que a equação balanceada indica que a reação entre 2 mol de CO e 1 mol de O_2 resulta na formação de 2 mol de CO_2.

Observe, a seguir, a equação dessa mesma reação quando são misturadas quantidades de reagentes que não obedecem à proporção estequiométrica.

$$2\ CO(g) + 2\ O_2(g) \longrightarrow 2\ CO_2(g) + O_2(g)$$

Representação sem proporção de tamanho.



Esquema da reação balanceada entre duas moléculas de monóxido de carbono e duas moléculas de oxigênio. Cores-fantasia.

Terminada a reação de uma mistura inicial de 2 mol de CO com 2 mol de O_2, verifica-se que o monóxido de carbono é totalmente consumido e há sobra de 1 mol do oxigênio. Nessa situação, o CO é chamado **reagente limitante**, e o O_2, **reagente em excesso**.

A reação ocorre de acordo com a proporção estequiométrica, e, portanto, a quantidade dos produtos formados é determinada (limitada) pela quantidade do reagente limitante. Considerando o exemplo, a partir de 2 mol de CO, só é possível obter 2 mol de CO_2, por maior que seja o excesso de O_2 utilizado.

Também é comum o uso de um reagente em excesso para que o outro reagente seja totalmente consumido. Para neutralizar o ácido sulfúrico (H_2SO_4) derramado em uma estrada, em um acidente rodoviário, por exemplo, colocou-se carbonato de cálcio ($CaCO_3$) sobre o local. Observe a equação dessa reação.

$$H_2SO_4(\ell) + CaCO_3(s) \longrightarrow CaSO_4(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$$

Embora a reação se processe na proporção de 1 mol de $CaCO_3$ (100 g) para 1 mol de H_2SO_4 (98 g), para se certificar de que todo o ácido foi efetivamente neutralizado, costuma-se adicionar carbonato de cálcio em excesso.

Não escreva no livro.

Determinação do reagente limitante

Como já foi visto, pela equação balanceada de uma reação, é possível determinar a relação entre as quantidades das substâncias envolvidas, partindo-se da proporção entre as quantidades de matéria, em mol, com base nos coeficientes dessas substâncias.

Nas indústrias e nos laboratórios, porém, nem sempre os reagentes são colocados em contato na proporção exata, determinada pela estequiometria da reação. Quando os reagentes não estão na proporção estequiométrica, há consumo total de um deles (reagente limitante) e sobra do outro (reagente em excesso). Nesse caso, com base na quantidade consumida do reagente limitante, podem-se determinar as quantidades das substâncias envolvidas.

Imagine que, para neutralizar 4,9 t de ácido sulfúrico, sejam utilizadas 8,0 t de carbonato de cálcio. É possível saber se há excesso de algum dos reagentes? Como determinar a massa de sulfato de cálcio formada? Havendo excesso de algum reagente, como saber a massa do reagente que não participa da reação?

Observe a equação balanceada da reação entre $H_2SO_4(\ell)$ e $CaCO_3(s)$.

$$H_2SO_4(\ell) + CaCO_3(s) \rightarrow CaSO_4(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$$

1 mol	1 mol		1 mol	
98 g	100 g		136 g	
4,9 t	8,0 t			

Pela análise desses dados, percebe-se que a massa de carbonato de cálcio é proporcionalmente maior que a massa de ácido sulfúrico. O carbonato de cálcio, portanto, é o reagente em excesso. O ácido sulfúrico é o reagente limitante.

A quantidade do reagente limitante deve servir de base para calcular as quantidades das outras substâncias que participam da reação.

A massa de sulfato de cálcio formada pode ser calculada com base na proporção a seguir.

$$98 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ ——— } 136 \text{ g de } CaSO_4$$
$$4{,}9 \cdot 10^6 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ ——— } x$$
$$x = 6{,}8 \cdot 10^6 \text{ g} = 6{,}8 \text{ t de } CaSO_4$$

A massa de carbonato de cálcio que participa da reação é determinada de forma análoga.

$$98 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ ——— } 100 \text{ g de } CaCO_3$$
$$4{,}9 \cdot 10^6 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ ——— } y$$
$$y = 5{,}0 \cdot 10^6 \text{ g} = 5{,}0 \text{ t de } CaCO_3$$

A massa em excesso de carbonato de cálcio corresponde à diferença entre o que foi colocado para reagir e o que efetivamente reagiu.

$$8{,}0 \text{ t} - 5{,}0 \text{ t} = 3{,}0 \text{ t}$$

Extintores de incêndio

Combustível, oxigênio e calor são os componentes de sustentação do fogo. Assim, é possível combater incêndios suprimindo um desses componentes, como nos métodos de resfriamento, que retira calor, e abafamento, que isola o combustível do oxigênio.

Quando o extintor de pó químico é acionado, por exemplo, o bicarbonato de sódio liberado se decompõe em gás carbônico e em água em um resíduo sólido de carbonato de sódio que recobre o material combustível, separando-o do oxigênio do ar. A falta de oxigênio (reagente limitante) interrompe a combustão.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

O silício é utilizado na produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, na indústria cerâmica e, em especial, na indústria eletrônica e microeletrônica. É material básico na produção de transistores para *chips*, células fotoelétricas e outros tipos de circuito eletrônico. O silício puro pode ser obtido por meio da reação:

$$SiC\ell_4(\ell) + 2\ Mg(s) \longrightarrow Si(s) + 2\ MgC\ell_2(s)$$

Considerando a reação entre 510 g de $SiC\ell_4$ e 150 g de Mg até que o reagente limitante seja totalmente consumido, determine:

a) a massa de silício formado no processo;

b) a massa do reagente em excesso.

Resolução

a) 1 mol de $SiC\ell_4$ —— 2 mol de Mg —— 1 mol de Si

170 g —— 48 g —————— 28 g

510 g —— 150 g —————— x

O $SiC\ell_4$ é o reagente limitante e o Mg é o reagente em excesso. A partir da massa do tetracloreto de silício, tem-se: $x = 84$ g de Si.

b) 170 g de $SiC\ell_4$ —— 48 g de Mg

510 g de $SiC\ell_4$ —— y

$y = 144$ g de Mg

Excesso: 150 g − 144 g = 6 g

REAGENTES IMPUROS E RENDIMENTO DE UMA REAÇÃO

Os exemplos e os cálculos apresentados até o momento consideraram apenas situações ideais em que os reagentes se encontravam puros e sem ocorrência de perda de materiais ou formação de subprodutos. Entretanto, praticamente todos os materiais disponíveis na natureza são misturas de substâncias e, por isso, nem toda a massa do material participa da reação desejada. Além disso, é comum que haja algumas causas – por exemplo, reações secundárias que utilizam os mesmos reagentes ou reações que não se completam – para um rendimento abaixo do teoricamente esperado pelos cálculos estequiométricos.

Na prática, portanto, é preciso considerar esses fatores e acrescentar outros cálculos considerando a impureza dos reagentes e o rendimento porcentual de um processo químico.

Reagentes impuros

ZenitX/Shutterstock.com/ID/BR

Minério de bauxita.

A obtenção do alumínio a partir da bauxita, seu minério mais importante, é um exemplo de reação envolvendo um reagente impuro.

Inicialmente, a bauxita é processada para a obtenção de alumina, $A\ell_2O_3$, de modo que, comumente, é possível obter 1 quilograma de $A\ell_2O_3$ a partir de 2 quilogramas de bauxita. Em seguida, o metal alumínio é obtido a partir da alumina por meio da eletrólise.

Por enquanto, apenas a primeira etapa será analisada. Aproximadamente 50% do minério corresponde a substâncias que não interessam ao processo de obtenção de alumínio e, portanto, devem ser descontadas da quantidade inicial. Nesse caso, diz-se que a bauxita apresenta 50% de pureza em $A\ell_2O_3$.

Para compreender melhor esses descontos, observe a resolução do exercício a seguir.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Equação de obtenção de alumínio por eletrólise:

$$2\ A\ell_2O_3(s) \xrightarrow{\text{eletricidade}} 4\ A\ell(s) + 3\ O_2(g)$$

Considerando que 50% da massa de bauxita corresponde ao óxido de alumínio, calcule a massa do minério, em kg, e o volume de oxigênio formado, a 927 °C e 1 atm, necessários para a obtenção de 1,35 kg de $A\ell(s)$.

Dados: massas molares em g/mol: $A\ell = 27$; $O = 16$.

Resolução

a) Cálculo da quantidade de $A\ell_2O_3$, em grama, necessária para a obtenção de 1,35 kg de $A\ell$:

$$n_{A\ell} = \frac{1350\ g}{27\ g \cdot mol^{-1}} = 50\ mol$$

$$\underset{2\ mol}{2\ A\ell_2O_3(s)} \xrightarrow{\text{eletricidade}} \underset{4\ mol}{4\ A\ell} + 3\ O_2$$

2 mol ——— 4 mol

x ——— 50 mol

$$x = \frac{2\ mol \cdot 50\ mol}{4\ mol} = 25\ mol\ de\ A\ell_2O_3$$

Massa de $A\ell_2O_3 = n \cdot M = 25\ mol \cdot 102\ g/mol = 2\,550\ g$ ou 2,55 kg

Cálculo da massa de bauxita que contém 50% de $A\ell_2O_3$:

2,55 kg ——— 50%

y ——— 100%

$y = 5{,}1$ kg de bauxita

b) Cálculo da quantidade de oxigênio formada, em mol:

$2\ A\ell_2O_3(s) \longrightarrow 4\ A\ell(s) + 3\ O_2(g)$

4 mol está para 3 mol, assim como 50 mol está para z. Logo,

$z = 37{,}5$ mol de O_2

Cálculo do volume de oxigênio formado, a 927 °C (1200 K) e 1 atm.

Substituindo na equação $pV = nRT$, tem-se:

$1\ atm \cdot V = 37{,}5\ mol \cdot 0{,}082\ atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \cdot 1200\ K$

$V = 3\,690$ L de O_2

O alumínio e a saúde humana

Dentre os metais, o alumínio é o mais abundante na natureza. Ocorre na maioria das rochas e solos combinado a outros elementos, mas nunca na forma metálica. O desenvolvimento de um método de produção comercial do alumínio metálico ocorreu no final do século XIX. O alumínio metálico apresenta baixa densidade e alta resistência à corrosão e pode ser facilmente moldado em vários formatos para a produção de objetos, entre outras aplicações.

O alumínio está naturalmente presente nos vegetais, frutas, produtos de origem animal e na água. As pessoas ingerem o alumínio por meio da água e dos alimentos. Mas a maior parte desse metal não é absorvida pelo organismo, pois o tubo digestivo constitui-se numa barreira para a absorção. Menos de 1% de todo o alumínio ingerido atinge a circulação sanguínea.

A exposição natural aos compostos de alumínio presentes em alimentos, na água e no ar somada ao uso de utensílios e de embalagens de alumínio e de medicamentos que contêm alumínio pode prejudicar nossa saúde. Altos níveis de alumínio em nosso corpo podem causar efeitos neurotóxicos, afetar os ossos e, possivelmente, desregular o sistema reprodutor.

Fonte de pesquisa: Alumínio e saúde. *Associação Brasileira do Alumínio* (Abal), São Paulo, [20--]. Disponível em: http://abal.org.br/sustentabilidade/aluminio-e-saude/. Acesso em: 20 set. 2024.

Rendimento de uma reação

O aumento do rendimento dos processos é uma preocupação da indústria química em geral. Entretanto, os processos químicos costumam apresentar um rendimento menor do que o teoricamente esperado pelos cálculos estequiométricos. Além de várias reações não ocorrerem com o consumo total dos reagentes, há casos em que se formam produtos secundários indesejáveis, os quais consomem parte dos reagentes. É comum também haver perdas, por exemplo, durante o processo de purificação dos produtos formados.

No processo atual de obtenção de etanol, por exemplo, apenas dois terços da cana-de-açúcar, o caldo, é aproveitado para a produção de açúcar e de etanol. O bagaço da cana-de-açúcar é o maior resíduo da agroindústria brasileira, correspondendo a cerca de 30% da massa moída. As usinas utilizam até 90% desse bagaço como fonte de energia, mas também tem sido usado na fabricação de papel, na produção de ração animal e na indústria química.

Todos os exemplos até o momento consideraram casos com rendimento de 100%, chamado **rendimento teórico**, que corresponde à massa de produtos calculada pela estequiometria da reação. O **rendimento real** corresponde à massa de produtos obtida efetivamente.

É comum empregar o rendimento porcentual em uma reação química. Ele pode ser calculado da seguinte forma:

$$r_{porcentual} = \frac{r_{real}}{r_{teórico}} \cdot 100\%$$

Conheça um exemplo na atividade resolvida a seguir.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Uma amostra de calcário foi intensamente aquecida. Nessas condições, o calcário sofre decomposição em óxido de cálcio e em dióxido de carbono.

$$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$$

A análise de 35,71 g de uma amostra de calcário forneceu 13,0 g de óxido de cálcio (CaO), além de dióxido de carbono (CO_2), após aquecimento a alta temperatura.

Determine o rendimento porcentual da transformação.

Dados: Massas molares: C = 12 g/mol; Ca = 40 g/mol; O = 16 g/mol.

Resolução

Cálculo da massa de óxido de cálcio que seria obtida considerando o rendimento teórico:

$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$

100 g ——— 56 g

35,71 g ——— x

$$x = \frac{35{,}71\ g \cdot 56\ g}{100\ g}$$

x = Massa de CaO = 20,0 g (r = 100%)

20,0 g ——— 100%

13,0 g ——— y%

y = 65%

Portanto, o rendimento real da reação é de 65%.

ROTEIRO

6. O método de conversão de nitrogênio (N_2) em amônia, chamado processo Haber-Bosch, é responsável pela produção anual de mais de 100 milhões de toneladas de amônia mundialmente. O processo exige alta temperatura e pressão para que o N_2 e o H_2 interajam sobre uma superfície de ferro, que serve como catalisador, por meio da equação:

$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$

Sabendo que o rendimento do processo é de 50%, determine a massa de NH_3 obtida pela reação de 900 g de H_2 com quantidade suficiente de N_2.

2 550 g

Não escreva no livro.

QUÍMICA E MATEMÁTICA

RAZÕES, PROPORÇÕES E REAÇÕES QUÍMICAS

Em Química, como em outras ciências, é necessário o conhecimento matemático. Os conceitos de razão e proporção são fundamentais no estudo das reações. A **razão** é o quociente entre dois números. Na molécula de água (H_2O), por exemplo, a razão entre a quantidade de átomos de oxigênio e de hidrogênio é $\frac{1}{2}$ ou 0,5 – ou seja, para cada 1 átomo de oxigênio, tem-se 2 átomos de hidrogênio. A **proporção**, por sua vez, envolve a comparação entre duas ou mais razões por meio de uma igualdade. Para formar a molécula de água, os átomos de oxigênio e de hidrogênio sempre se unem na proporção 1 para 2, ou seja 1 : 2.

Esse tipo de conhecimento é importante na indústria química. Vamos analisar o processo de produção da amônia (NH_3), que é matéria-prima para a produção de fertilizantes. A amônia é produzida pelo processo de Haber-Bosch, tendo como reagentes os gases nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2):

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$$

A partir dos coeficientes da equação química balanceada desse processo, conclui-se que as quantidades dos gases nitrogênio, hidrogênio e amônia estão na proporção 1 : 3 : 2. Mas o que isso significa? E qual é sua importância para o processo industrial?

Em condições ideais, as quantidades de reagentes e produtos de uma reação são grandezas **diretamente proporcionais**. Duas grandezas *a* e *b* são diretamente proporcionais quando a razão $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) é uma constante diferente de zero, chamada **razão de proporcionalidade** (k). Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, se uma delas é duplicada ou triplicada, a outra também sofre o mesmo efeito.

Thomaz Vita Neto/Pulsar Imagens

Aplicação de fertilizante em lavoura situada em Pereira Barreto (SP). Cerca de 80% da amônia produzida é usada como fertilizante diretamente ou após conversão em nitratos e ureia. Foto de 2022.

Na reação da síntese da amônia, temos a seguinte correspondência para as quantidades, em mol, de N_2 e NH_3:

×2 ×3

Quantidade de N_2 consumido (mol)	1	2	3	4	5	6	...	n
Quantidade de NH_3 produzido (mol)	2	4	6	8	10	12	...	$2n$

×2 ×3

Independentemente da quantidade de N_2 consumida, a quantidade de NH_3 produzida será o dobro, ou seja, estão na proporção 1 : 2. Outra maneira de representar essa relação é dizendo que $k = \frac{1}{2}$.

Quaisquer pares de substâncias de uma equação química podem ser comparados dessa maneira, permitindo previsões da quantidade de produto obtido a partir de uma determinada quantidade de reagente.

Conecte as ideias

3. A constante de proporcionalidade, que mostra a relação entre as quantidades dos participantes de uma reação, é expressa por uma razão. Essa relação entre quantidades também pode ser expressa por meio de uma proporção, pois as quantidades de reagentes e de produtos de uma reação são grandezas diretamente proporcionais. O conceito de porcentagem é utilizado nos cálculos de pureza de reagentes e de produtos. O rendimento de um processo químico é expresso por meio de uma porcentagem, e esse valor é necessário para prever as quantidades de reagentes necessárias ou de produtos a serem obtidos.

1. **Calcule a constante de proporcionalidade entre a quantidade de matéria de N_2 e H_2 na reação de síntese da amônia pelo processo de Haber-Bosch.** $k = \frac{1}{3}$

2. **Em um reator de uma indústria produtora de amônia que utiliza o processo de Haber-Bosch, deseja-se produzir 2 000 mol de amônia. Os parâmetros de operação da fábrica geraram um rendimento de 25%. Quais são as quantidades de N_2 e H_2, em mol, necessárias para produzir a quantidade de NH_3 prevista?** São necessários 4 000 mol de N_2 e 12 000 mol de H_2.

3. **Escreva um pequeno texto que apresente a importância dos conceitos matemáticos de razão, proporção e porcentagem para a química industrial.**

Não escreva no livro.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

O ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO DE CO_2 NA ATMOSFERA NO SÉCULO XX

Charles David Keeling (1928-2005) foi um geoquímico estadunidense que se dedicou ao estudo da concentração de gás carbônico (CO_2) na atmosfera terrestre. Ainda quando estudante de pós-graduação no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), Keeling foi motivado a estudar a interação do CO_2 atmosférico e o carbonato de cálcio presente na água. Entretanto, durante seus estudos, notou que as concentrações de CO_2 indicadas por outros pesquisadores variavam e impossibilitavam que ele adotasse um padrão para suas pesquisas. Assim, ele se viu obrigado a determinar essas concentrações ele mesmo, e, para isso, utilizou um instrumento para medição da pressão parcial de CO_2 – um manômetro de mercúrio com precisão de 0,1% – e análise por espectroscopia de massas.

Com suas medições, ele observou que a concentração de CO_2 variava de acordo com a localidade da medição, a época do ano ou o período do dia. Em 1957, esses resultados chamaram a atenção do governo dos Estados Unidos, que já pretendia fazer medições semelhantes em diferentes locais. Assim, Keeling foi convidado a participar das medições governamentais, continuando seus estudos de monitoramento de CO_2 em Mauna Loa, no Havaí, a partir de 1957. Para obter os dados mais confiáveis possíveis, ele utilizou equipamentos analíticos de alta precisão e fez uso de técnicas como espectroscopia de massas e espectroscopia de infravermelho, além de titulações de alta sensibilidade.

PARA EXPLORAR

Acesse

O efeito estufa

Neste simulador interativo desenvolvido pela Universidade do Colorado Boulder, nos Estados Unidos, é possível variar a concentração de gases de efeito estufa e observar a composição desses gases na atmosfera terrestre em diferentes períodos (atual, em 1750 e na era do gelo).

Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/greenhouse-effect/latest/greenhouse-effect_all.html?locale=pt_BR. Acesso em: 20 set. 2024.

A Curva de Keeling

Ao longo de décadas consecutivas de medições diárias em Mauna Loa, Keeling coletou dados suficientes para argumentar que, ao longo de um ano, a concentração de CO_2 aumenta no verão, quando as plantas são ricas em folhagens e respiram com maior facilidade, e diminui no inverno, quando as plantas perdem suas folhas, dificultando o processo de respiração. Esse foi um primeiro padrão interpretado por Keeling. No entanto, ao incorporar as medições referentes às últimas décadas, ele verificou que a concentração máxima de CO_2 aumentou progressivamente ao longo dos anos, como podemos interpretar no gráfico a seguir, conhecido hoje como Curva de Keeling.

CO_2 ATMOSFÉRICO NO OBSERVATÓRIO DE MAUNA LOA



Reinaldo Vignati/ID/BR

Os dados, medidos como a fração molar de dióxido de carbono no ar seco, em Mauna Loa (Havaí), constituem o registro mais longo de medições diretas de CO_2 na atmosfera.

Fonte do gráfico: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. *Laboratório de Monitoramento Global*, Havaí, [20--]. Disponível em: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. Acesso em: 20 set. 2024.

Não escreva no livro.

O aumento de CO_2 atmosférico verificado no Observatório de Mauna Loa foi associado principalmente ao aumento do uso dos combustíveis fósseis, e permitiu relacionar a emissão de gases de efeito estufa com o aumento da temperatura global, considerando que o CO_2 é capaz de absorver e de refletir a radiação em circulação pela Terra na forma de calor, retendo-a na troposfera. Ou seja, quanto maior a quantidade de CO_2, maior é a dificuldade de ocorrer a transferência de calor da crosta terrestre para o espaço, o que resulta no aumento da temperatura média global e, por sua vez, nas mudanças climáticas.

Petr Klabal/Shutterstock.com/ID/BR

O Observatório Mauna Loa está localizado no Havaí, a uma altitude de 3 397 metros acima do nível do mar. Esse observatório é uma importante instalação de pesquisa atmosférica que monitora e coleta continuamente dados relacionados às mudanças atmosféricas desde os anos 1950.

Preocupação mundial

Com base em décadas de investigações, as medições realizadas por Keeling suscitaram uma preocupação mundial sobre o futuro do planeta e possíveis catástrofes, promovendo esforços de líderes de diferentes países e de organizações não governamentais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), para controlar a emissão de CO_2 oriunda, majoritariamente, do uso de combustíveis fósseis. Por meio desses esforços, acordos internacionais, como o Protocolo de Kyoto, de 1997, que visava diminuir a emissão de CO_2 em escala mundial ao menos em 5% até 2012, foram firmados. Mais recentemente, em 2015, mais de 190 países se reuniram na França, na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, também conhecida como Conferência do Clima de Paris, com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 2 °C e de minimizar seus impactos nas mudanças climáticas do mundo. Atualmente, a ONU organiza conferências anuais do clima (COP).

Kamila Camilo/UOL/Folhapress

A ativista ambiental brasileira Txai Suruí (1997-) discursou na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) de 2021, realizada em Glasgow, na Escócia. A COP26 reuniu líderes mundiais, ativistas climáticos, ONGs, povos indígenas e outros representantes, com o intuito de articular políticas globais e medidas concretas, a fim de minimizar os efeitos das mudanças climáticas.

Para discutir

1 Qual foi a importância de Keeling ao refazer as medições de CO_2 na atmosfera?

2 Qual é a relação entre o aumento da concentração de CO_2 na atmosfera e o aumento da temperatura global?

3 Por quais motivos os líderes globais se organizam para tentar controlar a emissão de CO_2?

1. Ao refazer as medições da concentração de CO_2 atmosférico, Keeling observou que a concentração de CO_2 variava de acordo com a localidade da medição, a época do ano ou o período do dia, o que, de certa forma, justificava as diferentes concentrações relatadas por outros pesquisadores.

2. Quanto maior a quantidade de CO_2, maior é a dificuldade de ocorrer a transferência de calor da crosta terrestre para o espaço, devido a sua propriedade de absorver e de refletir a radiação de volta à Terra, o que resulta no aumento da temperatura média global e, consequentemente, em mudanças climáticas.

3. Ao controlar as emissões de CO_2 e estabelecer metas relacionadas, procura-se reduzir os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas, reduzindo as possibilidades de catástrofes.

Não escreva no livro.

ATIVIDADES

2. Fórmula porcentual, mínima e molecular. A porcentual indica a porcentagem em massa de cada elemento em uma substância; a mínima indica, por meio dos menores números inteiros, a proporção entre os átomos dos elementos na substância; já a molecular, indica o número de átomos de cada elemento na molécula ou espécie química da substância, bem como a proporção entre eles.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **Em caso de acidente envolvendo o derramamento de ácido sulfúrico concentrado, H_2SO_4(conc), uma possibilidade é fazer a absorção do material pela reação com cal (CaO). Outra possibilidade consiste em utilizar calcário, mineral contendo uma porcentagem de $CaCO_3$, pois este reage com o ácido sulfúrico de acordo com a equação a seguir.**

$H_2SO_4(conc) + CaCO_3(s) \rightarrow CaSO_4(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$

a) Considere um lote de calcário que apresenta 80% de pureza em $CaCO_3$. Determine a massa necessária de calcário, em kg, para neutralizar um litro de ácido sulfúrico concentrado, sabendo que o H_2SO_4(conc) apresenta 97% de pureza em ácido sulfúrico e densidade = 1,83 g/cm³.

b) Calcule o volume de CO_2(g) formado, nas CATP, quando um litro do ácido sulfúrico concentrado reage com quantidade suficiente de calcário para neutralizar completamente o ácido.

Dados: Volume molar nas CATP = 25 L/mol; Massas molares: H_2SO_4 = 98 g/mol; $CaCO_3$ = 100 g/mol.

Resolução:

a) A resolução dessa atividade envolve uma sequência de cálculos. Inicialmente, calcula-se a massa de ácido sulfúrico concentrado em um litro de solução. A densidade de 1,83 g/cm³ equivale a 1830 g/L.

Portanto, 1 L de ácido H_2SO_4(conc) contém 1830 g.

Como o H_2SO_4(conc) tem 97% de pureza, a massa de ácido que reagirá com o calcário é

$\frac{97}{100} \cdot 1830\ g = 1775{,}10\ g$ de H_2SO_4

Agora, calcula-se a massa de $CaCO_3$ utilizada para neutralizar o ácido.

$1\ H_2SO_4(conc) + 1\ CaCO_3(s) \rightarrow CaSO_4(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$

$1 \cdot 98\ g$ ——— $1 \cdot 100\ g$

$1775{,}10\ g$ ——— x

$x = 1811{,}33$ g de $CaCO_3$

3. Por meio de fórmulas que representem as substâncias reagentes (colocadas sempre à esquerda da seta) e os produtos da reação (colocados sempre à direita da seta).

O calcário utilizado contém 80% de pureza em $CaCO_3$. A massa total de calcário a ser utilizada pode ser calculada por:

1811,33 g ——— 80%

y g ——— 100%

$y = 2264{,}16$ g

Portanto, a massa necessária de calcário para neutralizar o ácido sulfúrico é de 2 264,16 g.

b) Como foi calculado no item a, a massa de H_2SO_4 concentrado presente em 1 L é de 1775,10 g.

Para calcular o volume de CO_2 liberado na reação, nas CATP, efetuamos o cálculo estequiométrico.

$1\ H_2SO_4(conc) + CaCO_3(s) \rightarrow CaSO_4(aq) + 1\ CO_2(g) + H_2O(\ell)$

$1 \cdot 98\ g$ ——— $1 \cdot 25\ L$

$1775{,}10\ g$ ——— $z \rightarrow z = 452{,}83$ L

Portanto, ao neutralizar 1 L de ácido sulfúrico concentrado, são liberados 452,83 L de CO_2 na atmosfera.

2 **Quais são os tipos de fórmulas químicas estudadas neste capítulo e o que elas indicam?**

3 **Como as espécies químicas participantes de uma reação são representadas em equações químicas?**

4 **Faça o balanceamento das equações a seguir.**

a) $H_2SO_4(aq) + Fe(OH)_3(s) \rightarrow Fe_2(SO_4)_3(aq) + H_2O(\ell)$

b) $N_2H_4(g) + N_2O_4(g) \rightarrow N_2(g) + H_2O(g)$

c) $SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$

4. a), b) e **c)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 **Analise se os pares de metal e ácido apresentados em cada um dos itens abaixo reagem. Em caso afirmativo, equacione as reações.**

a) Au + HCℓ b) Ba + 2 HCℓ c) Aℓ + 3 HCℓ

6 **Dois béqueres (A e B) contêm soluções aquosas de sulfato de cobre(II), $CuSO_4$, de cor azul, como mostra o esquema a seguir.**



Ilustrações: ID/BR

6. a) e **b)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Nos béqueres A e B são introduzidas, respectivamente, uma lâmina de zinco metálico (Zn) e uma de prata metálica (Ag). Elas permanecem em contato com as soluções por, aproximadamente, duas horas.

Com a retirada das lâminas, observa-se que:

- a lâmina de zinco apresenta-se recoberta por uma camada de sólido escuro;
- nenhuma alteração foi observada na lâmina de prata nem na solução em que ela foi introduzida.

a) Justifique o que ocorreu no béquer **A**. Por que no béquer **B** nenhuma alteração foi observada?

b) Equacione a reação química observada.

7 **O álcool isopropílico é uma substância que contém apenas carbono (C), oxigênio (O) e hidrogênio (H). É um líquido incolor altamente inflamável utilizado, dentre outras aplicações, para limpar componentes eletrônicos e em produtos de limpeza de superfícies de vidro. A combustão completa de 1 mol de álcool isopropílico produz 3 mol de CO_2 e 4 mol de H_2O. Sabendo que a massa de oxigênio é o dobro da massa de hidrogênio presente na substância, determine a fórmula molecular desse álcool.** C_3H_8O

5. a) Não reagem. **b)** $Ba(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow BaC\ell_2(aq) + H_2(g)$
c) $2\ A\ell(s) + 6\ HC\ell(aq) \rightarrow 2\ A\ell C\ell_3(aq) + H_2(g)$

Não escreva no livro.

8 Principal componente da parede celular das plantas, a celulose corresponde a 50% da composição da madeira. A análise de uma amostra de 1 kg de celulose obteve os resultados apresentados na tabela a seguir. Determine a fórmula mínima da celulose. $C_6H_{10}O_5$

Massa total da amostra	Massa de carbono	Massa de hidrogênio	Massa de oxigênio
1 kg	444,5 g	61,7 g	493,8 g

9 O controle de emissões de dióxido de enxofre (SO_2) pode ser feito pela absorção desse gás com solução de hidróxido de cálcio, reação que produz um sólido não poluente. A equação que representa esse processo é: m = 1 480 g ou 1,48 kg.

$$SO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaSO_3(s) + H_2O(\ell)$$

- Determine a massa necessária de hidróxido de cálcio para absorver 500 litros de dióxido de enxofre, nas condições ambientes.

Dados: Massa molar do $Ca(OH)_2$: 74 g/mol; Volume molar nas condições ambientes = 25 L/mol.

10 Em uma das etapas da produção de ácido nítrico, a amônia é queimada sobre telas de platina em presença de ar atmosférico. Essa reação é representada pela equação a seguir.

$$4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 4\ NO(g) + 6\ H_2O(g)$$

Considerando que sejam misturados 150 g de NH_3 com 150 g de O_2, pergunta-se:

a) Os reagentes foram misturados em proporção estequiométrica? Não, há excesso de amônia.

b) Qual é a massa, em gramas, de NO formada nessas condições? 112,5 g

c) Há algum reagente em excesso? Em caso afirmativo, determine a massa desse excesso. 86,25 g de amônia em excesso.

11 O cobre é um ótimo condutor elétrico, apresenta grande resistência à corrosão, além de ser muito dúctil (propriedade de poder ser transformado em fios) e maleável (propriedade de poder ser transformado em placas). Propriedades físicas favoráveis e baixa reatividade química, aliadas a um custo de produção relativamente baixo quando comparado com outros metais nobres, o tornam um material de grande importância em instalações elétricas e em outras aplicações. É obtido a partir da ustulação de Cu_2S presente na calcosita (minério de cobre), cuja equação encontra-se representada a seguir.

$$Cu_2S(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ Cu(s) + SO_2(g)$$

- Calcule a massa de Cu_2S necessária para a obtenção de 444,5 g de cobre metálico em um processo com 70% de rendimento.

Dados: Massas molares: Cu = 63,5 g/mol e S = = 32 g/mol. m = 795 g de calcosita.

12 Biocombustíveis têm origem biológica não fóssil e são obtidos em escala industrial a partir de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar, mamona, soja, babaçu, milho, entre outros. O etanol, biocombustível comercializado há mais tempo nos postos de gasolina, pode ser obtido pela fermentação da sacarose, reação representada de modo simplificado pela seguinte equação química balanceada:

$$C_{12}H_{22}O_{11}(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 4\ C_2H_6O(\ell) + 4\ CO_2(g)$$

- Calcule a quantidade máxima de etanol, em tonelada, que pode ser obtida a partir da fermentação de $1 \cdot 10^6$ mol de sacarose, considerando que o processo apresenta um rendimento de 75%. 138 t

13 O "galinho do tempo" é um antigo bibelô que varia da cor azul à cor rosa de acordo com as condições climáticas, como pode ser observado na foto.

Rita Barreto/Fotoarena

Na base do artefato, há uma escala de cores que indica se o tempo está quente e sem previsão de chuvas ou se o clima está chuvoso e frio.

A estrutura de plástico com o formato de galo é revestida com um tecido impregnado de cloreto de cobalto(II), sal que pode ser usado como indicador de umidade, pois é azul quando isento de água (sal anidro) e é rosa em presença de umidade (sal hidratado). O processo reversível pode ser representado por:

$$\underset{\text{sal anidro (azul)}}{CoC\ell_2(s)} + n\ H_2O(g) \rightleftharpoons \underset{\text{sal hidratado (rosa)}}{CoC\ell_2 \cdot n\ H_2O(s)}$$

- Determine o valor de n na fórmula do sal hidratado, considerando que 0,5 mol do sal anidro foi transformado em 82,95 g do sal hidratado.

Dados: Massas atômicas: H = 1 u; O = 16 u; Co = 58,9 u; Cℓ = 35,5 u.

n = 2. A fórmula do sal hidratado é $CoC\ell_2 \cdot 2\ H_2O(s)$

14 O aspartame é um adoçante artificial cujo poder adoçante é cerca de duzentas vezes maior que o do açúcar comum. Por isso, é muito utilizado em bebidas *diet*. Sua fórmula molecular é $C_{14}H_{18}N_2O_5$. Obtenha sua fórmula porcentual. $C_{57,14\%}H_{6,12\%}N_{9,52\%}O_{27,21\%}$

ESTUDO DE CASO



Roger Ressmeyer/Corbis/VCG/Getty Images

Linus Pauling, químico ganhador de dois prêmios Nobel e grande defensor do uso da vitamina C.



Vitamina C

LINUS PAULING E A VITAMINA C

Ao analisar as ligações químicas, o estudante Felipe se interessou em saber mais sobre a vida do químico estadunidense Linus Pauling (1901-1994). Pesquisando sobre o cientista, descobriu que Pauling era um defensor ferrenho do uso da vitamina C.

Pauling defendia a ingestão de megadoses diárias, pois acreditava que o uso prolongado da vitamina poderia prevenir uma série de doenças, como resfriados e até o câncer. Ele próprio consumia cerca de 18 g da vitamina todos os dias.

Quando terminou sua pesquisa, Felipe se perguntou: Será que Linus Pauling estava correto em defender o consumo de vitamina C como forma de prevenção de doenças?

Para tentar encontrar uma resposta, Felipe buscou saber mais sobre a vitamina C. Encontrou um texto que a relacionava a uma doença que atingia marinheiros nos séculos XV e XVI: o escorbuto.

O escorbuto é uma doença causada pela deficiência da vitamina C. Naquela época, não havia como transportar alimentos frescos nos navios e, por isso, os marinheiros se alimentavam basicamente de carne e peixes salgados e de uma espécie de bolacha feita de farinha, água e sal. Era a falta de alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes, que provocava a deficiência de vitamina C.

Os sintomas do escorbuto incluem exaustão, inflamação das gengivas, amolecimento e perda de dentes, problemas de pele, inchaço dos membros e hemorragias, podendo levar à morte. Vasco da Gama, por exemplo, chegou a perder cem dos 160 homens a bordo de uma de suas expedições por causa do escorbuto.

Ao pesquisar a relação entre a vitamina C e o escorbuto, Felipe descobriu que essa vitamina atua como **cofator** de enzimas que participam da produção de colágeno. Ele também encontrou a fórmula estrutural da vitamina C e leu que seu nome químico é ácido ascórbico.

Organizados em grupos, resolvam as atividades a seguir.

cofator: em Bioquímica, é uma pequena molécula que se liga a uma enzima, sendo essencial para a sua atividade.

1 **Que tipos de ligação química ocorrem entres os átomos presentes na molécula de vitamina C?** A molécula de vitamina C é formada por ligações covalentes.

2 **A fórmula molecular do ácido ascórbico é $C_6H_8O_6$. Determine sua massa molecular e sua massa molar.** Massa molecular = 176 u; massa molar = 176 g/mol.

3 **Linus Pauling ingeria cerca de 18 g de vitamina C por dia. Quantos mols dessa vitamina ele ingeria?** Aproximadamente 0,1 mol por dia.

Felipe ficou intrigado com o papel da vitamina C como antioxidante. Ele descobriu que a vitamina C pode ser facilmente oxidada em solução aquosa; isso significa que ela pode ser oxidada no lugar de outros compostos e, por isso, é muito utilizada como conservante de alimentos e em cosméticos, protegendo a pele contra os radicais livres formados pela ação dos raios UV.

Radicais livres são átomos ou moléculas que apresentam um ou mais elétrons livres (desemparelhados) em sua última camada eletrônica. Eles são produzidos pelo metabolismo do nosso organismo e são altamente instáveis e reativos.

Na verdade, radical livre não é o termo ideal para designar esses agentes reativos. Como a maioria deriva do metabolismo do O_2, os radicais livres costumam ser chamados espécies reativas do metabolismo do oxigênio (EROs).

4 **Esquematize a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas do átomo de oxigênio.** K: 2 elétrons; L: 6 elétrons.

Não escreva no livro.

5 **Que tipo de ligação ocorre na molécula de O_2? O que acontece com os elétrons na última camada do átomo de oxigênio na formação da molécula de O_2?**

Por causa de sua configuração eletrônica, o oxigênio tende a receber um elétron de cada vez, formando compostos intermediários altamente reativos, destacando-se o ânion radical superóxido (O_2^{-}•), o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e o radical hidroxila (•OH).

6 **Esquematize a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio. Em seguida, esquematize a ligação entre os átomos de oxigênio e hidrogênio no radical hidroxila. Utilize a representação de Lewis.**

7 **Considerando a configuração eletrônica do radical hidroxila, de que formas ele pode se ligar a outros compostos? E que tipos de ligação química esse radical é capaz de estabelecer com eles? Justifique.**

Felipe resolveu pesquisar as doenças relacionadas aos radicais livres, porque, para ele, aí estaria a resposta para saber se Linus Pauling estava correto em suas recomendações.

Ele leu que existem evidências de que os radicais livres estão relacionados a cerca de cinquenta doenças, incluindo câncer, doenças cardiovasculares, isquemia cerebral, doenças neurodegenerativas, além do envelhecimento.

Sobre o radical hidroxila, ele encontrou a seguinte informação em um artigo:

> O radical •OH é a espécie derivada do oxigênio mais reativa [...] dentre as EROs, sendo capaz de reagir rapidamente com quase todas as biomoléculas: carboidratos, lipídios, aminoácidos, DNA e ácidos orgânicos. Além de sua alta reatividade biológica, não existe defesa antioxidante enzimática capaz de eliminar o •OH, o que faz dele o radical livre mais danoso em termos celulares. [...]
>
> VIZZOTTO, E. *Radicais livres e mecanismos de proteção antioxidante*. 2017. 10 p. Disciplina de Fundamentos Bioquímicos dos Transtornos Metabólicos – Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017. p. 3.

Em suas leituras, Felipe descobriu também que o ácido ascórbico tem ação antioxidante não enzimática e que, na presença de oxigênio, ele se oxida, formando o ácido dehidroascórbico, tornando-se um doador de elétrons.



oxidação de ácido ascórbico em ácido dehidroascórbico

8 **Discuta com os colegas de que forma o ácido ascórbico neutralizaria o radical hidroxila.**

9 **Esquematize a reação entre o ácido ascórbico e o radical hidroxila.**

10 **Com base nas informações obtidas por Felipe, é possível afirmar que Linus Pauling estava correto em sua defesa da vitamina C? Justifique a resposta.**

Uma última informação chamou a atenção de Felipe: ao contrário do que defendia Linus Pauling, não existe nenhuma evidência de que o consumo de vitamina C ajude a prevenir e a tratar resfriados. Atualmente a ingestão diária recomendada pelo Conselho Federal de Farmácia é de, em média, 80 mg, cerca de 225 vezes menos do que Pauling costumava ingerir.

5. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7. O radical hidroxila tem um elétron desemparelhado na última camada do átomo de oxigênio. Ele pode se ligar a outros compostos doando ou recebendo um elétron. Além disso, ele pode realizar com outros compostos ligações iônicas (quando se liga a um elemento do tipo metal) ou covalentes (quando se liga a um elemento do tipo ametal ou hidrogênio).

8. Espera-se que os estudantes relacionem a capacidade doadora de elétrons do ácido ascórbico ao fato de o radical hidroxila ter um elétron desemparelhado na última camada. Dessa forma, o ácido ascórbico poderia doar um elétron para o radical hidroxila, estabilizando-o.

9. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

10. A ação antioxidante da vitamina C é capaz, sim, de proteger o organismo do estresse oxidativo que pode levar ao desenvolvimento de determinadas doenças, portanto, pode-se afirmar que Linus Pauling tinha razão em defender o uso da vitamina C, no entanto, não na dose ingerida por ele, que é 225 vezes superior à dose diária recomendada atualmente.

QUESTÕES GLOBAIS

1 (**Fuvest-SP**) O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos dos quais 98,90% são ^{12}C e 1,10% são ^{13}C.

a) Explique o significado das representações ^{12}C e ^{13}C.

b) Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural.

Dados: massas atômicas: $^{12}C = 12{,}000$; $^{13}C = 13{,}003$.

1. a) e **b).** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 (**UFRR**) O garimpo ilegal traz inúmeras consequências danosas ao meio ambiente, destruindo os cursos d'água, afetando a fauna local e impactando diretamente a vida de populações que vivem próximo a regiões exploradas. Em uma operação deflagrada pela Polícia Federal, em julho de 2022, para combater o garimpo ilegal, cerca de 39 quilos de ouro em barras foram apreendidos. Alternativa **c**.

(Fonte: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/07/10/baroes-do-ouro-ilegal-no-brasil-dinheiro-movimentado-as-margens-da-lei-chegou-a-r-16-bilhoes-em-dois-anos.ghtml)

Supondo que cada barra de ouro continha 1,576 kg, podemos afirmar que o número de átomos de ouro presente em cada barra é de aproximadamente:

a) $4{,}8 \cdot 10^{23}$

b) $1{,}2 \cdot 10^{23}$

c) $4{,}8 \cdot 10^{24}$

d) $4{,}8 \cdot 10^{22}$

e) $2{,}4 \cdot 10^{23}$

3 (**Unesp**) Certo *spray* antisséptico contém como princípio ativo o digliconato de clorexidina, na concentração de 10 mg/mL. Sabendo que a massa molar desse princípio ativo é, aproximadamente, $5{,}0 \cdot 10^2$ g/mol e que a constante de Avogadro é igual a $6{,}0 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}, o número de moléculas de digliconato de clorexidina presentes em um frasco contendo 50 mL desse antisséptico é. Alternativa **a**.

a) $6{,}0 \cdot 10^{20}$.

b) $6{,}0 \cdot 10^{17}$.

c) $6{,}0 \cdot 10^{14}$.

d) $6{,}0 \cdot 10^{23}$.

e) $6{,}0 \cdot 10^{26}$.

4 O etanol (C_2H_6O) é uma substância obtida da fermentação de açúcares. Sobre o etanol, pedem-se:

a) sua composição centesimal;

b) a equação da reação de sua combustão completa;

c) a massa de oxigênio necessária para alimentar a combustão completa de 23 kg de etanol;

d) o volume de gás carbônico, a 27 °C e 1,0 atm, liberado na combustão completa de 57,5 L de etanol, dado que a densidade desse álcool é 0,8 g/mL.

4. a) 52,2% de C, 13% de H e 34,8% de O
b) $C_2H_6O + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ **c)** 48 kg **d)** 49 200 L

5 (**Urca-CE**) A nicotina presente nos cigarros é um alcaloide que produz uma dependência química aos adeptos do tabagismo. Em uma análise elementar, um estudante de química realizou a combustão de 8,1 g de nicotina e teve como produto 22,0 g de dióxido de carbono (CO_2), 6,3 g de água (H_2O) e 1,4 g de nitrogênio (N_2). A partir desses dados experimentais, e da reação química não balanceada, marque a opção que contém a fórmula mínima da nicotina. (Use as seguintes massas molares: O = 16 g/mol, H = 1,0 g/mol, C = 12 g/mol e N = 14 g/mol). Alternativa **b**.

$C_xH_yN_z + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g) + N_2(g)$

a) $C_6H_{12}N$

b) C_5H_7N

c) C_4H_5N

d) C_3H_7N

e) C_6H_9N

6 (**Uerj**) O fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação da reação química entre essas duas substâncias: Alternativa **b**.

$$P_4(s) + 5\ O_2(g) \rightarrow P_4O_{10}(s)$$

Na reação de 248 g de P_4, a massa de O_2 consumida, em gramas, corresponde a:

a) 160

b) 320

c) 480

d) 640

7 (**Enem**) O cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, de massa molar 159 g/mol. Por meio da reação $Cu_2S(s) + O_2(g) \rightarrow Cu(s) + SO_2(g)$, é possível obtê-lo na forma metálica. A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de uma tonelada de calcocita com 7,95% (m/m) de pureza é Alternativa **a**.

a) $1 \cdot 10^3$

b) $5 \cdot 10^2$

c) $1 \cdot 10^0$

d) $5 \cdot 10^{-1}$

e) $4 \cdot 10^{-3}$

8 (**UFPR**) A perovskita $CH_3NH_3PbI_3$ é um material que, pelas suas propriedades fotovoltaicas, é considerado promissor para geração de eletricidade a partir da luz solar. O composto foi sintetizado em três etapas, descritas pelas equações químicas a seguir.

Não escreva no livro.

$Pb(NO_3)_2 + 2\ KI \rightarrow PbI_2 + 2\ KNO_3$

$CH_3NH_2 + HI \rightarrow CH_3NH_3I$

$PbI_2 + CH_3NH_3I \rightarrow CH_3NH_3PbI_3$

Os seguintes reagentes foram empregados na síntese: 0,6 mol de $Pb(NO_3)_2$; 0,8 mol de KI; 0,7 mol de CH_3NH_2; e 0,8 mol de HI. Nessas condições, qual será a quantidade máxima da perovskita $CH_3NH_3PbI_3$ produzida? Alternativa **a**.

a) 0,4 mol.

b) 0,6 mol.

c) 0,7 mol.

d) 0,8 mol.

e) 1,0 mol.

9 **Considere os seguintes reagentes:**

I. $Br_2(\ell) + ZnC\ell_2(aq)$

II. $Pb(s) + CrC\ell_3(aq)$

III. $Cu^{2+}(aq) + OH^-(aq)$

- Em qual(is) reação(ões) será(ão) formado(s) produto(s)? Explique o princípio que você considerou em sua decisão. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

10 **O calcário é usado como matéria-prima na fabricação de cal e cimento, na produção de corretivos para solos ácidos, como matéria-prima nas indústrias de papel, plásticos, química, siderúrgica, de vidro, de refratários e outras.**

O principal constituinte mineralógico do calcário é a calcita ($CaCO_3$), que pode conter impurezas em pequena quantidade. Uma amostra de 10 g de calcário foi tratada com ácido clorídrico em excesso, e o gás carbônico formado foi recolhido em um recipiente de 18,7 L. A medida da pressão parcial do CO_2 nesse recipiente foi igual a 0,10 atm, a 27 °C. Determine o teor de $CaCO_3$ na amostra de calcário. 76%

Dados: $R = 0{,}082\ atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$;
$CaCO_3 + 2\ HC\ell \rightarrow CaC\ell_2 + H_2O + CO_2$.

11 **Para determinar a fórmula molecular de um composto formado por átomos de carbono e de hidrogênio (C_xH_y), realizou-se a combustão total de uma amostra gasosa dessa substância. Essa amostra, a 1 atm e 27 °C, ocupava o volume de 12,3 L. Durante o procedimento, os produtos formados foram coletados por meio de dispositivos absorventes de H_2O (compartimento A) e de CO_2 (compartimento B), obtendo-se 36 g e 88 g, respectivamente.**



Reação não balanceada:

$$C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

A fórmula do composto orgânico analisado é C_4H_8 e a equação balanceada do processo é $C_4H_8 + 6\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 4\ H_2O$.

Com esses dados, determine a fórmula molecular do composto orgânico analisado e represente a equação balanceada do processo. Considere o gás com comportamento ideal.

Dado: $R = 0{,}082\ atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$.

12 **(Enem) Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, $CaC\ell_2$. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio di-hidratado, $CaC\ell_2 \cdot 2\ H_2O$.**

Considere a massa molar da água igual a 18 g · mol^{-1}, e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 g · mol^{-1}. Alternativa **d**.

Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual, em massa, é mais próximo de

a) 14%

b) 16%

c) 24%

d) 32%

e) 75%

13 **Os óxidos de enxofre são formados na queima de combustíveis fósseis que apresentam enxofre em sua composição como, por exemplo, o óleo *diesel* e o carvão mineral. Por serem poluentes atmosféricos, sua presença é altamente indesejável e adotam-se medidas para a redução da emissão desses óxidos. Por exemplo, recomenda-se o uso do *Diesel* S10, pois este contém um teor de enxofre 50 vezes menor do que o *Diesel* S500, ambos comercializados em postos de combustíveis.**

Em uma análise, foram recolhidas três amostras de óxidos de enxofre de diferentes fontes. Os resultados obtidos estão descritos na tabela a seguir.

Amostra	Massa da amostra (g)	Massa de enxofre (g)	Massa de oxigênio (g)
1	8	4	4
2	40	16	24
3	16	8	8

Determine as fórmulas mínimas dos óxidos das amostras 1, 2 e 3. Amostra 1: SO_2; amostra 2: SO_3; amostra 3: SO_2.

Dados: Massas atômicas: O = 16 u e S = 32 u.

14 **A massa de 13,9 g de uma substância *x* foi formada a partir da reação entre 2,07 g de fósforo (P) e uma determinada massa de gás cloro ($C\ell_2$). Identifique a fórmula empírica da substância *x*.** $PC\ell_5$

Não escreva no livro.

O COMPORTAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS

Os gases e diversas outras substâncias são fundamentais para a vida na Terra como a conhecemos. O gás oxigênio, por exemplo, é indispensável à respiração da grande maioria dos seres vivos, assim como o dióxido de carbono à fotossíntese.

A emissão de dióxido de carbono na atmosfera provoca graves alterações em sua composição. Além disso, parte desse gás é absorvido pelos corpos d'água, diminuindo a concentração dele na atmosfera. O gás carbônico absorvido reage com a água, formando um ácido inorgânico, aumentando a acidez dos oceanos. Quando é absorvido em excesso pelos corpos d'água, como vem acontecendo nos últimos anos pela queima excessiva de combustíveis fósseis, que aumenta a liberação de gás carbônico na atmosfera, desequilibra as reações de formação do esqueleto calcário de diversas espécies e compromete o ecossistema marinho.

Nesta unidade, você vai estudar o comportamento de várias substâncias, entre elas os gases e as substâncias inorgânicas, e terá a oportunidade de conhecer como elas se comportam.

OBJETIVOS

- Conhecer as variáveis de estado de um gás e como utilizá-las para prever o comportamento dos gases em diferentes situações.
- Compreender as diferentes funções inorgânicas e os contextos em que elas estão presentes.
- Investigar as soluções e as propriedades coligativas das soluções.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. Os mergulhadores usam cilindros para mergulho por não haver gás oxigênio na água ou há outra explicação? Justifique sua resposta.
2. A água do mar é levemente básica, e sua acidificação provoca alterações no ecossistema marinho. Quais podem ser as consequências dessas alterações para os seres vivos?
3. Como as mudanças causadas pela ação humana na atmosfera podem influenciar os padrões climáticos?

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1. Espera-se que os estudantes respondam que os mamíferos, como os seres humanos, não conseguem absorver o gás oxigênio dissolvido na água como fazem os peixes. Por essa razão, para mergulhos por tempo mais longo, é necessário esse suprimento de oxigênio.

3. Os estudantes podem dar respostas genéricas sobre a poluição do ar. Use esses conhecimentos prévios para dar uma ideia inicial do aquecimento do planeta pela intensificação do efeito estufa.

Na água dos oceanos, estão dissolvidos diversos íons e gases, essenciais para o ecossistema marinho. ▸

Kanarys/iStock/Getty Images

3

1 O comportamento dos gases

2 Funções inorgânicas

3 Soluções e propriedades coligativas das soluções

O COMPORTAMENTO DOS GASES

1. As ações humanas que intensificam o efeito estufa são o uso de combustíveis fósseis, as queimadas e os desmatamentos. Esses dois últimos são motivados pela busca de novas áreas para agricultura e pecuária e pelo comércio de madeira.

PARA COMEÇAR

1. Dê exemplos de ações humanas que têm intensificado o efeito estufa e explique por que elas ocorrem.
2. Como o aumento da acidez da chuva pode afetar os ambientes urbanos?
3. Quais são os principais tipos de radiação ultravioleta que alcançam a superfície da Terra? Como eles diferem em relação ao impacto na saúde humana?

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

COMO OS GASES AFETAM A VIDA NA TERRA

Os gases interagem com a vida na Terra de diferentes maneiras. O gás oxigênio, por exemplo, é essencial para a sobrevivência de seres aeróbios, como nós; já o gás ozônio, apesar de extremamente tóxico aos seres humanos, é essencial nas camadas mais altas da atmosfera por filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol, nociva a nós.

O dióxido de carbono (gás carbônico) e o vapor de água presentes na atmosfera absorvem parte da radiação infravermelha (calor) emitida pelo Sol, causando o efeito estufa. Esse processo é benéfico, pois sem ele a Terra seria um planeta gelado e não poderia abrigar a vida como é conhecida. As ações humanas, porém, intensificam esse efeito, fazendo com que a temperatura global alcance níveis comprometedores para a manutenção do equilíbrio de diversos biomas.

O gás carbônico encontrado na atmosfera deixa a chuva naturalmente ácida. No entanto, há alguns gases que, se lançados à atmosfera, intensificam a acidez da chuva, tornando-a prejudicial ao ambiente. Há também gases que causam problemas respiratórios, e ainda aqueles que reagem com o ozônio da camada superior da atmosfera, deixando os seres vivos vulneráveis à radiação ultravioleta.

Neste capítulo, você vai conhecer as substâncias em estado gasoso e suas principais características, o que será importante para a compreensão de vários processos químicos.

2. A chuva ácida provoca, ao longo do tempo, a corrosão de estruturas metálicas e de alvenaria, além de contaminar a água e o solo.

A emissão de gases na atmosfera por indústrias deve ter um controle rigoroso para garantir a qualidade adequada do ar que respiramos. Fábrica em Catalão (GO). Foto de 2024.

Andre Dib/ Pulsar Imagens

Não escreva no livro.

CARACTERÍSTICAS DOS GASES

O estudo dos gases é feito pelo comportamento de suas partículas, que podem ser átomos ou moléculas. Como não é possível vê-las, elaborou-se um modelo teórico para descrever as características mais importantes do comportamento gasoso. Esse modelo é chamado **teoria cinética dos gases**.

Segundo essa teoria, as partículas de matéria no estado gasoso estão mais afastadas umas das outras do que nos estados líquido ou sólido. Essas partículas estão em movimento constante e desordenado, chocando-se entre si e com as paredes do recipiente que as contém.

A observação do comportamento dos gases possibilita o levantamento de algumas características importantes.



ID/BR

Esquema de modelo cinético dos gases: as esferas representam as partículas, e as linhas tracejadas, o movimento delas dentro de um recipiente.

- Toda porção de substância em estado gasoso possui **massa**, e o **volume** ocupado corresponde ao volume do recipiente que a contém. Dessa forma, é possível que uma mesma quantidade de gás ocupe diferentes volumes, respeitando um limite mínimo de distância entre suas partículas.
- As partículas estão em constante movimento, colidindo com as paredes do recipiente que as contém. Elas exercem uma força de dentro para fora que é distribuída pela superfície das paredes. A intensidade da força por unidade de área das paredes dá o valor da **pressão**.
- A variação de temperatura também influencia o volume ocupado pelas substâncias em estado gasoso. Essas substâncias, sob aquecimento, sofrem **dilatação** devido ao aumento da intensidade do movimento e, consequentemente, ao aumento da distância entre suas partículas. A redução na temperatura causa comportamento oposto, ou seja, o movimento das partículas se torna mais lento e a distância entre elas diminui, provocando a **contração** da substância.
- Essas substâncias também podem ser misturadas em um processo chamado **difusão gasosa**, dada a facilidade que os gases têm de se dispersar em outro meio gasoso. A rapidez desse processo depende da mobilidade das partículas no meio em que elas são colocadas.

Durante o estudo dos gases, eles serão considerados ideais. Um gás ideal (ou perfeito) corresponde a um gás cujas partículas apresentam as seguintes características:

- têm volume considerado nulo em relação ao volume ocupado pelo gás;
- chocam-se elasticamente, isto é, sem perda de energia cinética;
- estão em constante e desordenado movimento;
- não estão sujeitas a forças de atração ou repulsão.

O comportamento do gás ideal pode ser visto apenas em determinadas condições, como baixas pressões e altas temperaturas. Alguns gases, porém, podem exibir comportamento próximo do ideal mesmo nas condições ambientes.

A maioria dos gases, quando em altas pressões ou baixas temperaturas, sofre contração; com isso, a proximidade entre suas partículas aumenta, e as forças que atuam entre elas – atração e repulsão – não podem ser desprezadas. Nessa situação, os gases passam a ter comportamento real.

Características dos gases

Massa

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Volume variável



Reinaldo Vignati/ID/BR

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

Compressão e dilatação



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

balão sob baixa temperatura — balão em condições ambientes

Difusão gasosa



Reinaldo Vignati/ID/BR

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

Variáveis de estado de um gás

Pressão

A pressão é uma grandeza física definida como a força exercida sobre uma unidade de área de determinada superfície.

Os gases atmosféricos exercem uma força-peso sobre cada unidade de área da superfície terrestre. Essa força é denominada pressão atmosférica.

O cientista italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) foi o primeiro a medir a pressão atmosférica.

Reinaldo Vignati/ID/BR



Representação sem proporção de tamanho.

Representação do experimento de Torricelli. Cores-fantasia.

Debom C. Fluidostática. Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, [20--]. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/tex/fis01043/20042/camila/index.html. Acesso em: 11 out. 2024.

Em 1643, ele preencheu um tubo com mercúrio e o verteu em um recipiente que também continha mercúrio. Torricelli observou que o mercúrio não escoava completamente e que ficava um espaço vazio na parte superior da coluna (vácuo). O mercúrio descia até uma altura de 760 mm, ao nível do mar. Essa altura é proporcional à pressão exercida pelo ar. Assim, a pressão de 1 atmosfera equivale a 760 mmHg ou 760 torr.

O Sistema Internacional de Medidas (SI) determina que as pressões sejam indicadas pela unidade Pascal (Pa), definida como a pressão exercida por uma força de 1 newton aplicada sobre uma área de 1 m^2. Entretanto, o SI admite o bar e o mmHg (ou torr) como unidades de pressão em uso. A unidade atm não é mais recomendada e, sempre que utilizada – geralmente em referência a fatos e documentos antigos –, deve ser acompanhada de sua conversão em unidades SI, como mostra a tabela abaixo.

Pressão atmosférica	Conversão para Pascal
milímetro de mercúrio (mmHg)	760 mmHg = $1{,}013 \cdot 10^5$ Pa
atmosfera (atm)	1 atm = $1{,}013 \cdot 10^5$ Pa
bar (bar)	1 bar = $1 \cdot 10^5$ Pa
torricelli (torr)	760 torr = $1{,}013 \cdot 10^5$ Pa

A pressão de um gás corresponde à força média por unidade de área com que suas partículas colidem com as paredes do recipiente que as contém. Assim, para uma dada temperatura, quanto maior a proximidade entre as partículas, maior o número de colisões e, portanto, maior a pressão do gás.

PARA EXPLORAR

Assista

A história do barômetro (e de como ele funciona) – Asaf Bar-Yosef

Veja a animação, de 2014, (em inglês, legendada), sobre a história do experimento de Torricelli. Duração: 4 min 45 s.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EkDhIzA-lwI. Acesso em: 19 set. 2024.

ROTEIRO

1. A pressão atmosférica na Lua pode ser considerada desprezível por ser muito baixa. Como você acha que o barômetro de Torricelli se comportaria na Lua?

Como a pressão atmosférica é muito baixa, o mercúrio não subiria pela coluna.

Volume

Corresponde ao espaço ocupado pelo gás. Você já sabe que o volume de um gás pode variar de acordo com o recipiente que ocupa. O volume dos gases, geralmente, é medido em litros (L). No Sistema Internacional de Medidas (SI) usa-se o metro cúbico (m^3), embora a unidade litro também possa ser utilizada.

Não escreva no livro.

Temperatura

A temperatura está diretamente relacionada à agitação das moléculas do gás. A escala Kelvin (K) é bastante utilizada para se referir a temperaturas de gases.

A temperatura de 273,15 K corresponde a 0 °C, e a de 373,15 K, a 100 °C, ou seja, as duas escalas possuem o mesmo intervalo. Assim, 0 K corresponderia, teoricamente, a uma temperatura de −273,15 °C. Nesse ponto da escala, considera-se que as partículas não têm movimento. Isso é conhecido como **zero termodinâmico**. A temperatura na escala Kelvin não tem valores negativos.

Por causa da exatidão da maioria dos termômetros de uso em laboratório, é comum arredondar o valor 273,15 K para 273 K nos cálculos realizados.

CIÊNCIA SE DISCUTE

Máscara de gás

Uma das maneiras de proteger os seres humanos de gases tóxicos é o uso de máscara de gás, inventada pelo estadunidense Garret Morgan (1877-1963). Seu gosto por mecânica e por inventos fez com que ele fosse próspero em negócios nessa área, recebendo amplo reconhecimento por suas contribuições para a segurança pública.

A máscara de gás que inventou em 1912 tornou-se importante equipamento de proteção individual e foi muito utilizada por bombeiros de variadas cidades.

Na Primeira Guerra Mundial, gases tóxicos foram usados como arma que causava morte ou ferimento, o que diminuía o desempenho das tropas inimigas. Para neutralizar os efeitos desses gases tóxicos, as máscaras de gás foram largamente usadas na proteção dos soldados. Em abril de 1915, o exército alemão lançou 180 toneladas de gás cloro contra tropas da Bélgica, deixando 15 000 vítimas. Em retaliação, houve um ataque com os mesmos métodos contra alemães em Loos, na França, em setembro do mesmo ano. À época, as máscaras de proteção eram criadas para alguns gases, por isso, novos gases que não ficavam retidos ou que destruíam o filtro das máscaras eram usados, marcando essa guerra pelo emprego desse tipo de arma.

Fonte de pesquisa: Silva, G. R. *et al*. Defesa química: histórico, classificação dos agentes de guerra e ação dos neurotóxicos. *Química Nova*, São Paulo, v. 35, n. 10, 2083-2091, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/H9JXbsRj9fGznjW9PHbZP6G/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 5 jun. 2024.

Ricardo Oliveira/Pulsar Imagens

Bombeiros com máscaras de proteção contra gases tóxicos apagando um incêndio em Iranduba (AM). Foto de 2023.

1. Como o desenvolvimento tecnológico das máscaras de gás pode ampliar o seu uso?

1. O desenvolvimento tecnológico pode criar máscaras que forneçam proteção contra um número cada vez maior de gases tóxicos. Essas máscaras garantiriam a segurança de profissionais como bombeiros e outros trabalhadores que precisam acessar áreas com risco de contaminação.

Saiba mais

Celsius (°C) é a escala de temperatura mais conhecida no Brasil, mas a temperatura dos gases é, geralmente, medida na escala Kelvin (K). Nos Estados Unidos, é comum o uso da escala Fahrenheit (°F).

Para comparar essas escalas, costuma-se utilizar como referência as temperaturas de fusão (TF) e de ebulição (TE) da água ao nível do mar.

A tabela a seguir apresenta as principais diferenças entre essas três escalas.

Escala	TF	TE	Intervalo
°C	0	100	100
K	273	373	100
°F	32	212	180

Características dos gases

Durante o estudo dos gases, foram apresentadas algumas características de seu comportamento, além das variáveis de estado de um gás, que auxiliam a descrição desse comportamento. Como você acha que essas variáveis se relacionam na descrição do comportamento dos gases? Por exemplo, o que deve acontecer com uma amostra gasosa contida em um recipiente fechado, quando aumentamos a temperatura do sistema? Nesta atividade, você e os colegas vão observar como essas variáveis se relacionam e como podemos utilizá-las para descrever o comportamento de um gás.

Material

- 2 balões de festa
- uma garrafa do tipo PET com volume de 2 L
- um recipiente com água quente e outro com água gelada, com capacidade para mergulhar a garrafa até a metade
- uma seringa de plástico descartável

Como fazer

Parte 1

1. Encha parcialmente um balão de festa e prenda-o ao gargalo da garrafa, de maneira que haja uma pequena massa de gás em seu interior.
2. Mergulhe a garrafa no recipiente com água quente. Aguarde alguns minutos, observe o que acontece com o balão e anote os resultados.
3. Em seguida, retire a garrafa com o balão do recipiente com água quente e coloque-a no recipiente com água gelada. Aguarde alguns minutos, observe o que acontece com o balão e anote os resultados.



Ilustrações: Reinaldo Vignati/ID/BR



Parte 2

4. Para esta parte do experimento, você deve pegar outro balão e enchê-lo um pouco, dando um nó na ponta, de maneira que ele caiba dentro da seringa.
5. Retire o êmbolo da seringa e coloque o balão dentro dela. Encaixe o êmbolo e obstrua com o dedo a saída de ar da ponta da seringa. Empurre o êmbolo e observe o que acontece com o balão e anote os resultados.
6. Em seguida, puxe o êmbolo da seringa e observe o que acontece com o balão. Anote o que você observou.

Para concluir

1 **O que acontece com o balão quando é colocado na água gelada? E na água quente? Elabore uma explicação para o fenômeno que foi observado, utilizando, para isso, as variáveis de estado de um gás.**

2 **O que aconteceu com o balão dentro da seringa quando o êmbolo foi empurrado? E quando o êmbolo foi puxado? Elabore uma explicação para o fenômeno observado.**

3 **Em relação à parte 1 do experimento, o que aconteceria se, em vez de um balão, a amostra gasosa estivesse contida em um recipiente fechado de vidro? Elabore uma hipótese e discuta-a com os colegas e o(a) professor(a).**

1. Quando o balão é colocado na água gelada, a diminuição da temperatura faz com que as partículas do gás fiquem mais próximas, diminuindo o volume do balão.

2. Quando o êmbolo é empurrado, o ar contido na seringa é pressionado contra o balão, fazendo-o diminuir de tamanho. Quando o êmbolo é puxado, a pressão diminui e o volume do balão aumenta.

3. Utilizando um recipiente de vidro, o volume não variaria, portanto, quando o recipiente fosse colocado na água gelada, haveria a diminuição da pressão do sistema, uma vez que as partículas do gás estariam mais próximas, exercendo menos força nas paredes do recipiente. Quando transferido para a água quente, o aumento da temperatura do sistema provocaria um aumento na energia cinética das partículas, que passariam a se chocar com mais força nas paredes do recipiente, aumentando a pressão do sistema.

Não escreva no livro.

TRANSFORMAÇÕES GASOSAS

Ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, os cientistas estudaram as transformações provocadas por variações de pressão, volume e temperatura em uma massa fixa de gás. Essas transformações podem ocorrer com temperatura constante (isotérmica), com pressão constante (isobárica), com volume constante (isocórica ou isovolumétrica) e com variação das três grandezas (transformação geral). O prefixo "iso" vem do grego *isos* e significa "igual".

Transformação isotérmica ou Lei de Boyle

Esse é o tipo de transformação que ocorre quando o gás contido em um recipiente é comprimido sob temperatura constante. Esse processo foi estudado por Robert Boyle (1627-1691). Ele observou que, quando se dobra a pressão em uma massa fixa de gás, seu volume cai pela metade.

Imagine uma seringa de injeção sem agulha, com o orifício obstruído, contendo certa quantidade de gás nitrogênio (N_2). Admitindo que esse gás esteja em condições ideais, ao se dobrar a pressão sobre o êmbolo da seringa, o volume de nitrogênio em seu interior cai pela metade.

Observe a seguir o esquema que ilustra essa situação.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Na seringa, sem agulha e com o orifício obstruído, está contido o gás nitrogênio.

Pode-se dizer, portanto, que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, isto é, quando a pressão aumenta, o volume do gás diminui proporcionalmente.

Observe, na tabela abaixo, os valores de pressão e de volume de determinada massa fixa de gás.

Pressão (atm)	Volume (mL)	Produto $p \cdot V$
1	8	8
2	4	8
4	2	8
8	1	8

Se os valores de pressão e volume forem colocados em um gráfico, para cada situação observa-se a formação de uma curva.



AM Produções Gráficas/ID/BR

Gráfico de pressão (atm) × volume (L).

A relação entre pressão e volume antes e depois da transformação para gases em condições ideais é expressa por:

$$p_1V_1 = p_2V_2 \text{ ou } pV = \text{constante}$$

Transformação isobárica ou Lei de Gay-Lussac

Em 1802, o físico e químico francês Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), ao estudar o comportamento do volume e da temperatura de uma massa fixa de gás sob pressão constante, observou que o volume era diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Isso significa que, nessas condições, quando a temperatura termodinâmica de um gás dobra, seu volume também dobra.

Imagine que a seringa de injeção do exemplo anterior, contendo certo volume de gás nitrogênio (N_2), seja feita de material resistente a altas temperaturas.

Observe, no esquema abaixo, que a pressão que age sobre o êmbolo do cilindro é a mesma.



Reinaldo Vignati/ID/BR

A tabela abaixo fornece os valores de volumes e de temperaturas para o aquecimento de 4 mL de um gás ideal, inicialmente, a 200 K.

Volume (mL)	Temperatura (K)	Relação $\frac{V}{T}$
4	200	$\frac{1}{50}$
8	400	$\frac{1}{50}$

Se os valores de volume e de temperatura forem colocados em um gráfico, para cada situação observa-se a formação de uma reta.



AM Produções Gráficas/ID/BR

Gráfico de volume (mL) × temperatura (K).

O volume e a temperatura, portanto, relacionam-se da seguinte maneira:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \text{ ou } \frac{V}{T} = \text{constante} \quad \text{(em condições ideais)}$$

Transformação isocórica (isovolumétrica) ou Lei de Charles e Gay-Lussac

Em 1787, o físico francês Jacques Charles (1746-1823) estudou a relação entre a pressão e a temperatura termodinâmica de uma massa fixa de gás sob volume constante e observou que, quando se dobrava a temperatura termodinâmica, a pressão do gás também dobrava.

Observe, no esquema a seguir, a relação entre pressão e temperatura.



Reinaldo Vignati/ID/BR

A tabela abaixo fornece os valores de pressão e temperatura para o aquecimento de um gás ideal, inicialmente, a 50 kPa e 300 K.

Pressão (kPa)	Temperatura (K)	Relação $\frac{p}{T}$
50	300	$\frac{1}{6}$
100	600	$\frac{1}{6}$

Se os valores de pressão e temperatura forem colocados em um gráfico, este será uma reta.



AM Produções Gráficas/ID/BR

Gráfico de pressão (kPa) × temperatura (K).

A pressão e a temperatura, portanto, relacionam-se da seguinte maneira:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \text{ ou } \frac{P}{T} = \text{constante} \quad \text{(em condições ideais)}$$

Equação geral dos gases

Quando uma massa fixa de gás sofre uma transformação em que as três grandezas (pressão, volume e temperatura) se alteram, a relação $\frac{pV}{T}$ permanece constante. A relação entre o estado inicial e o final pode ser expressa por uma equação, como a apresentada abaixo.

$$\frac{p_i V_i}{T_i} = \frac{p_f V_f}{T_f}$$

Essa equação é chamada equação geral dos gases.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Um passageiro embarcou em um avião que vai decolar de um aeroporto localizado ao nível do mar. No início da viagem, o volume intestinal de gás desse passageiro é de 180 mL. Avalie o que acontece com o ar do intestino, considerando que a pressão da cabine chegue à metade da pressão na decolagem. Desconsidere as mudanças de temperatura.

Resolução:

Como a temperatura é constante, deve-se avaliar as variáveis pressão e volume. Inicialmente, o volume ocupado pelo gás é de 180 mL, a uma pressão de 1 atm (pressão atmosférica a nível do mar). Quando a pressão cai para 0,5 atm (metade da pressão na decolagem), o volume de gás deve dobrar, uma vez que são grandezas inversamente proporcionais.

Não escreva no livro.

Transformações gasosas

Vimos, neste capítulo, que os gases podem passar por transformações provocadas pela variação de pressão, de volume e de temperatura. Mas como essas grandezas se relacionam em cada transformação? Nesta atividade, você e os colegas terão a oportunidade de simular as transformações gasosas que ocorrem em uma massa fixa de gás, por meio de um aplicativo digital.

Material

Computador, *notebook* ou *tablet* com internet para acessar o simulador disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_all.html?locale=pt_BR (acesso em: 2 out. 2024).

Como fazer

1. Acesse o simulador Propriedade dos Gases e selecione a opção "Explorar" para exibir a seguinte tela.
2. Selecione o pistão móvel e mova-o para cima e para baixo cinco vezes para injetar partículas de gás no recipiente, representadas pelas esferas roxas.
3. Espere até que todas as partículas estejam em movimento dentro do recipiente. No painel de controle do simulador, selecione a opção para manter o volume (V) constante.
4. Anote o valor de temperatura e de pressão exibidos nos mostradores. Depois, utilize o controle de temperatura para aumentar a temperatura do sistema. Observe o que acontece com as partículas de gás e faça anotações sobre seu comportamento. Anote também o valor de pressão exibido após o aumento da temperatura.



Phet Colorado. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_all.html?locale=pt_BR>. Acesso em: 5 ago. 2024.

5. No painel de controle, altere a opção para temperatura constante.
6. Utilizando o controlador da largura do recipiente, desloque-o para a esquerda, observe o comportamento das partículas do gás e anote suas observações. Em seguida, anote o valor de pressão exibido após o deslocamento do controlador de largura.
7. No painel de controle, altere a opção para pressão constante. Para este experimento, recomenda-se selecionar a opção "Pressão ↕V". Anote o valor da pressão exibido.
8. Utilizando o controlador de temperatura, aumente a temperatura do sistema e observe o comportamento das partículas do gás e o que acontece com o volume do sistema e anote suas observações.

Para concluir

1. O aumento da temperatura provoca o aumento da pressão do gás. Pode-se observar o aumento na velocidade das moléculas e o aumento do número de colisões entre elas e com as paredes do recipiente.

1 **Na etapa 4, após o aumento da temperatura, o que aconteceu com a pressão do sistema? Explique o que você observou com base nas características dos gases.**

2 **Na etapa 6, após o aumento da largura do recipiente, por que a pressão do sistema diminuiu? Explique.**

3 **Na etapa 7, a pressão foi mantida constante. Como pode ser explicado, nesse caso, o que acontece com a largura do recipiente quando se aumenta a temperatura?**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. Porque com o aumento do volume há mais espaço disponível para a movimentação das moléculas, o que diminui a ocorrência de choques contra as paredes do recipiente, resultando, assim, em menor pressão no recipiente.

QUÍMICA E BIOLOGIA

A PRODUÇÃO DE BIOGÁS

Projetos de geração de energia limpa

O biogás é uma mistura gasosa inflamável produzida pela decomposição de matéria orgânica na ausência de gás oxigênio. A composição do biogás varia de acordo com o tipo de material orgânico e do tratamento anaeróbio utilizado. De maneira geral, o biogás bruto apresenta, em volume, cerca de 50% de metano (CH_4), 40% de dióxido de carbono (CO_2) e 10% de outros gases, como sulfeto de hidrogênio (H_2S), nitrogênio (N_2) e amônia (NH_3).

O biogás ocorre naturalmente em pântanos, mangues, lagos e rios, mas também pode ser obtido, de forma artificial, em reservatórios, chamados de **biodigestores**, que utilizam matéria orgânica proveniente, por exemplo, de dejetos humanos e de animais, lodo de esgotos, restos de comida e resíduos agrícolas. No processo, além da formação do biogás, ocorre a produção de um líquido, o chorume, que apresenta propriedades fertilizantes e, por isso, é utilizado como adubo em plantações.

Observe ao lado um exemplo de sistema que utiliza biodigestor.



AMj Studio/ID/BR

Representação de um sistema de biodigestão. As setas azuis indicam o fluxo de água; as marrons, o fluxo de dejetos animais; e as amarelas, o fluxo de fertilizante. Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Oliveira Júnior, F. Manual de construção do biodigestor rural. [*S. l.*], [20--]. Disponível em: https://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20140917140023.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

Conecte as ideias

1. Resposta pessoal. Algumas doenças podem ser citadas pelos estudantes, como amebíase, giardíase, hepatite A, ascaridíase, entre muitas outras.

2. a) Organismos aeróbios realizam a respiração celular com a utilização de oxigênio. Os organismos anaeróbios não utilizam esse gás e, em algumas espécies, a presença dele prejudica o metabolismo e a vida desses organismos. **b)** $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(g)$

1 **Fezes humanas também podem ser aproveitadas para produzir o biogás, mas, nesse caso, os resíduos não devem ser reutilizados como adubo para evitar contaminação por micro-organismos patogênicos. Pesquise e cite três possíveis doenças que podem ser veiculadas por alimentos irrigados com água contaminada por dejetos humanos.**

2 **Nos biodigestores, as bactérias metanogênicas, anaeróbias, liberam, como produtos do processo de respiração, o gás metano e o dióxido de carbono.**

a) Explique a diferença entre organismos aeróbios e anaeróbios.

b) A energia proveniente da combustão do CH_4 presente no biogás pode ser utilizada para movimentar motores, aquecer ambientes ou água e iluminar locais. Escreva a equação química balanceada que representa sua combustão completa.

3 **O tratamento do biogás antes da queima elimina algumas substâncias nocivas à fauna e à flora, como o sulfeto de hidrogênio. A combustão dessa substância produz dióxido de enxofre (um poluente atmosférico) e água.**

a) Escreva a equação que representa a combustão do sulfeto de hidrogênio. $2\ H_2S(g) + 3\ O_2(g) \rightarrow SO_2(g) + 2\ H_2O(g)$

b) Por que o H_2S é nocivo ao meio ambiente e aos organismos vivos?
O sulfeto de hidrogênio pode ser fatal caso inalado, pois age sobre o sistema nervoso central. Sua queima gera dióxido de enxofre, uma das substâncias responsáveis pela chuva ácida.

Não escreva no livro.

ATIVIDADES

6. Sim, é possível, pois os gases podem se comprimir e ocupar o volume do recipiente que os contém. É possível manter a temperatura constante se a variação de volume for acompanhada de uma variação na pressão.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **Em um laboratório, um pesquisador mantém determinada massa de gás a uma temperatura de 373 K e a uma pressão de 2,50 atm. Supondo que não haja nenhuma variação de volume, qual a nova temperatura do gás se a pressão cair a 1,50 atm?**

Resolução:

De acordo com a situação apresentada, a temperatura inicial (T_1) é 373 K e a pressão inicial (p_1) é 2,50 atm. A temperatura final (T_2) ainda é desconhecida e a pressão final (p_2) é de 1,50 atm. Nesse caso, dado que o volume é constante, pode-se aplicar a lei de Charles e Gay-Lussac:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\frac{2,5}{373} = \frac{1,5}{T_2}$$

$$T_2 = 223,8 \text{ K}$$

3. Em São Paulo, pois sua altitude média é maior que a de Ribeirão Preto e, portanto, a pressão atmosférica é menor.

2 **Avalie e justifique os fenômenos relacionados nos itens a seguir de acordo com o comportamento esperado para os gases.**

a) Se determinada massa de gás for colocada em um recipiente de volume igual à metade do inicial sem que a temperatura seja afetada, haverá duplicação de sua pressão.

b) O gás não exerce pressão quando sua temperatura corresponde a zero Kelvin.

c) Um gás pode se expandir ou se contrair para ocupar o volume do recipiente.

d) A temperatura de um gás está relacionada com a agitação de suas partículas.

Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Observe, na figura a seguir, que a cidade de São Paulo está localizada a uma altitude de 760 metros, em média, acima do nível do mar. Ribeirão Preto, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, tem altitude média de 560 metros. Em qual das duas cidades o barômetro de Torricelli apresenta coluna com menor altura de mercúrio? Por quê?**

Reinaldo Vignati/ID/BR



4 **Avalie se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique.**

a) Quanto maior o número de colisões entre as partículas de um gás e com as paredes do recipiente em que está contido, maior será a pressão desse gás.

b) A pressão que os gases exercem sobre a superfície da Terra é a mesma em todos os lugares.

c) Os gases apresentam volume fixo.

Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 **A pressão atmosférica em Plutão corresponde a 0,30 Pa. Sabendo que em Vênus a pressão é 90 vezes maior que a da Terra, compare a diferença de pressão entre Plutão e Vênus.** Pressão em Vênus = $9,1 \cdot 10^6$ Pa (muito maior que a de Plutão).

6 **Um recipiente de 2 litros contém certa quantidade de um gás a determinada temperatura. É possível guardar essa quantidade de gás em outro recipiente cujo volume seja de 1 litro, mantendo a mesma temperatura? Justifique.**

7 **Observe a figura a seguir. Inicialmente, o ar está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa a outra parte. Calcule a temperatura final no estado II, desconsiderando o volume do tubo que liga os dois compartimentos do aparelho.** 440 K.



Reinaldo Vignati/ID/BR

8 **Jogadores de futebol acostumados a treinar ao nível do mar, como na cidade do Rio de Janeiro, encontram vários problemas ao jogarem em altitudes maiores, como em estádios localizados em outros países da América do Sul. Um desses problemas é a bola. Em sua opinião, qual seria a diferença de comportamento de uma bola de futebol ao nível do mar e a uma altitude em torno de 3 600 m?**

JackKPhoto/Shutterstock.com/ID/BR

Estádio Hernando Siles, localizado a 3 660 metros de altitude. La Paz, Bolívia. Foto de 2022.

8. Como a resistência do ar é menor, chutando com a mesma força a bola perde menos velocidade até chegar ao gol.

Não escreva no livro.

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
2. Eles contribuem para a acidificação da chuva e o aquecimento global.

FUNÇÕES INORGÂNICAS

PARA COMEÇAR

1. Como corrigir solos ácidos?
2. Qual é a relação entre os óxidos e a poluição atmosférica?
3. Como são formados os sais?

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES QUÍMICAS

A acidez do solo é um fator limitante na produtividade de diferentes culturas agrícolas, tanto no Brasil quanto em outros países. O aumento da produção de alimentos, somado a outras ações governamentais e de órgãos internacionais, é fundamental para a erradicação da fome no mundo.

Os solos ácidos são ruins para o cultivo, pois apresentam deficiência e toxicidade nutricionais, baixa capacidade de reter água e baixa atividade de microrganismos.

Em seu estado natural, o Cerrado brasileiro, maior bioma do país, com cerca de 2 milhões de km^2, teria baixa produtividade agrícola, mas a correção da acidez do solo tem possibilitado um aumento considerável dos níveis de produtividade. Entretanto, há desafios nesse processo: o manejo adequado e sustentável do solo com o uso de corretivos e fertilizantes, e a preservação da mata nativa.

Neste capítulo, você vai saber um pouco mais sobre os ácidos e as demais funções da Química Inorgânica, bem como sobre as aplicações desses conhecimentos em diversas áreas de nossa sociedade.

A produtividade agrícola no Cerrado brasileiro impulsiona a economia do país. Brazlândia (DF). Foto de 2021.

Adriano Kirihara/Pulsar Imagens

Não escreva no livro.

FUNÇÕES INORGÂNICAS

As substâncias podem ser classificadas em **orgânicas** e **inorgânicas**. As substâncias orgânicas apresentam átomos de carbono, os quais, geralmente, formam estruturas de átomos de carbono ligados entre si. Algumas dessas substâncias são a sacarose (açúcar comum), o etanol (álcool etílico) e o ácido acético (presente no vinagre). As substâncias inorgânicas, direta ou indiretamente, são de origem mineral, como o sulfato de cálcio ($CaSO_4$) e o nitrato de sódio ($NaNO_3$), entre outras. Algumas delas contam também com átomos de carbono, como o dióxido de carbono (CO_2) e o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) – presente em materiais calcários.

Para facilitar o estudo, as substâncias inorgânicas são divididas em quatro grupos principais chamados **funções inorgânicas**, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos.

ÁCIDOS

Cada tipo de função inorgânica reúne compostos com propriedades semelhantes. Certas propriedades dos ácidos são usadas para identificá-los, como as relacionadas a seguir.

- **Os ácidos são substâncias que liberam íons H_3O^+** quando estão em solução aquosa.
- **Os ácidos são eletrólitos**, pois sofrem ionização em água, gerando uma solução condutora de corrente elétrica.
- **Os ácidos reagem com carbonatos** (CO_3^{2-}) e **bicarbonatos** (HCO_3^-), produzindo gás carbônico (CO_2).
- **Os ácidos reagem com vários metais**, corroendo-os e produzindo gás hidrogênio.
- **Os ácidos atuam sobre a cor de indicadores ácido-base**, substâncias que assumem cores diferentes, dependendo da acidez ou da basicidade da solução. A fenolftaleína é um indicador ácido-base, por exemplo. Uma solução de fenolftaleína dissolvida em etanol é incolor em meio ácido e em meio neutro, ou em meio levemente básico, e adquire coloração rósea em meio fortemente básico. Uma tira de papel poroso, impregnado com um indicador chamado tornassol, adquire a cor vermelha quando imersa em solução ácida e fica azul após o contato com uma solução de caráter básico.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Em (**A**), dois tubos de ensaio com fenolftaleína. À esquerda indicando um meio que pode ser ácido, neutro ou levemente básico, e à direita, um meio fortemente básico. Em (**B**), papel de tornassol azul após ser imerso em meio ácido. Em (**C**), papel de tornassol vermelho após ser imerso em meio básico.

DE OLHO NO CONCEITO

Soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas

As substâncias que, quando dissolvidas em água, originam soluções condutoras de corrente elétrica são chamadas **eletrólitos**. As misturas formadas são denominadas soluções iônicas ou eletrolíticas. Os íons livres ou solvatados, isto é, cercados de moléculas de água, são responsáveis pela condutibilidade das soluções eletrolíticas.

As soluções eletrolíticas conduzem bem a eletricidade por apresentarem íons livres. São formadas a partir de compostos iônicos, submetidos a dissociação iônica, ou a partir de compostos moleculares que, quando dissolvidos em água, produzem íons. As soluções não eletrolíticas conduzem mal a eletricidade porque têm íons livres em concentração muito baixa.

Não escreva no livro.

Principais ácidos e suas aplicações

Os ácidos têm variadas aplicações industriais e, a partir deles, muitos produtos são obtidos. A seguir, conheça as características de alguns dos ácidos mais importantes, na forma em que são produzidos e comercializados.

Adriano Kirihara/Pulsar Imagens

Aplicação de pesticida em plantação em Campo Mourão (PR). O ácido sulfúrico e o ácido nítrico são usados na fabricação de inseticidas e de fertilizantes. Foto de 2020.

Ácido sulfúrico (H_2SO_4)

Ácido sulfúrico é o nome comercial da solução aquosa de sulfato de hidrogênio, que contém cerca de 97% em massa dessa substância. O sulfato de hidrogênio é um líquido incolor muito viscoso, corrosivo e denso (d = 1,83 g/cm³ a 20 °C), que entra em ebulição a 337 °C (a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa). É um agente desidratante poderoso, que provoca severas queimaduras em contato com a pele, carbonizando também alguns compostos orgânicos, como os açúcares e a celulose.

O ácido sulfúrico é infinitamente solúvel em água. A dissolução é um processo que libera muito calor e, portanto, deve-se adicionar lentamente o ácido sobre a água.

Esse ácido é usado em vários processos industriais: na fabricação de papel, de corantes, de inseticidas, de fertilizantes, de explosivos e de outros ácidos. As baterias de automóvel, por exemplo, contêm soluções aquosas de ácido sulfúrico.

Ácido nítrico (HNO_3)

O ácido nítrico comercial é uma solução aquosa que contém cerca de 70% em massa de nitrato de hidrogênio. Trata-se de um líquido incolor muito corrosivo, que entra em ebulição a 83 °C (a $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa). Seus vapores são extremamente tóxicos. Essa substância produz queimaduras e manchas em contato com a pele.

O ácido nítrico é usado na fabricação de corantes, de pesticidas, de fertilizantes, de explosivos (TNT e nitroglicerina) e de fibras sintéticas (náilon e seda artificial).

Ácido clorídrico ($HC\ell$)

O ácido clorídrico é uma solução aquosa que contém cerca de 37% em massa do gás cloreto de hidrogênio. Esse gás, quando puro, é incolor, muito tóxico e corrosivo.

Essa substância, em solução aquosa, é muito usada na limpeza de metais, no curtimento de couros e na obtenção de vários produtos. O ácido muriático, uma solução aquosa que contém ácido clorídrico, é comercializado para a limpeza de pisos, azulejos e superfícies metálicas.

Cozine/Shutterstock.com/ID/BR

Bebidas como refrigerantes devem ser consumidas com cautela, pois, além de não conterem nutrientes, apresentam ácido fosfórico em sua composição, substância que dificulta a absorção de cálcio pelo organismo.

Ácido fosfórico (H_3PO_4)

Ácido ortofosfórico ou ácido fosfórico, como é mais conhecido, são nomes usuais do ortofosfato de hidrogênio ou fosfato de hidrogênio. Essa substância é incolor e líquida em condição ambiente, na qual apresenta densidade de, aproximadamente, 1,71 g/cm³ a 20 °C. É solúvel em água em qualquer proporção.

Suas soluções aquosas são empregadas como conservantes na fabricação de refrigerantes, principalmente os do tipo cola (0,6 g de ácido fosfórico para cada litro de solução), na indústria farmacêutica, no preparo de fertilizantes, em produtos antiferrugem, além de em outras aplicações.

Força dos ácidos

Por meio da medida da condutibilidade elétrica das soluções, é possível verificar a extensão da ionização dos ácidos e classificá-los de acordo com seu **grau de ionização** (α), que indica a porcentagem de moléculas que ionizam em relação ao total de moléculas dissolvidas.

$$\alpha = \frac{\text{número de moléculas ionizadas}}{\text{número de moléculas dissolvidas}}$$

Não escreva no livro.

Considere os seguintes exemplos.

- HCℓ: a cada 100 moléculas dissolvidas em água, 92 se ionizam.

$$\alpha = \frac{92}{100} = 0{,}92 \text{ ou } 92\% \text{ de moléculas ionizadas}$$

- HF: a cada 100 moléculas dissolvidas em água, apenas 8 se ionizam.

$$\alpha = \frac{8}{100} = 0{,}08 \text{ ou } 8\% \text{ de moléculas ionizadas}$$

O grau de ionização determina a força e várias propriedades dos ácidos, as quais dependem da concentração de $H^+(aq)$ em solução a uma certa temperatura.

Classificação	Grau de ionização em % (α)	Exemplos
Forte	$\alpha\% > 50\%$	HCℓ ($\alpha\% = 92\%$)
Moderado ou médio	$5\% < \alpha\% < 50\%$	HF ($\alpha\% = 8\%$)
Fraco	$\alpha\% < 5\%$	H_2CO_3 ($\alpha\% = 0{,}18\%$)

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C. *et al. Química geral e reações químicas.* São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. v. 1. p. 75-78.

ROTEIRO

1. Tanto o cloreto de hidrogênio puro (HCℓ) como a água pura (H_2O) são péssimos condutores de corrente elétrica. Entretanto, ao misturar as duas substâncias, obtém-se uma solução eletrolítica. Explique essas observações experimentais.
2. Qual é a relação entre o grau de ionização de um ácido e a condutividade elétrica de sua solução aquosa?
3. Soluções aquosas formadas pela dissolução de um mesmo ácido podem apresentar diferentes condutividades elétricas? Justifique sua resposta.

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Nomenclatura dos ácidos inorgânicos

A nomenclatura dos ácidos é feita pelo nome dos ânions formados em sua ionização total ou parcial.

		Sufixo do ânion		Sufixo do ácido
ácido	////////////////// (nome do ânion com troca do sufixo)	eto	→	**ídrico**
		ato	→	**ico**
		ito	→	**oso**

O quadro a seguir mostra alguns exemplos. Consulte-o sempre que necessário.

EXEMPLOS DE ÂNIONS (CARGAS)					
Nº de carga 1⁻	**Nº de carga 1⁻**	**Nº de carga 2⁻**	**Nº de carga 2⁻**	**Nº de carga 3⁻**	**Nº de carga 4⁻**
F^- fluoreto	NO_2^- nitrito	S^{2-} sulfeto	SiO_3^{2-} metassilicato	PO_4^{3-} fosfato	$P_2O_7^{4-}$ pirofosfato
Cl^- cloreto	NO_3^- nitrato	SO_3^{2-} sulfito	HPO_3^{2-} fosfito	BO_3^{3-} borato	SiO_4^{4-} silicato
Br^- brometo	CN^- cianeto	SO_4^{2-} sulfato	CrO_4^{2-} cromato	$Fe(CN)_6^{3-}$ ferricianeto	$Fe(CN)_6^{4-}$ ferrocianeto
I^- iodeto	OCN^- cianato	$S_2O_3^{2-}$ tiossulfato	$Cr_2O_7^{2-}$ dicromato	—	—
ClO^- hipoclorito	SCN^- tiocianato	CO_3^{2-} carbonato	MnO_4^{2-} manganato	—	—

Quadro elaborado para fins didáticos.

Fórmulas dos ácidos

Com o auxílio do quadro de ânions, é possível escrever a fórmula do ácido a partir do seu nome. Nesse procedimento, o número de átomos de hidrogênio ionizáveis por fórmula é numericamente igual à carga elétrica do ânion. Lembre-se, no entanto, de que os ácidos são compostos moleculares e os átomos de hidrogênio estão ligados ao restante da estrutura por ligações covalentes.

- Etmologicamente, enxofre deriva da palavra latina "sulphur" e, por isso, os ácidos oxigenados do enxofre apresentam em seus nomes as letras "ur" antes do sufixo ico ou oso.
- Os ácidos do fósforo apresentam, em seus nomes, as letras "or" antes do sufixo ico ou oso.

Ânion	Nome do ácido com sufixo trocado	Fórmula do ácido
S^{2-} sulfeto	ácido sulfídrico	H_2S
SO_4^{2-} sulfato	ácido sulfúrico	H_2SO_4
SO_3^{2-} sulfito	ácido sulfuroso	H_2SO_3

Quadro elaborado para fins didáticos.

BASES

O leite de magnésia e a soda cáustica são exemplos de produtos que contêm substâncias com propriedades químicas que caracterizam outra importante função inorgânica, as bases. Assim como os ácidos, elas apresentam algumas propriedades em comum (propriedades funcionais). Conheça algumas delas.

- **As bases formam soluções eletrolíticas** quando misturadas em água. As bases fortes são eletrólitos fortes (elevado grau de dissociação). As bases fracas, por terem baixa solubilidade em água e/ou baixo grau de dissociação, apresentam também baixa condutibilidade elétrica. Algumas bases, como os hidróxidos alcalinos, são ótimos eletrólitos, quando fundidos. A fusão provoca a liberação dos íons porque o retículo cristalino se desfaz. Os íons livres tornam o meio um condutor de corrente elétrica.
- **As bases reagem com ácidos** por meio da **reação de neutralização**. Os ácidos são neutralizados por bases, e vice-versa, pois os íons $H^+(aq)$ presentes na solução ácida reagem com os íons $OH^-(aq)$ da solução básica, formando água.

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(\ell)$$

- **As bases atuam sobre a cor dos indicadores ácido-base**. O extrato de repolho roxo, por exemplo, quando em contato com uma solução alcalina, tem sua cor alterada, ou seja, passa do roxo para o azul ou para o verde, dependendo da concentração de íons hidroxila (OH^-) presentes na solução.

Principais bases e aplicações

Assim como os ácidos, as bases estão presentes em vários produtos usados diariamente.

Hidróxido de sódio (NaOH)

O hidróxido de sódio é um sólido branco, bastante solúvel em água, altamente corrosivo. Em contato com a pele, provoca queimaduras severas. Comercializado como soda cáustica, é muito utilizado, por exemplo, em uma das etapas do processo de fabricação do papel, de tecidos e de produtos de uso doméstico.

Por reagir com óleos e com gorduras, é matéria-prima na fabricação de sabões, e também é usado para desentupir pias. A dissolução do hidróxido de sódio em água libera energia. Por essa razão, recomenda-se não usar água quente em seu uso no desentupimento de pias e ralos, pois a temperatura pode ficar muito alta e causar danos às tubulações.

Hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$)

O hidróxido de cálcio é um sólido branco, pouco solúvel em água. É chamado cal hidratada, cal extinta ou cal apagada e, quando misturado à água e posteriormente filtrado, dele se obtém uma solução aquosa chamada água de cal. É usado na produção de argamassas e de tintas para a construção civil, na correção da acidez de solos na agricultura, no tratamento da água, em tratamentos odontológicos, entre outras aplicações.

Hidróxido de magnésio ($Mg(OH)_2$)

O hidróxido de magnésio é um sólido branco, muito pouco solúvel em água. Quando misturado à água, forma uma suspensão aquosa (mistura heterogênea) vendida comercialmente com o nome de leite de magnésia, um medicamento indicado para diminuir a acidez estomacal. Se ingerido em grande quantidade, tem efeito laxante.

AÇÃO E CIDADANIA

A história do sabão

Uma das hipóteses para o surgimento do sabão remonta aos povos pré-históricos, que, ao assarem a carne no fogo, devem ter notado, após pancadas de chuva, o aparecimento de uma espuma ao redor dos resíduos da fogueira e que as mãos ficavam mais limpas quando lavadas com essa espuma.

O sábio romano Plínio (23 ou 24 d.C.-79 d.C.) já mencionava a preparação do sabão ao se cozer sebo de carneiro com cinzas de madeira.

O processo de fabricação do sabão teve início no século XIII, com a utilização de materiais alcalinos (cinzas) e de materiais com alto teor de gordura, e foi aperfeiçoado com a substituição das cinzas pela lixívia – rica em hidróxido de potássio –, obtida pela passagem de água por mistura de cinza e cal, até o sistema atual, no qual se usa o hidróxido de sódio.

Fonte de pesquisa: Como ocorreu a história do sabão. *Clube da Química*, [*s. l.*], 9 set. 2023. Disponível em: https://clubedaquimica.com/2023/05/09/como-ocorreu-a-historia-do-sabao/. Acesso em: 18 set. 2024.

1. Discuta com os colegas sobre como a observação e a investigação de fenômenos podem contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e processos.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Amônia (NH_3)

A amônia, também chamada amoníaco, é um gás incolor, de cheiro forte e irritante. É utilizada na fabricação de ácido nítrico (HNO_3), explosivos, amaciantes de roupas, tinturas e alisantes para cabelos, desinfetantes, e, também, em sistemas de refrigeração. Apesar das várias aplicações, sua maior importância está vinculada à produção de fertilizantes.

Graças à síntese da amônia, considerada uma das descobertas mais importantes do século XX, a produção de fertilizantes nitrogenados levou a um aumento de 30% a 50% na produção agrícola. Estima-se que metade da população mundial tenha sua alimentação associada ao processo que ficou conhecido como Haber-Bosch.

Apesar de o gás nitrogênio (N_2) corresponder a cerca de 78% da atmosfera terrestre, a maioria dos seres vivos não consegue fixá-lo em compostos utilizáveis, como a amônia, e dependem, para isso, da atividade simbiótica de algumas espécies de bactérias (diazotróficas).

Há mais de cem anos, o químico alemão Fritz Haber (1868-1934), Nobel de Química de 1918 pela síntese da amônia, propôs uma forma de transformar os gases N_2 e H_2 em amônia (NH_3), utilizando temperaturas e pressões elevadas, na presença de ferro metálico como catalisador. Posteriormente, outro químico alemão, Carl Bosch (1874-1940), Nobel de Química de 1931, desenvolveu a síntese da amônia em escala industrial.

Ao borbulhar amônia em água, ocorrem as seguintes reações:

$$NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow NH_3 \cdot H_2O(aq) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

O grau de ionização da amônia é baixo, sendo, portanto, uma base fraca. De forma geral, em relação à força, podemos classificar as bases em fortes ou fracas.

Bases fortes: são as bases de metais alcalinos e alcalino-terrosos, exceto $Mg(OH)_2$.

Bases fracas: são as demais bases, incluindo $Mg(OH)_2$ e a amônia.

F.Neid/Shutterstock.com/ID/BR

Bactérias diazotróficas formam nódulos em raízes de leguminosas, fixando nitrogênio, que é absorvido pelas plantas na forma de íons amônio.

ROTEIRO

Os íons NH_4^+ e OH^- são formados pela reação de ionização da amônia em água. Não existe a substância NH_4OH e o nome hidróxido de amônio (inadequado, porém usado) é empregado apenas nas soluções aquosas de amônia.

4. Equacione a reação de ionização da amônia em água.

5. Por que a amônia é considerada uma base se não apresenta o grupo OH^- (hidróxido ou hidroxila) em sua fórmula?

4. $NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

5. Porque a amônia libera íons OH^- ao ser dissolvida em água, como observado na reação de ionização.

Nomenclatura das bases

A nomenclatura das bases depende da carga elétrica do cátion ligado ao íon hidróxido, que pode ser fixa ou variável. Note que a quantidade de íons OH^- é numericamente igual à carga elétrica do cátion formador da base.

Observe alguns exemplos.

Cátion formador	Fórmula da base	Nome da base
Na^+ (sódio)	$NaOH$	hidróxido de sódio
Ca^{2+} (cálcio)	$Ca(OH)_2$	hidróxido de cálcio
$A\ell^{3+}$ (alumínio)	$A\ell(OH)_3$	hidróxido de alumínio
Fe^{3+} (ferro(III))	$Fe(OH)_3$	hidróxido de ferro(III) ou hidróxido férrico
Ni^{2+} (níquel(II))	$Ni(OH)_2$	hidróxido de níquel(II) ou hidróxido niqueloso

Importante:

- Se um mesmo metal formar mais de um cátion, é necessário indicar sua carga elétrica, em numerais romanos, ao lado do nome do elemento.
- Também é possível diferenciar os metais que apresentam mais de uma carga elétrica pelos sufixos **ico** (carga maior) e **oso** (carga menor), forma não recomendada atualmente, mas ainda muito utilizada.

hidróxido de ////////////////// (nome do cátion)

ÓXIDOS

Os óxidos são substâncias formadas geralmente por oxigênio e por outro elemento qualquer, com exceção do flúor (único elemento mais eletronegativo que o oxigênio). Pelo fato de o gás oxigênio reagir com a maioria dos elementos químicos e estar disponível na atmosfera em grande quantidade, há uma enorme variedade de óxidos presentes em nosso cotidiano: o gás carbônico (CO_2), a cal (CaO) e vários minerais, como a hematita (mineral que contém Fe_2O_3), a bauxita (mineral que contém $A\ell_2O_3$), a pirolusita (mineral que contém MnO_2) e o quartzo (mineral constituído de SiO_2), que apresentam óxidos em sua composição.

Com base nesses exemplos, nota-se que há óxidos iônicos, formados por elemento metálico ligado ao oxigênio, óxidos moleculares e óxidos de rede covalente, estes últimos constituídos de elemento não metálico combinado ao oxigênio. Nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo.

Charles D. Winters/Science Source/Fotoarena

DEA/A. Rizzi/De Agostini/Getty Images

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

O gelo-seco (**A**), a hematita (**B**) e a cal (**C**) são exemplos de materiais formados por óxidos.

Nomenclatura dos óxidos

Os óxidos formados por metal geralmente são iônicos, apresentam o oxigênio com carga elétrica 2− e, usualmente, seguem a regra de nomenclatura a seguir.

óxido de ////////////////// (nome do cátion)

Ânion	Fórmula do óxido	Nome do óxido
Na^+ (sódio)	Na_2O	óxido de sódio
Fe^{3+} (ferro (III))	Fe_2O_3	óxido de ferro(III)
Pb^{4+} (chumbo (IV))	PbO_2	óxido de chumbo(IV)

Os óxidos formados por elementos não metálicos ou são moleculares ou são de rede covalente, e o número de átomos de oxigênio e do outro elemento presente na fórmula é indicado por prefixos numéricos em sua nomenclatura. Os óxidos metálicos também podem seguir essa regra de nomenclatura.

////////////////// (prefixo – mono, di, tri, tetra – indicando o nº de átomos de oxigênio) óxido de ////////////////// (prefixo – mono, di, tri, tetra – indicando o nº de átomos do elemento ligado ao oxigênio) ////////////////// (nome do elemento ligado ao oxigênio)

Fórmula do óxido	Nome do óxido
PbO_2	dióxido de chumbo
Fe_2O_3	trióxido de diferro
SO_2	dióxido de enxofre
SO_3	trióxido de enxofre
N_2O	monóxido de dinitrogênio
$C\ell_2O_3$	trióxido de dicloro

AÇÃO E CIDADANIA

Substâncias minerais no cotidiano dos povos indígenas

As comunidades indígenas usam substâncias minerais em diversas situações. Argilas de composições variadas, principalmente as constituídas de silicatos de alumínio e que contêm teores de outros íons metálicos, como ferro, cálcio e potássio, são usadas na produção de utensílios cerâmicos. Alguns objetos utilizados na caça e na pesca, como machadinhas e pontas de lança, são feitos com sílex, rocha dura e resistente formada principalmente por sílica $(SiO_2)_n$.

A ornamentação corporal tem um destaque especial entre as manifestações estéticas indígenas, tanto por suas elaborações quanto por seus aspectos simbólicos. A pintura corporal é feita com pigmentos naturais, como a limonita (óxidos de ferro hidratados, de coloração vermelho-ocre) e a pirolusita (óxido de manganês, de cor preta), além de corantes extraídos de frutos e de sementes.

Os Kayapó usam basicamente três cores para a pintura corporal: o preto, o branco e o vermelho.

O preto é preparado com a mistura de carvão, água e suco da fruta jenipapo. O pigmento vermelho é preparado com sementes secas de urucum misturadas com água e óleo de palmeira. A cor branca é obtida da mistura de argila com determinada quantidade de água.

1. Como o conhecimento indígena sobre pigmentos pode ser útil para a indústria têxtil? Discuta com os colegas.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Classificação dos óxidos

Óxidos básicos

Esses óxidos reagem com a água, formando íons OH^-, e com ácidos, formando sal e água.

$$Na_2O(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ NaOH(aq)$$

óxido de sódio — água — hidróxido de sódio

Óxidos ácidos

Eles reagem com a água, formando ácidos, e com soluções básicas, formando sal e água.

$$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$$

trióxido de enxofre (anidrido sulfúrico) — água — ácido sulfúrico

Óxidos anfóteros

Esses óxidos geralmente são sólidos, que não reagem com água, mas reagem tanto com ácidos fortes como com bases fortes.

Os óxidos anfóteros mais comuns são os de zinco (ZnO) e de alumínio ($A\ell_2O_3$). Entretanto, há outros óxidos anfóteros, formados por metais, como SnO e SnO_2, PbO e PbO_2, Sb_2O_3 e Sb_2O_5, e por semimetais, como As_2O_3 e As_2O_5.

$$ZnO(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2O(\ell)$$

óxido de zinco — ácido sulfúrico — sulfato de zinco — água

Peróxidos

São compostos que contêm o grupo — O — O —. Os mais comuns são os peróxidos de metais alcalinos e alcalinoterrosos e, principalmente, o peróxido de hidrogênio (H_2O_2).

O peróxido de hidrogênio, H — O — O — H, é molecular e líquido em condição ambiente. Em solução aquosa, é vendido em farmácias como água oxigenada.

Os peróxidos alcalinos e alcalinoterrosos são sólidos iônicos, que apresentam o ânion peróxido $(O — O)^{2-}$ ou O_2^{2-} e caráter básico. Exemplos: K_2O_2 (peróxido de potássio), CaO_2 (peróxido de cálcio) e Na_2O_2 (peróxido de sódio).

ROTEIRO

Cinzas de madeira já foram utilizadas na agricultura por apresentarem poder corretivo de acidez de solo. Uma das substâncias presentes nas cinzas capaz de diminuir a acidez do solo é o óxido de potássio (K_2O).

6. Equacione a reação do óxido de potássio com a água.

7. Equacione a reação do óxido de potássio com solução de ácido sulfúrico.

6. $K_2O(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ KOH(aq)$

7. $K_2O(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + H_2O(\ell)$

Óxidos, efeito estufa e aquecimento global

Monóxido de carbono (CO)

O monóxido de carbono é o gás usado nas siderúrgicas para reduzir o óxido de ferro(III), presente na hematita, a ferro metálico.

$$Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \rightarrow 2\ Fe(s) + 3\ CO_2(g)$$

O monóxido de carbono também é produzido na combustão incompleta, no processo de queimadas ou queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Esse gás é considerado um poluente nocivo. A exposição a ele provoca vários sintomas, os quais dependem da quantidade de CO no sangue – dor de cabeça, problemas de visão, redução da capacidade de trabalho –, e até mesmo morte. O fumo passivo e ativo são exemplos de exposição ao monóxido de carbono.

Dióxido de carbono (CO_2)

O dióxido de carbono, popularmente chamado de gás carbônico, está presente naturalmente na atmosfera terrestre em pequena concentração (cerca de 0,04%), sendo essencial para os seres vivos pela sua participação na fotossíntese, processo pelo qual a energia solar é transformada em energia química. Essa energia é repassada aos outros seres vivos pela cadeia alimentar. Plantas e animais restituem o dióxido de carbono à atmosfera pela respiração.

Outros fatores influem no ciclo do carbono –, a queima de combustíveis fósseis, as atividades industriais e de geração de energia, o desmatamento e as queimadas de florestas, as alterações no manejo e na ocupação do solo – e implicam o aumento acentuado da emissão de CO_2 na atmosfera, contribuindo para alterações climáticas importantes, como veremos a seguir.

Não escreva no livro.

Reinaldo Vignati/ID/BR



Representação esquemática do efeito estufa.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M.; Townsend, J. R.; Treichel, D. A. *Chemistry and chemical reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage Learning Inc., 2023. p. 1273.

Gases de efeito estufa (GEE), aquecimento global e mudanças climáticas

O efeito estufa é um processo natural que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície da Terra é absorvida por alguns gases presentes na atmosfera, chamados gases de efeito estufa (GEE). Assim, o calor fica retido na atmosfera terrestre, e é esse fenômeno que mantém o planeta aquecido e possibilita a vida. O aumento excessivo da concentração de GEE, entretanto, implica maior retenção de calor, provocando o aquecimento global e as mudanças climáticas, cujos efeitos temos observado há algum tempo.

Além do dióxido de carbono (CO_2), o metano (CH_4), o monóxido de dinitrogênio (N_2O), o vapor de água (H_2O), o ozônio (O_3) e os clorofluorcarbonetos (CFCs) são outros gases de efeito estufa. Eles podem reter a radiação solar de formas diferentes e permanecer na atmosfera por períodos diferentes de tempo, isto é, apresentam diferentes "poder estufa". O CO_2 não tem o maior "poder estufa", mas a sua abundância na atmosfera o tornou o mais importante GEE. Por isso, acordos internacionais estabelecem metas de diminuição de sua emissão para a atmosfera.

O metano tem poder estufa muito superior ao do CO_2 e sua concentração também vem crescendo de forma alarmante. Ele é gerado por determinadas bactérias a partir de matéria orgânica em decomposição como, por exemplo, em intestinos de animais ruminantes ou em plantações de arroz em áreas inundadas. Dentre as origens antropogênicas, a agropecuária tem sido responsável pela emissão de quantidades preocupantes de gás metano.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), "As atividades humanas, principalmente através das emissões de gases de

Adaptações baseadas em ecossistemas podem proteger vidas e meios de subsitência das ameaças trazidas pelo aquecimento global.

Comissão Global de Adaptação, 2019/WRI Brasil

Fonte de pesquisa: World Resources Institute. Disponível em: https://www.wribrasil.org.br/noticias/10-conclusoes-do-relatorio-do-ipcc-sobre-mudancas-climaticas-de-2023. Acesso em: 10 out. 2024.

Não escreva no livro.

efeito estufa, inequivocamente causaram o aquecimento global, [...] decorrentes do uso insustentável de energia, do uso da terra e da mudança no uso da terra, dos estilos de vida e dos padrões de consumo e produção [...].” “[...] Ocorreram mudanças generalizadas e rápidas na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera. A mudança do clima causada pelo homem já está afetando muitos extremos climáticos e meteorológicos em todas as regiões do mundo. Isto vem resultando em impactos adversos generalizados, e perdas e danos relacionados, à natureza e às pessoas [...].”

IPCC. Mudança do clima. Relatório Síntese – 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/copy_of_IPCC_Longer_Report_2023_Portugues.pdf. Acesso em: 19 set. 2024.

PARA EXPLORAR

Acesse

Efeito Estufa

Nesse simulador do projeto PhET Simulações Interativas, da Universidade do Colorado em Boulder, é possível variar a concentração de GEE na atmosfera e observar o que ocorre com a temperatura na superfície da Terra, além de mostrar historicamente essas variações.

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/greenhouse-effect. Acesso em: 19 set. 2024.

Chuva ácida

As chuvas normais são naturalmente ácidas pela presença do dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera, que, ao se misturar na água, forma o ácido carbônico (H_2CO_3). Embora fraco, esse ácido faz o pH da água da chuva normal aproximar-se de 5,6.

A chuva ácida apresenta pH inferior a 5,6, principalmente devido à presença de óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é a maior fonte desses óxidos. A mistura desses óxidos na água da chuva implica a formação dos ácidos sulfuroso (H_2SO_3), sulfúrico (H_2SO_4), nitroso (HNO_2) e nítrico (HNO_3).

A chuva ácida provoca vários e sérios prejuízos. Ela pode tornar os solos improdutivos e enfraquecer a vegetação, devido à dissolução e ao arraste de nutrientes do solo. Cátions metálicos como o $A\ell^{3+}$ são liberados pela ação da chuva ácida, comprometendo o ecossistema e toda a cadeia alimentar envolvida.

Além disso, monumentos feitos de calcário, mármore, metais e de outros materiais têm sido destruídos pela chuva ácida, que também contribui para a corrosão de materiais usados na construção de casas, edifícios, pontes, entre outras edificações.

Ismar Ingber/Pulsar Imagens

Estátua do profeta bíblico Daniel, no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Congonhas (MG). A imagem mostra o desgaste provocado pela ação de agentes biológicos, como fungos e liquens, e pela chuva ácida. Foto de 2023.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Uma usina termoelétrica gera energia elétrica a partir da energia liberada na queima de materiais combustíveis como, por exemplo, o carvão. A energia liberada na combustão desses materiais aquece a água, gerando vapor, que gira as pás das turbinas conectadas a geradores que transformam energia mecânica em energia elétrica.

Nesse processo, são gerados gases como o dióxido de carbono (CO_2), dióxido de nitrogênio (NO_2), o dióxido de enxofre (SO_2) e o trióxido de enxofre (SO_3), que não devem ser emitidos diretamente ao ambiente.

a) Considere as substâncias $CaCO_3$, NaOH, CaO e K_2CO_3. Qual(is) poderia(m) ser colocada(s) no filtro para a absorção e retenção dos gases produzidos no processo citado?

b) Os óxidos de nitrogênio, como o NO_2, e óxidos de enxofre, como o SO_2 e SO_3, são gases poluentes associados a que fenômeno ambiental indesejável?

Resolução:

a) A escolha mais adequada para a finalidade é NaOH (base) e CaO (óxido básico). Os gases citados no enunciado são óxidos ácidos. Esses gases podem ser absorvidos por substâncias de caráter básico. Das opções, evita-se o uso de carbonatos, porque podem reagir produzindo mais CO_2, gás de efeito estufa.

b) São associados à chuva ácida. Os óxidos do nitrogênio e os óxidos do enxofre reagem com a água da chuva produzindo ácidos fortes (ácido nítrico e ácido sulfúrico), capazes de reduzir o pH da água da chuva a valores inferiores a 5,6.

Simulando a chuva ácida

A chuva ácida pode causar diversos problemas ao meio ambiente. Neste experimento, você e os colegas vão reproduzir a chuva ácida em pequena escala para entender como ela atua nas superfícies.

Material

- forma de gelo, de preferência com as cavidades bem pequenas
- repolho roxo cortado em pequenos pedaços
- álcool
- água fresca de chuva
- almofariz e pistilo (podem ser substituídos por socador de alho)
- conta-gotas
- enxofre
- cadinho (pode ser substituído por prato ou por recipiente fundo de cerâmica)
- palitos de fósforo
- espátula ou colher de café metálica
- tubo de ensaio de 10 mL

Como fazer

1. Preparem o extrato de repolho roxo macerando, com o almofariz e o pistilo ou o socador de alho, as folhas de repolho picadas no álcool.
2. Façam um teste pingando 2 gotas do extrato de repolho em um tubo de ensaio contendo, aproximadamente, 2 mL de água de chuva (o equivalente a 40 gotas). Observem a cor e armazenem essa solução até o final do experimento.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Extrato de repolho roxo com diferentes valores de pH.

3. Coloquem o extrato nas cavidades da forma de gelo.
4. Posicionando-se em um dos cantos da forma, você ou um dos colegas sopra várias vezes sobre o líquido até observar alguma alteração na coloração do extrato.
5. Anotem o que observaram, lavem a forma e repitam o procedimento 3.
6. Coloquem uma pequena quantidade (cerca de 1 g) de enxofre em pó em uma espátula ou colher de café metálica.
7. O(a) professor(a) deve colocar a espátula sob a chama de um palito de fósforo (que aquece o metal) e, em seguida, depositar imediatamente o pó de enxofre no cadinho.
8. Coloquem a forma com os extratos de repolho roxo ao lado do cadinho e abane a fumaça de modo que ela entre em contato com os extratos. Observe e anote.

Fonte de pesquisa: Gepeq – Grupo de Pesquisa em Educação Química. Estudando o equilíbrio ácido-base. Revista *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 1, p. 32, maio 1995. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc01/exper1.pdf. Acesso em: 19 set. 2024.

Para concluir

1 **O extrato de repolho roxo pode apresentar diferentes cores em diferentes meios. Naqueles fortemente ácidos, ele se torna vermelho e, à medida que o pH aumenta, aproximando-se do valor 7, ele vai ficando rosa até chegar ao roxo. Utilize essa propriedade do repolho roxo para explicar as alterações observadas ao soprar sobre a forma e ao abanar a fumaça do enxofre que estava queimando no cadinho.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **O que o teste da água de chuva permite verificar? Com qual das situações descritas na questão anterior ele mais se assemelha?** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Ao observar as cavidades da forma de gelo, é possível notar alguma diferença comparando-se a cavidade mais próxima do sopro com a que está mais distante? Como isso pode ser explicado?** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **Diante do que você aprendeu nesse experimento, explique o significado desta afirmação: A chuva é naturalmente ácida.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

SAIS

O termo sal é geralmente associado ao principal constituinte do sal de cozinha, o cloreto de sódio ($NaC\ell$). Entretanto, há uma grande variedade de sais na natureza ou que podem ser sintetizados. Calcário, gesso e talco são exemplos de materiais que apresentam sais em sua composição. Os sais constituem uma importante classe de compostos da química inorgânica.

Tales Azzi/Pulsar Imagens

Estalactites são estruturas constituídas de carbonato de cálcio. Abismo Anhumas, Bonito (MS). Foto de 2024.

O que são sais?

Sais são substâncias iônicas que podem ser obtidas de reações químicas entre os ácidos e as bases, chamadas reações de **neutralização**.

Quando quantidades adequadas de soluções aquosas de ácido clorídrico ($HC\ell$) e de hidróxido de sódio ($NaOH$) são misturadas, ocorrem mudanças nas propriedades iniciais dessas soluções. Depois da neutralização, a solução final não será ácida nem básica. Os íons $H^+(aq)$ da solução ácida são neutralizados pelos íons $OH^-(aq)$ da solução básica, produzindo água. Os íons $Na^+(aq)$ e $C\ell^-(aq)$ permanecem em solução. Se toda a água do sistema for evaporada, obtém-se o sal $NaC\ell$, formado pelo cátion derivado da base e pelo ânion derivado do ácido.

A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico pode ser representada pela seguinte equação:

base	+	ácido	→	sal	+	água
$NaOH(aq)$	+	$HC\ell(aq)$	→	$NaC\ell(aq)$	+	$HOH(\ell)$
cátion da base		ânion do ácido		sal formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido		

O processo global pode ser representado pela equação:

$H^+(aq)$	+	$OH^-(aq)$	→ $H_2O(\ell)$
cátion hidrogênio proveniente da solução ácida		ânion hidroxila proveniente da solução básica	

Classificação e nomenclatura dos sais

Os sais podem ser classificados de acordo com critérios relacionados à sua composição ou às suas propriedades.

Quanto à natureza dos íons presentes

- **Sais normais**: apresentam um único tipo de cátion e um único tipo de ânion. Podem ser obtidos pela neutralização total de ácidos e bases. Exemplos: Na_2SO_4, $KC\ell$, $CaCO_3$, NH_4NO_3.
- **Hidrogenossais**: contam com um ou mais átomos de hidrogênio ionizáveis. Podem ser obtidos pela neutralização parcial de um ácido que apresenta dois ou mais átomos de hidrogênio ionizáveis por molécula por uma base. Exemplos: $NaHCO_3$, $NaHSO_4$, KH_2PO_4, K_2HPO_4.
- **Hidroxissais**: apresentam um ou mais íons hidróxido e podem ser obtidos pela reação de neutralização parcial de uma base com dois ou mais OH^- por um ácido. Exemplos: $Ca(OH)C\ell$, $Fe(OH)_2NO_3$, $A\ell(OH)C\ell_2$.
- **Sais duplos ou mistos**: apresentam dois tipos de cátion ou dois tipos de ânion. Podem ser obtidos pela neutralização total de uma base por dois ácidos ou de um ácido por duas bases. Exemplos: $KNaSO_4$, $Ca(NO_3)Br$.

Quanto à presença de água

- **Sais hidratados**: apresentam água em sua estrutura cristalina. Exemplos: $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$ (sulfato de cobre penta-hidratado), $CaC\ell_2 \cdot 2\ H_2O$ (cloreto de cálcio di-hidratado),
- **Sais anidros**: não há água em sua estrutura cristalina. Exemplos: $CuSO_4$, $CaC\ell_2$.

Alguns sais anidros são usados como agentes secantes. Ao absorver a umidade de um ambiente, eles evitam o aparecimento de bolor, por exemplo.

Quanto à solubilidade em água

A solubilidade de um sal em água depende da intensidade das interações entre os íons do sal e as moléculas de água e da temperatura.

Alguns autores utilizam o termo insolúvel para classificar determinados sais. Analisando de maneira rigorosa, não existe sal totalmente insolúvel. Existem alguns sais que são pouquíssimo solúveis, sendo necessária uma grande quantidade de água para dissolver uma pequena porção desse sal. Por essa razão, é mais correto classificar os sais em solúveis ou pouco solúveis. Exemplos: $CaCO_3$ e $CaSO_4$ são muito pouco solúveis; $MgC\ell_2$ e Na_2S são solúveis.

Nomenclatura e fórmulas dos sais

A nomenclatura dos sais obedece à seguinte estrutura:

////////////////// (nome do ânion)	de	////////////////////// (nome do cátion)

Lembre que toda substância é eletricamente neutra e, portanto, as fórmulas dos sais devem apresentar igualdade de cargas positivas e negativas. Observe alguns exemplos.

Fórmula do sal	Ânion	Cátion	Nome do sal
$(NH_4)_2SO_4$	SO_4^{2-} sulfato	NH_4^+ amônio	sulfato de amônio
$A\ell(NO_2)_3$	NO^{2-} nitrito	$A\ell^{3+}$ alumínio	nitrito de alumínio
$Ni_2(CO_3)_3$	CO_3^{2-} carbonato	Ni^{3+} níquel(III)	carbonato de níquel(III)
$Ca(OH)NO_3$	OH^- hidroxi NO^{3-} nitrato	Ca^{2+} cálcio	hidroxinitrato de cálcio
NaH_2PO_4	PO_4^{3-} fosfato	H^+ hidrogeno Na^+ sódio	di-hidrogeno-fosfato de sódio
$NaKSO_4$	SO_4^{2-} sulfato	Na^+ sódio K^+ potássio	sulfato de sódio e potássio

Importante:

- Em hidrogenossais, utiliza-se a palavra hidrogeno para nomear o H^+, precedida de um prefixo para indicar a sua quantidade (mono, di, tri, ...).
- Em hidroxissais, utiliza-se a palavra hidroxi para nomear o OH^-, precedida de um prefixo para indicar a sua quantidade (mono, di, tri, ...).

ATIVIDADE RESOLVIDA

Os fosfatos de cálcio apresentam compatibilidade e similaridade química com diversas partes do corpo humano, como tecidos ósseos e tecidos dentários. Esses sais atuam minimizando patologias como a osteomielite e as doenças bucais. Os diversos fosfatos de cálcio existentes diferenciam-se pela razão entre o número de átomos de cálcio e de fósforo em suas fórmulas e alguns estão representados a seguir.

- fosfato de cálcio amorfo: $Ca_3(PO_4)_2 \cdot n\ H_2O$
- fosfato octacálcico: $Ca_8H_2(PO_4)_6 \cdot 5\ H_2O$
- hidroxiapatita: $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_x$

a) As fórmulas do fosfato de cálcio amorfo e do fosfato octacálcico apresentam, respectivamente, $n\ H_2O$ e $5\ H_2O$. O que essas representações indicam?

b) Considerando que o Ca é um metal alcalino-terroso e que o íon fosfato é trivalente negativo (PO_4^{3-}), determine o valor de x e a fórmula da hidroxiapatita.

Resolução:

a) Ambos são sais hidratados, isto é, apresentam moléculas de água em sua estrutura cristalina. O valor n na fórmula do fosfato de cálcio amorfo indica que há um número variável de moléculas de água para cada $Ca_3(PO_4)_2$ dentro da estrutura cristalina. No caso do fosfato octacálcico, há 5 moléculas de água para cada $Ca_3(PO_4)_2$ no retículo cristalino.

b) Sendo o cálcio do grupo II da Tabela Periódica, seu átomo forma o cátion Ca^{2+}. O íon fosfato tem carga 3− e o íon hidroxila é monovalente negativo (OH^-). Como toda substância deve ser eletricamente neutra, a somatória das cargas deve ser igual a zero na hidroxiapatita. Assim:

$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_x$

$10\ (2+) + 6\ (3-) + x\ (-1) = 0$

$(+20) + (-18) + (-x) = 0 \rightarrow x = 2$

Portanto, a fórmula da hidroxiapatita é: $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$

Aplicações dos sais

Cloreto de sódio (NaCℓ)

O cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, tem várias aplicações além de seu uso culinário. Esse sal é usado na conservação de carnes, na produção do soro fisiológico e na obtenção de soda cáustica (NaOH), de gás cloro ($C\ell_2$) e de hipoclorito de sódio (NaCℓO). Ele pode ser obtido da cristalização da água do mar nas salinas ou ser retirado de depósitos de sal-gema.

Bernd Weissbrod/DPA/Picture-Alliance/AFP

Área de extração de sal-gema em Heilbronn, Alemanha. Foto de 2021.

Hidrogenocarbonato de sódio ($NaHCO_3$)

Conhecido também como bicarbonato de sódio, esse sal é usado principalmente como fermento químico no preparo de bolos e biscoitos e no tratamento da lã e da seda.

Carbonato de cálcio ($CaCO_3$)

O carbonato de cálcio – sólido branco – é o principal constituinte do calcário e do mármore. Também está presente nas conchas, nos recifes de corais, nas cascas de ovos e nas estalactites e estalagmites. Ao ser aquecido, sofre decomposição, produzindo cal (CaO), matéria-prima para a produção de cimento.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

DISSOCIAÇÃO ELETROLÍTICA

O químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927), na defesa de sua tese, realizada em 1884, apresentou uma teoria sobre dissociação eletrolítica e, sob muitas críticas, ele foi aprovado com nota mínima.

Sua teoria contradizia o modelo atômico de Dalton, muito aceito na época. Os cientistas ainda não diferenciavam substância molecular de substância iônica e o modelo atômico de Rutherford (partícula com núcleo e eletrosfera) seria proposto anos depois. Confiante, Arrhenius afirmava que os eletrólitos em solução dissociavam-se em partículas carregadas eletricamente (íons) com liberdade de movimento, havendo igualdade na quantidade de cargas positivas e negativas.

Em 1889, ele publicou um trabalho intitulado *Sobre a dissociação das substâncias em meio aquoso* e, em 1903, recebeu o Prêmio Nobel de Química em reconhecimento à sua contribuição ao tema. Arrhenius prosseguiu os estudos, identificando os íons presentes nas soluções, e criou uma definição de ácidos, bases e sais que utilizamos até hoje.

Arrhenius também foi pioneiro nos estudos sobre climatologia; em 1896 publicou um artigo no qual estimava que uma duplicação na concentração de CO_2 na atmosfera poderia levar a um aumento de cerca de 5 °C a 6 °C na temperatura global, o que foi impressionante para a época. Arrhenius estabeleceu as bases para a pesquisa sobre o aquecimento global e o papel dos gases de efeito estufa, muito antes de se tornar um tema amplamente debatido nos séculos XX e XXI.





Fotografias: Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Observe que a água destilada (**A**) e os cristais de NaCℓ (**B**), separadamente, são maus condutores de corrente elétrica (a lâmpada permanece apagada) quando em contato com dois eletrodos ligados a um gerador de energia. Quando as duas substâncias são misturadas (**C**), os cátions Na^+ são atraídos pelo polo negativo, e os ânions $Cℓ^-$, pelo polo positivo. Então a lâmpada acende, indicando passagem de corrente elétrica.

Para discutir

1 **Pesquise outros casos de cientistas que foram rejeitados por suas ideias inovadoras. Compartilhe com os colegas de turma.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ATIVIDADES

1 Observe a figura abaixo (em cores-fantasia), que representa um circuito elétrico. O béquer contém, inicialmente, água pura. Ao serem adicionadas ao béquer, quais das substâncias indicadas nos itens a seguir fazem a lâmpada acender? Justifique sua resposta.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.



AMj Studio/ID/BR

a) Cloreto de potássio (KCℓ).
b) Brometo de hidrogênio (HBr).
c) Um pedaço de mármore ($CaCO_3$), que é praticamente insolúvel na água.

ATIVIDADE RESOLVIDA

2 Em uma aula de laboratório, o professor de Química apresentou aos estudantes três frascos rotulados como **A**, **B** e **C**, contendo soluções aquosas incolores de NaOH, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (açúcar comum) e HCℓ, não necessariamente nessa ordem. Disponibilizou, para cada estudante, uma estante com tubos de ensaio, um aparelho para medir a condutibilidade elétrica das soluções, béqueres e um frasco conta-gotas contendo fenolftaleína. Também informou que a fenolftaleína é incolor em meio ácido ou neutro e adquire a coloração rosa em meio básico.

Um estudante fez experimentos e registrou os seguintes resultados:

Frasco	Condutibilidade elétrica	Coloração da solução após adição de fenolftaleína
A	não conduz	incolor
B	conduz	incolor
C	conduz	rosa

Com esses resultados, determine o conteúdo dos frascos **A**, **B** e **C**.

Resolução:

Soluções de ácidos e bases conduzem corrente elétrica por apresentarem íons livres. Portanto, o frasco **A** deve conter $C_{12}H_{22}O_{11}$, pois o açúcar é um composto molecular que não ioniza na água e sua solução aquosa não conduz corrente elétrica.

O frasco **B** deve conter HCℓ, pois a fenolftaleína permaneceu incolor em contato com a solução.

O frasco **C** contém NaOH, pois apresentou a coloração rosa.

4. c) Todas as soluções formadas pelos óxidos do enunciado apresentam íons livres e, portanto, são soluções eletrolíticas.

3 O azul de bromotimol é um indicador ácido-base utilizado em laboratórios e no controle do pH da água de aquários. Quando adicionado ao vinagre (solução aquosa de ácido acético), sua coloração muda para o amarelo, e quando em contato com solução aquosa de soda cáustica (hidróxido de sódio), fica azul. Se você usar um canudo para soprar dentro de uma solução contendo água e azul de bromotimol, a coloração mudará do azul para o amarelo. Essas observações lhe permitem concluir que: Alternativa **a**.

a) no ar expirado há um gás que, ao reagir com a água, produz íons H^+.
b) no ar expirado há muito cloreto de hidrogênio gasoso, responsável pelo caráter ácido.
c) o ar expirado tem caráter básico.
d) o ar expirado contém amônia, responsável pela mudança de cor do azul de bromotimol.

4 Considere os seguintes óxidos:

$$CaO,\ CO_2,\ NO_2,\ Na_2O,\ C\ell_2O_5,\ K_2O,\ BaO \text{ e } SO_3$$

a) Indique os óxidos que reagem com a água resultando em solução que adquire a coloração azul ao serem adicionadas algumas gotas de azul de bromotimol. Equacione a reação de um desses óxidos com a água. CaO, Na_2O, K_2O e BaO. Exemplo: $Na_2O(s) + H_2O(aq) \rightarrow 2\ NaOH(aq)$
b) Indique os óxidos que reagem com a água resultando em solução que adquire a coloração amarela ao serem adicionadas algumas gotas de azul de bromotimol. Equacione a reação de um desses óxidos com a água. CO_2, NO_2, $C\ell_2O_5$ e SO_3 Exemplo: $SO_3(g) + H_2O(aq) \rightarrow H_2SO_4(aq)$
c) Quais dessas substâncias produzem soluções eletrolíticas ao serem dissolvidas em água? Justifique sua resposta.

5 O vidro é feito de uma mistura de matérias-primas naturais, principalmente areia (dióxido de silício), barrilha (carbonato de sódio) e calcário (carbonato de cálcio), além de outros materiais em menor proporção (óxidos de magnésio e de alumínio, corantes e descorantes). Observe a composição do vidro no gráfico abaixo e faça o que se pede.



AMj Studio/ID/BR

a) Classifique o óxido de magnésio de acordo com seu caráter ácido, básico ou anfótero e equacione a reação desse óxido com a água.

5. a) Óxido básico. $MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

Não escreva no livro.

5. b) $A\ell_2O_3 + 6\ HNO_3 \rightarrow 2\ A\ell(NO_3)_3 + 3\ H_2O$
Produtos formados: nitrato de alumínio e água.

b) O óxido de alumínio é anfótero, e reage com ácidos fortes formando um sal e água. Equacione a reação desse óxido com ácido nítrico e dê o nome dos produtos formados.

6 **O principal tipo de solo do cerrado, o latossolo, apresenta acentuada acidez e elevada quantidade de espécies iônicas de alumínio (tóxico para as plantas), fatores que comprometem a produtividade agrícola. Além disso, a deficiência de alguns nutrientes, como o magnésio, faz com que os solos do cerrado precisem de corretivos adequados para uma lavoura rentável e produtiva. A deficiência de magnésio compromete a realização de fotossíntese e outras funções nos vegetais. Uma maneira de corrigir o pH do solo e suprir o magnésio, necessário para as plantas, consiste no uso de dolomita, mineral que contém carbonato de cálcio e magnésio ($CaMg(CO_3)_2$), e magnesita, mineral que contém carbonato de magnésio ($MgCO_3$) e óxido de magnésio (MgO).**

Analise as afirmativas a seguir. Alternativa **c**.

I. As três substâncias citadas no enunciado correspondem a sais básicos e, por isso, podem ser usados para diminuir a acidez do solo e no fornecimento de magnésio para as plantas.

II. A dolomita e a magnesita reagem com ácidos, mas apenas os carbonatos são capazes de fornecer íons de magnésio, pois o MgO é praticamente insolúvel em meio ácido.

III. As três substâncias presentes nos minerais reagem com íons H^+ presentes no solo ácido, contribuindo para a correção de pH do solo e para o suprimento de magnésio.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II, apenas
c) III, apenas
d) I e II apenas.
e) I, II e III.

7 **As erupções vulcânicas mais explosivas estão associadas a magmas ricos em gases que se expandem ao se aproximarem da superfície terrestre. Nesses casos, os gases são liberados de forma difusa em temperaturas elevadas pela cratera ativa. Dentre esses gases, podemos citar: dióxido de carbono (CO_2), dióxido de enxofre (SO_2), trióxido de enxofre (SO_3), vapor de água (H_2O), ácido sulfúrico (H_2SO_4), sulfeto de hidrogênio (H_2S), cloreto de hidrogênio ($HC\ell$) e fluoreto de hidrogênio (HF).**

A respeito dessas substâncias, analise as seguintes afirmações:

I. Com exceção do vapor de água, todas as demais substâncias citadas formam soluções ácidas ao serem dissolvidas em água.

II. Os gases H_2S, $HC\ell$ e HF se dissolvem e ionizam em água, mas diferem quanto ao grau de ionização.

III. Os gases SO_2 e SO_3 são óxidos moleculares e reagem com a água produzindo, respectivamente, H_2SO_3 e H_2SO_4.

É correto o que se afirma em: Alternativa **e**.

a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

8. a) $2\ NO_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow HNO_2(aq) + HNO_3(aq)$

8 **Além de óxidos de enxofre, a combustão de óleo *diesel* produz gás carbônico, monóxido de carbono, material particulado (fuligem) e óxidos de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio (NO) vai para a atmosfera e reage com o oxigênio do ar atmosférico, transformando-se em dióxido de nitrogênio (NO_2). Este último reage com a água, contribuindo para o aumento da acidez da água da chuva, pois nessa reação ocorre a formação de ácido nítrico e de ácido nitroso.**

a) Equacione a reação entre o dióxido de nitrogênio e a água. Consulte os quadros de ânions para determinar a fórmula dos ácidos formados na reação.

b) Vimos que os principais poluentes responsáveis pela alteração do pH da água da chuva são o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Qual é a classificação desses óxidos? Como o caráter ácido ou básico desses óxidos pode ser verificado em laboratório? São óxidos ácidos. A partir da dissolução desses óxidos em água com posterior verificação do pH do meio.

9 **Durante a combustão do óleo *diesel*, há a formação de diversas substâncias, que são emitidas pelos escapamentos. Quanto maior a quantidade de enxofre presente no combustível, maior será a quantidade de óxidos de enxofre formada na combustão. O dióxido de enxofre, depois de ser liberado do escapamento, pode reagir com o oxigênio produzindo o trióxido de enxofre. Esses óxidos são tóxicos, e o contato com pequenas quantidades deles pode causar irritação nos olhos, nas vias respiratórias e na pele. Além disso, esses óxidos contribuem para a formação da chuva ácida.**

- Represente a equação da reação entre cada um desses óxidos com a água. $SO_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_3(aq)$
$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

10 **A ingestão de hidróxido de sódio pode causar danos graves e irreversíveis a todo o sistema gastrointestinal e a toda mucosa com a qual entra em contato, incluindo a corrosão das pregas vocais. O hidróxido de magnésio, por sua vez, é usado como antiácido. Como se explica essa diferença de propriedades entre esses dois hidróxidos?**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1. O sal (NaCℓ) dissocia-se em água, formando íons Na^+ e $Cℓ^-$, interagindo por meio de interações do tipo íon-dipolo.
2. As ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas; uma mistura de gases é uma solução gasosa.
3. Não. Uma solução se refere às misturas homogêneas, que apresentam uma única fase.

SOLUÇÕES E PROPRIEDADES COLIGATIVAS DAS SOLUÇÕES

PARA COMEÇAR

1. Quais são as interações que ocorrem entre as substâncias em uma mistura de sal e água?
2. Embora seja frequente associar o termo "solução" à dissolução de um sólido em um líquido, nem toda solução é formada dessa maneira. Cite outras soluções formadas por substâncias em outros estados físicos.
3. Toda mistura pode ser considerada uma solução? Por quê?

AS DIFERENTES PROPRIEDADES DE UMA SOLUÇÃO DE SAL DE COZINHA

É muito comum a adição de sal de cozinha (NaCℓ) à agua a ser utilizada no cozimento de alimentos. Em países frios, o uso desse sal em ruas e estradas cobertas por neve também é habitual. O que essas práticas têm em comum?

Com a adição de sal de cozinha, a água demora mais tempo para entrar em ebulição. Entretanto, esse procedimento faz os alimentos cozinharem mais rapidamente, pois, em razão da presença de sal, a água entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura, o que acelera o cozimento dos alimentos.

Assim como o sal altera a temperatura de ebulição da água, ele provocará alterações também na temperatura de congelamento.

A variação da temperatura de ebulição e de congelamento do solvente não dependem da substância adicionada, mas da concentração de partículas de soluto presente na dispersão. A maioria dos materiais com que temos contato no dia a dia são dispersões (misturas). Manipulamos poucas substâncias consideradas puras.

Neste capítulo, estudaremos uma mistura específica, as soluções e algumas de suas propriedades. As propriedades de uma solução que dependem apenas da concentração de partículas de soluto e que não dependem de sua natureza são denominadas propriedades coligativas.

É habitual despejar sal em locais em que ocorrem nevascas para evitar o acúmulo de gelo.

NICOLAS MAETERLINCK/BELGA MAG/AF

Não escreva no livro.

AS SOLUÇÕES

Todo sistema formado por mais de uma substância é chamado dispersão. Uma dispersão é composta de pelo menos um disperso e de um dispergente. Já o termo solução é dado a toda dispersão que forma um sistema homogêneo, tanto a olho nu quanto ao microscópio.

No caso de uma solução aquosa de cloreto de sódio, por exemplo, o sal é o disperso, ou soluto (substância dissolvida), e a água é o dispergente, ou solvente (substância que dissolve). A quantidade de soluto que uma quantidade fixa de solvente consegue dissolver depende do soluto, do solvente, da temperatura da solução e, em alguns casos, da pressão em que a mistura foi feita.

Solução sólida

Nesse tipo de solução, tanto o soluto quanto o solvente se encontram no estado sólido. Geralmente, essas soluções são formadas por ligas metálicas. As ligas são produzidas com a finalidade de melhorar as características de determinado material. São exemplos de liga metálica o ouro 18 quilates (mistura de ouro e prata ou ouro e cobre), o bronze (mistura de cobre e estanho), o latão (mistura de cobre e zinco), entre outros. No caso do ouro 18 quilates, são adicionados prata ou cobre para aumentar a durabilidade, a resistência e o brilho, resultando em um material adequado para a confecção de joias.

Solução gasosa

Sempre que ocorre uma mistura entre gases, forma-se uma solução gasosa, pois os gases são miscíveis entre si. Um exemplo é o ar isento de partículas sólidas e líquidas. Nessas condições, o ar possui a composição mostrada no quadro ao lado.

Gás	N_2	O_2	Ar	CO_2	Outros gases
% em volume	78	21	0,9	0,04	0,06

Soluções formadas pela dissolução de gases em líquidos

Os gases do ar se dissolvem, em maior ou menor concentração, nas águas dos mares, dos rios e dos lagos. Sem esse processo, a sobrevivência da fauna e da flora aquáticas estaria comprometida.

A solubilidade dos gases na água depende de fatores como temperatura e pressão.

O aumento de pressão provoca elevação da solubilidade de gases em líquidos. Isso explica a pressurização do gás carbônico nas bebidas gaseificadas quando engarrafadas.

O aumento de temperatura, por sua vez, diminui a solubilidade dos gases em líquidos, isto é, quando a temperatura sobe, a solubilidade dos gases em líquidos diminui. Percebemos isso quando abrimos uma garrafa de bebida gaseificada numa temperatura maior em relação à uma garrafa com a bebida em uma temperatura muito baixa. Ao abrir a garrafa com a bebida de maior temperatura, o gás escapa mais rápido; já aquela com a bebida mais gelada (menor temperatura), ao ser aberta, libera menos gás.

Como a solubilidade de um gás em líquidos diminui à medida que a temperatura do líquido aumenta, os cientistas alertam para o perigo da elevação da temperatura do planeta e dos desastres climáticos produzidos por esse aumento.

Apenas uma pequena elevação na temperatura dos oceanos, mares, rios ou lagos já é suficiente para reduzir o teor de oxigênio dissolvido na água. Como consequência, a vida aquática, que necessita desse oxigênio, sofre com essa diminuição.

Quintana Beach County/Anadolu Agency/AFP

Em 2023, no Texas (EUA), uma onda de calor causou a redução de oxigênio no oceano, causando a morte de muitos peixes.

Soluções formadas pela mistura de líquidos

O álcool comercializado em farmácias ou em supermercados é uma solução formada por álcool etílico (C_2H_6O), também chamado de etanol, e água. Outra solução líquida encontrada em farmácias é a água oxigenada, uma solução de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e água. É importante ressaltar que a água oxigenada já foi muito utilizada para limpar ferimentos na pele para evitar infecções, mas esse uso não é indicado, uma vez que, além de eliminar possíveis patógenos, pode danificar células saudáveis da pele. Para evitar infecções em ferimentos superficiais na pele, o mais indicado é lavar a região com água e sabão.



© Sofia Colombini/Acervo da fotógrafa

Fernando Favoretto/Criar Imagem

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

A água oxigenada (**A**), o álcool etílico hidratado (**B**) e o álcool iodado (**C**) são exemplos de soluções líquidas.

Soluções formadas pela dissolução de sólidos em líquidos

A água do mar filtrada e o soro fisiológico são soluções formadas por sólidos dissolvidos em líquidos.

Outros exemplos são:

- **Água boricada**: solução aquosa de concentração de, aproximadamente, 3% (*m*/*V*) de ácido bórico. É utilizada como antisséptico para limpeza de ferimentos.
- **Álcool iodado**: solução de iodo e iodeto de sódio, ou iodo e iodeto de potássio, dissolvidos em álcool etílico. É utilizada principalmente na higienização de ferimentos.

QUÍMICA E BIOLOGIA

Doença de descompressão

Quanto maior a profundidade do mergulho, maior será a pressão a que o mergulhador estará sujeito e, portanto, maior a solubilização de gases como o oxigênio e o nitrogênio no sangue.

Caso o mergulhador volte muito rápido à superfície, a solubilidade desses gases diminui rapidamente, levando a um quadro sintomático conhecido como mal dos mergulhadores, caracterizado por dores nas articulações dos membros superiores e inferiores.

1. Como devem se comportar os gases dissolvidos no sangue em uma subida muito rápida do mergulhador para a superfície?

Andriej Szypiłow/Alamy/Fotoarena

Mergulhador no fundo do mar.

1. O comportamento dos gases nessa situação se assemelha à abertura de uma garrafa de bebida gaseificada. A pressão no fundo do mar pode ser comparada à garrafa fechada. Quando o mergulhador sobe muito rápido, podem ser formadas bolhas de gás oxigênio e nitrogênio no sangue, assim como são formadas as bolhas de gás carbônico ao abrir a garrafa.

Não escreva no livro.

RELAÇÕES ENTRE A QUANTIDADE DE SOLUTO E A DE SOLVENTE OU A DE SOLUÇÃO

A relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente (ou a quantidade de solução) determina a concentração de soluto na solução. Quando preparamos um suco, a relação entre a quantidade de açúcar e a de suco determina o quanto o suco ficará doce. Se acrescentarmos mais soluto (açúcar), a solução ficará mais concentrada (mais doce).

Quando diluímos um suco integral, adicionando água, também estamos alterando a concentração da solução. Veja a imagem desta página.

Fernando Vivaldini/Fotoarena

Esses dois copos com suco de uva contêm soluções de diferentes concentrações. No copo à esquerda, o suco de uva é concentrado e integral e, no copo à direita, o refresco de uva recebeu adição de água (solução mais diluída).

Concentração em massa

A concentração em massa de um soluto em uma solução é dada pela relação entre a massa do soluto e o volume da solução.

$$\text{Concentração em massa} = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{volume da solução}}$$

Essa forma de expressar concentração é muito utilizada em medicamentos. Com base nessas informações, é possível saber a quantidade de cada componente no conteúdo de todo o frasco do medicamento. Para um frasco de cloridrato de nafazolina (0,5 mg/mL) contendo 30 mL, por exemplo, tem-se:

$$0{,}5\ \text{mg/mL} = \frac{\text{massa do soluto}}{30\ \text{mL}} = 0{,}5\ \text{mg/mL} \cdot 30\ \text{mL} = 15\ \text{mg de nafazolina}$$

Fração em massa [*x* (*m*/*m*)] e porcentagem em massa [% (*m*/*m*)]

A fração em massa é obtida da relação entre a massa do soluto e a massa da solução.

$$\text{Fração em massa} = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{massa da solução}}$$

A porcentagem em massa corresponde à fração em massa · 100.

$$\text{Porcentagem em massa} = \text{fração em massa} \cdot 100$$

Por exemplo, uma solução de cloreto de sódio em água (NaCℓ) contém 40 g de NaCℓ dissolvidos em 460 g de H_2O, formando uma solução de 500 g de massa. Então, a fração em massa e a porcentagem em massa são, respectivamente:

$$x\ (m/m) = \frac{40\ \text{g}}{500\ \text{g}} = 0{,}08$$

$$\%\ (m/m) = 0{,}08 \cdot 100 = 8\%$$

Essa forma de expressar concentrações é comum nas embalagens de álcool para limpeza. No caso do álcool 70%, por exemplo, esse valor corresponde à porcentagem em massa de álcool na solução e também pode ser denominado teor.

Não escreva no livro.

Fração em volume [x (V/V)] e porcentagem em volume [% (V/V)]

A fração em volume é a relação entre o volume do soluto e o volume total da solução.

$$\text{Fração em volume} = \frac{\text{volume do soluto}}{\text{volume total da solução}}$$

A porcentagem em volume é igual à fração em volume · 100%.

Essa forma de expressar concentrações é comum na indicação da composição do ar. Se nas mesmas condições de temperatura e pressão os componentes de um litro de ar seco e puro forem separados, o resultado ficará próximo a 0,78 L de N_2, 0,21 L de O_2 e 0,01 L de outros gases. Assim, tem-se:

$$x\,(V/V)_{N_2} = \frac{0{,}78\ \text{L}}{1\ \text{L}}$$

$$x\,(V/V)_{O_2} = \frac{0{,}21\ \text{L}}{1\ \text{L}}$$

$$x\,(V/V)_{\text{outros gases}} = \frac{0{,}01\ \text{L}}{1\ \text{L}}$$

ou, expressando a porcentagem em volume:

$$\%\,(V/V)_{N_2} = 0{,}78 \cdot 100\% = 78\%$$

$$\%\,(V/V)_{O_2} = 0{,}21 \cdot 100\% = 21\%$$

$$\%\,(V/V)_{\text{outros gases}} = 0{,}01 \cdot 100\% = 1\%$$

DE OLHO NO CONCEITO

Distinção entre concentração em massa e densidade

Apesar de a concentração em massa ter a mesma unidade que a densidade, pois ambas são relações entre massa e volume, é importante alertar que essas grandezas são diferentes.

A concentração em massa revela a massa de soluto presente em determinado volume de solução, enquanto a densidade indica a massa de solução correspondente a determinado volume dessa solução ou a massa de soluto correspondente a determinado volume de soluto ou a massa de solvente correspondente a determinado volume de solvente.

Observe que a concentração em massa de ácido acético no vinagre é diferente da densidade desse ácido.

$C_{\text{ác. acético}} = 0{,}04$ g/mL

e

$d_{\text{ác. acético}} = 1{,}01$ g/mL

Partes por milhão (ppm) e partes por bilhão (ppb), para relações m/m, m/V e V/V

Para concentrações muito pequenas, podem ser utilizadas as unidades **ppm** (partes por milhão) ou **ppb** (partes por bilhão).

$$1\ \text{ppm} = \frac{1\ \text{parte}}{1\ \text{milhão de partes}} = \frac{1\ \text{parte}}{10^6\ \text{partes}}$$

e

$$1\ \text{ppb} = \frac{1\ \text{parte}}{1\ \text{bilhão de partes}} = \frac{1\ \text{parte}}{10^9\ \text{partes}}$$

A seguir, são apresentados alguns exemplos de utilização dessas unidades.

Os índices de qualidade do ar, da água e do solo definem os limites aceitáveis de concentração de poluentes e de contaminantes no ambiente. Acima desses limites, a concentração de determinadas substâncias coloca em risco a saúde da população e provoca danos ambientais.

Entre esses poluentes, o dióxido de carbono (CO_2) tem recebido atenção especial nos últimos anos por causa das transformações indicadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). Para o IPCC, a meta para 2050 de um limite seguro de concentração de CO_2 na atmosfera é aproximadamente 500 ppm (m/V).

Em diferentes meios (água e solo), os limites de concentração de determinado contaminante podem variar. Para o solo, no caso do mercúrio (Hg), segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), admite-se até 0,5 mg/kg ou 0,5 ppm (m/m); já para o consumo humano de água, de acordo com o Ministério da Saúde, admite-se até 1 μg/L ou 1 ppb (m/V) de mercúrio.

Não escreva no livro.

AÇÃO E CIDADANIA

O uso do bafômetro

Uma das infrações mais graves que um motorista pode cometer é dirigir embriagado. Essa infração gera multa, suspensão da habilitação e apreensão do veículo.

A condição de embriaguez do motorista pode ser determinada pelo nível de álcool em sua corrente sanguínea. A análise da taxa de álcool no sangue pode ser feita por um exame de sangue ou por meio de um aparelho chamado bafômetro. De acordo com a legislação brasileira, o motorista não pode apresentar uma concentração igual ou maior que 0,05 mg de álcool por litro de ar no bafômetro.

Há vários tipos de bafômetro. No de funcionamento mais simples (bafômetro descartável), a pessoa investigada sopra em um tubo contendo dicromato de potássio e sílica. Caso exista etanol em sua expiração, ele será oxidado a etanal, de acordo com a seguinte equação química:

Leandro Ferreira/Fotoarena

O etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, é o aparelho utilizado para medir a concentração de álcool na corrente sanguínea.

$$K_2Cr_2O_7(aq) + 4\ H_2SO_4(aq) + 3\ CH_3CH_2OH(g) \rightarrow Cr_2(SO_4)_3(aq) + 7\ H_2O(\ell) + 3\ CH_3CHO(g) + K_2SO_4(aq)$$

O dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$), que tem cor laranja, origina $Cr_2(SO_4)_3$, que libera o íon cromo(III), que tem cor verde. Assim, quanto maior for a intensidade do verde, maior a concentração de álcool no sangue da pessoa testada.

1. **Qual é sua opinião sobre as leis que punem as pessoas que dirigem sob efeito de álcool?**
   Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
2. **Elabore um cartaz que poderia ser utilizado pela prefeitura de sua cidade para conscientizar os motoristas a não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir.**
   Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Concentração em quantidade de matéria por litro (*C*)

A concentração em quantidade de matéria de um soluto em uma solução é a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução.

$$\text{Concentração} = \frac{\text{quantidade de matéria do soluto}}{\text{volume da solução}}$$

Essa forma de expressar concentração é uma das mais utilizadas para caracterizar soluções manipuladas em laboratórios para diferentes finalidades, das análises químicas aos experimentos mais simples; por exemplo, a obtenção de um precipitado pela mistura de soluções aquosas iônicas.

Praticamente todos os rótulos de frascos de soluções laboratoriais contêm a concentração expressa em mol/L.

Suponha que seja necessário preparar 200 mL de solução de NaOH 1,0 mol/L. Nesse exemplo, é preciso considerar que em 200 mL deve haver $200\ \text{mL} \cdot \frac{1\ \text{mol}}{1\,000\ \text{mL}}$ de NaOH. Como 0,2 mol corresponde a 0,2 mol · 40 g/mol = 8 g, é necessário dissolver 8 g de NaOH e completar o volume até 0,2 L.

No caso de soluções iônicas, é comum expressar a quantidade de matéria de íons por litro de solução. A concentração em mol/L dos íons de uma solução é obtida da relação entre a quantidade de matéria de íons do soluto e o volume da solução.

$$\text{Concentração em mol de íons/L} = \frac{\text{quantidade de matéria de íons do soluto}}{\text{volume da solução (L)}}$$

Por exemplo, para uma solução 1,0 mol/L de NaOH:

$$\underset{1,0\ \text{mol/L}}{1\ NaOH(aq)} \rightarrow \underset{1,0\ \text{mol/L}}{1\ Na^+(aq)} + \underset{1,0\ \text{mol/L}}{1\ OH^-(aq)}$$

$$C_{NaOH} = 1,0\ \text{mol/L} \Rightarrow C_{Na^+} = 1,0\ \text{mol/L}$$
$$C_{OH^-} = 1,0\ \text{mol/L}$$

Molalidade

A **molalidade** é a relação entre a quantidade de matéria de um soluto e a massa do solvente em quilogramas.

$$\text{Molalidade} = \frac{\text{quantidade de matéria do soluto}}{\text{massa do solvente}}$$

Veja, por exemplo, a molalidade de glicose de uma solução contendo 4 g de glicose ($C_6H_{12}O_6$) em 100 g (0,1 kg) de água.

Dado: massa molar da glicose = 180 g/mol.

- Cálculo da quantidade de glicose em mol:

1 mol de glicose ——— 180 g
x ——— 4 g
x = 0,02 mol

- Cálculo da molalidade de glicose na solução:

0,1 kg de água ——— 0,02 mol de glicose
1 kg de água ——— y
y = 0,2 mol de glicose

A molalidade da glicose nessa solução é 0,2 mol de glicose/kg de água. Essa forma de expressar concentração é utilizada somente quando se deseja relacionar a quantidade de matéria de soluto com a massa do solvente, sem considerar o volume ou a massa total da solução.

Diferentes concentrações para diferentes finalidades

O "cloro ativo" é muito utilizado para tratamento de água e para limpeza geral.

Dependendo da finalidade, são utilizadas soluções com concentrações diferentes de cloro.

- Em água para beber: C = 0,4 mg/L.
- Em solução para desinfecção de verduras e outros alimentos: C = 4 mg/L.
- Em utensílios: C = 8 mg/L.
- Como produto de limpeza (água sanitária), a concentração de "cloro ativo" fica entre 25 g/L e 50 g/L.

Fração em quantidade de matéria ou fração em mol [x (n/n)]

Fração em quantidade de matéria ou fração em mol de um soluto é a relação entre a quantidade de matéria desse soluto e a soma das quantidades de matéria de todas as substâncias presentes na solução.

$$\text{Fração em quantidade de matéria ou fração em mol do soluto} = \frac{\text{quantidade de matéria do soluto}}{\text{quantidade total de matéria da solução}}$$

Quando uma solução tem mais de um soluto, a fração em mol é referência para informar a quantidade de cada um deles. A fração em mol do solvente é a relação entre a quantidade de matéria do solvente e a soma das quantidades de matéria de todos os componentes da mistura.

$$\text{Fração em quantidade de matéria ou fração em mol do solvente} = \frac{\text{quantidade de matéria do solvente}}{\text{quantidade total de matéria da solução}}$$

ROTEIRO

1. Uma solução aquosa contém 0,2 mol de HNO_3 (ácido nítrico) em 0,5 L de solução. Qual é a concentração em mol/L de ácido nítrico nessa solução?

Concentração = $\frac{0,2 \text{ mol}}{0,5 \text{ L}}$ = 0,4 mol/L

Não escreva no livro.

PROPRIEDADES COLIGATIVAS

Quando um líquido é mantido em um sistema fechado, ocorre coexistência entre a fase líquida e a fase de vapor, de modo que a composição de cada fase permanece constante, ou seja, a rapidez da evaporação é igual à rapidez da condensação. A pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido em equilíbrio com a fase líquida é chamada pressão de vapor, e depende da substância que o constitui e da temperatura em que ele se encontra. Nas mesmas condições de temperatura, um líquido volátil tem uma pressão de vapor maior do que um líquido menos volátil. Se analisarmos dois recipientes contendo um mesmo líquido puro sob temperaturas diferentes, o que tiver a uma temperatura mais elevada terá maior pressão de vapor.

Ebulioscopia e crioscopia

A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente. Como, para um líquido entrar em ebulição, sua pressão de vapor deve se igualar à pressão atmosférica, a temperatura de ebulição da solução será maior que a temperatura de ebulição do solvente puro.

Tatiana Kasatkina/Shutterstock.com/ID/BR

Massas cozinham mais rapidamente com a adição de sal à água.

Por que os alimentos cozinham mais rápido quando se adiciona sal à água? O tempo de cozimento de um alimento depende da temperatura em que ele é preparado. Assim, ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 °C. Se você adicionar sal à água, ela entrará em ebulição a uma temperatura acima de 100 °C, diminuindo o tempo de cozimento do alimento. Quanto mais concentrada for a solução, maior será o aumento da temperatura de ebulição da água, ou seja, maior será o **efeito ebulioscópico**.

Esse fenômeno é explicado pela interação entre as partículas do soluto e do solvente, que resulta em maior dificuldade para vencer tais interações (requer maior energia para que as moléculas do solvente escapem do líquido).

O aumento da temperatura de ebulição de uma solução em relação ao solvente puro pode ser calculado pela expressão:

$$\Delta t_e = K_e \cdot C \cdot i$$

em que:

Δt_e = variação da temperatura de ebulição;
K_e = constante ebulioscópica (específica para cada solvente);
C = molalidade;
i = fator de Van't Hoff.

O fator de Van't Hoff (i) considera o número de partículas originadas pela dissolução do soluto no solvente. Esse fator é calculado pela seguinte expressão matemática: $i = 1 + \alpha (q - 1)$, em que α corresponde ao grau de ionização do soluto no solvente, e q corresponde ao número total de partículas originadas de uma molécula ou de um agregado iônico.

Exemplos: O fator de Van't Hoff para uma solução de sacarose é 1, pois cada molécula de sacarose origina uma única partícula dissolvida, que é a própria molécula. Nesse caso, o grau de ionização é zero, pois esse açúcar não se ioniza em água.

$$i = 1 + 0\,(1 - 1) = 1$$

Já o $NaC\ell$, que apresenta grau de dissociação praticamente igual a 1, se dissocia totalmente em água, e cada agregado $NaC\ell$ origina dois íons (um Na^+ e um $C\ell^-$), portanto, o fator de Van't Hoff é igual a 2.

$$i = 1 + 1\,(2 - 1) = 2$$

O fator de Van't Hoff para o sulfato de alumínio [$A\ell_2(SO_4)_3$], cujo grau de ionização é 0,85, ou seja, 85%, e origina 5 íons por agregado (dois $A\ell^{3+}$ e três SO_4^{2-}), é 4,4.

$$i = 1 + 0{,}85\,(5 - 1) = 4{,}4$$

Diminuindo-se a temperatura de um líquido, a energia cinética de suas partículas também diminui, o que possibilita a formação de uma estrutura mais organizada: o sólido. É assim que a água ou qualquer outra substância se solidifica. No caso da água pura, isso ocorre a 0 °C ao nível do mar. A temperatura de congelamento da água é menor quando ela contém soluto dissolvido. A diminuição da temperatura de congelamento de solvente por adição de soluto não volátil denomina-se **efeito crioscópico**.

Essa redução da temperatura pode ser calculada pela expressão:

$$\Delta t_c = K_c \cdot C \cdot i$$

em que:

Δt_c = variação da temperatura de congelamento;
K_c = constante crioscópica (específica para cada solvente);
C = molalidade;
i = fator de Van't Hoff.

Setta Sornnoi/Shutterstock.com/ID/BR

No radiador de veículos automotivos é utilizada uma mistura de etilenoglicol e água, conhecida popularmente por aditivo de radiador. Com a adição dessa mistura à água é possível diminuir a temperatura de congelamento. Esse recurso permite que o sistema de arrefecimento dos veículos (o radiador) funcione mesmo quando os automóveis rodam em regiões muito frias, onde a temperatura ambiente é menor do que a de fusão da água, ou seja, menor que 0 °C.

O aditivo de radiador mais utilizado atualmente é o composto principalmente de etilenoglicol. Além de diminuir a temperatura de congelamento, apresenta propriedades anticorrosivas.

Não escreva no livro.

Osmose e pressão osmótica

Osmose

Folhas de salada temperadas com sal em um dia tornam-se murchas no dia seguinte ou até algumas horas depois. Por que isso acontece?

Quando ocorre adição de sal em vegetais, parte da água que se encontra no interior de suas células sai delas espontaneamente, devido à diferença de concentração do sal existente entre o meio externo e o meio interno das células, é por isso que murcham. Isso acontece porque a membrana das células é semipermeável, ou seja, permite a movimentação de água (solvente) entre os meios intra e extracelular.

Observe a ilustração a seguir para entender melhor como funciona a membrana.



AMj Studio/ID/BR

Fonte de pesquisa: Reece, J. B. *et al*. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 131.

Esquema da passagem de solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Cores-fantasia.

O recipiente da ilustração acima contém duas soluções separadas por uma membrana semipermeável. Essa membrana permite apenas a passagem de solvente (o papel celofane e a membrana celular são exemplos de membrana semipermeável quando o solvente é água). Na imagem, há uma solução mais concentrada no compartimento da direita e outra menos concentrada no compartimento da esquerda. As partículas de soluto são representadas pelas esferas maiores. A diferença de concentração entre os meios provoca o fenômeno da **osmose**, que é definido como a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Quanto maior for a diferença de concentração, maior será o fluxo de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada.

A osmose é importante no processo de conservação dos alimentos; por exemplo, quando a carne é salgada, a diferença de concentração entre o meio externo e o interior das células promove a saída de água tanto das células da carne quanto das células de microrganismos, que poderiam causar sua deterioração. Com a saída de água, as células murcham e morrem. Algo similar ocorre na conservação de frutas em calda. A elevada concentração de açúcar da calda promove a saída de água das células de microrganismos, podendo causar sua morte, impedindo assim a degradação de diversas substâncias, o que ajuda a conservar as frutas por mais tempo.

ROTEIRO

2. Elabore um desenho representando simplificadamente a osmose que ocorre nas células e escreva um parágrafo explicando sua importância para a manutenção do equilíbrio hídrico das células.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Pressão osmótica

Chama-se **pressão osmótica** a pressão que deve ser aplicada para evitar que o solvente atravesse a membrana. Quanto maior for a diferença de concentração entre os dois meios, maior deverá ser a intensidade da pressão aplicada para evitar a passagem de solvente. Veja a ilustração a seguir.

AMj Studio/ID/BR



A figura da esquerda mostra a osmose (passagem de água para o meio onde se encontra a solução salina). Na figura da direita, observa-se que, aplicando pressão suficiente no compartimento onde se encontra a solução salina, impede-se que a água atravesse a membrana. Esquema em cores-fantasia.

Como qualquer outra propriedade coligativa, a pressão osmótica só depende da concentração de partículas do soluto na solução.

A pressão osmótica pode ser calculada pela expressão:

$$\Pi = C \cdot R \cdot T \cdot i$$

em que:

Π = pressão osmótica;

T = temperatura (em K);

C = concentração do soluto em mol/L;

i = fator de Van't Hoff;

R = constante universal dos gases.

ANNE E. WESTON/SPL/Fotoarena

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

A pressão osmótica no sangue humano é aproximadamente 7,7 atm. Os glóbulos vermelhos de nosso sangue têm aproximadamente a mesma pressão osmótica. Pode-se dizer que as hemácias (glóbulos vermelhos) são isotônicas em relação ao sangue, ou seja, apresentam a mesma pressão osmótica (imagem **A**).

O soro fisiológico (imagem **B**), que é uma solução aquosa de cloreto de sódio ($NaC\ell$), também deve ser isotônico em relação ao sangue.

Quando uma membrana semipermeável separa duas soluções de concentrações diferentes, a solução mais concentrada é chamada **hipertônica** (tem maior pressão osmótica), e a solução mais diluída é chamada de **hipotônica** (tem menor pressão osmótica).

Tanto as hemácias (**A**) quanto o soro fisiológico (**B**) são isotônicos em relação ao nosso sangue. A micrografia, em cores-fantasia, mostra hemácias com aumento de cerca de 2000 vezes.

Não escreva no livro.

Osmose reversa

No esquema ao lado, uma membrana semipermeável separa o compartimento **A** (contendo solução aquosa de cloreto de sódio) do compartimento **B** (contendo água pura). Como visto anteriormente, a água deve passar, espontaneamente, por osmose, do meio mais diluído (compartimento **B**) para o mais concentrado (compartimento **A**). Se aplicarmos no tubo **A** uma pressão equivalente à pressão osmótica, impediremos a passagem da água pela membrana.

Da expressão $\Pi = C \cdot R \cdot T \cdot i$, conclui-se que, quanto maior for a concentração da solução em **A** e maior for a temperatura do sistema, maior será a pressão osmótica.

Se a pressão aplicada ao tubo **A** for superior à pressão osmótica, conseguiremos fazer a água passar do meio mais concentrado para o meio mais diluído. Essa passagem é conhecida por **osmose reversa**.

É importante salientar que, diferentemente da osmose, não se trata de um fenômeno espontâneo. Em regiões muito áridas, é comum a utilização da osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água do mar. Por esse motivo, ela também é chamada de **dessalinização**.

A osmose reversa também é usada em cidades do sertão nordestino para a obtenção de água potável a partir de água salobra.



AMj Studio/ID/BR

Esquema de osmose reversa. Cores-fantasia.

Dessalinizadores

A falta de água potável é um dos problemas mais sérios que o planeta enfrenta. Apesar de haver grande quantidade de água na Terra, aproximadamente 97% dela encontra-se nos mares, ou seja, não está disponível para o consumo humano em virtude da grande concentração salina.

Para aumentar a oferta de água potável no mundo, estão sendo desenvolvidos equipamentos capazes de transformar a água salgada em água doce. Esses equipamentos são os dessalinizadores e funcionam pelo princípio da osmose reversa.



AMj Studio/ID/BR

Esquema de equipamento de osmose reversa. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Osmose reversa (OR). *Portal Tratamento de água*, São Paulo, 23 ago. 2023. Disponível em: https://tratamentodeagua.com.br/artigo/osmose-reversa-or/. Acesso em: 11 out. 2024.

Houve um avanço muito grande nesse processo quando se descobriu que membranas sintéticas tinham propriedades similares às membranas semipermeáveis encontradas nas células humanas, por exemplo.

PARA EXPLORAR

Assista

Programa Água Doce: processo de dessalinização ajuda no abastecimento de municípios

O vídeo, publicado em 22 mar. 2024 pelo canal Jornal de Minas, mostra uma iniciativa do poder público para dessalinização da água, realizada em Minas Gerais.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ASAZTavTlQ8. Acesso em: 19 set. 2024.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Considere uma solução saturada de cloreto de sódio e determine a pressão que deve ser aplicada ao sistema para dessalinizá-la a 25 °C.

Dados: solubilidade do cloreto de sódio em água = 35,9 g/100 mL (25 °C); massa molar: Na = 23 g/mol; Cℓ = 35,5 g/mol; R = 0,082 atm · L · K · mol^{-1}

Resolução

Cálculo da concentração em quantidade de matéria de NaCℓ:

$$n = \frac{35{,}9\ \text{g}}{58{,}5\ \text{g/mol}} = 0{,}6\ \text{mol}$$

$$C_{NaCℓ} = \frac{n_{NaCℓ}}{V} = \frac{0{,}6\ \text{mol}}{0{,}1\ \text{L}} = 6\ \text{mol/L}$$

Cálculo da pressão osmótica da água saturada de NaCℓ:

$$\Pi = C \cdot R \cdot T \cdot i$$

$$\Pi = 6\ \text{mol/L} \cdot 0{,}082\ \text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 298\ \text{K} \cdot 2$$

$$\Pi = 293{,}2\ \text{atm}$$

Para dessalinizar essa amostra de água, a 25 °C, deve-se aplicar uma pressão superior a 293,2 atm.

Osmose

Os processos de entrada e saída de água das células vegetais alteram a aparência e a textura dos alimentos.

Nesta atividade, você e os colegas se organizarão em grupos para observar algumas dessas alterações e compreender como o fenômeno da osmose está presente em situações do cotidiano.

Antes de iniciar o procedimento, responda às seguintes questões:

- Haverá alteração na quantidade de água nas células vegetais de um pedaço de batata em contato com um soluto como sal ou açúcar? E em sua consistência?

Material

- faca sem ponta ou de plástico
- 2 colheres (de café)
- 2 batatas-inglesas cruas
- guardanapos de papel (ou papel-toalha)
- sal de cozinha (cloreto de sódio)
- açúcar comum (sacarose)
- caneta

2. Apenas dentro dos buracos em que foi adicionado cada soluto, uma vez que o processo de osmose ocorreu apenas nas células da batata em contato com o soluto.

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Equipamentos de segurança

Óculos de segurança e avental de mangas compridas feito de algodão.

Reinaldo Vignati/ID/BR

Materiais utilizados nesta atividade.

Como fazer

1. Com a faca, cortem as batatas ao meio, de forma a obter quatro metades.
2. Com auxílio de uma colher, façam um buraco no centro de três metades, removendo parte do miolo das batatas, sem ferir a casca; a última metade deve ficar intacta.
3. Sequem bem cada metade com um guardanapo de papel.
4. Peguem três guardanapos de papel limpos e identifiquem cada um com uma caneta, escrevendo "I. Controle", "II. Sal" e "III. Açúcar", respectivamente. Peguem mais dois guardanapos de papel limpos e escrevam no primeiro "sal" e no segundo, "açúcar".
5. Coloquem uma metade de batata em cada um dos três primeiros guardanapos, de forma que o buraco fique voltado para cima; reservem a quarta metade (sem o buraco).
6. Adicionem uma colher de sal no buraco da batata no guardanapo II e uma colher de açúcar no buraco da batata no guardanapo III.
7. Coloquem uma colher de sal diretamente no guardanapo escrito "sal" e posicionem-no abaixo do guardanapo escrito "II. Sal". Coloquem uma colher de açúcar diretamente no guardanapo escrito "açúcar" e posicionem-no abaixo do guardanapo escrito "III. Açúcar".
8. Observem por cerca de 25 minutos o aspecto das batatas nos guardanapos II e III, comparando-as com a batata no guardanapo I. Comparem também os solutos nos guardanapos ("sal" e "açúcar") com os adicionados nas batatas dos guardanapos II e III.

Resíduos

Descartem os solutos e as misturas de soluto na pia em água corrente e os resíduos de batata no lixo*.

Para concluir

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1 **Retome as perguntas iniciais e verifique se as respostas coincidem com os resultados obtidos no experimento. Com base em seus conhecimentos, explique o que aconteceu com as batatas nos guardanapos I, II e III e os solutos adicionados.**

2 **Houve liberação de água nos guardanapos ou apenas dentro dos buracos em que foi adicionado o soluto? Explique o ocorrido.**

3 **Se colocássemos por alguns minutos um pedaço de batata em um copo com água, outro pedaço em um copo com a mesma quantidade de água e mais 1 colher de sal de cozinha e um terceiro pedaço em um copo contendo também a mesma quantidade de água e mais 4 colheres do sal, o que aconteceria?**

4 **Uma folha de alface guardada em geladeira por alguns dias tende a murchar devido ao fluxo do ar frio e seco. Sugira uma maneira para deixar a alface com aspecto fresco novamente. Justifique sua resposta.**

* Se houver uma composteira ou horta na escola, os resíduos de batata podem ser encaminhados ao responsável por sua manutenção.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes concluam que o pedaço de batata imerso apenas em água aumentaria de volume devido ao fluxo de moléculas de água para o meio hipertônico (batata); que o pedaço imerso na solução com baixa concentração de sal não teria alteração perceptível (os meios são praticamente isotônicos), e que o pedaço imerso na solução concentrada sofreria redução de volume devido ao fluxo de água da batata (meio hipotônico) para a solução (meio hipertônico).

Não escreva no livro.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

DESSALINIZAÇÃO

4. Espera-se que os estudantes associem a quantidade de sais dissolvidos com cada tipo de água (água doce: salinidade igual ou inferior a 0,5 partes por mil; água salobra: salinidade superior a 0,5 partes por mil e inferior a 30 partes por mil; água salgada: salinidade igual ou superior a 30 partes por mil), bem como percebam que o aumento da salinidade do solo pode impactar diretamente a agricultura, a criação de animais, além de contaminar as águas subterrâneas, utilizadas para abastecimento em poços artesianos, por exemplo. Nos mares e oceanos, o aumento da salinidade (e temperatura da água) pode levar à diminuição do oxigênio dissolvido e, consequentemente, contribuir para a formação de "zonas mortas", em que poucos animais marinhos e costeiros podem sobreviver.

A escassez de água potável para a população já é um problema em várias localidades pelo mundo. Existem previsões de que esse problema poderá atingir 1 bilhão de pessoas até 2050. Por esse motivo, é cada vez maior o investimento em usinas de dessalinização, que obtêm água potável ao remover o sal da água.

Existem dois processos para a dessalinização da água: a destilação térmica e a osmose reversa. Na destilação térmica, a água salgada é aquecida, e o vapor, que não contém sal, é coletado e resfriado, voltando para o estado líquido. Na osmose reversa, a água salgada é filtrada ao ser submetida a uma alta pressão e passar por uma membrana semipermeável. A destilação térmica apresenta custo e consumo de energia menores em comparação à osmose reversa, motivo pelo qual a maioria das novas usinas de dessalinização opera com esse processo.

Jack Guez/AFP

A usina de dessalinização de Ashkelon, no litoral mediterrâneo no sul de Israel, produz cerca de 120 milhões de m3 de água doce por ano. Foto de 2022.

Atualmente, 56 bilhões de litros de água dessalinizada podem ser produzidos todos os dias no planeta, o que equivale a cerca de 7 litros por pessoa.

O Brasil possui uma usina de dessalinização da água do mar em Fernando de Noronha (PE). Cerca de um terço da água potável usada nesse arquipélago é produzida por essa usina. Outras duas usinas de dessalinização estão sendo construídas em Fortaleza (CE) e Ilhabela (SP).

Na região do semiárido nordestino, a água dos lençóis freáticos obtida por meio da perfuração de poços, em geral, é salobra. Em várias localidades foram instaladas máquinas de dessalinização, que retiram o sal da água por meio da osmose reversa, atendendo à população.

Um dos principais impactos ambientais causados pela dessalinização da água do mar é o descarte da salmoura – o rejeito da dessalinização – no meio ambiente. Devido à alta concentração de sal, a salmoura pode causar poluição marinha, poluição da água do subsolo e salinização do solo.

Estima-se que 70% da produção global de salmoura tenha origem no Oriente Médio, região que produz uma grande quantidade de água dessalinizada. A salinidade da salmoura precisa ser reduzida antes do descarte, e cientistas estão pesquisando e desenvolvendo tecnologias para recuperar, de forma eficiente, sais, minerais e metais dessa salmoura. Esse material pode, então, ser destinado a indústrias para ser usado como matéria-prima, diminuindo o custo de produção da água dessalinizada e preservando o ambiente.

Fontes de pesquisa: Brito, T. *G1 Ceará*, 7 out. 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2023/10/07/entenda-como-funciona-a-usina-que-tira-sal-da-agua-do-mar-e-gera-embate-por-risco-de-derrubar-a-internet-no-brasil.ghtml; Tirar sal da água do mar vira 'presente e futuro' contra escassez; veja prós e contras. Ecoa Uol, 24 mar. 2024. Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/noticias/deutsche-welle/2024/03/24/dessalinizar-agua-do-mar-vira-presente-e-futuro-contra-escassez-veja-pros-e-contras.htm. Acessos em: 19 set. 2024.

2. É importante que os estudantes constatem, em suas pesquisas, que a dessalinização da água ainda é pouco usada no Brasil. Esse processo é adotado principalmente no semiárido nordestino, para produção de água doce em estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.

Para discutir

1 **Além da produção de água doce potável para o consumo humano, pesquise e cite outras aplicações da osmose reversa.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Faça um levantamento dos principais estados brasileiros que utilizam o processo de dessalinização para purificação de água subterrânea.**

3 **Nas usinas que operam com água salobra, como no semiárido brasileiro, pesquise como é feito o descarte e a utilização do rejeito salino de forma adequada para que o solo e as águas subterrâneas não sejam comprometidos.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **Qual é a diferença entre água doce, água salobra e água salgada (salina)? Quais são os possíveis impactos da dispersão inadequada do rejeito salino no solo e nos mares e oceanos?**

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **Sabendo que a pressão de vapor da água pura a 25 °C é igual a 3,2 kPa, preveja a pressão de vapor, a 25 °C, de uma solução de 0,20 mol de sacarose em 1,80 mol de água. Utilize a lei de Raoult.**

Resolução

A lei de Raoult está dada:

$p_{solução} = x_{solvente} \cdot p_{solvente\ puro}$

A pressão do solvente puro é 3,2 kPa. Portanto, para que a resolução seja possível, é preciso determinar a fração em quantidade de matéria do solvente.

$$x_{solvente} = \frac{n_{solvente}}{n_{solvente} + n_{soluto}}$$

Assim, obtém-se:

$n_{solvente} = 1{,}80$ mol

$n_{soluto} = 0{,}20$ mol

$$x_{solvente} = \frac{1{,}80 \text{ mol}}{(1{,}80 + 0{,}20) \text{ mol}}$$

$x_{solvente} = 0{,}90$

Tem-se:

$p_{solução} = x_{solvente} \cdot p_{solvente\ puro}$

$p_{solução} = 0{,}9 \cdot 3{,}2$ kPa

$p_{solução} = 2{,}9$ kPa

7. a) O copo contendo solução de açúcar, pois apresenta maior pressão de vapor.
b) A água pura evaporaria mais rápido que ambas as soluções, pois o solvente puro tem maior pressão de vapor que as soluções.

2 **Uma solução aquosa contém 0,2 mol de HNO_3 (ácido nítrico) em meio litro de solução. Qual é a concentração em mol/L de ácido nítrico nessa solução?** 0,4 mol/L

3 **Um medicamento comercializado em gotas indica, em seu rótulo, que a concentração de diclofenaco de potássio em sua composição é igual a 15 mg/mL. Uma enfermeira ministrou uma dose desse medicamento a um paciente por meio da diluição de 2 mL dele em água, resultando em um volume final de 200 mL. Qual foi a concentração de diclofenaco de potássio consumida pelo paciente?** 0,15 mg/mL.

4 **O leite é um alimento rico em cálcio (Ca). Sabendo que em 200 mL de leite há aproximadamente 335 mg de Ca, determine a quantidade de Ca ingerida, em mg, por um indivíduo que consome diariamente 300 mL de leite e calcule a concentração de Ca no leite em g/L.** 502,5 mg de Ca; $C = 1{,}675$ g/L

5 **Determinada estação de tratamento de água processa cerca de 20 000 litros de água por minuto. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima de fluoreto na água não pode ultrapassar $8{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Considerando o volume total de água tratada por hora, determine a quantidade máxima de fluoreto que poderá ser adicionada à água.** 96 mol

6 **Tem-se 1 litro de uma solução 2,0 mol/L de KOH. Qual é a massa de KOH que deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter concentração de 3,0 mol/L?**

Desprezar a variação de volume da solução quando o KOH for adicionado. Dado: Massa molar do KOH = 56 g/mol. 56 g

7 **Um professor de Química adicionou massas iguais de sal de cozinha (NaCℓ) e de açúcar (sacarose) em copos diferentes, cada um contendo 200 mL de água. Após certo tempo, observou-se que um dos copos estava mais vazio do que o outro, devido à evaporação de parte da água. Responda:**

a) Qual dos copos esvaziou mais rapidamente? Justifique sua resposta.

b) Se, ao invés das misturas citadas, tivéssemos um copo com 200 mL de água pura, de que maneira o processo de evaporação da água seria afetado? Justifique sua resposta.

Dados: massa molar da sacarose = 342 g/mol; massa molar do NaCℓ = 58,5 g/mol

8 **Observe o gráfico a seguir.**



AMJ Studio/ID/BR

As curvas **A**, **B** e **C** correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas: solução aquosa de nitrato de potássio, KNO_3, solução aquosa de nitrato de cálcio, $Ca(NO_3)_2$, de mesma concentração em mol/L, e água pura (não necessariamente nessa ordem). A associação entre as curvas e os sistemas correspondentes é: Alternativa **b**.

a) **A**, água pura; **B**, solução aquosa de nitrato de cálcio; **C**, solução aquosa de nitrato de potássio.

b) **A**, água pura; **B**, solução aquosa de nitrato de potássio; **C**, solução aquosa de nitrato de cálcio.

c) **A**, solução aquosa de nitrato de cálcio; **B**, solução aquosa de nitrato de potássio; **C**, água pura.

d) **A**, solução aquosa de nitrato de potássio; **B**, solução aquosa de nitrato de cálcio; **C**, água pura.

Não escreva no livro.

13. Sim. O tempo de cozimento seria maior, pois a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente. No caso, a adição dos sais faria com que a água entrasse em ebulição acima de 100 °C, acelerando o cozimento do macarrão.

15. a) Como a concentração salina na célula do protozoário é maior, ocorreria, por osmose, entrada de água na célula, promovendo o seu inchamento.
b) Como a concentração salina é maior no meio exterior do que na célula do protozoário, ocorreria saída de água da célula.

9 Para realizar um experimento de investigação da pressão de vapor, um químico preparou uma solução dissolvendo-se 1,0 mol de NaCℓ em 360,0 g de água.

a) Qual é a pressão de vapor da água dessa solução?

b) Na segunda parte do experimento, o químico investigou o que aconteceria se, em vez de NaCℓ, fosse adicionada sacarose. Considere essa troca e responda: Qual é a quantidade de sacarose, em massa, necessária para que a pressão de vapor da água seja a mesma calculada no item **a**?

Dados: pressão de vapor da água a 25 °C = 3,2 kPa; massa molar da água = 18 g/mol; massa molar da sacarose = 342 g/mol **9. a)** 3,04 kPa; **b)** 342 g

10 Considere a seguinte observação a respeito das propriedades físicas das soluções aquosas:

Uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,1 mol/L apresenta a mesma temperatura de ebulição de uma solução desse mesmo soluto a 0,2 mol/L, pois a temperatura de ebulição varia de acordo com a natureza do soluto e não com a quantidade. Como se trata de solutos iguais, a temperatura de ebulição será a mesma.

A afirmação está **correta**? Justifique sua resposta.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

11 Um estudante fez a seguinte observação a respeito da pressão de vapor de um líquido: "Quando um soluto não volátil é dissolvido em um solvente, a pressão de vapor do líquido diminui e, por consequência, o líquido torna-se mais volátil". A observação está correta? Justifique sua resposta.

12 Durante uma aula de Química, a professora fez a seguinte demonstração: adicionou água pura a um béquer e aqueceu-a até que iniciasse a ebulição. Em seguida, adicionou uma colher de açúcar à água, o que fez a água parar de ferver; porém a fervura continuou alguns minutos depois. Os estudantes observaram a demonstração da professora e fizeram algumas observações, tentando explicar o fenômeno. Seguem as observações de dois estudantes.

11. A observação está incorreta. A adição de um soluto não volátil provoca abaixamento da pressão de vapor do solvente, o que faz com que ele se torne menos volátil.

Estudante **A**:

"Quando o açúcar foi adicionado, a água parou de ferver porque ocorreu uma reação química entre a água e o açúcar. Assim que a reação cessou, a água voltou a ferver."

14. O comentário não está correto, pois osmose é a passagem de solvente, por uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado.

Estudante **B**:

"Com a adição de açúcar, a pressão de vapor da água diminuiu, fazendo a ebulição ocorrer a uma temperatura mais elevada."

Qual deles apresentou a explicação **correta**? Justifique sua resposta.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

13 O cloreto de potássio (KCℓ), mediante prescrição médica, pois em excesso pode acarretar sérios problemas de saúde a quem o consome, é usado em algumas dietas em substituição ao sal de cozinha (NaCℓ). O uso do cloreto de potássio é recomendado para diminuir o consumo de sódio.

Determinado cozinheiro preparou uma macarronada fazendo uso do sal de cozinha convencional e, uma outra, adicionando cloreto de potássio na quantidade recomendada pelo médico. O procedimento adotado para os dois preparos foi o mesmo: uma mistura de água e sal foi aquecida até a fervura e, em seguida, o macarrão foi adicionado para o cozimento.

Em relação ao tempo de cozimento do alimento, se o cloreto de sódio ou o cloreto de potássio fossem adicionados após a fervura da água, haveria alguma alteração? Justifique sua resposta.

14 Um estudante fez o seguinte comentário a respeito da osmose: "Quando ocorre osmose, há passagem de soluto da solução mais concentrada para a solução menos concentrada".

O comentário está **correto**? Justifique.

15 Os protozoários são seres unicelulares que vivem em ambientes marinhos ou de água doce. Eles possuem uma membrana celular adaptada ao meio correspondente.

a) O que aconteceria com um protozoário adaptado a ambientes marinhos se fosse colocado em água destilada?

b) O que aconteceria com um protozoário de água doce se fosse colocado na água do mar?

16 Um laboratório dispõe de soluções aquosas de glicose ($C_6H_{12}O_6$) e sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) de mesma concentração, em g/L, e sob mesma temperatura. Diga qual das duas soluções apresentará maior pressão osmótica. Justifique sua resposta.

17 Na desidratação infantil, aconselha-se a administração de soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetado na veia, é preciso tomar alguns cuidados especiais com a concentração do soro, uma vez que ele deve ser isotônico em relação ao sangue. Explique por que isso é necessário.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

18 Um professor adicionou duas soluções, uma de cloreto de sódio 0,6 mol/L e outra de sacarose 1,0 mol/L, em um recipiente, separadas por uma membrana semipermeável. Passados alguns instantes, o equilíbrio foi atingido. O professor pediu aos estudantes que previssem o que deveria ocorrer no sistema depois de um tempo suficiente para que ele atingisse o equilíbrio. O estudante A disse que deveria haver passagem de água da solução de cloreto de sódio (mais diluída, 0,6 mol/L) para a de sacarose (mais concentrada, 1,0 mol/L), enquanto o estudante B disse que a água deveria passar da solução de sacarose para a solução de cloreto de sódio. Qual dos estudantes está certo? Por quê? Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

16. Como a glicose tem uma massa molar (180 g/mol) menor do que a da sacarose (342 g/mol), embora as concentrações, em g/L, de ambas as soluções sejam as mesmas, a glicose terá maior concentração em quantidade de matéria. Portanto, se ambas as soluções estiverem à mesma temperatura, a solução de glicose terá maior pressão osmótica.

PENSANDO CIÊNCIAS

COMO DESCOBRIR SE O LEITE FOI ADULTERADO?

Alexeysun/Shutterstock.com/ID/BR

O leite processado industrialmente pode ser pasteurizado ou esterilizado pelo método UHT (sigla para *ultra high temperature*).

A indústria alimentícia segue normas rígidas que regulam a qualidade dos produtos comercializados para o consumo humano. Alterações na composição dos alimentos, porém, podem ocorrer por acidente ou mesmo intencionalmente. No caso do leite, pode-se citar a adição de substâncias proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a fim de aumentar o rendimento e/ou disfarçar a deterioração do produto.

Reúna-se em grupo e imagine a seguinte situação: Você e os colegas de grupo fazem parte do setor de inspeção de produtos lácteos e receberam uma denúncia de que o fabricante de determinada marca de leite está adulterando o produto. Como vocês fariam para determinar se a composição do leite foi alterada?

Decompondo o problema

Inicialmente, vocês vão decompor o problema complexo em problemas mais simples de ser resolvidos. Para responder à questão "Como determinar se a composição do leite foi alterada?", é necessário conhecer a regulamentação da indústria de laticínios, as fraudes geralmente aplicadas nesse segmento, a maneira como o leite é fiscalizado pelas autoridades, entre outros aspectos.

Algumas sugestões de perguntas:

- Qual é o padrão de qualidade determinado para os leites processados?
- Que aditivos legais podem ser colocados no leite?
- Quais substâncias são geralmente usadas para adulterar o leite?
- Como detectar a presença de substâncias ilegais no leite?
- Que materiais devem ser utilizados para fazer a análise da composição do leite?

Reconhecendo padrões

Partindo da pergunta "Como detectar a presença de substâncias ilegais no leite?", é possível reconhecer características dessa situação que sejam comuns a outras situações que envolvem a identificação de substâncias em uma amostra.

Por exemplo, se você adicionar iodo em uma amostra de farinha de trigo, vai notar que a região dessa amostra em que o iodo foi aplicado fica mais escura. Isso acontece porque a farinha de trigo tem amido em sua composição e esse carboidrato reage com o iodo, passando da cor laranja para a cor preta. A mudança de coloração do iodo, portanto, evidencia a ocorrência de uma reação química entre ele e o amido presente na farinha.

Discuta com os colegas de grupo se faria sentido pensar em reações químicas para identificar a presença de substâncias ilegais no leite adulterado. Reconheçam também padrões para os demais problemas levantados na etapa anterior.

Fotografias: Mar de Palha/ID/BR





Ao aplicar iodo em uma amostra de açúcar (**A**) e em uma amostra de farinha de trigo (**B**), nota-se que a reação ocorre apenas na farinha de trigo. Logo, apenas a farinha apresenta amido em sua composição.

Não escreva no livro.

Abstraindo o problema

Cada detalhe levantado ao se estudar um problema mais complexo envolve questionamentos. Alguns deles, porém, não são pertinentes para o estudo em questão. Por isso, é importante abstrair os pontos relevantes de um problema. Para isso, vamos voltar à questão: "Como detectar a presença de substâncias ilegais no leite?"

Uma das substâncias adicionadas ilegalmente ao leite para mascarar o gosto azedo de sua deterioração é o hidróxido de sódio (NaOH), conhecido popularmente como soda cáustica. A presença de substâncias básicas como a soda cáustica pode ser evidenciada por meio de um indicador de acidez, como a fenolftaleína, que fica incolor em meio ácido e cor-de-rosa em meio básico. O leite fraudado com água também fica levemente mais básico.

Analisem se o uso de um indicador de acidez é uma opção interessante para detectar a presença de substâncias ilegais no leite. Na discussão, procurem identificar os aspectos que realmente importam à solução do problema. Por exemplo: A marca do indicador de acidez é relevante? Não. Quem vai aplicar o produto é relevante? Também não. Existem outros indicadores de acidez? Sim. Quais são eles e como funcionam? Para essa questão, é possível organizar uma tabela com as informações a respeito de vários tipos de indicador de acidez conhecidos.

Indicador de acidez	Que cor fica em meio ácido?	Que cor fica em meio básico?	Facilidade de obtenção e custo
fenolftaleína	incolor	cor-de-rosa	//////////////////////////////
//////////////////////////////	//////////////////////////////	//////////////////////////////	//////////////////////////////
//////////////////////////////	//////////////////////////////	//////////////////////////////	//////////////////////////////

Além disso, levantem questionamentos a respeito dos outros problemas. É importante considerar que a mudança de coloração é apenas uma das evidências da ocorrência de uma reação química. Outro ponto é que substâncias similares podem desencadear as mesmas reações.

Buscando soluções

Em grupo, discutam uma possível solução para o problema, descrevendo qual procedimento e quais materiais serão utilizados. Compartilhem a ideia com o(a) professor(a) para que ele(a) possa avaliá-la.

Elaborando o algoritmo

A solução de um problema pode ser expressa na forma de um algoritmo, que apresenta o passo a passo do que deve ser realizado.

Tomando como exemplo a tarefa de pendurar um quadro pequeno na parede, é necessário: **a**. marcar na parede, com um lápis, o local onde se deseja colocar o prego; **b**. escolher um prego com cabeça de tamanho adequado ao quadro; **c**. segurar o prego, posicionando sua ponta sobre a marca a lápis na parede; **d**. com a outra mão, usar o martelo para bater algumas vezes na cabeça do prego até que entre na parede; **e**. pendurar o quadro na parede, pelo seu suporte.

Com base na pesquisa e na discussão em grupo, elaborem um algoritmo para determinar se há alguma substância ilegal no leite denunciado por adulteração.

Dragon Images/Shutterstock.com/ID/BR

Elaborar um passo a passo antes de executar uma tarefa nos ajuda a não esquecer nenhuma etapa do processo.

Para discutir

1 **Compartilhem com os demais grupos o algoritmo que desenvolveram e analisem o algoritmo deles. Depois, discutam as diferenças e as semelhanças entre eles.**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Quais são as limitações do algoritmo desenvolvido em cada grupo?**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Quais foram as principais dificuldades para desenvolver essa atividade? Como cada grupo lidou com elas?** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

QUESTÕES GLOBAIS

1. Na Lua, a pressão atmosférica é muito baixa, pois a quantidade de gases em sua superfície é muito pequena. A altura do barômetro de Torricelli, portanto, seria muito pequena, ou seja, quase todo o mercúrio escoaria.

1 A pressão atmosférica na Lua pode ser considerada desprezível em razão de ser muito baixa. Como você acha que o barômetro de Torricelli se comportaria na Lua? Explique seu raciocínio e discuta com os colegas. Vocês chegaram às mesmas conclusões?

2 (**Enem**)

Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo *diesel* com 13000 ppm de enxofre. Em 2009, o *diesel* passou a ter 1800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o *diesel* S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o *diesel* S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um *diesel* com teores de enxofre ainda menores.

Os impactos da má qualidade do óleo *diesel* brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br.* Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

*Fonte de pesquisa atualizada: https://repositorio.itl.org.br/jspui/bitstream/123456789/161/1/Cartilha%20-%20Os%20impactos%20da%20m%C3%A1%20qualidade%20do%20%C3%B3leo%20diesel%20brasileiro.pdf. Acesso em: 2 maio 2025.

A substituição do *diesel* usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão de SO_3 de: Alternativa **d**.

a) 86,2%
b) 96,2%
c) 97,2%
d) 99,6%
e) 99,9%

3 (**UFU-MG**) Em uma atividade experimental o professor pegou duas garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta. Alternativa **b**.

a) O balão que murchou foi colocado em água quente, pois o aumento da temperatura causou uma contração dos gases da bexiga.
b) O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente, devido ao aumento da temperatura do sistema e à expansão dos gases presentes na bexiga.
c) O volume do balão que foi colocado em água fria diminuiu, porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo o choque das partículas de gás com as paredes do balão.
d) Em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado, porque o tamanho das partículas de gás foi modificado.

4 (**Unifor-CE**) Um pneu de automóvel contém ar sob pressão de 3,0 atm à temperatura de 7,0 °C. Após viagem de 72 km, verifica-se que a temperatura do pneu atinge 47 °C. Considerando o ar um gás ideal e desprezando a variação de volume do pneu, a pressão do ar nessa nova condição vale, em atmosferas:

a) 3,1
b) 3,4 Alternativa **b**.
c) 3,7
d) 4,0
e) 4,3

5 (**Enem**) A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Alternativa **d**.

a) 1,0 mL
b) 1,7 mL
c) 2,7 mL
d) 4,0 mL
e) 6,7 mL

6 (**Unifesp**) A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm (partes por milhão). Uma amostra de 100 g da crosta terrestre contém um valor médio, em mg de chumbo, igual a: Alternativa **d**.

a) 20
b) 10
c) 5
d) 2
e) 1

Não escreva no livro.

7 **(FCMSC-SP)** Um cilindro metálico de volume constante contém uma quantidade invariável de certo gás a 47 °C e pressão igual a P1.

Ao elevar a temperatura do gás no interior do cilindro, atinge-se 147 °C. Nessa temperatura, a pressão P2 do gás será, aproximadamente, Alternativa **b**.

a) 13,1 × P1.
b) 1,31 × P1.
c) 10 × P1.
d) 100 × P1.
e) 131 × P1.

10. a) O leite desnatado tem quantidades elevadas de cálcio e proteínas quando comparado ao soro. Ambos são similares quanto ao teor de lactose (9,8 g e 10 g) e apresentam baixa quantidade de gordura (0,5 g e 1,0 g). Portanto, deve-se concordar parcialmente.

8 **(Uece)** Como o monóxido de carbono (CO) causa vários danos à saúde, sua presença no ar atmosférico deve ser controlada. A principal fonte de emissão desse gás é a queima incompleta de combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o *diesel*. O quadro a seguir mostra a relação do monóxido de carbono na atmosfera com os sintomas em seres humanos.

CO no ar (%)	Sintomas em seres humanos
0,001	sem efeito
0,050	vertigens, desmaio
0,200	coma e morte
0,500	morte rápida

O teor desse gás na atmosfera em uma sala, um edifício, um veículo ou em qualquer espaço fechado deve ser mantido a não mais de 0,0039% como um nível de exposição média de oito horas. Baseando-se no quadro anterior, o que poderá acontecer com um indivíduo que ficar em exposição durante um período de oito horas se o nível de monóxido de carbono atingir 0,083%?

a) Nada acontecerá.
b) Terá vertigens e desmaio. Alternativa **b**.
c) Entrará em coma.
d) Terá morte rápida.

9 **(UFSC)** Alternativas corretas: 02, 04 e 08.

Notícias de acidentes com produtos químicos infelizmente são recorrentes nos noticiários. Esses acidentes causam, muitas vezes, impactos ao meio ambiente e à saúde dos que estão próximos ao evento. Em julho de 2022 ocorreu um acidente com um caminhão que transportava, entre outros produtos, etanol 70% e 90%, em massa.

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2022/07/27/caminhao-carregado-com-produtos-quimicos-tomba-e-interdita-acesso-a-avenida-na-zona-leste-de-ribeirao-preto-sp.ghtml. Acesso em: 19 set. 2024.

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

01. os valores 70% e 90% estão relacionados com a massa molar do álcool utilizado.
02. o etanol 70%, comercializado como "álcool 70" e amplamente usado para sanitização durante a pandemia de covid-19, possui 70% em massa de etanol e 30% em massa de água.
04. o etanol 70% é um líquido inflamável que estaria sujeito à combustão devido à presença de água, que é um comburente, e ao calor produzido pela irradiação solar no local do acidente.
08. o etanol produzido no Brasil é um biocombustível originado de vegetais, como a cana-de-açúcar.
16. a neutralização do derramamento com uma solução aquosa de detergente não seria efetiva, porque a solubilidade do etanol em água é limitada e haveria precipitação do álcool.

10 **(Unicamp-SP)** Nos últimos tempos, os consumidores observaram que, nas gôndolas dos supermercados, apareceram vários produtos alternativos derivados de leite, como as bebidas lácteas. Matéria veiculada recentemente em portal de notícias questiona: "Essas bebidas lácteas são saudáveis?". O entrevistado responde: "O soro de leite pode ser consumido como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura". A reportagem traz ainda uma série de informações sobre a composição do leite, do soro e de uma bebida láctea, conforme apresentado na tabela 1.

Comparação entre leite, soro e bebida láctea para 1 copo de 200 mL.

Tabela 1

	Leite integral	Soro	Bebida láctea*
Proteínas / g	6,6	1,5	4,0
Gorduras / g	8,0	0,5	4,0
Lactose / g	9,8	9,8	9,8
Cálcio / g	280	70	95

Comparação entre leite, soro e bebida láctea para 1 copo de 200 mL.

Tabela 2

	Leite desnatado **
Proteínas / g	5,8
Gorduras / g	1,8
Lactose / g	10
Cálcio / g	260

* A composição da bebida láctea foi calculada considerando uma mistura de 60% de soro de leite e 40% de leite integral.
** Dados obtidos a partir do rótulo de um produto comercializado.

a) Com base nas informações das duas tabelas, você concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda da declaração atribuída ao entrevistado? Justifique sua resposta.
b) Considerando que os dados da bebida láctea tenham sido calculados em conformidade com o que se informa no rodapé das tabelas, e que os outros dados dessa tabela estejam corretos, há algum erro nos dados da bebida láctea? Justifique.

10. b) As quantidades de proteínas, gorduras e cálcio na mistura estão incorretas. Usando 80 mL de leite integral e 120 mL de soro para preparar um copo de bebida láctea na proporção indicada, obtém-se 3,54 g de proteínas, 3,5 g de gorduras e 154 g de cálcio.

Não escreva no livro.

ENERGIA E TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA

Muitas vezes, é possível identificar se uma fruta está madura pela cor que ela apresenta. O amadurecimento envolve várias reações químicas, e alguns fatores podem retardar ou acelerar esse processo. A temperatura é um deles. No verão, as frutas amadurecem mais rapidamente do que no inverno.

Nesta unidade, você vai compreender como tornar uma reação mais rápida ou mais lenta. Verá também como a energia envolvida nas reações está presente em várias situações do dia a dia, bem como no funcionamento do corpo humano e na escolha de um combustível, entre outras.

OBJETIVOS

- Compreender como ocorre a absorção e a liberação de energia nas reações químicas e a sua relação com situações do dia a dia e os processos produtivos.
- Estimar, por diferentes métodos, a energia absorvida ou liberada em uma reação química.
- Compreender como é calculada a rapidez ou a taxa das reações químicas.
- Reconhecer os fatores que alteram a rapidez de uma reação química e suas implicações em situações do dia a dia e nos processos produtivos.

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. A foto mostra frutos verdes e maduros. Além da cor, quais são as outras características de um alimento que podemos observar para decidir se ele está pronto para o consumo?
2. Cite algumas situações do dia a dia em que o ser humano precisa de energia.
3. A deterioração de um alimento é causada por reações químicas que ocorrem com os seus ingredientes. O que pode ser feito para retardar esse processo?

2. Resposta variável. O ser humano precisa de energia para se alimentar, praticar atividades físicas, trabalhar, estudar, etc.

3. Resposta variável. Pode-se, por exemplo, conservar o alimento na geladeira e guardá-lo em um recipiente bem vedado, impedindo a entrada de microrganismos. Caso o alimento não precise ser refrigerado, guardá-lo em um local seco e arejado.

Jabuticabeira com frutos maduros e verdes. ▸



Patricia Peceguini Viana/Shutterstock.com/ID/BR

UNIDADE 4

1 Termoquímica

2 Cinética química

TERMOQUÍMICA

PARA COMEÇAR

1. O corpo humano necessita de energia para a manutenção de suas funções vitais e para a realização de várias atividades, como as essenciais à sua sobrevivência. Cite algumas dessas atividades que fazem parte do seu dia a dia.
2. Por que alimentos ricos em gordura são muito calóricos?
3. Assim como o corpo humano necessita de energia para realizar atividades, no dia a dia a energia também é necessária para aquecer ambientes, movimentar veículos e máquinas, etc. De que maneira o consumo energético para essas atividades está relacionado à intensificação do aquecimento global?

1. Resposta pessoal. O ser humano precisa de energia para se alimentar, praticar atividades físicas, trabalhar, estudar, etc.

2. Porque a gordura tem um alto valor energético, ou conteúdo energético, mais do que o dobro do valor energético de carboidratos e proteínas, e sua queima libera mais energia do que os outros nutrientes.

3. A queima dos combustíveis fósseis libera gás carbônico na atmosfera, principal responsável pela intensificação do aquecimento global. Esse processo ocorre tanto nos motores dos veículos quanto na produção de energia elétrica em usinas termoelétricas. As usinas hidrelétricas também contribuem para o problema, pois muitas vezes a instalação das usinas causa devastação de grandes áreas naturais.

A ENERGIA DOS ALIMENTOS É QUÍMICA

Você já deve ter ouvido falar em valor energético ou conteúdo calórico de alimentos. Esse valor corresponde à energia produzida no corpo pela ingestão de certa massa de determinado alimento.

Podemos encontrar essa informação na tabela nutricional impressa nos rótulos de alimentos comercializados no mundo todo. Mas o que significam esses valores? Como são determinados? Qual é a relação entre os nutrientes listados e o valor energético de cada alimento?

Essas e outras questões sobre a energia envolvida nas transformações químicas são tratadas pela termoquímica, um dos tópicos da Termodinâmica, e serão desenvolvidas ao longo deste capítulo.

Por meio do metabolismo celular, nosso corpo é capaz de obter energia de carboidratos, proteínas e gorduras por um processo chamado de respiração celular, que envolve um conjunto complexo de reações químicas em que os nutrientes são transformados em dióxido de carbono (CO_2) e em água (H_2O). Essa energia é armazenada em moléculas de adenosina trifosfato ou ATP, que são utilizadas pelas células para disponibilizar a energia necessária para o funcionamento do organismo.

Você já deve ter ouvido falar que os carboidratos são os combustíveis do corpo e, efetivamente, essa é uma das principais funções desse nutriente. Entretanto, nosso organismo pode utilizar gordura ou até mesmo proteína como fonte de energia: 1 g de carboidrato ou de proteína fornece 4 kcal de energia, 1 g de gordura fornece 9 kcal, ou seja, a gordura apresenta um conteúdo energético muito maior.

A energia responsável pelo funcionamento do organismo é fornecida pelos alimentos, ou seja, pelos nutrientes como os carboidratos, a gordura e as proteínas.

Heatonright/Carlos Gawronski/Stock/Getty Images

Não escreva no livro.

TRANSFORMAÇÕES EXOTÉRMICAS E ENDOTÉRMICAS

Toda transformação de matéria envolve troca de energia entre o sistema e o ambiente, ou seja, a energia liberada ou absorvida durante determinada transformação em um sistema é trocada com o ambiente. No caso de a transformação **liberar energia** para o ambiente, ela é classificada como **exotérmica**. É o que ocorre durante a combustão do gás metano (CH_4) presente no gás natural. O calor liberado nessa transformação, além de aquecer a vizinhança – aquecimento do ar ao redor da chama –, servirá também para ferver água em uma panela ou cozinhar alimentos. Nesse caso, a fervura da água e o cozimento de alimentos são exemplos de transformações **endotérmicas**, em que o sistema **absorve energia** na forma de calor do ambiente durante a transformação.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Em processos exotérmicos, como a queima de um combustível, a energia produzida pela reação é transferida para o ambiente. Já em processos endotérmicos, como a fusão e a ebulição de uma substância, a energia é transferida do ambiente para o sistema, para que a transformação ocorra.

A combustão do metano e a vaporização da água podem ser representadas respectivamente pelas equações:

$$CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(g) + \text{calor}$$

$$H_2O(\ell) + \text{calor} \rightleftharpoons H_2O(g)$$

Considerando o Princípio da Conservação da Energia, podemos afirmar que, se energia na forma de calor foi liberada para o ambiente durante a combustão do metano, a energia interna do sistema diminuiu, ou seja, os produtos apresentam menos energia do que os reagentes.

Da mesma maneira, a energia absorvida pela água em ebulição é armazenada nas moléculas de água no estado gasoso, que apresenta maior liberdade de movimento do que as moléculas de água no estado líquido. Logo, a energia do sistema, constituído agora de água no estado gasoso, é maior do que a energia que ele tinha quando a água estava no estado líquido. Esse princípio pode ser descrito por meio de diagramas de energia (figuras **A** e **B**).

ATIVIDADE RESOLVIDA

O processo de fusão de qualquer sólido é endotérmico. Se a fusão de 10 g de gelo absorve 800 kcal, qual seria a quantidade de energia envolvida na solidificação de 50 g de água líquida?

Resolução

Se a fusão de 10 g de gelo absorve 800 kcal, então a fusão de 50 g de gelo (5 vezes mais matéria) envolveria 4 000 kcal (5 · 800 kcal).

Pelo Princípio da Conservação da Energia, se a fusão do gelo absorve energia, ou seja, é um processo endotérmico, a solidificação da água (processo inverso) libera energia, ou seja, é exotérmico.

Logo, a solidificação de 50 g de água libera 4 000 kcal.

DE OLHO NO CONCEITO

Primeira Lei da Termodinâmica

Um sistema pode trocar energia com o ambiente na forma de calor (Q) ou trabalho (τ). Segundo a Iupac (sigla em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada), a energia interna de um sistema é representada pela letra U, e a variação dessa energia (ΔU) é resultado das trocas de calor entre sistema e ambiente e o trabalho realizado pelo sistema ou sobre ele. A variação da energia interna do sistema é dada pela expressão:

$$\Delta U = Q + \tau$$

Essa é a forma algébrica da Primeira Lei da Termodinâmica, que estabelece que a energia pode ser transferida na forma de calor ou trabalho, mas não pode ser perdida nem criada.



ID/BR



ID/BR

Diagramas de energia representando a energia interna dos sistemas químicos. Em um processo exotérmico, como a combustão do metano (**A**), os produtos apresentam menor energia do que os reagentes. A vaporização da água (**B**) é um processo endotérmico; logo, 1 mol de moléculas de água no estado gasoso tem mais energia do que 1 mol de moléculas de água no estado líquido à mesma temperatura.

A evolução dos termômetros

Joule e a conversão de energia em calor

O físico britânico James P. Joule (1818-1889) determinou, na primeira metade do século XIX, que a energia potencial gravitacional poderia ser transformada em calor sensível e aquecer uma amostra de água.

Com medidas cuidadosas, Joule demonstrou a relação entre o trabalho mecânico expresso em N · m e o calor expresso em calorias. Seu experimento mais célebre consistiu em deixar cair de determinada altura, repetidamente, um peso conectado a um eixo com pás, e medir o aquecimento da água ocasionado pelo movimento das pás.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Esquema do dispositivo criado por Joule.

Fonte de pesquisa: Burrows, A. *et al*. Chemistry³: introducing inorganic, organic and physical chemistry. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2021. p. 615.

Em seus experimentos obteve a relação de 1 cal = 4,15 J. Os valores aceitos hoje são de 1 cal = 4,18 J.

ROTEIRO

1. **Em uma bomba calorimétrica, a combustão de 10 g de glicose aqueceu 2 000 g de água em 18,7 °C. Determine a energia liberada na combustão de 1 g de glicose.**
2. **Determine a variação de temperatura de uma amostra de 250,0 g de água em uma bomba calorimétrica, inicialmente a 20 °C, após a combustão de 0,5 g de etanol. Considere que o calor de combustão do etanol é de 29,7 kJ/g e o calor específico da água é de 4,18 J/g · °C.**

1. 3,74 kcal
2. 14,2 °C

ENERGIA ENVOLVIDA NAS TRANSFORMAÇÕES

Para determinar a energia envolvida em uma reação química, utilizamos a bomba calorimétrica, equipamento isolado termicamente do ambiente. Esse equipamento possibilita que o calor envolvido na transformação seja completamente transferido para o aquecimento do sistema, que, em geral, corresponde a determinada massa de água. No caso de reações de combustão, utiliza-se uma resistência elétrica para a ignição do combustível e uma atmosfera de gás oxigênio puro para garantir que a queima seja completa.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Esquema de bomba calorimétrica. A transformação ocorre na câmara de reação e verifica-se o aumento da temperatura da água no termômetro.

Fonte de pesquisa: Calorimeter. *In*: Encyclopedia Britannica, 26 abr. 2022. Disponível em: https://www.britannica.com/technology/calorimeter. Acesso em: 15 out. 2024.

O calor da reação é calculado pela lei fundamental da calorimetria.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$I_2(g) + C\ell_2(g) \rightleftharpoons 2\,IC\ell(g)$$

- Q é o calor envolvido na transformação;
- m é a massa de água presente na bomba calorimétrica;
- c é o calor específico da água, ou seja, a energia necessária para aquecer 1 g de água em 1 °C;
- ΔT é a variação de temperatura da água na bomba calorimétrica ($T_{Final} - T_{Inicial}$).

Para determinar o calor de combustão do metano, por exemplo, foram colocados em uma bomba calorimétrica 500 g de água, inicialmente a 25 °C, e na câmara de reação estavam presentes 1,0 g de metano e gás oxigênio em excesso. Após a combustão, verificou-se que a temperatura final da água era de 50 °C. Considerando que o calor específico da água é de 1 cal/g · °C, podemos determinar o calor liberado na combustão de 1,0 g de metano.

$Q = 500 \cdot 1 \cdot (50 - 25) = 12\,500$ cal ou 12,5 kcal

A unidade de energia caloria (cal) equivale à energia necessária para aquecer 1,0 g de água em 1 °C; não é uma coincidência que isso equivalha ao calor específico da água. Essa unidade é muita prática, pois é muito comum usar o aquecimento de uma massa conhecida de água para determinar a energia trocada entre sistemas. A unidade quilocaloria (kcal) equivale a 1 000 calorias.

Já a unidade de energia do Sistema Internacional (SI), bastante utilizada em Física para relacionar a energia transferida na forma de calor com a energia mecânica e o trabalho realizado por uma máquina, é o joule (J). O joule equivale à força de um newton (N) aplicada para o deslocamento de um metro (m) ou 1 J = 1 N · m.

Uma caloria equivale a 4,18 J, ou seja, o calor específico da água na unidade SI é 4,18 J/g · °C e a energia liberada na combustão de 1,0 g de metano é de 52,25 kJ (12,5 · 4,18).

Não escreva no livro.

1. O etanol é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar, ou seja, é um biocombustível, já a gasolina é obtida do fracionamento do petróleo, um combustível fóssil. O dióxido de carbono liberado da queima do etanol foi de certa maneira absorvido pela fotossíntese no desenvolvimento da cana-de-açúcar, havendo uma compensação e pouca ou nenhuma contribuição para o aquecimento global. Já no caso da gasolina, o dióxido de carbono liberado na combustão é proveniente de um carbono que estava fora do ciclo do carbono há milhões de anos, contribuindo significativamente para o aquecimento global.

PODER CALORÍFICO DE UM COMBUSTÍVEL E CALOR DE COMBUSTÃO

A energia liberada na combustão completa de 1,0 g ou 1,0 kg de combustível é conhecida como **poder calorífico**. Esse é um dos parâmetros importantes na escolha de um combustível.

PODER CALORÍFICO DE COMBUSTÍVEIS

Combustível	Etanol anidro	Etanol hidratado	Gasolina A (sem etanol)	Gasolina C (27% de etanol anidro)	Carvão	Óleo *diesel*	Metano
Poder calorífico (kJ/kg)	28 215	26 334	43 472	39 292	31 354	42 218	49 909

Fonte de pesquisa: EPE/Balanço Energético Nacional. Fatores de conversão, densidades e poderes caloríficos inferiores. ANP, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/arquivos-anuario-estatistico-2024/outras-pecas-documentais/fatores-conversao.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

Entretanto, para discutir aspectos relacionados aos fenômenos químicos em si, é comum apresentar a quantidade de energia por mol de combustível, afinal, as propriedades químicas são mais bem expressas se analisamos o material pela quantidade de matéria do que pela massa. Chamamos a grandeza que expressa a energia liberada por mol de combustível de **calor de combustão**.

Por exemplo, se pensarmos na contribuição de combustíveis fósseis para o aquecimento global, é importante comparar os que emitem mais energia por quantidade de gás carbônico liberado.

CALOR DE COMBUSTÃO DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS

Substância	Metano	Butano	Etanol	Glicose	Sacarose	Hidrogênio
Fórmula	CH_4	C_4H_{10}	C_2H_5OH	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{11}$	H_2
Calor de combustão (kJ/mol)	891	2 878	1 367	2 820	5 638	286

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 5-67.

AÇÃO E CIDADANIA

Comparando a gasolina e o etanol

Considerando que a densidade do etanol hidratado é de 0,809 kg/L e a da gasolina C – que contém 27% de etanol anidro em volume – é de 0,754 kg/L, podemos calcular que 1 L de álcool combustível libera aproximadamente 70% da energia de 1 L da gasolina disponível nos postos de combustível.

Calor liberado na queima de 1 L de etanol: $Q_{etanol} = 26\,334 \cdot 0{,}809 = 21\,304{,}2$ kJ.

Calor liberado na queima de 1 L de gasolina: $Q_{gasolina} = 39\,292 \cdot 0{,}754 = 29\,626{,}2$ kJ.

$$\frac{Q_{etanol}}{Q_{gasolina}} = \frac{2134{,}21}{29626{,}2} \approx 72\%$$

Desse modo, para um carro *flex*, que pode ser abastecido com etanol hidratado ou gasolina C, quando o preço por litro do etanol corresponde a 70% ou menos do preço da gasolina, é vantagem financeira abastecer o carro com álcool. Note que pelo álcool fornecer menos energia, invariavelmente a autonomia do veículo será menor, mantendo-se as demais condições de consumo.

1. Além da questão do preço do combustível e da autonomia do veículo, devemos considerar a contribuição dos combustíveis para o aquecimento global. Converse com os colegas sobre o motivo do etanol ser um combustível menos poluente do que a gasolina.

Daniel Cymbalista/Pulsar Imagens

No Brasil, os automóveis do tipo *flex* podem ser abastecidos com etanol hidratado ou com gasolina C, que atualmente contém 27% de etanol anidro. São Paulo (SP). Foto de 2018.

ENTALPIA E VARIAÇÃO DE ENTALPIA DE REAÇÃO

Em transformações em que a pressão do sistema permanece constante, a energia envolvida em uma transformação química é denominada variação de entalpia (ΔH). A adoção da função entalpia (H) permitiu simplificações importantes nas equações termodinâmicas e, por isso, é adotada para as reações químicas realizadas em sistemas abertos, pois, nesse caso, a pressão se mantém constante.

Apesar de o estudo da termoquímica no Ensino Médio não detalhar as equações termodinâmicas, usualmente utilizamos a variação de entalpia como sinônimo do calor de reação. A variação de entalpia de reação ($\Delta H_{reação}$) pode ser descrita como a diferença entre a entalpia do sistema final (H_F) e a entalpia do sistema inicial (H_I). Como estamos falando de transformações químicas, podemos considerar a diferença entre a entalpia dos produtos (H_{Prod}) e a entalpia dos reagentes (H_{Reag}).

Assim, $Q_{Reação} = \Delta H_{Reação} = H_{Prod} - H_{Reag}$

Note que a função entalpia da maneira que estamos adotando pode ser considerada equivalente à energia interna do sistema, ou seja, H_{Prod} equivale à energia interna dos produtos, enquanto H_{Reag} equivale à energia interna dos reagentes.

Como em toda reação exotérmica a energia interna dos produtos é menor do que a energia interna dos reagentes, podemos dizer que transformações exotérmicas apresentam **variação de entalpia negativa**, ou $\Delta H < 0$. As variações de entalpia de combustão são todas negativas, pois toda combustão é exotérmica.

Já os processos endotérmicos apresentam **variação de entalpia positiva**, ou seja, $\Delta H > 0$.

A decomposição do carbonato de cálcio ($CaCO_3$), substância extraída do calcário em fornos de calcinação em temperaturas superiores a 900 °C, é um exemplo de reação endotérmica. Esse processo de decomposição é utilizado para a produção de cal virgem (CaO), substância presente em diversos procedimentos industriais, especialmente pelo seu caráter básico.

Ilustrações: Renan Oracic/ID/BR



Diagrama de variação de entalpia da combustão do metano, um processo exotérmico.

Renan Oracic/ID/BR



Diagrama de variação de entalpia da decomposição do carbonato de cálcio, um processo endotérmico.

Chemical industry/Shutterstock.com/ID/BR

RHJPhotos/Shutterstock.com/ID/BR

O carbonato de cálcio (**A**) extraído do calcário é decomposto em dióxido de carbono e cal virgem, ou óxido de cálcio (**B**). O óxido de cálcio é utilizado na construção civil, na indústria petroquímica e nas metalúrgicas.

Variação de entalpia nas mudanças de estado físico

As mudanças de estado físico são transformações reversíveis que nos ajudam a compreender diversos fatores relacionados ao estudo da termoquímica. A vaporização de um líquido, que tanto pode ser a ebulição ou a evaporação, é um processo endotérmico, que retira calor da vizinhança. Percebemos que a ebulição da água cessa imediatamente ao apagarmos a chama do fogão, ou que sentimos muito frio se estivermos molhados ao vento, situação em que há rápida evaporação da água.

Não escreva no livro.

Em Física, chamamos a energia necessária para vaporizar 1 g de água de calor latente de vaporização (L_{vap}). Em Química, normalmente trabalhamos com a entalpia de vaporização (ΔH_{vap}), que corresponde à energia necessária para vaporizar 1 mol (ou 18 g) de água.

A transformação do estado gasoso em estado líquido é conhecida como condensação, processo exotérmico que libera a mesma quantidade de energia que foi absorvida durante a vaporização.

A vaporização de um líquido é explicada pelo rompimento de interações intermoleculares – no caso da água, as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas. O **rompimento de ligações** precisa de energia, por isso é um processo **endotérmico**. Já a condensação envolve a formação das interações intermoleculares, caracterizando o estado líquido. A **formação de ligações** libera energia, portanto, é um processo **exotérmico**.

Podemos assumir que a fusão e a solidificação seguem a mesma lógica: a fusão do gelo é um processo endotérmico; já a solidificação libera energia para o ambiente, em um processo exotérmico. Na fusão, interações que ocorrem no retículo cristalino do sólido são rompidas, e, na solidificação, essas mesmas interações precisam ser refeitas.



Renan Oracic/ID/BR

Esquema relacionando as transformações vaporização e condensação da água a 100 °C e pressão de 1 bar.



Renan Oracic/ID/BR

Esquema relacionando as transformações fusão e solidificação da água a 0 °C e pressão de 1 bar.

CALOR LATENTE (*L*) E ENTALPIA (ΔH) DE VAPORIZAÇÃO E FUSÃO DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS

Substância	Fórmula	L_{fus} (kJ/g)	ΔH_{fus} (kJ/mol)	L_{vap} (kJ/g)	ΔH_{vap} (kJ/mol)
Água	H_2O	0,33	6,0	2,25	40,5
Amônia	NH_3	0,33	5,6	1,38	23,4
Benzeno	C_6H_6	0,13	9,9	0,43	33,8
Mercúrio	Hg	0,011	2,3	0,30	59,2

Fonte de pesquisa: HAYNES, W. M. (ed.). *Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

CIÊNCIA SE DISCUTE

Alfred Nobel e a invenção da dinamite

Um explosivo é uma substância que se decompõe rapidamente, liberando grande quantidade de energia e formando um volume elevado de gases.

A pólvora, um dos primeiros explosivos dos quais se tem registros, foi inventada pelos chineses no século IX. Esse explosivo é produzido misturando salitre ($NaNO_3$), carvão e enxofre em proporções adequadas. Por vários séculos, a pólvora foi o único explosivo que podia ser usado de forma mais segura e eficiente.

Em meados do século XIX, outros explosivos foram inventados, como a nitrocelulose e a nitroglicerina. Esses explosivos causaram muitos acidentes. A nitroglicerina explode facilmente quando é aquecida ou sofre algum impacto.

O sueco Alfred Nobel (1833-1896) era filho de um empresário que fabricava explosivos. Em 1864, um galpão usado para produzir nitroglicerina na fábrica explodiu, matando quatro funcionários e o irmão mais novo de Nobel. Depois de estudar sobre explosivos nos Estados Unidos e na França, Nobel inventou a dinamite, em 1867. A dinamite se mostrou uma substância mais segura para o manuseio e o armazenamento do que a nitroglicerina.

Nobel abriu fábricas de explosivos em vários países e também investiu na exploração de petróleo na Rússia, acumulando uma grande fortuna.

Nobel sofreu muitas críticas pelo uso da dinamite em guerras e conflitos. No entanto, seu objetivo, ao criar novos explosivos, era permitir que fossem usados de maneira mais segura em aplicações como a abertura de túneis, a construção de ferrovias e rodovias, a extração de matérias-primas em pedreiras, etc.

Para mostrar que sua intenção com a produção de explosivos não era que eles fossem utilizados para fins bélicos, Nobel deixou praticamente toda a sua fortuna para a Fundação Nobel, que instituiu o Prêmio Nobel. Esse prêmio é concedido anualmente, desde 1901, a contribuições destacadas nas áreas de Química, Física, Medicina, Literatura e promoção da paz. Em 1969, a Academia Real de Ciências da Suécia passou a premiar também trabalhos na área de Economia.

1. **Em sua opinião, até que ponto um cientista pode ser responsabilizado pela invenção de um material ou um artefato que pode trazer ao mesmo tempo benefícios e prejuízos ao ser humano?** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

AÇÃO E CIDADANIA

Tabela nutricional de alimentos

1. O componente não especificado é a água. Alimentos mais úmidos vão apresentar maior teor de água e, consequentemente, maior massa não indicada na tabela nutricional.

Os alimentos industrializados devem apresentar uma tabela nutricional indicando o conteúdo energético e a quantidade dos macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gordura, além das informações nutricionais de sódio e fibras alimentares.

Atualmente, além dos carboidratos, os rótulos devem indicar a quantidade total de açúcar e a quantidade de açúcar adicionada ao produto. Também deve ser especificada a quantidade de gordura saturada e de gordura *trans* nos alimentos.

Essas informações são importantes, pois carboidratos complexos são considerados mais saudáveis, porque são absorvidos de modo lento e contínuo pelo organismo, não alterando abruptamente a taxa de glicemia do sangue, como ocorre na ingestão de açúcares adicionados.

Já a gordura saturada e especialmente a gordura *trans* estão associadas a problemas relacionados à arterioesclerose, ou seja, à formação de placas que impedem a passagem do sangue em veias e artérias. A gordura saturada deve se limitar a 40% da gordura total ingerida, mas, em relação à ingestão de gordura *trans*, não há limite considerado seguro.

Fernando Favoretto/ID/BR



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 80 g (1 prato)

Quantidade por porção		% VD(*)
Valor energético	277 kcal = 1.163 kJ	14
Carboidratos	59 g	20
Proteínas	8,2 g	11
Gorduras totais	0,9 g	2
Gorduras saturadas	0,4 g	2
Gorduras *trans*	0 g	**
Fibra alimentar	2,2 g	9
Sódio	20 mg	1

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.

Todos os rótulos devem conter as informações nutricionais para uma porção de 100 g e para uma porção típica, que deve ser quantificada por uma medida caseira (colheres, número de unidades).

Daniel Cymbalista/Fotoarena

Acervo da Anvisa/Governo Federal

Alimentos com excesso de gordura, sódio ou açúcar devem apresentar um rótulo em destaque na parte frontal da embalagem.

1. Escolha rótulos de alguns alimentos industrializados e some a massa dos nutrientes. Lembre-se de que açúcares estão contidos em carboidratos, e gorduras saturadas estão contidas em gorduras totais. Compare o valor obtido com a massa total da porção. O valor é o mesmo? Caso não seja, qual é o componente que apresenta massa significativa e não está descrito na tabela?

2. As novas normas sobre a rotulagem dos alimentos, que passaram a exigir que os fabricantes mostrassem o selo com a lupa da foto acima, entraram em vigor em outubro de 2022. Você observa esse selo na embalagem antes de comprar um alimento? Essas informações mudaram seus hábitos alimentares? Converse sobre isso com os colegas. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes estejam atentos a essas informações ao adquirirem alimentos industrializados e que consumam alimentos que contêm alto teor de açúcar adicionado, sódio e gordura saturada o mínimo possível.

Equação termoquímica e entalpia-padrão

As equações termoquímicas, além de representar os reagentes e produtos e ser coerente com a proporção estequiométrica entre as substâncias participantes, devem incluir o valor da variação de entalpia do processo. Os estados físicos de cada um dos componentes da reação devem estar representados, pois já vimos que a entalpia de uma substância depende de seu estado físico.

Os valores de entalpia dependem da temperatura. É comum nos referirmos à condição-padrão, ou seja, temperatura de 25 °C e pressão de 1 bar ou 10^5 Pa para os gases envolvidos. Nesse caso, nos referimos à variação de entalpia-padrão ou entalpia-padrão (ΔH^0).

A combustão do gás hidrogênio forma água, e, nas condições desse processo, podemos considerá-la no estado líquido ou no estado gasoso. A seguir, acompanhe como ficariam as respectivas equações termoquímicas para essa reação.

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g) \qquad \Delta H = -242 \text{ kJ/mol de } H_2$$

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell) \qquad \Delta H = 286 \text{ kJ/mol de } H_2$$

PARA EXPLORAR

Leia

A gordura *trans* que você não vê

O texto, publicado no *site* do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), traz informações sobre os problemas causados pela gordura *trans* contida em alguns alimentos.

Disponível em: https://idec.org.br/gordura-trans. Acesso em: 24 set. 2024.

Não escreva no livro.

LEI DE HESS

Nem sempre é possível determinar experimentalmente a energia envolvida em uma transformação química utilizando um calorímetro ou bomba calorimétrica, em razão de certas condições experimentais. Entre elas estão a lentidão de algumas reações, que torna relevante a dissipação do calor para o ambiente, e a ocorrência de reações secundárias, que formam produtos não desejados, que impossibilitam determinar a contribuição de cada etapa do processo.

Para essas situações, podemos calcular a entalpia de reação utilizando um método conhecido como **lei de Hess**, que afirma que:

> A quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independentemente de o composto ser formado direta ou indiretamente em uma série de etapas.
>
> CHAGAS, A. P.; AIROLDI, C. Lavoisier, Hess e os primórdios da termoquímica. Revista *Química Nova na Escola*, p. 95, jul. 1981.

Assim, podemos combinar uma série de equações termoquímicas partindo dos mesmos reagentes e chegar aos mesmos produtos. Ao somarmos as variações de entalpia de reação de cada etapa, obteremos a variação de entalpia de reação para a reação-problema.

O que o químico suíço German Henry Hess (1802-1850) enunciou, com base em uma série de experimentos meticulosamente realizados, está em total acordo com o Princípio da Conservação de Energia e com o conceito de função de estado para a entalpia, propriedade cujo valor depende apenas do estado atual do sistema e não da maneira pela qual o estado foi atingido. Em outras palavras, se partirmos dos mesmos reagentes e chegarmos aos mesmos produtos, a energia envolvida será a mesma, não importa o caminho percorrido ou as etapas reacionais.

Considere a combustão incompleta do carvão para gerar monóxido de carbono (CO) representada a seguir.

$$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) \qquad \Delta H^0 = ?$$

Essa reação é difícil de ser realizada experimentalmente com 100% de rendimento, pois não há como evitar a formação do dióxido de carbono. Mas é possível determinar os calores de combustão do carvão e do monóxido de carbono. Para isso, considere as reações de combustão do carvão e do monóxido de carbono representadas a seguir.

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H^0 = -393 \text{ kJ/mol}$$

$$CO(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H^0 = -283 \text{ kJ/mol}$$



Renan Oracic/ID/BR

Resolvendo graficamente, note que a equação $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$ equivale à nossa reação-problema. Basta simplificar a quantidade de $O_2(g)$ nos reagentes e nos produtos:

$$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) \qquad \Delta H = -393 - (-283) = -110 \text{ kJ/mol de C(s)}$$

O diagrama de variação de entalpia ilustra bem o conceito da lei de Hess, mas é possível resolver algebricamente. Para isso, mantemos a primeira equação como está e invertemos a segunda. Em seguida, basta somar as duas equações para chegarmos à equação termoquímica da reação-problema:

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H^0 = -393 \text{ kJ/mol}$$

$$CO_2(g) \rightarrow CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \qquad \Delta H^0 = 283 \text{ kJ/mol}$$

$$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) \qquad \Delta H = -393 + 283 = -110 \text{ kJ/mol de C(s)}$$

ROTEIRO

3. Determine a variação de entalpia de sublimação da água com base nos dados de variação de entalpia de vaporização e de fusão da água apresentados na página 187.

$\Delta H_{subl} = 46{,}5$ kJ/mol

Não escreva no livro.

ENERGIA DE LIGAÇÃO

Como discutimos no início do capítulo, o modelo que explica a conversão da energia química em outras formas de energia, como o calor, está baseado no rompimento de ligações químicas ou interações intermoleculares, que são processos endotérmicos, e na formação de novas ligações químicas ou interações intermoleculares, que são processos exotérmicos. É o saldo dessas etapas que explica se a reação libera ou absorve calor do ambiente.

Nesse contexto, é importante conhecer a energia envolvida na formação e no rompimento de cada ligação química. A **energia de ligação** é a energia necessária para romper 1 mol de ligações de uma substância no estado gasoso.

$$H_2(g) \rightarrow 2\ H(g) \qquad \Delta H = 436\ kJ/mol$$

A tabela a seguir apresenta algumas energias de ligação em kJ/mol.

Ligação	Energia média	Ligação	Energia média	Ligação	Energia média
C — C	347,0	N ≡ N	943,8	O — H	462,3
C = C	612,0	C — H	413,0	H — F	564,3
C ≡ C	834,3	C — Cℓ	331,0	H — Cℓ	431,0
H — H	435,6	C — O	357,4	Cℓ — Cℓ	243,0
O = O	492,0	C = O	773,5	N — H	390,4

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C. *et al. Chemistry and chemical reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage, 2023. p. 435.

Podemos usar os valores de energia de ligação para determinar a variação de entalpia de uma reação. Note que, como todos os dados se referem às substâncias no estado gasoso, o método funciona melhor se reagentes e produtos estiverem nesse estado; caso contrário, haverá desvios consideráveis relacionados às energias envolvidas na mudança de estado.

QUÍMICA E BIOLOGIA

Lei de Hess e o metabolismo

1. Resposta pessoal. Espera-se que o valor obtido seja o mesmo ou bem próximo. Eventuais diferenças podem ser atribuídas ao arredondamento das quantidades de carboidratos, gorduras e proteínas.

O conteúdo energético dos alimentos pode ser determinado experimentalmente utilizando-se uma bomba calorimétrica semelhante à usada para determinar o poder calorífico dos alimentos.

No entanto, além de o método não funcionar bem se o alimento for muito úmido, o experimento, para ser realizado de modo preciso, sai relativamente caro. Então, muitos fabricantes recorrem ao cálculo que se baseia na composição dos macronutrientes carboidratos, proteínas e gorduras. Os valores de 4 kcal/g para proteínas e carboidratos e de 9 kcal/g para gorduras foram obtidos experimentalmente.

Mas você já parou para pensar por que esse método funciona? Afinal, se você já viu óleo vegetal queimando deve imaginar que em nossas células acontece algo bem diferente, certo?

Apesar de a respiração celular não ser uma combustão, especialmente se considerarmos a violência da reação química, os reagentes e os produtos são os mesmos para gorduras e carboidratos:

Gordura + gás oxigênio → gás carbônico + água

Carboidrato + gás oxigênio → gás carbônico + água

Logo, segundo a lei de Hess, podemos considerar que a energia envolvida é a mesma, independentemente das etapas envolvidas. E, de fato, as etapas são muito diferentes, quando comparamos a combustão com a respiração celular, sendo que nas células o processo ocorre especialmente na organela chamada mitocôndria e envolve diversas etapas catalisadas por enzimas muito específicas.

Já no caso das proteínas, é necessário um pequeno ajuste, pois a combustão gera gás nitrogênio, enquanto nosso metabolismo elimina o nitrogênio contido nos aminoácidos na forma de ureia. Em produtos diferentes, a combustão gera 5,2 kcal/g de proteína, valor maior que a respiração celular (4,2 kcal/g), considerando 4 kcal/g para efeito de cálculo nos rótulos.

1. Consulte a tabela nutricional de seu alimento preferido e verifique se o conteúdo calórico informado corresponde ao cálculo com base na energia fornecida pelos macronutrientes.

Não escreva no livro.

Considere a reação de formação da água, descrita a seguir:

$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = ?$

Ligações rompidas	Ligações formadas
1 mol de H — H: 435,6 kJ	2 mol de ligação O — H: −924,6 kJ
$\frac{1}{2}$ mol de O ═ O: 246 kJ	
Total absorvido: 681,6 kJ	Total liberado: −924,6 kJ

$\Delta H = 681{,}6 - 924{,}6 = -243$ kJ/mol de H_2O formado

Note que esse cálculo emprega, de maneira simplificada, a metodologia da lei de Hess:

$H_2(g) \rightarrow 2\,H(g)$ $\Delta H = 435{,}6$ kJ

$\frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow O(g)$ $\Delta H = 246$ kJ

$2\,H(g) + O(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = -924{,}6$ kJ

Somando-se as equações, temos:

$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = 681{,}6 - 924{,}6 = -243$ kJ/mol de H_2O formado

ENTALPIA-PADRÃO DE FORMAÇÃO (ΔH^0_f)

A **entalpia-padrão de formação** (ΔH^0_f) corresponde à variação de entalpia da reação para a obtenção de 1 mol de uma substância a partir das respectivas substâncias elementares. Se existirem formas alotrópicas distintas de um mesmo elemento, a espécie considerada como estado-padrão será aquela que apresentar maior estabilidade, ou seja, menor valor de entalpia.

A grafita, o gás oxigênio, o fósforo vermelho e o enxofre rômbico são exemplos de formas alotrópicas no estado-padrão.

Portanto, a entalpia-padrão de formação de substâncias simples no estado-padrão é zero, pois não há nenhuma transformação química ou mudança de estado físico.

$H_2(g) \rightarrow H_2(g)$ $\Delta H^0_f = 0$

$O_2(g) \rightarrow O_2(g)$ $\Delta H^0_f = 0$

Jxfzsy/iStock/Getty Images

Minério de grafita, um alótropo do elemento químico carbono.

Phil Degginger/Science Source/Fotoarena

Amostra de fósforo vermelho, um alótropo do elemento químico fósforo.

Dirk Wiersma/SPL/Fotoarena

Cristais de enxofre rômbico, forma alotrópica do elemento químico enxofre.

ENTALPIAS-PADRÃO DE FORMAÇÃO (kJ/mol)

Substâncias	ΔH^0_f	Substâncias	ΔH^0_f	Substâncias	ΔH^0_f
$C\ell_2(g)$	0,0	C(g)	+716,0	$C_2H_4(g)$	+52,3
$Br_2(\ell)$	0,0	$O_2(g)$	0,0	$C_2H_2(g)$	+226,6
$Br_2(g)$	+30,9	CO(g)	−110,4	CaO(s)	−634,9
$I_2(s)$	0,0	$CO_2(g)$	−393,3	$Ca(OH)_2(s)$	−985,6
$I_2(g)$	+62,3	$H_2O(\ell)$	−285,5	$CaCO_3(s)$	−1 205,5
C(grafita)	0,0	$H_2O(g)$	−241,6	$SO_2(g)$	−296,4
C(diamante)	+1,9	$C_2H_6(g)$	−84,4	$SO_3(g)$	−395,4

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. *Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. Seção 5.

ROTEIRO

4. Represente as equações de formação do etano (C_2H_6) e do carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e determine suas variações de entalpia-padrão de formação.

$2\,C(grafita) + 3\,H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$ $\Delta H^0_f = -84{,}4$ kJ/mol

$Ca(s) + C(grafita) + \frac{3}{2} O_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$ $\Delta H^0_f = -1\,205{,}5$ kJ/mol

Determinação da variação de entalpia de reação a partir da entalpia-padrão de formação

Os valores de entalpia-padrão de formação são úteis no cálculo das variações de entalpia de reação no estado-padrão, quando não há possibilidade de realizar o experimento. Como as reações de formação usam como reagentes as substâncias simples no estado-padrão e o produto é um mol da substância em questão, podemos considerar que as etapas, seguindo a lei de Hess, seriam de decomposição dos reagentes de uma reação qualquer com posterior formação dos produtos.

Vamos exemplificar com a reação de decomposição do nitrato de amônio (NH_4NO_3), representada pela equação química a seguir.

$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2\ H_2O(\ell) \quad \Delta H = ?$

Sejam as variações de entalpia-padrão de formação das substâncias envolvidas:

$\Delta H^0_f\ (NH_4NO_3) = -340$ kJ/mol

$\Delta H^0_f\ (H_2O) = -285{,}5$ kJ/mol

$\Delta H^0_f\ (N_2O) = 82{,}0$ kJ/mol

Escrevendo as equações de formação, temos:

$N_2(g) + 2\ H_2(g) + \frac{3}{2}\ O_2(g) \rightarrow NH_4NO_3(s) \qquad \Delta H^0 = -340$ kJ/mol

$N_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \rightarrow N_2O(g) \qquad \Delta H^0 = 82$ kJ/mol

$H_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell) \qquad \Delta H^0 = -285{,}5$ kJ/mol

Invertendo a equação que se refere ao nitrato de amônio e multiplicando por 2 a que se refere à água:

$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2(g) + 2\ H_2(g) + \frac{3}{2}\ O_2(g) \qquad \Delta H^0 = 340$ kJ/mol

$N_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \rightarrow N_2O(g) \qquad \Delta H^0 = 82$ kJ/mol

$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(\ell) \qquad \Delta H^0 = -571$ kJ $(-285{,}5 \cdot 2)$

Somando-se as três equações, obtém-se a equação da reação-problema:

$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2\ H_2O(\ell) \qquad \Delta H^0 = -149$ kJ $(340 + 82 - 571)$

Como foi visto nesse exemplo, a vantagem de trabalhar com as entalpias-padrão de formação é que o procedimento de reorganização das equações será sempre o mesmo. As substâncias que são **reagentes** na reação-problema terão sua **equação de formação invertida**, e, consequentemente, o valor de **entalpia de formação** terá o seu **sinal trocado**. Já as equações de formação são mantidas as mesmas para as substâncias que são **produto** na situação-problema; logo, **não há troca de sinal** para o valor de **entalpia de formação**. Dependendo da estequiometria apresentada pela reação-problema, é possível que alguma equação de formação seja multiplicada por algum valor; nesses casos, a entalpia de formação deverá ser multiplicada pelo mesmo valor.

Podemos, então, adotar a fórmula:

$\Delta H^0 = \Sigma\ \Delta H^0_f(\text{produtos}) - \Sigma\ \Delta H^0_f(\text{reagentes})$

Aplicando para a reação de decomposição do nitrato de amônio, temos:

$\Delta H^0 = [\Delta H^0_f(N_2O) + 2\ \Delta H^0_f(H_2O)] - \Delta H^0_f(NH_4NO_3)$

$\Delta H^0 = [82 - 571] + 340 = -149$ kJ

A expressão $\Delta H^0 = \Sigma\ \Delta H^0_f(\text{produtos}) - \Sigma\ \Delta H^0_f(\text{reagentes})$ só é válida para as entalpias-padrão de formação, uma simplificação da aplicação da lei de Hess, que é válida em qualquer condição.

Note que essa expressão é diferente da definição de variação de entalpia apresentada no início do capítulo ($\Delta H_{Reação} = H_{Prod} - H_{Reag}$), que é válida em qualquer situação, mas não pode ser calculada nem determinada experimentalmente, pois os valores absolutos de entalpia de cada substância não podem ser determinados, apenas variações de entalpia.

Não escreva no livro.

QUÍMICA E MATEMÁTICA

DIAGRAMAS DE ENTALPIA

Há várias maneiras de representar a variação da entalpia de uma reação química. Vejamos o caso da combustão completa de um mol de propano, um processo exotérmico. Uma das possibilidades é indicar o valor de ΔH ao lado da equação química:

$$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(\ell) \qquad \Delta H = -2\,220\ kJ/mol$$

Uma alternativa a essa representação é incluir a energia liberada como um dos "produtos" na equação química:

$$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(\ell) + 2\,220\ kJ/mol$$

A terceira forma é utilizando um diagrama de variação de entalpia, uma abordagem mais visual. Diagramas desse tipo são constituídos de um eixo vertical orientado para cima que representa a entalpia. Cada substância ou conjunto de substâncias é incluído no gráfico em um patamar localizado na altura correspondente à sua entalpia. Para representar reações químicas, colocam-se todos os reagentes em um patamar e todos os produtos em outro. No caso da combustão do propano, o diagrama de variação de entalpia seria:



Renan Oracic/ID/BR

Esse diagrama mostra que na combustão do propano, certa quantidade de energia é perdida até que o patamar energético dos produtos seja alcançado. Por isso, a diferença entre a energia dos produtos e a dos reagentes corresponde à variação da entalpia da reação, que, nesse caso, é negativa, visto que a energia está sendo liberada ($\Delta H = -2\,324 - (-104) = -2\,220$ kJ/mol).

Fonte de pesquisa: Atkins, P.; Jones, L. *Princípios de Química*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Por ser mais visual que as equações químicas, o diagrama de variação de entalpia nos permite fazer comparações entre a variação de entalpia de diversas reações de maneira mais eficiente e rápida, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Vamos comparar a energia liberada pela combustão completa de 1 mol de propeno e de 1 mol de ciclopropano, isômeros de fórmula molecular C_3H_6, utilizando um diagrama de variação de entalpia.



Renan Oracic/ID/BR

Fonte de pesquisa: Atkins, P.; Jones, L. *Princípios de Química*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Como o ciclopropano apresenta uma variação de entalpia maior que o propeno e a combustão completa de ambos gera os mesmos produtos nas mesmas proporções, o patamar energético dos produtos das duas reações é o mesmo. Sendo assim, a "distância" energética entre o ciclopropano e os produtos de sua combustão é maior que a do propeno. Portanto, a combustão de 1 mol de ciclopropano libera mais energia do que a combustão de 1 mol de propeno.

Não escreva no livro.

O diagrama fornece também a variação de entalpia da reação de conversão de propeno em ciclopropano.



Fonte de pesquisa: Atkins, P.; Jones, L. *Princípios de Química*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Renan Oracic/ID/BR



Renan Oracic/ID/BR

1. a) A vaporização da água é um processo endotérmico. $\Delta H = 44$ kJ
1. b) A passagem do estado sólido para o estado gasoso é chamada de sublimação. $\Delta H = 51$ kJ
2. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
2. b) $H(NO_2) = 16{,}5$ kJ; $H(N_2O_4) = -24$ kJ.

Nesse caso, o produto (ciclopropano) tem energia maior que o reagente (propeno). Por essa razão, para que a transformação aconteça, os reagentes devem absorver determinada quantidade de energia, cujo valor corresponde à diferença dos patamares energéticos das duas substâncias envolvidas. Note que o valor de ΔH é positivo, visto que há absorção de energia.

A conversão no sentido oposto, de ciclopropano a propeno, também pode ocorrer. Como não há alteração do valor das entalpias do ciclopropano e do propeno, em módulo, a variação da reação direta e inversa são iguais. Como agora a reação ocorre no sentido da diminuição da entalpia, o valor de ΔH passa a ser -33 kJ.

Conecte as ideias

1 **O quadro a seguir mostra as entalpias de 1 mol de água em diferentes estados físicos.**

	$H_2O(g)$	$H_2O(\ell)$	$H_2O(s)$
Entalpia (kJ/mol)	−242	−286	−293

Fonte de pesquisa: Atkins, P.; Jones, L. *Princípios de Química*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Em seu caderno, elabore um diagrama de variação de entalpia, colocando cada estado físico da água em um patamar energético. Em seguida, a partir da análise do digrama, responda:

a) A vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Qual é o valor da variação e entalpia dessa mudança de estado físico?

b) Qual é o nome da passagem do estado sólido para o estado gasoso? Para a água, qual é o valor da variação de entalpia dessa mudança de estado físico?

c) De acordo com o diagrama, a solidificação da água é um processo endotérmico ou exotérmico?
A solidificação da água é um processo exotérmico.

2. **Considere as equações químicas a seguir.**

$$N_2(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow 2\,NO_2(g) \qquad \Delta H = +33 \text{ kJ}$$

$$2\,NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g) \qquad \Delta H = -57 \text{ kJ}$$

a) Elabore um diagrama de variação de entalpia que inclua, qualitativamente, os patamares dos reagentes e dos produtos de ambas as reações descritas, bem como as setas que indicam as trasnformações.

b) Se a entalpia de formação do gás nitrogênio e do gás oxigênio é igual a 0 kJ, determine a variação de entalpia dos dois óxidos de nitrogênio que participam das reações descritas.

3. **A gasolina é formada por uma mistura de compostos, sendo o isoctano (C_8H_{18}) um dos principais, e que está relacionado à qualidade do combustível. A combustão completa dessa substância é descrita pela equação:** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

$$C_8H_{18}(\ell) + \frac{25}{2}\,O_2(g) \rightarrow 8\,CO_2(g) + 9\,H_2O(g) \qquad \Delta H = -5\,471 \text{ kJ/mol}$$

Considerando que a variação de entalpia de formação da água no estado gasoso é igual a −242 kJ/mol e que a entalpia de formação do isoctano líquido é igual a −227 kJ/mol, determine o ΔH de formação do CO_2.

Não escreva no livro.

Analisando a queima de uma vela

Como vimos anteriormente, a energia envolvida durante uma reação química pode ser medida usando uma bomba calorimétrica, considerando que o calor da transformação seja completamente transferido para o aquecimento de um sistema, que, geralmente, é constituído de uma massa de água. É possível calcular a energia liberada na queima de uma vela usando esse método?

ATENÇÃO!
A queima da amostra deve ser acompanhada pelo(a) professor(a).

Material

- água da torneira
- balança
- erlenmeyer de 125 mL ou béquer de 100 mL de borossilicato
- luva de cozinha
- placa de Petri ou pires
- proveta de 50 mL ou 100 mL
- suporte universal com garra
- termômetro
- vela

Como fazer

1. Fixe a vela no centro da placa de Petri. Determine a massa do sistema inicial e anote o valor.
2. Com a balança tarada, determine a massa do béquer e anote.
3. Em seguida, utilizando a proveta, coloque 50 mL de água no béquer (ainda na balança) e determine a massa de água correspondente.
4. Ainda com o béquer apoiado no suporte, prenda-o na garra com cuidado. Certifique-se de que está firme.
5. Coloque o pavio na posição vertical e posicione o béquer a 3 cm acima do pavio, movendo a garra e fixando-a no suporte universal.
6. Verifique se o pavio da vela está posicionado bem ao centro no fundo do béquer.
7. Acenda a vela e aqueça a água durante sete minutos, medindo a temperatura a cada 30 s.
8. Durante o aquecimento, para homogeneizar a temperatura, misture a água com o termômetro por 10 s antes da medida. Reproduza o quadro abaixo no caderno e anote os dados.

t (s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
T (°C)	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////	//////

9. Usando luvas, pese o béquer com água imediatamente após o final do aquecimento e anote.

Para concluir

1 **Considerando o calor específico da água igual a 1 cal/g · °C, determine a quantidade de calor liberada pela combustão da vela. Caso a massa evaporada tenha sido significativa, some o calor absorvido durante a vaporização. Nota: o calor de vaporização (Q_{vap}) é calculado pela fórmula $Q_{vap} = m \cdot L$, em que m é a massa da água, em gramas, e L é o calor latente de vaporização da água, igual a 540 cal/g.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **O combustível da vela é a parafina que envolve o pavio. Considerando que a variação da massa observada do sistema equivale à massa de combustível queimado, determine o poder calorífico da parafina.** A diferença entre a massa do sistema final e a massa do sistema inicial indica a massa de parafina consumida na combustão. Ao dividir o calor total obtido na atividade 1 pela massa em gramas de parafina queimada, chegamos ao poder calorífico em kcal/g.

3 **Examine o procedimento experimental analisado e discuta os principais erros experimentais. Como seria possível minimizá-los?** O sistema experimental não garante que toda a energia liberada na combustão da vela seja efetivamente utilizada para aquecer a água. Há aquecimento do recipiente, do ar. O ideal seria fazer o experimento em um calorímetro.

4 **O que seria necessário modificar na vela para que o poder calorífico fosse diferente? Explique.**
O poder calorífico é uma propriedade do combustível. Velas com o mesmo combustível deveriam apresentar poder calorífico semelhante. Para alteração do valor seria necessária a utilização de um combustível diferente para a vela.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **A reação de obtenção do tricloreto de fósforo $PC\ell_3$ a partir do gás cloro ($C\ell_2$) e do fósforo (P_4) não ocorre diretamente; portanto, não é possível determinar a variação de entalpia do processo experimentalmente.**

$P_4(s) + 6\ C\ell_2(g) \rightarrow 4\ PC\ell_3(s) \qquad \Delta H = ?$

Entretanto, é possível determinar as variações de entalpia para as equações a seguir, que descrevem a formação do pentacloreto de fósforo.

$P_4(s) + 10\ C\ell_2(g) \rightarrow 4\ PC\ell_5(s) \qquad \Delta H_1 = -1774{,}0\ kJ$

$PC\ell_3(\ell) + C\ell_2(g) \rightarrow PC\ell_5(s) \qquad \Delta H_2 = -124{,}0\ kJ$

Determine a variação de entalpia de formação do tricloreto de fósforo.

Resolução:

Para se obter a equação da reação pretendida, podemos combinar as equações fornecidas:

$P_4(s) + 10\ C\ell_2(g) \rightarrow 4\ PC\ell_5(s) \qquad \Delta H_1 = -1774{,}0\ kJ$

$4 \cdot [PC\ell_5(s) \rightarrow PC\ell_3(\ell) + C\ell_2(g)] \quad \Delta H = -4 \cdot \Delta H_2 = -4 \cdot (-124{,}0\ kJ)$

Note que invertemos a equação entre o tricloreto de fósforo e o cloro, e a multiplicamos por quatro, pois desse modo teremos uma equação com o tricloreto de fósforo como produto. Com isso devemos alterar o valor de ΔH invertendo-se o sinal e multiplicando-se o valor por quatro, mantendo a proporção da energia envolvida com a quantidade de reagentes e produtos.

$P_4(s) + 10\ C\ell_2(g) \rightarrow \cancel{4\ PC\ell_5}(s) \qquad \Delta H_1 = -1774{,}0\ kJ$

$+\ \cancel{4\ PC\ell_5}(s) \rightarrow 4\ PC\ell_3(\ell) + 4\ C\ell_2(g) \qquad -4 \cdot \Delta H_2 = 496{,}0\ kJ$

$P_4(s) + 6\ C\ell_2(g) \rightarrow 4\ PC\ell_3(\ell) \qquad \Delta H = -1278{,}0\ kJ$

2 **Frações mais pesadas do petróleo podem gerar derivados mais leves, como os utilizados na indústria petroquímica e na gasolina, a partir da reação de craqueamento (do inglês *cracking*, "quebra"). Nesse processo, ocorre o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e pelo uso apropriado de catalisador. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em hexano e propeno (propileno), conforme representado na equação química a seguir.**

$C_{12}H_{26}(\ell) \rightarrow C_6H_{14}(g) + 2\ C_3H_6(g) \qquad \Delta H^0 = ?$

Dadas as equações termoquímicas de combustão completa, no estado-padrão para os três hidrocarbonetos citados, determine a variação de entalpia-padrão do processo de craqueamento representado.

$C_{12}H_{26}(\ell) + \frac{37}{2}\ O_2(g) \rightarrow 12\ CO_2(g) + 13\ H_2O(\ell)$

$\Delta H^0_{comb} = -7\,510\ kJ/mol$

$C_6H_{14}(g) + \frac{19}{2}\ O_2(g) \rightarrow 6\ CO_2(g) + 7\ H_2O(\ell)$

$\Delta H^0_{comb} = -4\,160\ kJ/mol$

$C_3H_6(g) + \frac{9}{2}\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 3\ H_2O(\ell)$

$\Delta H^0_{comb} = -2\,220\ kJ/mol$

$\Delta H^0 = 1\,090\ kJ/mol$

3 **O metano é um combustível presente no gás natural, de origem fóssil e que também pode ser obtido da matéria orgânica de esgotos e aterros sanitários em biodigestores. A seguir, são representadas a reação de formação do metano a partir das substâncias simples grafita e gás hidrogênio (equação I) e a produção de metano a partir da combinação de átomos de carbono e hidrogênio isolados no estado gasoso (equação II).**

I. $C(grafite) + 2\ H_2(g) \rightarrow CH_4(g) \qquad \Delta H = -x\ cal/mol$

II. $C(g) + 4\ H(g) \rightarrow CH_4(g) \qquad \Delta H = -y\ cal/mol$

Compare os valores de x e y.

$|y| > |x|$

4 **O metanol é um combustível líquido utilizado para abastecer carros de corridas automobilísticas nos Estados Unidos e pode ser considerado um substituto da gasolina. É possível sintetizar o metanol a partir do gás natural, de acordo com a equação:**

$2\ CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ CH_3OH(\ell) \qquad \Delta H = ?$

Considerando as reações representadas a seguir, determine a variação de entalpia envolvida na síntese de 160 g de metanol a partir do gás metano.

$CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + 3\ H_2(g) \qquad \Delta H = +206\ kJ$

$2\ H_2(g) + CO(g) \rightarrow CH_3OH(\ell) \qquad \Delta H = -128\ kJ$

$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(g) \qquad \Delta H = -484\ kJ$

Dados: massas molares (g/mol): H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. $\Delta H = -820\ kJ$

5 **O etanol produzido no Brasil por meio da fermentação da cana-de-açúcar é obtido na indústria petroquímica pela reação de adição de água ao etileno, de acordo com a equação:**

$C_2H_4(g) + H_2O(\ell) \rightarrow C_2H_5OH(\ell)$

Calcule a variação de entalpia dessa reação usando as seguintes equações termoquímicas:

$C_2H_4(g) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$

$\Delta H = -1410\ kJ/mol$ de C_2H_4

$C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(\ell)$

$\Delta H = -1370\ kJ/mol$ de C_2H_5OH

$\Delta H = -40\ kJ/mol$ de C_2H_4

6 **O diclorometano ($CH_2C\ell_2$) é um solvente largamente utilizado na indústria e pode ser obtido por meio da reação de substituição do gás cloro com metano em duas etapas:**

$CH_4(g) + C\ell_2(g) \rightarrow CH_3C\ell(\ell) + C\ell_2(g)$

$\Delta H = -98{,}3\ kJ/mol$ de CH_4

$CH_3C\ell(\ell) + C\ell_2(g) \rightarrow CH_2C\ell_2(\ell) + HC\ell(g)$

$\Delta H = -104\ kJ/mol$ de $CH_3C\ell$

Escreva a equação termoquímica e determine a variação de entalpia da reação entre metano e cloro na obtenção do diclorometano.

$CH_4(g) + 2\ C\ell_2(g) \rightarrow CH_2C\ell_2(\ell) + 2\ HC\ell(g) \qquad \Delta H = -202{,}3\ kJ/mol$ de CH_4

Não escreva no livro.

7. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7 **O etanol é um biocombustível que pode ser encontrado misturado à gasolina ou como etanol hidratado.**

a) Escreva as equações termoquímicas de combustão do etanol (C_2H_6O) no estado líquido e no estado gasoso, e avalie qual deve apresentar o maior valor.

b) Represente as duas reações em um diagram de variação de entalpia.

7. b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

8 **A água oxigenada é uma solução aquosa comercial de peróxido de hidrogênio utilizada como antisséptico ou como agente oxidante. Ao passar a água oxigenada em um ferimento, o peróxido de hidrogênio se decompõe em contato com a enzima catalase, formando gás oxigênio, que mata os microrganismos anaeróbicos presentes.**

Kopytin Georgy/Shutterstock.com/ID/BR

A água oxigenada libera bolhas de oxigênio ao ser colocada sobre um ferimento.

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio pode ser representada pela equação termoquímica:

$$H_2O_2(aq) \rightarrow H_2O(\ell) + \frac{1}{2}O_2(g) \quad \Delta H = -98 \text{ kJ}$$

a) Classifique a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio em endotérmica ou exotérmica. Justifique.

b) A resposta ao item **a** é coerente com a afirmação: "Toda quebra de ligação é endotérmica"? Explique.

c) Determine a energia envolvida na decomposição de peróxido de hidrogênio suficiente para produzir 4,0 g de gás oxigênio. **8. c)** 24,5 kJ

8. b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

9 **O etileno, ou eteno, é uma das matérias-primas mais versáteis da indústria petroquímica. Sua aplicação está relacionada à alta reatividade da ligação C=C. Uma das reações típicas desse composto e substâncias análogas é a reação de adição, em que o rompimento da ligação dupla permite a incorporação de dois átomos aos átomos de carbono. Estime a variação de entalpia da reação de adição de gás clorídrico ao etileno a partir dos valores de energia de ligação fornecidos na tabela da página 190:**

$$CH_2{=}CH_2(g) + HC\ell(g) \rightarrow CH_3CH_2C\ell(g) \qquad \Delta H^0 = ?$$

$\Delta H^0 = -48$ kJ/mol

10 **Em um alto-forno siderúrgico, o óxido de ferro(III), proveniente da hematita, reage com o monóxido de carbono formado na reação do coque (carvão) com o oxigênio, gerando ferro metálico e dióxido de carbono.**

$$Fe_2O_3(s) + 3\,CO(g) \rightarrow 2\,Fe(s) + 3\,CO_2(g) \qquad \Delta H^0 = ?$$

Determine a variação de entalpia-padrão da reação a partir dos valores de entalpia-padrão de formação fornecidos: **10.** $\Delta H^0_r = -24{,}8$ kJ

$\Delta H^0_f(Fe_2O_3) = -824{,}2$ kJ/mol

$\Delta H^0_f(CO) = -110{,}5$ kJ/mol

$\Delta H^0_f(CO_2) = -393{,}5$ kJ/mol

11. a) $K(s) \rightarrow K(g)$ $\quad \Delta H = 89$ kJ/mol

11. b) $C\ell_2(g) \rightarrow 2\,C\ell(g)$ $\quad \Delta H = 244$ kJ/mol

11. c) $K(s) + \frac{1}{2}C\ell_2(g) \rightarrow KC\ell(s)$ $\quad \Delta H = -437$ kJ/mol

11 **O estudo da energia reticular de um retículo cristalino iônico envolve a análise do ciclo de Born-Haber. A energia reticular de um composto iônico está relacionada à interação entre cátions e ânions no retículo cristalino.**

O diagrama de entalpia a seguir exemplifica o ciclo de Born-Haber do cloreto de potássio ($KC\ell$).



Renan Oracid/ID/BR

Com base no diagrama, escreva a equação que descreve o fenômeno indicado em cada item e apresente os respectivos valores de ΔH (em kJ/mol).

a) Entalpia de sublimação do potássio.

b) Energia de ligação $C\ell - C\ell$.

c) Entalpia de formação do cloreto de potássio.

12 **Com base no diagrama, determine a entalpia-padrão de formação do dióxido de nitrogênio (NO_2).**

$\Delta H^0_f = 33$ kJ/mol



Renan Oracid/ID/BR

8. a) A reação é exotérmica, uma vez que o ΔH da reação é negativo, indicando que a energia está sendo liberada do sistema para o ambiente. Isso sinaliza que os produtos apresentam menor entalpia que os reagentes.

Não escreva no livro.

CAPÍTULO 2

1. O aumento da temperatura em uma reação química aumenta a energia cinética das substâncias envolvidas; então, elas colidem com mais frequência e com maior energia. Essas colisões aumentam a probabilidade de as substâncias atingirem a energia de ativação necessária para que a reação ocorra, resultando em uma maior rapidez na reação.

CINÉTICA QUÍMICA

PARA COMEÇAR

1. De que maneira o aumento da temperatura de uma reação química pode acelerar sua rapidez?
2. Por que substâncias em pó reagem mais rapidamente quando comparadas com um comprimido inteiro?
3. Atualmente, alguns processos biotecnológicos fazem uso de enzimas chamadas "industriais". Quais são os benefícios do uso de enzimas fora do ambiente biológico?

2. Substâncias em pó têm maior superfície de contato exposta ao reagente em comparação com um comprimido inteiro. Isso permite que mais substâncias entrem em contato com o reagente, facilitando uma maior frequência de colisões e, consequentemente, uma maior rapidez na reação.

AS ENZIMAS ACELERAM AS REAÇÕES QUÍMICAS

Você já pensou como seu organismo consegue digerir alimentos em poucas horas ou como as feridas cicatrizam tão rapidamente? Esse e outros processos do organismo seriam extremamente lentos se não fosse a ação das enzimas. As enzimas são moléculas de proteína que funcionam como catalisadores biológicos. Os catalisadores são substâncias que alteram a rapidez das reações sem serem consumidos no processo.

Para ser iniciada, toda reação química requer certa quantidade de energia, conhecida como **energia de ativação**. As enzimas (e qualquer catalisador) funcionam diminuindo essa barreira energética, facilitando o encontro entre as moléculas reagentes e permitindo que a reação ocorra mais rapidamente.

Por exemplo, as enzimas digestivas, como a amilase, a lipase e a protease, aceleram a quebra de carboidratos, gorduras e proteínas, respectivamente, permitindo que os nutrientes sejam absorvidos pelo corpo rapidamente.

A enzima amilase converte o amido (um polímero de glicose) em moléculas menores de maltose e glicose. A amilase se liga ao amido e altera sua estrutura, diminuindo a energia de ativação necessária para quebrar as ligações glicosídicas. Isso resulta em uma conversão rápida e eficiente de amido em açúcares simples, que podem ser facilmente absorvidos pelo corpo. Sem essas enzimas, o processo de digestão seria extremamente lento, comprometendo a nutrição e a energia disponível para as atividades diárias.

No sistema imunológico, enzimas como a DNA polimerase são essenciais na replicação do DNA, permitindo que as células do sistema imunológico se multipliquem rapidamente em resposta a infecções. Além disso, a enzima lisozima, encontrada em lágrimas e saliva, ajuda a destruir as paredes celulares das bactérias, defendendo o organismo contra patógenos.

A rapidez de uma reação química também pode ser alterada por outros fatores, como a temperatura, a superfície de contato e a concentração de reagentes. Neste capítulo, você estudará a rapidez das reações químicas e os fatores que alteram a rapidez dessas reações.

3. Os benefícios são alta especificidade e eficiência, o que permite reações mais rápidas e seletivas com menor consumo de energia e menos subprodutos indesejados. Além disso, as enzimas são biodegradáveis e funcionam em condições que tornam os processos industriais mais sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental em comparação com os métodos tradicionais.

Quando nos alimentamos, diversas enzimas do nosso corpo aceleram algumas reações químicas, o que facilita a digestão e o fornecimento de energia para o organismo.

MBI/iStock/Getty Images

Não escreva no livro.

RAPIDEZ DAS REAÇÕES

Cinética química é a área de estudo da Química que investiga a rapidez das reações químicas e os mecanismos por meio dos quais elas se processam. É comum também se falar em "velocidade" das reações químicas, em vez de "rapidez".

A rapidez da reação química é expressa pela variação de alguma grandeza relacionada com a quantidade de reagente ou produto (concentração, quantidade de matéria, pressão, massa, volume) por unidade de tempo.

$$\text{Rapidez de reação} = \frac{|\text{variação da quantidade de uma substância}|}{\text{intervalo de tempo}}$$

Isso significa que podemos calcular a rapidez de uma reação tanto pelo decréscimo das massas ou das concentrações dos reagentes quanto pelo aumento das massas ou das concentrações dos produtos.

A escolha do método usado para calcular a rapidez de uma reação depende especificamente da reação a ser estudada, mas em todas as reações o princípio consiste em medir a variação da quantidade de uma das substâncias consumidas ou formadas em um intervalo de tempo.

ALGUMAS UNIDADES UTILIZADAS NA DETERMINAÇÃO DA RAPIDEZ DAS REAÇÕES

Grandeza	Unidade de rapidez
Concentração	mol/L · s mol/L · min mol/L · h
Quantidade de matéria	mol/s mol/min mol/h
Pressão	atm/s atm/min atm/h

No tópico "Medida da rapidez média de uma reação", a seguir, você vai encontrar um exemplo de cálculo da rapidez envolvendo a reação de decomposição do gás pentóxido de dinitrogênio (N_2O_5), representada pela equação química:

$$\underset{\text{incolor}}{2\,N_2O_5(g)} \longrightarrow \underset{\text{castanho}}{4\,NO_2(g)} + \underset{\text{incolor}}{O_2(g)}$$



Esquema da reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio. Cores-fantasia.

Valores positivos

É comum determinar a rapidez de uma reação pela expressão:

$$\text{Rapidez} = \frac{\Delta\,(\text{quantidade})}{\Delta\,(\text{tempo})}$$

Nesse caso, o cálculo da rapidez com que os reagentes são consumidos remete a um valor negativo, indicando que as substâncias foram consumidas. Em muitos livros didáticos você pode encontrar esse tratamento.

Apesar disso, geralmente se procura expressar a rapidez de uma reação por valores positivos. Para isso, considera-se a variação da quantidade de substância em módulo, evitando-se, assim, valores negativos no resultado final.

$$\text{Rapidez} = \frac{|\Delta\,(\text{quantidade})|}{\Delta\,(\text{tempo})}$$

Medida da rapidez média de uma reação

Os dados experimentais representados na tabela a seguir foram coletados de um experimento envolvendo a decomposição do pentóxido de dinitrogênio (N_2O_5) a 55 °C.

	CONCENTRAÇÃO ($\cdot 10^{-4}$ mol/L)		
Tempo (s)	**N_2O_5**	**NO_2**	**O_2**
0	200	0	0
100	168	64	16
200	142	116	29
300	120	160	40
400	101	198	49
500	86	228	57

Fonte de pesquisa: McMurry, J. E.; Fay, R. C.; McCarty, L. *Chemistry*. 4. ed. New Jersey: Pearson Education, 2004.



Esses valores mostram que a concentração de N_2O_5 diminui com o tempo e que as concentrações de NO_2 e de O_2 aumentam com o tempo. Com os dados do experimento, pode-se construir o gráfico ao lado.

Note que a inclinação de todas as curvas é maior no início (reação mais rápida no começo) e menor no final.

A rapidez média de consumo de N_2O_5 e de formação de NO_2 pode ser calculada em diferentes intervalos de tempo.

- Intervalo de 0 a 100 s:

$$\text{Rapidez}_{N_2O_5} = \frac{|168 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} - 200 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}|}{100\ \text{s}} =$$

$$= 3{,}2 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Rapidez}_{NO_2} = \frac{|64 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} - 0|}{100\ \text{s}} = 6{,}4 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

- Intervalo de 200 s a 300 s:

$$\text{Rapidez}_{N_2O_5} = \frac{|120 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} - 142 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}|}{100\ \text{s}} = 2{,}2 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Rapidez}_{NO_2} = \frac{|160 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} - 116 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}|}{100\ \text{s}} = 4{,}4 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

- Intervalo de 400 s a 500 s:

$$\text{Rapidez}_{N_2O_5} = \frac{|86 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} - 101 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}|}{100\ \text{s}} = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Rapidez}_{NO_2} = \frac{|228 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} - 198 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}|}{100\ \text{s}} = 3{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Note que a rapidez de consumo do N_2O_5 é sempre a metade da rapidez de formação do NO_2, o que está de acordo com a proporção estequiométrica da reação, 2 N_2O_5 : 4 NO_2.

Observe que a rapidez de formação de O_2 será $\frac{1}{2}$ da rapidez de consumo de N_2O_5 e $\frac{1}{4}$ da rapidez de formação de NO_2.

Intervalos (em s)	Rapidez do N_2O_5 (mol/L · s)	Rapidez do NO_2 (mol/L · s)	Rapidez do O_2 (mol/L · s)
0 a 100	$3{,}20 \cdot 10^{-5}$	$6{,}40 \cdot 10^{-5}$	$1{,}60 \cdot 10^{-5}$
200 a 300	$2{,}20 \cdot 10^{-5}$	$4{,}40 \cdot 10^{-5}$	$1{,}10 \cdot 10^{-5}$
400 a 500	$1{,}50 \cdot 10^{-5}$	$3{,}00 \cdot 10^{-5}$	$0{,}75 \cdot 10^{-5}$

A rapidez da reação tende a diminuir à medida que a concentração de reagentes na mistura diminui e a de produtos aumenta.

Não escreva no livro.

COMO AS REAÇÕES OCORREM?

Uma mesma reação pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo das condições em que ela acontece.

Note, por exemplo, a reação de magnésio com água (imagem **A**).

O magnésio (Mg) interage muito lentamente com água fria no tubo **I**. No tubo **II**, temos magnésio em água morna. A temperatura mais alta torna a reação mais rápida. Observe as bolhas se desprendendo no tubo **II**. Ambos os tubos contêm fenolftaleína, que adquire coloração rósea à medida que a reação ocorre e se forma o hidróxido de magnésio.

Por que se verifica a diferença de comportamento observada na fotografia? Que fator aqui descrito altera a rapidez das reações?

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Reação de magnésio com água na presença de fenolftaleína.

Teoria das colisões

Trata-se de um modelo que explica satisfatoriamente os fatores que influem na rapidez das reações. De acordo com a teoria das colisões, átomos, moléculas ou íons das substâncias reagentes devem colidir para que a reação química ocorra. Quanto mais colisões por unidade de tempo (isto é, maior frequência de choques), maior será a rapidez da reação.

Segundo essa teoria, para que haja uma reação é necessário que a colisão ocorra com uma quantidade mínima de energia, capaz de provocar um rearranjo de átomos dos reagentes, formando novas ligações (imagem **B**).



AMj Studio/ID/BR

Representação das colisões em uma reação química. Note a orientação das moléculas quando colidem. Cores-fantasia.

Nem todos os choques conduzem à formação de produtos, porque, além do fator energia, alguns choques se dão segundo uma geometria desfavorável.

Considere a reação genérica ilustrada na figura **C**.

$$A_2 + B_2 \longrightarrow 2\ AB$$

As moléculas de A_2 e de B_2 devem colidir de modo a favorecer a quebra das ligações e a consequente formação do produto AB (imagem **C**).

Portanto, para que uma reação ocorra, é necessário que haja colisão com energia suficiente entre as moléculas e em uma orientação favorável. É o que se chama de **colisão efetiva** ou **choque efetivo**, ou seja, é a colisão que resulta na formação de produtos.



AMj Studio/ID/BR

I e II: orientações não favoráveis; III: orientação favorável. Cores-fantasia.

Rapidez de uma reação química

Objetivo

Como aumentar a rapidez de uma reação química? A rapidez de uma reação química pode ser alterada por diversos fatores; um deles é a concentração dos reagentes. Nesta atividade, você e os colegas vão verificar a rapidez de uma reação química e como a concentração de reagente pode influenciá-la.

Material

- 1 colher de café rasa de bicarbonato de sódio
- 2 provetas de 50 mL
- cronômetro ou relógio com ponteiro de segundos
- cuba de vidro ou recipiente transparente
- mangueira plástica flexível
- régua
- rolha de silicone furada
- suporte para tubo de ensaio
- suporte universal com garra
- tubo de ensaio (25 mm × 180 mm, ou maior)
- vinagre incolor

ATENÇÃO!

Resíduos
Dilua as soluções antes de jogá-las na pia.

ATENÇÃO!

Equipamentos de segurança
Use óculos de segurança e avental de algodão com mangas compridas.

Como fazer

1. Introduzam o bicarbonato no tubo de ensaio. Adaptem uma das extremidades da mangueira na rolha e tampem o tubo de ensaio.
2. Coloquem água na proveta até enchê-la. Depois a tampem com o auxílio da palma da mão e invertam o tubo com cuidado dentro da cuba que contém água e vinagre – 10 mL de vinagre para 100 mL de água. Certifiquem-se de que não há bolhas dentro da proveta e prendam-na com a garra do suporte universal.
3. Introduzam a outra extremidade da mangueira na proveta que está na cuba, como mostra a foto.
4. Utilizando uma proveta, meçam 10 mL de vinagre. Depois, destampem o tubo de ensaio, adicionem o vinagre e tampem rapidamente o tubo.
5. Quando a primeira bolha surgir na proveta invertida, comecem a marcar o tempo.
6. Parem a marcação do tempo quando o volume de gás na proveta atingir o valor estipulado pelo(a) professor(a).
7. Repitam os passos 4, 5 e 6, variando o volume de vinagre entre 20 mL e 30 mL.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Representação da montagem do sistema de coleta de gás durante a realização do experimento.

Para concluir

1. $NaHCO_3(aq) + H_4C_2O_2(aq) \rightarrow NaH_3C_2O_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$. A formação de gás ($CO_2$) pode ser observada, sendo uma evidência da reação ocorrida.

1 **Escreva a equação química que descreve a transformação estudada. Qual evidência pode ser utilizada para verificar a ocorrência da reação? Explique.**

2 **Compare os valores de tempo obtidos com os dos outros grupos. Vocês chegaram a resultados parecidos? Discuta com os colegas possíveis diferenças.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Explique se há alguma relação entre a rapidez da reação e a concentração do vinagre.**
Espera-se que os estudantes respondam que, quanto mais vinagre é adicionado, mais rápida é a reação, pois mais moléculas de ácido acético estarão no tubo, ou seja, há mais reagente.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

A DECOMPOSIÇÃO DAS SACOLAS DE MERCADO

[...] A Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, divulgou uma pesquisa que pode acelerar a degradação de plásticos biodegradáveis.

O projeto, que está em fase de análise para obtenção de patente, foi realizado por pesquisadores do Departamento de Microbiologia da Universidade e surpreendeu os estudiosos ao formar cogumelos comestíveis durante o processo.

Entre os defensores da retirada de circulação das sacolas plásticas, o principal argumento é o de preservação do meio ambiente, visto que o produto pode levar até 100 anos para se degradar. [...]

Tentando reverter esse processo, muitos supermercados adotaram as sacolas oxibiodegradáveis, que têm a presença de D2W, ou os chamados plásticos verdes, que são usados no setor de frutas e verduras.

O problema é que tanto as embalagens D2W (feitas com plástico originário de petróleo aditivado com íons metálicos de titânio) como os plásticos verdes (com polímeros vindos do bagaço de cana-de-açúcar) não têm informações sobre eficiência da degradação amplamente conhecidas.

O pesquisador José Maria Rodrigues da Luz, que criou a pesquisa durante seu doutorado, afirmou que as informações sobre os prazos que as sacolas atuais demoram para se decompor são vagas. "O que sabemos é que esse tipo de embalagem, quando exposta ao sol, nos lixões ou aterros, pode sofrer um processo de decomposição, mas nem sempre ele é completo", contou.

Por isso, o estudioso começou seu trabalho avaliando se as sacolas eram realmente biodegradáveis e em quais condições isso se aplicava. Depois de testes químicos, físicos e biológicos, ele concluiu que a simples exposição ao sol não é suficiente para a degradação das sacolas ditas ecológicas.



Fotografias: www.PLOS.org/ Creative Commons

As imagens mostram a decomposição do plástico ao longo do tempo. A imagem **A** retrata o início, e a **C**, a fase mais avançada do processo, com o aparecimento de fungos.

Foi aí que ele avaliou o potencial dos fungos da podridão branca, que são conhecidos como bons degradadores de polímeros complexos, como forma de acelerar o processo, e descobriu que a umidade é essencial para o crescimento inicial do fungo. "Nós colocamos toalhas de papel em cima das sacolas porque o fungo, inicialmente, não ataca o plástico e sim o papel para produzir enzimas que degradam o plástico", explicou.

Como resultado desta fase, o plástico começou a desaparecer em apenas 45 dias, mesmo sem a presença de luz solar, que facilita ainda mais a proliferação do fungo. E uma surpresa deixou os pesquisadores ainda mais animados. Durante o processo de degradação das sacolas, foram formados cogumelos comestíveis.

A orientadora da pesquisa, Maria Catarina Megumi Kasuya, comemorou os resultados, mas alertou que ainda são necessários testes para comprovar a qualidade do alimento produzido a partir dos plásticos degradados. "Nós sabemos que o cogumelo produzido é comestível, mas ainda precisamos analisar se alguns componentes tóxicos, oriundos da degradação do plástico ou das tintas, podem se acumular nos cogumelos", alertou.

Pesquisa da UFV acelera degradação de sacolas plásticas biodegradáveis. *G1*, [*s. l.*], 26 abr. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2015/04/pesquisa-da-ufv-acelera-degradacao-de-sacolas-plasticas-biodegradaveis.html. Acesso em: 28 jul. 2024.

Para discutir

1. O problema citado no texto é o acúmulo de sacolas plásticas descartadas no ambiente e o seu tempo elevado de decomposição (cerca de cem anos).

1 **Muitas vezes, a pesquisa científica se inicia com alguma questão a ser solucionada. No texto apresentado nesta seção, qual foi o problema?**

2 **É possível identificar nesse texto aspectos importantes referentes à natureza da ciência. Leia, no trecho a seguir, o que pesquisadores na área dizem:**

A aprendizagem sobre a ciência deveria incluir elementos tais como sua relação com a cultura e a sociedade, o caráter mutável das ideias científicas, a humanização dos cientistas, entre outros. Esses aspectos fazem parte do que os filósofos e epistemólogos chamam de natureza da ciência. A natureza da ciência é um conjunto de conhecimentos sobre a ciência que trata de seus métodos, objetivos, limitações, influência, etc. [...]

Silva, C.; Moura, B. A natureza da ciência por meio do estudo de episódios históricos: o caso da popularização da óptica newtoniana. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 30, n. 1, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v30n1/a16v30n1.pdf. Acesso em: 28 jul. 2024.

Reflita sobre os textos e converse com os colegas sobre o caráter mutável das ideias científicas.

3 **Se possível, compartilhe as ideias das atividades 1 e 2 com os colegas. É importante que você argumente adequadamente a favor de seu ponto de vista sobre cada questão.** Respostas pessoais. Se julgar pertinente, promova um debate com toda a turma.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam que, apesar de a pesquisa científica seguir métodos e procedimentos universais, ela sempre está sujeita à influência de fatores culturais e sociais.

FATORES QUE ALTERAM A RAPIDEZ DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS

Alguns fatores podem afetar a rapidez de uma transformação química, como a temperatura, a concentração dos reagentes e o uso de catalisadores.

Por exemplo, quando armazenamos alimentos na geladeira, a baixa temperatura de seu interior faz com que as reações que deterioram os alimentos demorem mais tempo para acontecer. Assim, o alimento permanece adequado para o consumo por mais tempo. Também é comum, em peixarias e feiras livres, os peixes serem mantidos sobre gelo.

Andreswd/Stock/Getty Images

Para evitar que alimentos estraguem rapidamente, é recomendável armazená-los na geladeira. Certos alimentos duram ainda mais se forem armazenados no congelador.

Adriano Kirihara/Pulsar Imagens

É comum vermos peixes expostos para venda conservados sobre o gelo. São Paulo (SP). Foto de 2020.

Assim como é necessário, no cotidiano, retardar algumas reações químicas, em outros casos, é necessário acelerá-las, como nas reações que ocorrem no nosso organismo, que são catalisadas pelas enzimas, comentadas na abertura deste capítulo. Esses e outros fatores serão estudados a seguir.

Influência da superfície de contato

Para que uma reação ocorra mais rapidamente, é preciso haver mais colisões por unidade de tempo. Isso leva a um aumento da probabilidade de choques efetivos.

Quando comparamos a diferença da rapidez da reação de um comprimido efervescente triturado e de um não triturado, podemos notar que o comprimido triturado reage mais rapidamente, o que é evidenciado pela maior liberação de gás em relação ao não triturado, no mesmo intervalo de tempo, como mostra a fotografia a seguir.

Trevor Clifford Photography/SPL/Fotoarena

Reação de um comprimido efervescente triturado (à direita) e não triturado (à esquerda) em água.

Isso acontece porque, com o comprimido triturado, a região de contato entre os reagentes (a substância do comprimido e a água) é muito maior, possibilitando maior quantidade de colisões entre os reagentes. Isso leva a um aumento da quantidade de choques efetivos, o que torna a reação mais rápida.

Por isso, quando nos alimentamos, também é importante mastigar bem os alimentos. Ao fazer isso, aumentamos a superfície de contato entre as substâncias dos alimentos com a saliva e o suco gástrico. Esse processo facilita a digestão.

Para compreender a influência da superfície de contato, atente para a ilustração a seguir. Nela, as setas indicam as partes do comprimido triturado e não triturado, respectivamente, em que é possível haver colisão com a água (segundo reagente). É dessa forma que triturar um comprimido faz com que ele reaja mais rapidamente.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Representação esquemática, em cores-fantasia, da influência da superfície de contato na rapidez de uma reação química. Note que a região de contato entre o comprimido e os reagentes (representados pelas setas) é maior no comprimido triturado.

Influência da temperatura

Quando se aumenta a temperatura de um sistema em que espécies estão reagindo, a energia cinética média delas também aumenta. Com o aumento da energia cinética das espécies, ocorrem mais colisões entre os reagentes, que podem resultar em mais colisões com energia suficiente para reagir. Analise o gráfico a seguir.



Reinaldo Vignati/ID/BR

No gráfico, $E_{mín}$ representa o valor mínimo de energia para que a reação ocorra. Note que a área do gráfico em que as partículas reagentes colidem com energia suficiente para tanto apresenta duas regiões, uma mais clara e outra mais escura. A primeira representa as partículas

Não escreva no livro.

com energia suficiente para reagir à temperatura T_1, enquanto a segunda representa as colisões adicionais que reagem à temperatura T_2.

Um exemplo da influência da temperatura pode ser observado ao utilizar uma panela de pressão. A mandioca, por exemplo, leva de 20 a 25 minutos para ser cozida em uma panela comum. Na panela de pressão, esse tempo passa para 10 minutos. Isso acontece porque, na panela de pressão, a água continua líquida a uma temperatura acima de 100 °C ao nível do mar, cozinhando o alimento mais rapidamente.

Funcionamento da panela de pressão

Na panela de pressão, a água atinge uma temperatura acima de 100 °C ao nível do mar e continua no estado líquido por causa da pressão dentro da panela. Ela impede parcialmente que algumas moléculas de água passem para o estado de vapor, mantendo-as no estado líquido. Caso a panela não tivesse o pino que deixa escapar o vapor de água, a panela explodiria. Por isso é importante respeitar o volume máximo da panela, indicado pelo fabricante. Isso impede que o escape de vapor seja entupido e cause acidentes.

Plenz/Shutterstock.com/ID/BR

Ao utilizar panelas de pressão, sempre verifique se o pino que permite a liberação de vapor está limpo (os furos não devem estar obstruídos) e em bom estado. Em caso negativo, não utilize a panela.

Influência da concentração

Considere a reação química descrita a seguir, entre hidrogênio (H_2) e óxido nítrico (NO), ambos gasosos.



$$2\,H_2(g) + 2\,NO(g) \rightarrow 2\,H_2O(g) + N_2(g)$$

Para compreender a influência da concentração na rapidez de uma reação química, foram feitos três experimentos diferentes. Os dados estão apresentados na tabela a seguir.

Experimento	Concentração inicial (mol/L)		Rapidez inicial (mol/min)
	NO	H_2	
I	0,006	0,001	0,025
II	0,006	0,002	0,050
III	0,006	0,003	0,075

Note que a concentração de óxido nítrico se manteve constante nos três experimentos, enquanto a concentração de gás hidrogênio foi aumentada. Perceba também que a rapidez inicial da reação aumentou. Nesse caso, pode-se inferir que um acréscimo na concentração do reagente promoveu um aumento na rapidez da reação. Isso acontece porque, quando se aumenta a concentração dos reagentes, há mais partículas confinadas no recipiente e, assim, mais colisões efetivas por unidade de tempo podem ocorrer.

Porém, nem sempre um aumento da concentração de reagente aumenta a rapidez da reação. É necessário verificar experimentalmente cada caso. Em alguns, por exemplo, a rapidez não é alterada, ou, ainda, pode dobrar ou até mesmo quadruplicar.

Representação sem proporção de tamanho.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Representação da reação entre H_2 e NO em diferentes concentrações. Cores-fantasia.

CATALISADORES

Algumas reações acontecem muito lentamente, o que pode ser um problema para processos industriais, por exemplo. Para aumentar a rapidez dessas reações, pode-se adicionar catalisadores, que são substâncias que aumentam a rapidez da reação sem serem consumidas no processo, sendo regeneradas ao final dele.

O catalisador atua fornecendo um outro mecanismo, ou caminho, de reação para que ela aconteça. Esse outro mecanismo apresenta menor energia de ativação, aumentando a rapidez da reação. O gráfico a seguir representa esse processo.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Gráfico de energia e função do caminho de reação para uma mesma reação com e sem a presença de catalisador. E_a representa a energia de ativação para cada uma das reações. Note que para a reação catalisada a energia de ativação é menor.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

O CONCEITO DE CATALISADOR

Durante a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, foram desenvolvidas diversas técnicas para a produção de bens de consumo. A industrialização impulsionou o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, como a Química. Apesar disso, a industrialização também teve consequências socioambientais, positivas e negativas. Entre as positivas, podemos citar o melhor manejo de matérias-primas e a maior eficiência na produção de bens materiais, o que permitiu barateá-los. Entre as negativas, estão a poluição da atmosfera, a contaminação da água e o aquecimento global.

Uma das maneiras de haver uma produção eficiente e mais barata, ao mesmo tempo em que se polui menos o ambiente, é por meio da catálise, a qual, em geral, é um processo em que se aumenta a rapidez de uma reação química pela adição de um catalisador. Por meio de processos catalíticos é possível, idealmente, produzir mais produtos, gerando menos resíduos e possivelmente evitando a utilização de reagentes nocivos ao ambiente. Esse é um dos motivos pelos quais a catálise é um dos princípios da Química Verde.

DE OLHO NO CONCEITO

Química Verde

A Química Verde é uma abordagem que visa minimizar o impacto ambiental de atividades na área química. A Química Verde se baseia em doze princípios, que orientam a utilização de métodos mais seguros e eficientes, com o intuito de reduzir ou eliminar substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente.

Além da catálise, a Química Verde busca, entre outros, a eficiência atômica, que pode ser definida como a tentativa de minimizar a perda de materiais, ou seja, de promover reações em que o máximo de átomos do reagente seja incorporado aos produtos.

Ao longo da história, diversos cientistas realizaram experimentos e desenvolveram maneiras de sintetizar substâncias. Algumas dessas sínteses eram realizadas na presença de outras substâncias, sem fazerem parte do produto final. Por exemplo, em 1540, Valerius Cordus (1515-1544), médico alemão, publicou o desenvolvimento de um método para sintetizar éter do álcool, utilizando ácido sulfúrico. Atualmente, sabe-se que muitas reações são catalisadas em meio ácido.

Em outros experimentos, realizados no século XVIII, o cientista inglês Joseph Priestley (1733-1804) verificou que algumas reações químicas aconteciam por meio do contato dos reagentes com um filamento metálico. Na época, Priestley acreditava que esse condutor servia como fonte de calor para a reação. Na mesma época, experimentos realizados pelo químico francês Louis Jacques Thénard (1777-1857) também foram importantes para o desenvolvimento do conceito de catalisador. O pesquisador verificou que o peróxido de hidrogênio (H_2O_2, a água oxigenada) sofria decomposição em diversas superfícies, incluindo algumas que pareciam não ter sofrido alteração ao final do processo.

Diversos outros experimentos foram conduzidos ao longo do tempo, e tantas outras explicações foram apresentadas para os fenômenos observados. Entretanto, por volta do século XIX, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), enquanto trabalhava na escrita de relatórios para a Academia de Ciências de Estocolmo, analisou diversos trabalhos e notou que vários experimentos tinham em comum a presença de uma substância que, embora não fosse consumida no processo, era essencial para que a reação acontecesse de maneira significativa. Berzelius também notou que esse fenômeno ainda não havia sido estudado e, portanto, não estava nomeado. Em 1835, Berzelius publica sua teoria e cunha o termo "força catalítica", sistematizando uma nova área da química. Após o relatório de Berzelius, vários pesquisadores reportaram seus resultados à luz do conceito de catálise.

Fonte de pesquisa: Rocha, M. G. *et al*. Revisitando a história da catálise: as contribuições de Elizabeth Fulhame e outros aspectos históricos. *Revista Virtual de Química*, Niterói, v. 15, n. 2, p. 283-294, 2023.

Para discutir

1. A sistematização feita por Berzelius passou a nortear os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores a partir desta data. Para a Química moderna, essa sistematização permitiu unificar os resultados obtidos por vários pesquisadores em torno de um conceito, estabelecendo uma nova área de pesquisa e produção de conhecimento.

1. Qual é a relevância da sistematização do conceito de catalisador por Jöns Jacob Berzelius e como essa sistematização impactou a Química moderna?

2. Os processos catalíticos permitem a produção de quantidades maiores de produtos, gerando menos resíduos e possivelmente evitando a utilização de reagentes nocivos ao ambiente.

2. Como a catálise pode tornar processos industriais mais sustentáveis?

3. Discuta com um colega o papel da ciência e da tecnologia na transformação das práticas industriais. Depois, produzam um breve texto destacando o que vocês discutiram.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam o papel do desenvolvimento científico e tecnológico em melhorar a produtividade industrial e, ao mesmo tempo, preservar o ambiente.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **O gráfico a seguir foi obtido para uma reação entre carbonato de cálcio e excesso de ácido clorídrico.**



AMj Studio/ID/BR

A curva mostra o volume total de dióxido de carbono liberado (medido a temperatura e pressão constantes) em função do tempo.

Dado: $CaCO_3(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow CaC\ell_2(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$.

Quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio reaja?

Resposta: Pelo gráfico, observa-se que o volume total de CO_2 produzido será de 24 L. O volume de CO_2 atinge a metade desse valor (12 L) em 30 segundos. Como a proporção estequiométrica entre carbonato de cálcio e CO_2 é de 1:1, pode-se inferir que, quando tiver sido formado metade do volume total de CO_2, terá sido consumido metade do carbonato de cálcio.

2 **Observe a figura a seguir e realize as atividades propostas.**



AMj Studio/ID/BR

a) Apresente uma hipótese para outra posição favorável para um choque efetivo. Faça o desenho no caderno, compartilhe com os colegas e analise quais hipóteses são viáveis. Justifique.

b) A interação química representada é exotérmica ou endotérmica? Justifique. **2. b)** Endotérmica, pois há absorção de energia dos reagentes para se transformarem em produtos.

2. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem um desenho em que as moléculas colidam na geometria favorável para formar os produtos.

3 **Foi feita uma pesquisa para se avaliar o teor de vitamina C em 100 g de acerola ao longo de 4 meses. O gráfico representa o quanto de vitamina C se degradada ao longo desse período, em duas temperaturas diferentes.**



AMj Studio/ID/BR

a) Calcule a rapidez média de degradação da vitamina C no intervalo de dias (10-110) para as duas temperaturas: −120 °C e −180 °C.

b) Compare os valores e responda: Em qual momento a degradação foi maior? Proponha uma explicação para esse fenômeno.

3. a) e **b)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **Proponha explicações para as seguintes observações, identificando o principal fator que interfere na rapidez dessas interações químicas:**

4. a), **b)**, **c)** e **d)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Para se acender uma fogueira mais eficientemente, podem ser utilizados gravetos de madeira dispostos separadamente, em vez de toras do mesmo material.

b) Alguns alimentos como frutas, verduras e carnes se conservam por mais tempo se armazenados na geladeira.

c) Para a síntese da amônia, além de pressão e temperatura adequadas, é imprescindível a utilização de outra substância no processo, por exemplo, o ferro.

d) Quando se abana carvão em brasa na churrasqueira, ele se torna mais incandescente.

5 **O zinco metálico reage com uma solução de ácido clorídrico, liberando gás hidrogênio e energia. Se o mesmo experimento for realizado na presença de cobre metálico, que não reage com a solução de ácido clorídrico, observa-se que a reação fica aproximadamente três vezes mais rápida. No final do experimento, observa-se que o cobre permanece inalterado na solução, enquanto o zinco foi totalmente consumido.**

a) Explique por que a adição do metal cobre acelera a reação. Porque o cobre atua como catalisador.

b) Esboce um gráfico de energia × caminho de reação que mostre as duas reações descritas a seguir.

I. $Zn(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow ZnC\ell_2(aq) + H_2(g)$

II. $Zn(s) + 2\ HC\ell(aq) + Cu(s) \rightarrow ZnC\ell_2(aq) + H_2(g) + Cu(s)$

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

PENSANDO CIÊNCIAS

COMO SE DETERMINA A QUANTIDADE DE CALORIAS DE UM ALIMENTO?

Quando estamos seguindo uma dieta específica, é comum analisarmos o conteúdo calórico dos alimentos que vão compor cada uma das refeições. Essa informação é facilmente obtida dos rótulos dos alimentos. Mas como é determinada a quantidade de calorias de uma porção de determinado alimento? Nesta atividade, você e os colegas vão pesquisar e refletir a respeito do procedimento mais utilizado na indústria alimentícia para resolver esse problema.

Decompondo o tema

Quando estamos diante de um problema complexo, é importante realizar a sua decomposição em questões mais simples. Nesse caso, podemos levantar as seguintes indagações:

- Quais são os principais nutrientes dos alimentos?
- Quais nutrientes são utilizados pelo nosso organismo para produzir energia?
- Existem técnicas para determinar a quantidade de nutrientes energéticos em um alimento?

Nishihama/Shutterstock.com/ID/BR

Conjunto de vegetais.

Reconhecendo padrões

Considerem como as perguntas realizadas na etapa anterior podem auxiliar na resolução do problema, refletindo sobre como a quantidade de nutrientes energéticos de um alimento está relacionada com seu valor calórico. Pesquisem se todos os nutrientes energéticos são capazes de gerar a mesma quantidade de energia por grama e qual é o teor calórico desses nutrientes. Essa informação pode ser útil para determinar o teor calórico de, por exemplo, um abacate. Suponha que você soubesse que em 10 gramas de poupa de abacate há 0,6 gramas de carboidratos, 0,12 gramas de proteínas e 1,2 gramas de gorduras; seria possível resolver o problema proposto? De quais outras informações vocês precisariam?

Abstraindo o problema

Os nutrientes energéticos têm propriedades físico-químicas diferentes. Por exemplo, vários carboidratos e proteínas são moléculas predominantemente polares, enquanto as gorduras são compostos apolares. Como essa informação pode ser utilizada para a separação dos componentes nutricionais de uma amostra de alimento?

Uma técnica muito utilizada na análise da composição de misturas é a dissolução fracionada. Ela consiste na adição de um solvente que dissolve apenas uma parcela dos componentes da mistura. A solubilidade de um soluto em um determinado solvente, como um nutriente, depende da sua polaridade. Solutos apolares tendem a dissolver melhor solutos apolares, por exemplo. Sabendo disso, como seria possível separar as gorduras dos demais nutrientes? Quais solventes poderiam ser utilizados para esse procedimento? Após a adição do solvente, como vocês determinariam a massa de gordura presente na amostra do alimento?

Note que, em procedimentos como esse, várias medidas devem ser tomadas antes do início da separação da mistura. Uma delas é a massa da amostra que está sendo analisada; outra é a massa do solvente que será adicionado à mistura. Reflita com os colegas por que essas medidas são indispensáveis para a determinação da massa de gordura no alimento e, posteriormente, do conteúdo calórico proveniente desse nutriente.

Não escreva no livro.

A separação das proteínas e dos carboidratos é mais complexa, mas é possível determinar a quantidade de proteínas em uma amostra de alimento por meio da quantidade de nitrogênio nela presente, visto que esse elemento só é encontrado nesse nutriente.

Buscando soluções

Sabendo que é possível determinar a quantidade de gorduras e proteínas por processos físicos e químicos, como esses dados poderiam ser úteis para calcular a quantidade de carboidratos na amostra seca (sem água) de alimento? Apesar de não serem os únicos nutrientes dos alimentos, os carboidratos, as proteínas e as gorduras representam a maior porcentagem em massa de amostras secas, de modo que é possível desprezar a massa dos demais nutrientes sem incorrer em erros grosseiros de cálculo do teor calórico.

Com todas essas informações, é hora de esquematizar o procedimento completo para a resolução do problema inicial.

Elaborando o algoritmo

Agora, você e os colegas vão elaborar um esquema, também conhecido como algoritmo, que apresenta todos os passos para a resolução do problema. O algoritmo pode ser elaborado por escrito, enumerando as etapas, ou por meio de um fluxograma, que é uma maneira mais visual de representar as etapas de um procedimento e, por isso, é muito utilizado em laboratórios.

Acompanhe a seguir um exemplo de fluxograma, que mostra as etapas de como fazer café coado.



Com base nas discussões, elaborem um fluxograma para representar o procedimento de determinação do teor calórico de uma amostra de alimento.

Para discutir

1. **Utilizando os dados fornecidos no texto e o teor calórico por grama de cada nutriente, calcule a quantidade de calorias de um abacate de 400 gramas (as massas da casca e da semente já foram desconsideradas).** 547,2 kcal

2. **Compostos orgânicos, como carboidratos, proteínas e gorduras, sofrem combustão. Reflita com os colegas sobre outra maneira de determinar o conteúdo energético de um alimento utilizando a combustão dele como procedimento principal. Nesse caso, seria mais adequado utilizar uma amostra seca ou úmida do alimento?** Resposta pessoal. Os estudantes podem sugerir o uso da bomba calorimétrica, citada no capítulo 1 desta unidade. Nesse equipamento, deve-se usar uma amostra seca do alimento.

3. **Escolha outro grupo de colegas e troquem os diagramas. Leiam o diagrama do outro grupo e verifiquem se foi incluído algo importante que vocês deixaram de lado. Houve alguma dificuldade na interpretação do diagrama do outro grupo? Se sim, qual? Compartilhem suas reflexões com o restante da sala.** Respostas pessoais. Se julgar pertinente, depois que todos os estudantes compartilharem os seus algoritmos, elabore em conjunto com a turma o algoritmo que eles consideram mais eficaz para resolver o problema proposto.

Não escreva no livro.

QUESTÕES GLOBAIS

1 **Analise o gráfico a seguir referente à transformação dos gases hidrogênio e iodo em iodeto de hidrogênio gasoso.** **1. a)**, **b)**, **c)** e **d)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.



AMj Studio/ID/BR

a) Equacione a reação química correspondente.

b) Qual é o valor da energia de ativação para essa transformação?

c) Quanto vale o ΔH?

d) Trata-se de uma reação química endotérmica ou exotérmica? Justifique.

2 **Leia o texto e faça o que se pede.**

Muitas das reações químicas, apesar de serem possíveis sob o ponto de vista termodinâmico, acabam não sendo observadas na prática ou se processam com velocidades extremamente lentas, quase imperceptíveis. É o caso do perclorato de potássio, $KC\ell O_4$, que é um poderoso explosivo, ou do azoteto de sódio, NaN_3, empregado nos *airbags*. Ambos, apesar de sua grande instabilidade termodinâmica, podem ser estocados por longo tempo no laboratório. Entretanto, pequenas quantidades de impurezas orgânicas, ou a aplicação de uma faísca elétrica, poderão provocar sua detonação imediata.

TOMA, H. E. O tempo na química. *Revista USP*, São Paulo, n. 81, p. 79, 2009. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/13732/15550. Acesso em: 30 jul. 2024.

a) Formule uma hipótese que explique por que os explosivos descritos no texto podem ficar armazenados por longo tempo sem que nada ocorra. Relacione-a com o papel desempenhado pela faísca.

b) Desenhe um esboço de gráfico: "rapidez da reação química × temperatura", que poderia representar o tipo de reação descrita no texto.

2. b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. a) As interações químicas precisam de energia de ativação para ocorrer. Por isso, as reações mencionadas só ocorrem com a faísca que vai prover essa energia mínima para dar início a elas.

3 **(Famerp-SP)** A imagem mostra a formação de água líquida por meio de duas mudanças de estado físico distintas:

Mudança 1 – água formada na superfície externa de um copo.

Mudança 2 – água proveniente do derretimento do gelo.

Cosma/Shutterstock.com/ID/BR

De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre

a) condensação em 1 e fusão em 2; e ambos os processos são exotérmicos.

b) liquefação em 1 e em 2; um processo exotérmico.

c) condensação e processo exotérmico em 1; fusão e processo endotérmico em 2.

d) liquefação e processo endotérmico em 1; fusão e processo exotérmico em 2.

e) sublimação em 1 e liquefação em 2; ambos os processos são exotérmicos. Alternativa **c**.

4 **(Fuvest-SP) Apesar de a África ser considerada o berço das civilizações e existirem indícios de conhecimentos elementares de Química no sul do continente cerca de 100 000 anos atrás, os conhecimentos químicos ensinados são eurocentristas. Entretanto, uma das grandes contribuições para o estudo de reatividade química é atribuída ao químico egípcio Ahmed Hassan Zewail, agraciado com o prêmio Nobel em 1999 por seus estudos de reações químicas usando uma técnica conhecida como espectroscopia de femtossegundos. Essa técnica possibilita identificar espécies com tempo de vida curto utilizando pulsos de *laser* com duração de 10^{-15} s.**

Essa contribuição é relevante para o estudo de reações químicas, pois Alternativa **b**.

a) todos os processos químicos são extremamente rápidos e não podem ser estudados por técnicas que não sejam em femtossegundos.

b) as reações químicas podem passar por espécies instáveis e com pouco tempo de vida.

c) o tempo existente para analisar os produtos de uma reação depende apenas da quantidade de produtos formada.

Não escreva no livro.

d) permite entender como reagentes específicos se comportam frente a processos reacionais que são extremamente lentos.

e) apenas com uma técnica tão rápida é possível analisar o grau de pureza dos reagentes isolados.

5 **(FCM-MG) A oxidação da glicose é um processo vital, que fornece a energia necessária para sustentar a vida de todas as células em nosso corpo. Essa reação química complexa está intimamente ligada aos processos digestivos, os quais são responsáveis por quebrar os alimentos em suas unidades constituintes, incluindo a glicose, para que ela possa ser utilizada como fonte de energia. No organismo humano, até 40% da energia resultante da oxidação da glicose pode ser disponibilizada à atividade muscular. A oxidação da glicose produz, além de energia, gás carbônico e água, conforme a equação química a seguir. No sentido de evitar doenças causadas pelo excesso de glicose, como o câncer e o diabetes *mellitus*, a prática de atividade física está entre os métodos de prevenção.**

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O \qquad \Delta H = -2\,800\ kJ$

Suponha que um atleta, em seu café da manhã, faça a ingestão, entre frutas e carboidratos, de uma quantidade de 10 gramas de glicose. Considere as massas molares (em g/mol): Alternativa **a**.

H = 1; C = 12; O = 16.

Na oxidação da glicose ingerida pelo atleta, a energia aproveitada para atividade muscular, em quilojoules, é mais próxima de

a) 62,2.

b) 155,5.

c) 622,2.

d) 1120,0.

6 **(UEA-AM) A decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2) é uma reação que ocorre de acordo com a equação:**

$$2\ H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ H_2O(\ell) + O_2(g)$$

Para estudar a cinética da decomposição do peróxido de hidrogênio, foram preparadas soluções com concentrações diferentes, as quais foram submetidas a diferentes temperaturas, sendo que em uma das soluções foi adicionado um catalisador. A tabela apresenta as diferentes condições a que as soluções foram submetidas e o tempo necessário para iniciar a decomposição do H_2O_2 em cada caso.

Experimento	Concentração de H_2O_2	Temperatura	Tempo para iniciar a liberação de CO_2
1	10 mol/L	30 °C	5 minutos
2	10 mol/L	50 °C	1 minuto
3	5,0 mol/L	30 °C	8 minutos
4	5,0 mol/L	30 °C	1 minuto
5	5,0 mol/L	50 °C	5 minutos

A solução em que foi adicionado um catalisador é a do experimento de número Alternativa **c**.

a) 1.

b) 2.

c) 4.

d) 3.

e) 5.

7 **(Fuvest-SP) O cientista Richard Feynman, prêmio Nobel de Física em 1965, fez comentários sobre o processo de combustão em uma entrevista chamada *Fun to Imagine*. Segundo ele, à primeira vista, é impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para a formação de CO_2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente.** Alternativa **e**.

Essa aparente contradição pode ser explicada, pois

a) a reação depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer.

b) o fogo torna a reação desfavorável.

c) o fogo depende da presença de CO_2 para começar.

d) o átomo de carbono da árvore é muito mais resistente ao O_2 do que os átomos de carbono dispersos no fogo.

e) a reação precisa de uma energia de ativação para começar.

8 **(Famerp-SP) Segundo a teoria das colisões efetivas, para que uma reação ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam umas com as outras com orientação espacial adequada e energia mínima. Assim, qualquer alteração no meio reacional que interfira nesses dois fatores modifica a velocidade da reação. A figura mostra o sistema reacional gasoso 1 submetido a modificações que proporcionaram os sistemas 2 e 3.** Alternativa **a**.



Famerp-SP, 2022. Facsímile: ID/BR

Considerando que as moléculas existentes nesses sistemas reajam entre si, as relações entre as velocidades (V) das reações dos sistemas 1 e 2 e dos sistemas 1 e 3 são, respectivamente,

a) V1 < V2 e V1 < V3

b) V1 = V2 e V1 > V3

c) V1 > V2 e V1 > V3

d) V1 < V2 e V1 > V3

e) V1 = V2 e V1 < V3

PRODUTOS QUÍMICOS EM CASA

MANUAL PARA IDENTIFICAÇÃO, USO E ARMAZENAGEM

O que será feito

Ao ser utilizado em ambiente domiciliar, qualquer produto de limpeza com diferentes compostos químicos em sua fórmula pode trazer riscos à saúde, por ser inflamável, tóxico ou contaminante. Também pode causar irritação na pele e alergias.

Ainda hoje, é comum nos depararmos com produtos de limpeza clandestinos, que podem exibir ou não rótulo em que constem informações sobre sua composição e sobre cuidados de uso e armazenamento. Produtos clandestinos não são certificados pelo Ministério da Saúde, ou seja, não foram submetidos à avaliação de sua eficácia e segurança para uso, manuseio ou armazenagem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão responsável pelo registro de produtos e por fiscalizar e coibir o comércio dos que forem irregulares. Por isso, é importante comprar e utilizar apenas produtos certificados por esse órgão.

K-Paul/iStock/Getty Images

São muitos os produtos químicos domésticos: alvejantes, desengordurantes, detergentes, entre outros. Produtos de limpeza doméstica podem representar riscos à saúde, como intoxicação ou queimaduras.

No entanto, até mesmo em produtos de limpeza certificados, verifica-se, muitas vezes, que as informações dos rótulos sobre a composição e os riscos que eles podem causar à saúde nem sempre estão em uma linguagem acessível à população, deixando-as expostas aos riscos inerentes a esses produtos. Essa falha de comunicação pode causar acidentes domésticos de consequências graves, como intoxicações (por via oral, respiratória ou cutânea) ou queimaduras.

Embora os produtos devam ser, geralmente, manuseados apenas por adultos, as vítimas desses acidentes podem também ser crianças, adolescentes e até animais domésticos. O que pode ser feito, então, para prevenir esse problema?

Neste projeto, você e os colegas vão elaborar um manual para identificação, uso e armazenamento de produtos de limpeza doméstica. Esse manual será direcionado tanto à comunidade escolar quanto à comunidade local e poderá ser compartilhado tanto em formato impresso quanto em formato digital.

Não escreva no livro.

Objetivos

- Pesquisar informações sobre os produtos químicos de uso doméstico.
- Definir o público-alvo do manual e as informações mais relevantes a serem divulgadas.
- Confeccionar um manual de identificação, uso e armazenagem que contenha essas informações.
- Divulgar e disponibilizar o manual para a comunidade, em formato físico e/ou *on-line*, visando alcançar o público-alvo.

Preparação

Listando os produtos de limpeza presentes nas residências

Para o desenvolvimento deste projeto, reflita a respeito de algumas questões nesta etapa inicial, por exemplo: Quais são os produtos de limpeza mais utilizados em residências? Quais são os possíveis riscos decorrentes das falhas no uso e no armazenamento desses produtos? Esses produtos apresentam informações de segurança para seu uso e armazenamento em rótulos, estabelecimentos comerciais, internet, etc.? Além desses, outros questionamentos podem ser propostos.

Cada um deverá começar o projeto pela própria residência. Tendo como parâmetros o armazenamento e o uso de produtos de limpeza em casa, pense nas questões a seguir e escreva as respostas no caderno.

1. Quais produtos de limpeza você e seus familiares geralmente têm em casa?

2. Onde esses produtos são armazenados? Esse armazenamento é feito tomando-se precauções? Quais? Você sabe quais são os riscos desses produtos à saúde?

3. Você já ouviu falar de algum caso de intoxicação ou de queimadura causada pela má utilização de produtos de limpeza em ambiente domiciliar? Descreva o ocorrido.

1. Resposta variável. Espera-se que os estudantes apontem inseticidas, alvejantes, detergentes e produtos de limpeza em geral, solventes, entre outros.

2. Respostas variáveis que requerem reflexão sobre conhecimentos prévios e sobre o texto introdutório.

3. Resposta pessoal. Observe se os estudantes estabelecem relação causal entre o uso do produto e o efeito gerado no corpo humano. Verifique também se eles são capazes de explicar o ocorrido com base em seus conhecimentos de Química e Biologia.

Organizem-se em grupos para conversar sobre as respostas que deram a essas questões e elaborem uma lista dos produtos de limpeza mencionados.

Com a lista em mãos, cada integrante do grupo deve coletar dados nas comunidades escolar e local. Para isso, façam cópias dessa lista e distribuam-nas entre colegas de outras turmas, vizinhos e outras pessoas da comunidade, solicitando-lhes que assinalem os produtos de limpeza que costumam usar e armazenar em casa.

Com o auxílio do(a) professor(a), tabulem os dados inseridos nas listas, elencando os produtos que aparecem com mais frequência nas residências.

Apresente aos demais grupos os resultados contabilizados, expressando as quantidades absolutas e a proporção, em porcentagem, dos produtos mais encontrados.

Reklamlar/iStock/Getty Images

A higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, o uso de máscaras e a vacinação foram as medidas mais importantes durante a pandemia do coronavírus.

Investigando as informações sobre os produtos listados

Agora que vocês identificaram os produtos de limpeza mais presentes nas residências, é hora de pesquisar as características desses produtos. Reúna-se com seu grupo para responder às questões a seguir sobre cada um deles. Pesquisem informações em livros técnicos ou em artigos de jornais e de revistas, consultem especialistas ou profissionais das áreas da química ou da saúde e acessem *sites* confiáveis, como o da Anvisa e o de centros toxicológicos brasileiros. **1.** a **5.** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1. Esse produto tem alguma restrição de comercialização (controle de idade do comprador/consumidor, limite de quantidade ou de diluição, regulamentação por lei)? Se sim, qual(is)?
2. Quais são os riscos que esse produto apresenta, se utilizado de maneira inadequada?
3. Quais são os riscos que esse produto apresenta, se armazenado de maneira inadequada?
4. O rótulo ou a embalagem do produto apresenta informações como: uso seguro, armazenamento e o que fazer em caso de acidente doméstico (ingestão, intoxicação, contato com a pele e com os olhos, entre outros)?
5. As informações veiculadas sobre esse produto (em rótulos, bulas, anúncios publicitários, estabelecimentos comerciais, na mídia, entre outros meios) são eficazes para evitar acidentes? Que informação sobre esse produto vocês consideram importante ressalvar?

Cada grupo apresentará suas respostas ao restante da turma no dia combinado com o(a) professor(a). Após as apresentações, formem uma roda de conversa para discutirem os tópicos a seguir.

- Quais são os produtos químicos domésticos que mais oferecem riscos às pessoas? Por quê?
- As informações a respeito desses produtos (e sobre os riscos que eles trazem) estão claras para o consumidor doméstico?
- Qual é o perfil das pessoas e das famílias que estão mais expostas aos riscos apresentados pelos produtos químicos domésticos? Por quê?

Planejando os próximos passos

Neste momento, vocês já devem saber quais produtos oferecem riscos à saúde. Agora, vocês vão planejar como será o manual e o evento na escola para orientar as pessoas e compartilhar o material produzido. Para isso, discutam e definam:

- a organização em grupos – vocês podem manter os mesmos grupos da etapa anterior ou criar novos grupos. Sugere-se que uma parte dos grupos fique responsável pela criação e elaboração do manual e que a outra parte cuide da organização e dos preparativos para o evento na escola, incluindo sua divulgação. Esta, no entanto, é uma sugestão: avaliem, com o(a) professor(a), se ela é adequada para a turma;
- o público-alvo da publicação e do evento – essa definição é essencial para a tomada de decisões ao longo do desenvolvimento do projeto;
- a tarefa que caberá a cada grupo – procurem dividir as tarefas de modo equilibrado;
- o cronograma de trabalho – definam as datas para entregas, reuniões, entre outras tarefas. O cronograma é uma importante ferramenta para que o projeto seja bem-sucedido.

Desenvolvimento

É hora de colocar a mão na massa! Organizem os trabalhos entre os grupos da forma como a turma e o(a) professor(a) considerarem mais adequada.

Elaborando o manual

Para a elaboração do manual, atentem aos pontos a seguir e levantem outros que considerarem necessários.

- Definam o projeto gráfico do manual. Para isso, vocês podem, por exemplo, pesquisar na internet modelos, conhecidos como *templates*, de manuais ou de publicações similares, pesquisar publicações impressas, entre outros. É importante apresentar um projeto gráfico que seja atrativo e funcional para o público-alvo.
- Organizem a elaboração dos textos e as imagens ilustrativas. Cada grupo pode ficar responsável por três a quatro produtos, devendo compilar as informações relacionadas a cada um deles, como descrição do produto, indicação de uso, principais riscos, cuidados que o consumidor deve ter ao comprar, usar e armazenar o produto, entre outras que o grupo considerar relevantes.
- Procurem evitar que o conteúdo do manual fique redundante. Vocês podem organizar os produtos em categorias – por exemplo, "alvejantes" e "inflamáveis". Atentem para que as imagens e o texto do manual sejam adequados ao perfil do público-alvo e para que o texto seja claro e conciso. Se necessário, peçam o auxílio do(a) professor(a) da área de Linguagens.
- Elaborem o manual, preferencialmente, no computador. No caso de ser feito artesanalmente, que seja digitalizado, posteriormente, para facilitar o compartilhamento digital do material, ampliando seu alcance na comunidade local. Definam também se o manual pode ser hospedado em um *site*, como o da escola, por exemplo, caso a instituição tenha um.

Não escreva no livro.

AndreyPopov/iStock/Getty Images

Durante o desenvolvimento do projeto, fiquem atentos às datas do cronograma. Caso percebam a necessidade de algum ajuste, falem com o(a) professor(a) e a turma, para que reavaliem o que pode ser feito e qual é o melhor caminho a seguir.

Organizando o evento

Organizem o evento, definindo, por exemplo, se:

- Haverá uma palestra de abertura? Em caso positivo, ela será feita por vocês ou por um profissional convidado da área da saúde ou da química?
- O evento terá painéis, folhetos, cartazes?
- Em que dia será realizado? Em que local da escola será feito?
- O que será necessário para a sua realização?
- Quantos manuais devem ser impressos para distribuição no dia do evento?
- Onde essa impressão será feita?
- Como vocês vão se organizar no dia do evento?

Procurem a direção da escola para acertar os detalhes.

Deem atenção especial à divulgação do manual nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, atentando para a linguagem dos textos e as imagens.

Convidem pessoas da sua família e da comunidade local, ou seja, aquela externa à escola.

Refinando o manual e ajustando detalhes do evento

Antes de imprimirem o manual e divulgarem o evento de lançamento para a comunidade, apresentem os materiais elaborados e demais ideias e produções ao(à) professor(a) e à turma, para que todos possam emitir opiniões e dar sugestões de melhoria. Com base nessas contribuições, vocês poderão realizar as alterações que considerarem pertinentes.

Vocês podem também apresentar uma versão prévia do manual para sua família e para as pessoas da comunidade que colaboraram indicando os produtos de limpeza que mais utilizavam. Solicitem a opinião deles a respeito da clareza e da pertinência do texto.

Com as melhorias feitas e o material fechado, providenciem as impressões ou o compartilhamento digital.

Conclusão

Compartilhando o manual com a comunidade

Preparem previamente o local destinado ao evento, acertando detalhes de sua organização: afixar cartazes, recepcionar o público e o palestrante (caso tenham optado por convidar um), distribuir os manuais, providenciar os materiais necessários, entre outros.

Durante a realização do evento, é importante que toda a turma esteja disponível para sanar as dúvidas dos participantes e orientá-los. Informe-os sobre o formato escolhido (impresso e/ou digital) e as formas de compartilhamento do manual – por *e-mail*, pelas redes sociais ou pelo *site* da escola.

Solicitem às pessoas que participaram do evento a opinião delas.

Para receber o retorno do público, é recomendável que vocês criem um questionário para avaliar se o manual apresentou algo novo para essas pessoas, se elas mudaram algum hábito no uso de produtos químicos e para saber se elas acham que esse tipo de material é capaz de reduzir a ocorrência de acidentes. Esse retorno será essencial para a avaliação do projeto como um todo.

Avaliação

2. Respostas pessoais. Se julgar pertinente, planeje uma reelaboração do manual pelos estudantes algum tempo depois do término do projeto.

1 **O manual teve impactos positivos na vida das pessoas que tiveram acesso a ele? Por quê? Cite exemplos.** Respostas pessoais.

2 **Você considera que esse manual pode ser melhorado (em uma reedição, por exemplo)? Se sim, como?** Respostas pessoais.

3 **A participação dos membros do grupo durante a execução do projeto se deu de maneira equilibrada? Como a distribuição do trabalho poderia ser aprimorada?** Respostas pessoais.

4 **O desenvolvimento deste projeto foi benéfico para você? De que modo?** Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes se sintam mais preparados para aplicar em seu dia a dia os cuidados necessários para manipular produtos químicos.

ELETROQUÍMICA

Existem diversas reações químicas que resultam de um processo de transferência de elétrons, denominadas reações de oxirredução. Elas estão presentes, por exemplo, na corrosão de materiais metálicos, nas reações de combustão, na obtenção de metais a partir de seus minérios, na fotossíntese, na fermentação, entre outros.

As reações de oxirredução também são responsáveis pela geração de energia nas pilhas e baterias, como as que são utilizadas em carros comerciais híbridos (que apresentam propulsão tanto elétrica quanto por combustão interna) e em carros elétricos (movidos exclusivamente por baterias recarregáveis).

A fabricação e a comercialização de carros elétricos vêm crescendo nos últimos anos no Brasil e no mundo, apesar de os carros com combustão interna ainda serem muito mais comuns. Atualmente, em alguns locais do Brasil, é possível também encontrar veículos de transporte coletivo elétricos.

O funcionamento das baterias e dos outros exemplos citados está relacionado com a transferência de elétrons que ocorre entre os átomos e as moléculas nas reações de oxirredução. Neste capítulo, você vai aprender a reconhecer as reações de oxirredução e investigar alguns exemplos delas em seu dia a dia.

OBJETIVOS

- Reconhecer reações de oxirredução.
- Compreender o funcionamento de pilhas e baterias.
- Investigar o enferrujamento de pregos.
- Compreender o processo de eletrólise.
- Reconhecer algumas aplicações do processo de eletrólise na indústria.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. **Existem incentivos no Brasil para o desenvolvimento e comercialização de carros híbridos e elétricos? Discuta a relevância de incentivos nesse setor.**
2. **Que limitações existem para a comercialização massiva de carros elétricos atualmente?**
3. **Quais são as vantagens do carro elétrico em comparação com o carro de combustão interna, em termos de emissão de poluentes?**

1. Resposta pessoal. Alguns estados brasileiros oferecem desconto ou isenção no imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para carros híbridos e elétricos.

2. A necessidade de maior autonomia das baterias e infraestrutura de pontos de recarga.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Ônibus elétrico em funcionamento na cidade de São José dos Campos (SP). Foto de 2024. ▸

UNIDADE 5

1 Contando elétrons

2 Eletrólise

João Prudente/Pulsar Imagens

CONTANDO ELÉTRONS

PARA COMEÇAR

1. O que causa o processo de corrosão no casco do navio?
2. O que são íons?
3. O que você entende por oxidação?

1. A interação da água e do oxigênio do ar com o ferro do casco provoca a corrosão do metal.

2. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

REAÇÕES ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS

Algumas reações químicas envolvem a transferência de elétrons entre as espécies químicas dos reagentes. Elas são chamadas reações de oxirredução (ou apenas redox) e são processos muito comuns no dia a dia. Um exemplo bastante conhecido é a corrosão de materiais metálicos, como o aço e o ferro fundido.

A ferrugem está associada ao ferro, mas a corrosão pode ocorrer em diversos materiais. Entender e prevenir o processo de corrosão é importante, pois ele pode causar grandes prejuízos econômicos e desperdício de recursos, além de colocar em risco a vida de pessoas, devido ao potencial de acidentes.

Essas reações também estão presentes em pilhas e baterias, em processos biológicos como a fotossíntese, no funcionamento do bafômetro, no escurecimento de lentes fotossensíveis em presença de luz solar, bem como na ação antioxidante da vitamina C. Todos esses processos dependem da transferência de elétrons, mas como a transferência dessa partícula entre as espécies químicas envolvidas nessas reações pode estar relacionada a tantos processos diferentes?

Neste capítulo, você vai aprender a reconhecer reações de oxirredução, a balancear equações que as representam e a investigar alguns exemplos em seu cotidiano, como o da corrosão, e os métodos utilizados para evitá-la em superfícies metálicas.

Processo de corrosão em navio. Ilhas Canárias, Espanha. Foto de 2023.

Ardielphoto.com/Shutterstock.com/ID/BR

Não escreva no livro.

REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO

Reações entre metais e cátions metálicos em solução aquosa, como a que ocorre entre uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), $CuSO_4$, e um material de aço (constituído predominantemente de ferro), como um prego, são exemplos de reações de oxirredução (figuras **A** e **B**).

Fotografias: Sérgio Dotta Jr./ID/BR



(**A**) O prego de aço é colocado em contato com a solução aquosa de $CuSO_4$, de cor azul. (**B**) Nesse processo, ocorrem o depósito de metal avermelhado (cobre) e a descoloração da solução azul, que indica uma diminuição da concentração de cátions Cu^{2+} presentes na solução.

No processo, os átomos de ferro (Fe) presentes no aço perdem elétrons, formando cátions Fe^{2+}, ou seja, ocorre a corrosão do metal. Enquanto isso, os cátions Cu^{2+}, responsáveis pela coloração azul da solução, recebem esses elétrons e se depositam como cobre metálico (Cu). Essa transformação é um exemplo de reação de oxirredução que pode ser representada pela seguinte equação:

$$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$$

O ferro é um metal mais reativo que o cobre e, portanto, apresenta maior tendência a formar cátions. Sendo assim, o ferro metálico (Fe) é **oxidado**, ou seja, perde elétrons, enquanto o cátion Cu^{2+} é **reduzido**, isto é, recebe elétrons. Os processos de oxidação e de redução sempre acontecem simultaneamente, e pode-se dizer que a reação ocorre mediante uma **transferência de elétrons**. Nesse caso, a transferência acontece dos átomos de ferro (Fe) para os íons Cu^{2+} em solução aquosa.

A espécie que perde elétrons promove a redução daquela que recebe elétrons e é chamada **agente redutor**. Já a espécie que recebe os elétrons, promovendo a oxidação do outro reagente, é chamada **agente oxidante**. No exemplo, o ferro metálico atua como agente redutor e o cátion Cu^{2+}, como agente oxidante.

NÚMERO DE OXIDAÇÃO (Nox)

Quando reações de oxirredução envolvem metais e íons metálicos, como no exemplo anterior, é fácil reconhecer o processo de transferência de elétrons, pois a carga elétrica das substâncias varia. Contudo, nem sempre isso acontece.

O álcool etílico (ou etanol, CH_3CH_2OH), presente no vinho, por exemplo, oxida-se em contato com o oxigênio atmosférico, resultando em água e ácido acético (CH_3CO_2H), como o presente no vinagre.

$$\underset{\text{etanol}}{C_2H_6O(aq)} + O_2(g) \rightarrow \underset{\text{ácido acético}}{C_2H_4O_2(aq)} + H_2O(\ell)$$

A oxidação do etanol implica um processo de transferência de elétrons. Assim, se o etanol é oxidado, o oxigênio do ar é reduzido.

Por não envolver a formação de íons, entretanto, a transferência de elétrons entre as espécies não é facilmente percebida ou constatada. Para reconhecer uma reação de oxirredução, é preciso determinar o **número de oxidação** (**Nox**) dos átomos dos elementos envolvidos no processo. Para íons monoatômicos, o número de oxidação é igual à carga real dos íons; já para moléculas neutras e íons poliatômicos, o Nox é definido como a carga elétrica hipotética que cada átomo teria caso os elétrons de suas ligações fossem transferidos para o átomo mais eletronegativo.

DE OLHO NO CONCEITO

Eletronegatividade: uma medida relativa

A eletronegatividade é uma medida relativa da tendência que um átomo tem para atrair o par de elétrons envolvido em uma ligação química. Ela depende do raio atômico e da quantidade de prótons no núcleo.

Quando átomos que apresentam a mesma eletronegatividade – átomos de um mesmo elemento, por exemplo – compartilham elétrons, estes se distribuem de forma homogênea entre os dois átomos. Porém, quando átomos de elementos diferentes compartilham elétrons, estes tendem a ficar mais próximos do átomo de maior eletronegatividade, resultando em uma distribuição de cargas não uniforme entre eles.

De forma geral, quanto menor for o raio atômico de um elemento e maior a quantidade de prótons em seu núcleo, maior será a atração do núcleo pelos elétrons envolvidos na ligação.

Assim, na Tabela Periódica, em um mesmo grupo, a eletronegatividade é maior nos elementos que se situam nos primeiros períodos.

Os gases nobres não apresentam eletronegatividade, pois eles não apresentam tendência para receber ou compartilhar elétrons.

Em um mesmo período, a eletronegatividade aumenta com o aumento do número atômico, ou seja, da esquerda para a direita.



ID/BR

1. Significa que essa substância não apresenta excesso ou falta de elétrons em seus átomos.

ROTEIRO

1. **Em relação do número de oxidação, o que significa dizer que uma substância é neutra?**

Regras para determinação do Nox

Nem sempre é necessário analisar cada ligação de uma espécie química (íon ou molécula) para determinar o Nox de um átomo. É possível obter o Nox a partir da fórmula molecular da espécie e de algumas regras práticas. Essas regras são apresentadas a seguir.

Soma dos Nox em determinada espécie

Em determinada espécie química, a soma dos Nox dos átomos que a constituem deve ser igual a zero. Caso se trate de um íon, a soma dos Nox dos seus átomos será igual à carga do íon.

Exemplos

KCℓ	NaF	CaO
+1 −1	+1 −1	+2 −2

Nox de substâncias simples

Nas substâncias simples, o Nox de cada átomo é zero, pois só estão envolvidos átomos de um mesmo elemento, não havendo, portanto, diferença de eletronegatividade entre eles.

Exemplos

O_2, H_2, Ag

Nox do oxigênio em substâncias compostas

O Nox do oxigênio geralmente é −2. As exceções são o composto OF_2 (difluoreto de oxigênio), em que o Nox do oxigênio é +2 por ser o flúor o elemento mais eletronegativo, e os peróxidos, nos quais o Nox do oxigênio é −1.

Nos peróxidos, verifica-se a presença de ligação simples entre dois átomos de oxigênio (—O—O—). Nesse caso, cada átomo de oxigênio faz uma ligação com átomos menos eletronegativos, apresentando Nox −1.



Nox fixo em substâncias compostas

Alguns elementos metálicos apresentam sempre o mesmo Nox ao formar compostos iônicos. Esse é o caso dos metais alcalinos, os quais formam cátions de carga +1, e dos metais alcalinoterrosos, os quais formam cátions de carga +2. Outros metais que formam cátions de carga fixa são o zinco (+2), a prata (+1) e o titânio (+3).

O flúor é um elemento monovalente (cada átomo só faz uma ligação) e, por ser o mais eletronegativo, apresenta Nox −1 em seus compostos.

O hidrogênio também é um elemento monovalente. Nos hidretos metálicos (NaH, LiH, CaH_2), ele forma ânion de carga −1. Ao formar ligações covalentes, apresenta Nox +1, quando ligado a átomos mais eletronegativos (F, O, Cℓ, N, Br, I, S, C), e Nox −1, quando ligado a átomos menos eletronegativos (Si, As, Sb, B, Be).

Essas regras são baseadas na determinação de cargas formais ou parciais nos compostos e não substituem a análise das ligações em razão da eletronegatividade. Ainda assim, elas permitem determinar com rapidez o Nox e, na prática, são aplicadas com bastante frequência.

Nox médio

Os compostos orgânicos são constituídos predominantemente de átomos de carbono (C) e hidrogênio (H), mas muitos compostos contêm também oxigênio (O) e nitrogênio (N).

Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono geralmente apresentam Nox distintos, como nas moléculas de etanol (C_2H_6O) e de ácido acético ($C_2H_4O_2$).



Nesse caso, é comum a determinação do Nox médio dos átomos de carbono, que corresponde à soma dos seus números de oxidação, dividida pelo número de átomos de carbono na molécula.

- Nox médio do carbono na molécula de etanol:

$$\frac{-3-1}{2} = -2$$

- Nox médio do carbono na molécula de ácido acético:

$$\frac{-3+3}{2} = 0$$

O Nox médio é obtido quando apenas a fórmula molecular das substâncias é analisada, e atribui-se Nox aos elementos com base nas regras apresentadas anteriormente.

Exemplos

- C_2H_6O: como o Nox do H é +1 e o do O é −2, para que a soma algébrica seja zero, o Nox médio do C deve ser −2.
- $C_2H_4O_2$: como o Nox do H é +1 e o do O é −2, para ter zero na soma algébrica, o Nox médio do C deve ser zero.

ROTEIRO

2. Quando cortamos uma maçã e a deixamos em contato com o ar, a polpa escurece rapidamente, pois oxida em contato com o oxigênio. Mas bastam algumas gotas de limão, que contém ácido cítrico, para evitar o escurecimento. Quais poderiam ser os agentes oxidantes e redutores nesse processo? Justifique.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Nox E AS REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO

O número de oxidação permite a identificação de reações de oxirredução, sendo essa a sua principal aplicação. A diminuição do Nox de um átomo presente em determinada espécie química indica uma **redução**; já o aumento do Nox indica uma **oxidação**.

Na transformação do etanol em ácido acético, especificamente, observa-se um aumento do Nox de um átomo de carbono (C) do etanol, variando de −1 para +3. Já os átomos de oxigênio presentes no O_2 têm seus Nox diminuídos ao serem incorporados às moléculas de ácido acético e de água, passando de 0 para −2. Essa variação de Nox indica que se trata de um processo de oxirredução.



Nessa reação, todos os átomos estão unidos por ligações covalentes, ou seja, não há formação de íons e, portanto, os Nox não correspondem à carga elétrica.

O número total de elétrons compartilhados pelos átomos também é o mesmo nos reagentes e nos produtos. Os átomos de carbono compartilham, cada um, quatro pares de elétrons; os de oxigênio, dois pares; e os de hidrogênio, um par. Logo, nenhum átomo perdeu ou ganhou elétrons, transformando-se em íon. Por que, então, essa reação é considerada de oxirredução? Qual é o significado dos números de oxidação?

Cada átomo de oxigênio que faz parte do O_2 (molécula apolar) passou a formar ligações com átomos de elementos menos eletronegativos: o carbono presente no ácido acético e o hidrogênio na água. Essas ligações são polares, e os elétrons são mais atraídos pelo oxigênio, que é mais eletronegativo. Ou seja, a densidade eletrônica de cada oxigênio nas moléculas dos produtos é maior do que aquela na molécula O=O, em que os elétrons da ligação são igualmente atraídos pelos dois átomos.

Já o átomo de carbono ligado ao oxigênio, no etanol, tem sua densidade eletrônica diminuída, pois passa a ter dois de seus elétrons atraídos por um átomo de oxigênio adicional, que é mais eletronegativo.

Nessa reação, ocorrem a diminuição da densidade eletrônica do carbono e o aumento da densidade eletrônica do oxigênio.

Logo, podemos concluir que houve transferência de elétrons do átomo de carbono do agente redutor, o etanol, para os átomos de oxigênio do agente oxidante, o gás oxigênio, mesmo não tendo sido originados cátions e ânions. A variação dos Nox indica, portanto, o número de elétrons envolvidos no processo.

CIÊNCIA SE DISCUTE

A descoberta do oxigênio

Historiadores admitem que a descoberta do gás hoje conhecido como oxigênio envolve no mínimo três personagens: o químico francês Antoine Lavoisier (1743-1794), o teólogo e filósofo inglês Joseph Priestley (1733-1804) e o químico sueco Carl Wilhelm Scheele (1742-1786). No século XVIII, diversos estudiosos se dedicavam a entender o comportamento dos "ares". Em 1774, Priestley utilizou uma grande lente para focalizar raios solares e decompor uma amostra de óxido de mercúrio, e depois testou o gás produzido. Ao capturar e testar o "ar", ele notou que este era capaz de manter a combustão de uma vela e, ao expor um camundongo isolado a esse gás, observou que o animal parecia mais revigorado. Em 1772, Scheele também tinha notado um estranho comportamento de um gás liberado ao aquecer compostos como o dióxido de manganês, chamando esse gás de "ar de fogo", devido à sua capacidade de combustão. Lavoisier, que teve acesso aos trabalhos de Priestley, decidiu também estudar o óxido de mercúrio. Ao repetir as experiências, Lavoisier analisou as propriedades desse novo gás e percebeu que ele não se dissolvia na água, mas reagia com certos metais formando óxidos. Ao realizar vários testes, ele concluiu que no "ar" havia dois tipos distintos de gases, um capaz de gerar combustão e sustentar a vida, e outro com teor asfixiante. O primeiro é conhecido hoje como oxigênio, e o segundo, como nitrogênio.


SPL/Fotoarena

Equipamentos utilizados por Joseph Priestley para estudar o comportamento dos "ares". Gravura presente na obra *Nomenclature Chimique: Ou Synonymie Ancienne Et Moderne, Pour Servir A L'Intelligence Des Auteurs* (1789).

1. **Durante muito tempo, o crédito pela descoberta do oxigênio foi dado exclusivamente ao francês Lavoisier. Segundo o texto, é possível afirmar que somente ele foi responsável por essa descoberta? Justifique sua resposta.**

Não é possível afirmar que Lavoisier foi o autor exclusivo da descoberta do oxigênio, pois Priestley e Scheele também observaram a formação desse gás durante seus experimentos. Além disso, o próprio Lavoisier partiu dos experimentos realizados por Priestley para estudar o óxido de mercúrio. Essa questão coloca em evidência a natureza colaborativa da construção do conhecimento científico.

Por que o ferro enferruja?

Quem já parou para observar móveis e utensílios de aço, originalmente prateados e brilhantes, geralmente nota, com o passar do tempo, a formação de um sólido avermelhado aderido. A ferrugem, nome popular desse sólido, é produto da oxidação do ferro metálico. Mas por que e como isso acontece?

Nesta atividade, você e os colegas vão investigar em quais condições essa reação ocorre.

Material

- pregos não galvanizados de ferro (sem ferrugem)
- sacos plásticos pequenos para transporte dos pregos

Como fazer

1. Organizem-se em dois grupos. Cada integrante dos grupos receberá um prego, o qual deverá ser levado para casa e colocado em um lugar de sua própria escolha por uma semana, para que, posteriormente, seja avaliado o grau de oxidação do prego. Os estudantes do primeiro grupo deverão escolher um local com condições que considerem ideais para que os pregos atinjam alto grau de corrosão, enquanto os do segundo grupo colocarão os pregos em locais que acreditam evitar a ocorrência desse processo.
2. Elaborem um painel para registrar os estudantes que fazem parte dos grupos. Nesse painel, anotem também o local da casa em que o prego de cada estudante será deixado pelo tempo previsto.
3. Estipulem uma data para que todos tragam de volta os pregos para a análise dos resultados.
4. Cada um vai levar o prego para casa, deixando-o em local predeterminado e, na data combinada, reúnam os pregos para a análise. Para evitar danos ao objeto e acidentes, transporte o prego da escola para casa e de casa para a escola em um saco plástico pequeno, identificado com seu nome.
5. Com todos os pregos reunidos, organizem as amostras por ordem crescente de oxidação, ou seja, do prego menos enferrujado para o mais enferrujado.
6. Em seguida, analisem os locais onde cada prego foi deixado, elegendo as condições que realmente influenciaram na formação de ferrugem. Registrem, no caderno, os apontamentos e as conclusões.

ATENÇÃO!
Cuidado para não se ferir com os pregos.

EyeEm Mobile GmbH/iStock/Getty Images

Pregos enferrujados.

Para concluir

1 **Em que local foi deixado o prego que menos enferrujou? E o que mais enferrujou? Descreva as condições ambientais nos dois casos.** **1.** A resposta dessa questão vai depender das amostras que os estudantes trouxeram. **2. a)** Para ocorrer a corrosão do ferro, é necessária a presença de oxigênio e de água.

2 **Na oxidação do ferro mais comumente observada, é imprescindível a presença de duas substâncias.**

a) De acordo com o observado no experimento, é possível deduzir quais são elas?

b) A ferrugem que se formou nos pregos é provavelmente trióxido de ferro(III) hidratado. Qual é a fórmula dessa substância? Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

c) Considerando as respostas aos itens anteriores, indique as semirreações de oxidação e redução e a equação global do processo observado. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

d) Qual é o agente oxidante da reação? O agente oxidante é o gás oxigênio.

3 **Proponha uma maneira para proteger objetos de ferro da oxidação.**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

BALANCEAMENTO DE EQUAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO

Uma reação de oxirredução é caracterizada pela transferência de elétrons de uma espécie química, que é oxidada (agente redutor), para outra espécie, que é reduzida (agente oxidante). É possível identificar a transferência de elétrons pela análise dos Nox dos elementos nas espécies que compõem os reagentes e os produtos. A variação do Nox, Δ(Nox), de determinado elemento indica o número de elétrons envolvidos nos processos de oxidação e de redução. Analise o exemplo.

$$Fe_2O_3(s) + 3\,CO(g) \xrightarrow{\Delta} 2\,Fe(s) + 3\,CO_2(g)$$

$+3\,-2$ $\quad$ $+2\,-2$ $\quad$ 0 $\quad$ $+4\,-2$

Nox do ferro diminui (redução). Cada átomo de ferro recebe 3 e^-. Δ(Nox) = 3

Nox do carbono aumenta (oxidação). Cada átomo de carbono transfere 2 e^-. Δ(Nox) = 2

Patrick Pleul/picture alliance/G

O ferro metálico é obtido por meio da redução do Fe_2O_3 (presente no minério hematita) pelo monóxido de carbono (CO) em um forno siderúrgico. Brandenburg, Alemanha. Foto de 2024.

Note que o número de elétrons recebidos pelos átomos de ferro (Fe) é igual ao número de elétrons transferidos pelos átomos de carbono (C). Na equação, estão representados dois átomos de ferro (nos reagentes e nos produtos); logo, esses dois átomos receberam seis elétrons. Também estão representados três átomos de carbono, cada um transferindo dois elétrons. Assim, há transferência de seis elétrons.

Em toda reação química, há conservação no número de elétrons. Portanto, o número de elétrons transferidos pelo agente redutor é igual ao número de elétrons recebidos pelo agente oxidante. No acerto de coeficientes dos elementos envolvidos nas reações de oxirredução, é importante lembrar que todos os elétrons transferidos no processo de oxidação são recebidos no processo de redução.

O método de balanceamento de equações químicas por tentativa e erro tem sido satisfatório até agora. Para algumas reações de oxirredução, entretanto, esse método pode ser bastante complicado. Por exemplo, como você balancearia a equação a seguir?

$$KMnO_4(aq) + H_2SO_4(aq) + H_2O_2(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + H_2O(\ell) + MnSO_4(aq) + O_2(g)$$

Certamente, o método de tentativa e erro não é muito conveniente para o equacionamento da reação de permanganato de potássio ($KMnO_4$) e ácido sulfúrico (H_2SO_4) com peróxido de hidrogênio (H_2O_2), em solução aquosa, nem para muitos outros exemplos de reações de oxirredução.

Note que, ao iniciar o balanceamento ajustando os coeficientes para os átomos dos elementos potássio, manganês, hidrogênio e enxofre, a quantidade de átomos do elemento oxigênio fica desbalanceada. Como o oxigênio está presente em todos os reagentes e em todos os produtos, o ajuste dos coeficientes requer a análise da transferência de elétrons na reação.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

A solução de permanganato de potássio tem cor violeta (primeiro tubo de ensaio da imagem **A**). Na reação com a água oxigenada (imagem **B**), ocorrem a descoloração da solução e a liberação de gás oxigênio.

Exemplo de método para balancear equações de oxirredução

Para fazer o balanceamento da equação da reação entre as soluções de permanganato de potássio e de água oxigenada em meio ácido, é preciso inicialmente identificar o Nox de cada elemento nos reagentes e nos produtos.

O oxigênio foi oxidado, Δ(Nox) = 1 elétron.
Cada átomo de O perdeu 1 elétron.

$$\overset{+1}{K}\overset{+7}{Mn}\overset{-2}{O_4} + \overset{+1}{H_2}\overset{+6}{S}\overset{-2}{O_4} + \overset{+1}{H_2}\overset{-1}{O_2} \longrightarrow \overset{+1}{K_2}\overset{+6}{S}\overset{-2}{O_4} + \overset{+1}{H_2}\overset{-2}{O} + \overset{0}{O_2} + \overset{+2}{Mn}\overset{+6}{S}\overset{-2}{O_4}$$

O Mn foi reduzido, Δ(Nox) = 5 elétrons.

Cada átomo de Mn recebeu 5 elétrons.
(Os estados físicos das substâncias foram omitidos para facilitar a leitura.)

A análise dos números de oxidação de cada elemento indica que o átomo de manganês foi **reduzido** e seu Nox variou de +7 para +2. Foram recebidos cinco elétrons por átomo de manganês: ΔNox = 5. Já a **oxidação** ocorreu no átomo de oxigênio da água oxigenada, com variação do Nox (ΔNox) de −1 para 0. Nesse caso, o $KMnO_4$ é o agente oxidante (foi reduzido e oxidou o H_2O_2), e o H_2O_2 é o agente redutor (foi oxidado e reduziu o $KMnO_4$).

Para acertar os coeficientes da equação, deve-se garantir que o número de elétrons cedidos pelo H_2O_2 seja igual ao número de elétrons recebidos pelo $KMnO_4$. Para isso, o número de átomos de oxigênio do peróxido de hidrogênio deve ser cinco vezes maior que o número de átomos de manganês:

Elemento	Equiparação pela quantidade maior de elétrons	Equiparação eletrônica de acordo com a atomicidade
Mn	1 átomo → 5 elétrons	2 átomos → 10 elétrons
O	5 átomos → 5 elétrons	10 átomos → 10 elétrons

atomicidade: número de átomos de um elemento presentes em uma molécula.

Como no H_2O_2 a **atomicidade** do oxigênio é 2, o número de átomos desse elemento será **sempre par**. A equação, por enquanto, é escrita da seguinte forma:

$$\mathbf{2}\ KMnO_4 + H_2SO_4 + \mathbf{5}\ H_2O_2 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O + \mathbf{2}\ MnSO_4 + \mathbf{5}\ O_2$$

O próximo passo é acertar os coeficientes das demais espécies envolvidas. Note que já se conhece o número de átomos de potássio (K) envolvidos. Assim, acerta-se o coeficiente do K_2SO_4. Tem-se, agora, a quantidade total de SO_4^{2-}, sendo possível acertar o coeficiente do H_2SO_4 e, finalmente, o coeficiente da água.

$$2\ KMnO_4 + \mathbf{3}\ H_2SO_4 + 5\ H_2O_2 \rightarrow \mathbf{1}\ K_2SO_4 + \mathbf{8}\ H_2O + 2\ MnSO_4 + 5\ O_2$$

Como se trata de reação em solução aquosa envolvendo compostos iônicos e ácido forte, pode-se escrevê-la na forma iônica:

$$2\ MnO_4^-(aq) + \mathbf{6}\ H^+(aq) + 5\ H_2O_2(aq) \rightarrow \mathbf{8}\ H_2O(\ell) + 2\ Mn^{2+}(aq) + 5\ O_2(g)$$

Nessa representação, não constam os íons $K^+(aq)$ e $SO_4^{2-}(aq)$, pois permanecem dissociados em solução e nenhum deles tem participação efetiva na transformação química.

PARA EXPLORAR

Acesse

Balanceamento de equações químicas

Elaborado pela Universidade do Colorado Boulder, nos EUA, o programa apresenta uma introdução com um simulador interativo e um jogo sobre balanceamento de equações químicas. Analise como os Nox dos elementos variam em cada reação apresentada.

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/balancing-chemical-equations. Acesso em: 26 set. 2024.

REAÇÕES REDOX E PRODUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA

Muitas reações de oxirredução ocorrem espontaneamente, podendo ser utilizadas para a geração de eletricidade. Para isso, basta montar um aparato denominado **pilha**, em que o agente oxidante e o agente redutor são mantidos em compartimentos separados, denominados **semicélulas eletroquímicas**.

Não escreva no livro.

As semicélulas são conectadas por um fio metálico, que possibilita a circulação de elétrons, e uma **ponte salina**, que permite a circulação de íons entre as semicélulas, garantindo a neutralidade de carga elétrica.

A pilha de Daniell

O esquema a seguir ilustra o dispositivo para obtenção de corrente elétrica a partir da reação de oxidação do zinco metálico e redução de íons cobre(II) em solução aquosa, conhecido como pilha de Daniell. As placas de zinco e de cobre são os **eletrodos** da pilha. Por convenção, chama-se **ânodo** o eletrodo em que ocorre oxidação e **cátodo** o eletrodo no qual ocorre redução.

AMj Studio/ID/BR



Representação sem proporção de tamanho.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L.; Lemay Jr., H. E.; Bursten, B. E.; Burdge, J. R. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

Esquema da pilha de Daniell. Cores-fantasia.

Nesse processo, a placa de zinco no béquer à direita sofre corrosão, enquanto no béquer à esquerda o metal cobre é depositado. Com o passar do tempo, a cor azul da solução de Cu^{2+}(aq) vai ficando menos intensa, devido à diminuição da concentração desse cátion na solução.

Os processos que ocorrem em cada béquer (semicélula) podem ser assim representados:

Ânodo (−): $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-$ (semirreação de oxidação)

Cátodo (+): $Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Cu(s)$ (semirreação de redução)

No eletrodo negativo (ânodo) da pilha, ocorre o processo de oxidação do zinco, liberando elétrons que são transferidos pelo fio metálico para o eletrodo positivo (cátodo). Esses elétrons participam do processo de redução dos cátions Cu^{2+}, depositando o cobre metálico no polo positivo. Os dois processos são simultâneos.

A soma das duas equações das semirreações resulta na reação global equacionada a seguir. Note que todos os elétrons provenientes da oxidação estão envolvidos na redução, havendo conservação dos elétrons e, consequentemente, da carga elétrica total do sistema.

Equação global: $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

Uma maneira prática de representar o esquema de uma pilha é o **diagrama da pilha**. Para o caso da pilha de Daniell, tem-se o diagrama representado a seguir.

A ponte salina é representada por duas barras

$$Zn(s) \;|\; Zn^{2+}(aq) \;\|\; Cu^{2+}(aq) \;|\; Cu(s)$$

Primeiro apresenta-se o ânodo separando por barra a espécie que se oxida da espécie resultante da oxidação; **depois representa-se o cátodo separando por barra a espécie que se reduz da espécie resultante da redução.**

Os elétrons liberados pelo zinco circulam pelo fio elétrico, antes de serem incorporados pelos cátions Cu^{2+}(aq). Os íons presentes na ponte salina mantêm a neutralidade das soluções. No ânodo, o aumento da concentração de cátions Zn^{2+}(aq) requer um fluxo de ânions SO_4^{2-}(aq). No cátodo, a diminuição da concentração de Cu^{2+}(aq) requer um fluxo de cátions K^+(aq). Dessa forma, o circuito elétrico está fechado.

No início do experimento, a concentração das soluções de $ZnSO_4$ e de $CuSO_4$ é 1,0 mol/L. Nessa situação, com auxílio de um voltímetro, é possível determinar a tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico (ddp) da pilha: 1,10 V.

Não escreva no livro.

O eletrodo-padrão de hidrogênio

A **diferença de potencial elétrico** (ddp) ou **tensão elétrica** é o trabalho necessário para deslocar uma carga unitária entre dois pontos dentro de um campo elétrico. Em uma pilha, a ddp indica a tendência de ocorrer reação de oxirredução entre as espécies presentes nas células eletroquímicas. Quanto maior a diferença de potencial de uma pilha, maior a tendência de ocorrer a reação de transferência de elétrons.

A ddp de uma pilha está relacionada à tendência de oxidação do agente redutor e à tendência de redução do agente oxidante. Desse modo, se for fixado um eletrodo de referência, pode-se comparar o potencial de oxidação ou redução de cada espécie.

A semicélula adotada para comparação é o **eletrodo-padrão de hidrogênio**. Essa semicélula é constituída de um eletrodo de platina (metal bastante inerte) de área 1 cm^2 e de um tubo de vidro, onde é introduzido gás hidrogênio (H_2) na pressão de 1 bar (10^5 Pa), imersos em uma solução aquosa com concentração de 1,0 mol/L de cátions H^+. Considerando que todo o sistema está a 25 °C, adota-se que o potencial-padrão de redução do hidrogênio é nulo, $E°(H^+|H_2) = 0$.

Ao se associar o eletrodo-padrão de hidrogênio a um eletrodo-padrão de zinco, obtém-se uma pilha que apresenta ddp igual a 0,76 V (figura **A**).

Nesse processo, a placa de zinco é oxidada, sendo o polo negativo da pilha, enquanto os íons H^+ são reduzidos, formando gás hidrogênio (H_2).

Como é atribuído potencial nulo ao eletrodo-padrão de hidrogênio, tem-se que o potencial-padrão de oxidação ($E°_{oxi}$) do zinco metálico é 0,76 V, ou $E°(Zn|Zn^{2+}) = 0,76$ V. Equacionando a reação global:

AMj Studio/ID/BR



Esquema da determinação do potencial do eletrodo-padrão de zinco. Cores-fantasia.

Representação sem proporção de tamanho.

$$Zn(s) + 2\,H^+(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g) \qquad E°_{oxi} = 0,76\ V$$

Ao se associar o eletrodo-padrão de hidrogênio a um eletrodo-padrão de cobre, obtém-se uma pilha que apresenta ddp igual a 0,34 V (figura **B**). Nesse caso, a oxidação ocorre no eletrodo-padrão de hidrogênio, que é o ânodo.

O gás hidrogênio (H_2) perde elétrons para o eletrodo de platina, gerando íons H^+ em solução. Os elétrons são transferidos para o eletrodo de cobre, reduzindo os cátions Cu^{2+} a cobre metálico, que se deposita na placa metálica.

Como também é atribuído valor nulo ao potencial-padrão de oxidação do eletrodo de hidrogênio, $E°(H_2|H^+) = 0$, tem-se que o potencial-padrão de redução ($E°_{red}$) dos íons Cu^{2+} é 0,34 V, ou $E°(Cu^{2+}|Cu) = 0,34$ V. Equacionando a reação global:

AMj Studio/ID/BR



Esquema da determinação do potencial do eletrodo-padrão de cobre. Cores-fantasia.

Representação sem proporção de tamanho.

$$Cu^{2+}(aq) + H_2(g) \longrightarrow Cu(s) + 2\,H^+(aq) \qquad E°_{red} = 0,34\ V$$

Pode-se concluir que o zinco metálico tem maior tendência a ser oxidado que o gás hidrogênio, que, por sua vez, oxida-se mais facilmente que o cobre metálico. Em termos de redução, o cátion Cu^{2+} tem maior potencial de redução do que o cátion H^+, e o cátion Zn^{2+} é o que apresenta menor tendência de sofrer redução.

Um valor de potencial-padrão de redução positivo indica que na semicélula ocorre um processo de redução, enquanto no eletrodo-padrão de hidrogênio ocorre a oxidação. Já um valor negativo indica maior tendência de oxidação das espécies da semicélula, se comparada com a do eletrodo-padrão de hidrogênio.

Não escreva no livro.

ESPONTANEIDADE DAS REAÇÕES

As pilhas são dispositivos que funcionam a partir de reações espontâneas. A diferença de potencial de uma pilha está relacionada à tendência de ocorrer a oxirredução entre a espécie redutora do ânodo e a oxidante do cátodo.

Em todo processo redox, uma espécie se oxida enquanto outra se reduz. Deve-se analisar as duas semirreações envolvidas e verificar qual espécie apresenta maior caráter oxidante (sofrendo redução). A outra espécie será oxidada. Reações espontâneas apresentam diferença de potencial-padrão ($\Delta E°$) de reação positivo, em que:

$$\Delta E° = E°_{\text{cátodo}} - E°_{\text{ânodo}} = E°_{\text{oxi}} + E°_{\text{red}}.$$

Considere uma pilha contendo os metais magnésio (Mg) e prata (Ag), e soluções aquosas de seus respectivos íons com concentração 1,0 mol/L. Qual será a ddp da pilha, sabendo que o potencial-padrão de redução do magnésio e da prata são, respectivamente, −2,37 V e +0,80 V?

O cátion Ag^+ apresenta maior potencial de redução. Logo, o metal magnésio irá se oxidar (será o ânodo), e deve-se considerar o $E°_{oxi}$ do eletrodo, que é o oposto do $E°_{red}$.

Ânodo (−): $Mg(s) \longrightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\,e^-$
$E°_{oxi} = +2{,}37$ V

Cátodo (+): $2\,Ag^+(aq) + 2\,e^- \longrightarrow 2\,Ag(s)$
$E°_{red} = +0{,}80$ V

Eq. global: $Mg(s) + 2\,Ag^+(aq) \longrightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\,Ag(s)$
$\Delta E° = +2{,}37\text{ V} + 0{,}80\text{ V} = +3{,}17$ V

Note que, para acertar o balanceamento da equação global, é necessário acertar o número de elétrons cedidos na oxidação e o número de elétrons recebidos na redução. Os valores do potencial-padrão de redução ou de oxidação não se alteram quando se multiplicam os componentes da equação, pois a tensão elétrica é uma propriedade intensiva que independe da quantidade de matéria.

PILHAS COMERCIAIS

A seguir, serão analisadas algumas pilhas e baterias comerciais e suas principais aplicações. Em todos os dispositivos, será possível identificar duas semicélulas, ânodo (polo −) e cátodo (polo +), e um mecanismo de condução iônica entre as semicélulas com função idêntica à ponte salina. A condução de elétrons sempre ocorre externamente à pilha, passando pelo equipamento ligado a ela.

As pilhas e as baterias comerciais devem apresentar tamanho, formato, massa e desempenho adequados para o equipamento específico. Deve-se estar atento para evitar acidentes, danos ao ambiente ou ao aparelho.

As pilhas e as baterias são classificadas em primárias (as que não podem ser recarregadas) ou secundárias (as recarregáveis).

Pilha seca (pilha de Leclanché) e pilha alcalina

A **pilha comum** foi desenvolvida pelo químico francês Georges Leclanché (1839-1882), por volta de 1860. Um copo de zinco metálico é preenchido com uma pasta úmida contendo $NH_4C\ell$, $ZnC\ell_2$ e MnO_2. Um bastão de grafite é preso ao tampo de aço e fica em contato com essa pasta. A pasta faz o papel da ponte salina, permitindo a migração de ânions OH^- do eletrodo de grafite ao copo de zinco (figura **A**).

Embora a pilha apresente ddp de 1,5 V, a corrente elétrica gerada é relativamente pequena, não sendo adequada para aparelhos de maior potência. As principais reações envolvidas são:

Polo (+): $2\,MnO_2(s) + 2\,H_2O(\ell) + 2\,e^- \longrightarrow$
$\longrightarrow 2\,MnO(OH)(s) + 2\,OH^-(aq)$

Polo (−): $Zn(s) + 2\,NH_4C\ell(aq) + 2\,OH^-(aq) \longrightarrow$
$\longrightarrow Zn(NH_3)_2C\ell_2(aq) + 2\,H_2O(\ell) + 2\,e^-$

Reações secundárias podem diminuir a vida útil da pilha comum. A formação de gás amônia pode gerar bolhas ao redor do cátodo, dificultando a passagem de corrente. O copo de zinco pode ser corroído, deixando vazar um material corrosivo. Por isso, recomenda-se não deixar a pilha em aparelhos que não sejam usados frequentemente.

A **pilha alcalina** é um aperfeiçoamento da pilha seca, e passou a ser comercializada na década de 1950. Embora os eletrodos sejam os mesmos, a pasta eletrólita contém MnO_2, ZnO e KOH (30% em massa). Para evitar o vazamento da pasta cáustica, o recipiente é de aço lacrado. O ânodo é de zinco metálico em pó (figura **B**).

Essas alterações garantem uma maior durabilidade e o fornecimento de uma corrente maior, mantendo a ddp em 1,5 V. As semirreações que ocorrem no eletrodo dessa pilha são representadas pelas seguintes equações:

Polo (+): $2\,MnO_2(s) + 2\,H_2O(\ell) + 2\,e^- \longrightarrow$
$\longrightarrow 2\,MnO(OH)(s) + 2\,OH^-(aq)$

Polo (−): $Zn(s) + 2\,OH^-(aq) \longrightarrow$
$\longrightarrow Zn(OH)_2(s) + 2\,e^-$



Ilustrações: AMJ Studio/ID/BR

Pilha comum (**A**) e pilha alcalina (**B**). Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Bocchi, N.; Ferracin, L. C.; Biaggio, S. R. Pilhas e baterias: funcionamento e impacto ambiental. Química Nova na Escola, n. 11, maio, 2000. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

ROTEIRO

3. Considerando a densidade da água a 25 °C igual a 1,0 g/cm³ e a de uma solução de ácido sulfúrico 40% (massa/massa) igual a 1,30 g/cm³, explique por que é possível verificar o estado da carga de uma bateria de chumbo/ácido por meio da análise da densidade do eletrólito.

Durante o processo de descarga, ácido sulfúrico é consumido e água é produzida, reduzindo, assim, a densidade do eletrólito.

Bateria de chumbo/óxido de chumbo(IV)

A bateria de chumbo, também conhecida como bateria de chumbo/ácido, é um exemplo de bateria secundária ou recarregável. Ela tem diversas aplicações, sendo responsável pela ignição e funcionamento da parte elétrica dos automóveis, pelo tracionamento de alguns motores elétricos e por manter em funcionamento alguns equipamentos em caso de queda de fornecimento de eletricidade (*no-breaks*).

A bateria consiste em várias pilhas em paralelo (dependendo do modelo) para aumentar a corrente máxima fornecida e seis conjuntos em série, resultando em uma ddp de 12 V. Cada par de eletrodos fornece uma tensão de 2 V que permanece relativamente constante durante seu funcionamento (variação de 10%).

Cada pilha é constituída de um ânodo de chumbo poroso e um cátodo revestido por PbO_2, um óxido bastante insolúvel. O eletrólito é uma solução aquosa com 40% em massa de H_2SO_4.

Polo (+): $PbO_2(s) + 4\,H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow PbSO_4(s) + 2\,H_2O(\ell)$

Polo (−): $Pb(s) + SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow PbSO_4(s) + 2\,e^-$

Eq. global: $PbO_2(s) + 2\,H_2SO_4(aq) + Pb(s) \longrightarrow 2\,PbSO_4(s) + 2\,H_2O(\ell)$

Representação sem proporção de tamanho.



AMj Studio/ID/BR

Esquema de uma bateria de chumbo/ácido. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Bocchi, N.; Ferracin, L. C.; Biaggio, S. R. Pilhas e baterias: funcionamento e impacto ambiental. Química Nova na Escola, n. 11, maio, 2000. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

O produto formado é um sólido pouco solúvel em solução aquosa de H_2SO_4, ficando aderido às placas de chumbo. Esse fato permite a aplicação de corrente elétrica para recarga da bateria, ocasionando a reação inversa e recuperando os eletrodos de chumbo e de óxido de chumbo(IV).

Essa reação não é espontânea e apresenta ddp negativa; portanto, é necessária a aplicação de energia para que ocorra. Nos automóveis, essa energia é fornecida pelo movimento do motor, por meio do alternador, o qual possui um dínamo, cuja função é transformar energia mecânica em energia elétrica.

Logística reversa de pilhas e baterias

AÇÃO E CIDADANIA

Descarte de pilhas e baterias

Algumas baterias primárias e secundárias comercializadas no país ainda podem conter em sua composição metais pesados altamente tóxicos, como Hg, Cd e Pb.

Conforme a Resolução n. 401 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), diversos tipos de pilha e de bateria devem obedecer a limites máximos de concentração de chumbo, cádmio e mercúrio permitidos na composição. De acordo com esse documento, as pilhas e as baterias não podem ser descartadas a céu aberto ou em aterros não licenciados, incineradas em instalações ilegais ou irregulares e lançadas em corpos d'água. É importante ressaltar que os responsáveis pela destinação final de pilhas e baterias usadas são os estabelecimentos que as comercializam, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos. Estes serão responsáveis pelos procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final adequados.

Algumas instituições têm instalado postos de coleta de pilhas e baterias, que são encaminhadas à prefeitura ou a empresas especializadas nesse tipo de reciclagem.

Além de oferecer locais de coleta e destino apropriado desse material, tais iniciativas incentivam a população a um consumo consciente e à preservação ambiental.

Apesar das regulamentações para coleta e reciclagem adequadas, muitos consumidores ainda descartam esses itens no lixo comum, aumentando o risco de contaminação ambiental por vazamento de metais pesados. Outro risco importante é a inflamabilidade de alguns tipos de baterias, como as de íon lítio, que, em ambiente úmido, podem desencadear incêndios.

1. Considerando a importância da responsabilidade ambiental, como podemos promover práticas cidadãs e conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias em nossa comunidade?

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Baterias de íon lítio

As baterias de íon lítio são as mais modernas, usadas em celulares e computadores portáteis. Alguns automóveis elétricos estão sendo comercializados alimentados por essa tecnologia. Devido à baixa densidade dos materiais usados, são leves e apresentam potencial entre 3,0 V e 3,5 V. A quantidade de carga total gerada por uma bateria (ou pilha) depende da quantidade de reagente presente. As baterias de lítio permitem uma autonomia muito maior, com as recargas ocorrendo em menor frequência.

O funcionamento dessa bateria é bastante complexo. Tanto o ânodo como o cátodo são formados por estruturas lamelares, ou seja, com os átomos dispostos em planos (lâminas), havendo espaço para inserção de íons entre esses planos. Os íons lítio (Li^+) são bastante pequenos e se inserem nessas estruturas. Desse modo, o processo de descarga envolve a migração dos íons lítio, em um solvente não aquoso, do ânodo para o cátodo.

O ânodo é formado por uma associação de grafite com o metal cobre. Os íons lítio se intercalam entre os planos de estruturas hexagonais de carbono, formando a espécie representada por Li_yC_6. A saída do íon representa a oxidação do eletrodo. No ânodo, os íons Li^+ se intercalam na estrutura de um óxido lamelar, o $LiCoO_2$. A intercalação dos íons Li^+ provoca a redução do cátion Co^{3+} do óxido a Co^{2+}. As equações estão esquematizadas a seguir:

Cátodo: $Li_xCoO_2(s) + y\,Li^+(solv) + y\,e^- \longrightarrow Li_{x+y}CoO_2(s)$

Ânodo: $Li_yC_6(s) \longrightarrow 6\,C(s) + y\,Li^+(solv) + y\,e^-$

Andrejj/iStock/Getty Images

Bateria de lítio.

Representação sem proporção de tamanho.

AMj Studio/ID/BR



Esquema do processo de descarga da bateria de íons lítio. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Bocchi, N.; Ferracin, L. C.; Biaggio, S. R. Pilhas e baterias: funcionamento e impacto ambiental. Química Nova na Escola, n. 11, maio, 2000. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

Como o processo é reversível, basta aplicar uma corrente contínua por meio de um transformador para recarregar a bateria, ou seja, provocar a migração dos íons lítio da estrutura lamelar do óxido para a grafite.

Células a combustível

Uma célula a combustível é um dispositivo que gera energia elétrica a partir de uma reação química. Ao contrário das pilhas, porém, os reagentes não estão contidos no interior do sistema, mas armazenados externamente. A produção de energia elétrica ocorre à medida que os reagentes são introduzidos no sistema.

A célula a combustível mais conhecida é a de hidrogênio/oxigênio, utilizada em programas espaciais estadunidenses, como o *Gemini* e o *Apollo*. A reação global em tais células é a oxidação do hidrogênio pelo oxigênio, resultando em vapor de água.

O mecanismo das células a combustível é basicamente semelhante: a célula unitária é formada por dois eletrodos porosos, cuja composição depende do tipo de célula, separados por um eletrólito e ligados por um circuito externo.

Na célula a combustível de hidrogênio/oxigênio, o gás hidrogênio é bombeado no ânodo da pilha, e o oxigênio, no cátodo. O H_2 (combustível) penetra através da estrutura porosa do ânodo, dissolve-se no eletrólito e reage formando H^+ e liberando elétrons, os quais chegam ao cátodo pelo circuito externo e ali participam da reação de redução do oxigênio. Em meio ácido, as semirreações que ocorrem na célula são:

Ânodo:
$H_2(g) \longrightarrow 2\,H^+(aq) + 2\,e^-$

Cátodo:
$O_2(g) + 4\,H^+(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O(\ell)$

Representação sem proporção de tamanho.

AMj Studio/ID/BR



Célula a combustível de hidrogênio/oxigênio. Cores-fantasia.

QUÍMICA E FÍSICA

COMO FUNCIONA A RECARGA DE BATERIAS?

Todas as pilhas geram correntes elétricas a partir de reações de oxirredução espontâneas e descarregam por causa do consumo dos agentes redutores e oxidantes. Para que ocorra a recarga da pilha, é necessário restaurar esses agentes. Então, é preciso promover reação contrária da descarga, que não é espontânea. Por isso, para que a recarga ocorra, é necessária uma fonte de energia externa, e esse é o papel dos carregadores de pilhas. Ao serem conectados na tomada, a energia da rede elétrica força a reação de restauração dos agentes redutores e oxidantes. Parece simples, mas, por razões diversas, nem todas as pilhas podem ser recarregadas.

Muitas pilhas são projetadas para uma única descarga e devem ser substituídas após esse processo. Vários motivos estão associados à incapacidade de recarga dessas pilhas. Nas pilhas alcalinas, por exemplo, o eletrodo negativo é feito de zinco metálico, que é oxidado a Zn^{2+} durante a descarga. A reação contrária recupera os átomos de zinco metálico, mas estes se depositam no eletrodo de maneira bastante irregular, o que torna o seu funcionamento no ciclo seguinte de descarga bem menos eficiente. Além disso, como elas possuem uma solução aquosa concentrada de KOH, o fornecimento de energia elétrica pode causar a eletrólise da água no ambiente confinado da pilha, com produção de gás hidrogênio e gás oxigênio, gerando um aumento da pressão no seu interior, visto que seu invólucro é lacrado.

Diferentemente das pilhas alcalinas, as baterias de íons de lítio, muito utilizadas em aparelhos eletrônicos como os celulares, são recarregáveis. Como o próprio nome diz, elas são produzidas com lítio, um metal com baixo potencial de redução e, por isso, um ótimo agente redutor. No entanto, ele é muito reativo na presença de água, o que torna baterias com lítio metálico suscetíveis a explosões caso haja contato do eletrodo de lítio metálico com soluções aquosas. Assim, as baterias de íon de lítio foram projetadas para funcionarem na ausência de água. No tópico *Baterias de íon lítio*, foi mostrado como ocorre a descarga desse tipo de bateria. A ilustração aqui apresentada mostra o processo de recarga.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Recarga da bateria de íons de lítio. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Bocchi, N.; Ferracin, L. C.; Biaggio, S. R. Pilhas e baterias: funcionamento e impacto ambiental. Química Nova na Escola, n. 11, maio, 2000. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

Conecte as ideias

1 **A partir das informações apresentadas sobre as pilhas alcalinas, responda: por que não é recomendado (e até perigoso) tentar:**

a) abrir o invólucro das pilhas alcalinas? Porque elas são compostas, entre outras substâncias, por uma solução aquosa de KOH, que é corrosiva.

b) recarregar pilhas primárias alcalinas com carregadores de pilhas recarregáveis?
Porque pode ocorrer a produção de gás hidrogênio e gás oxigênio, gerando um aumento da pressão em seu interior e levando a uma explosão.

2 **Automóveis, mesmo não-elétricos, possuem baterias, sendo a de chumbo/ácido a mais comum. Faça uma pesquisa e elabore um infográfico sobre o funcionamento das baterias de automóveis, incluindo os processos de descarga e recarga.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **As palavras "pilha" e "bateria" são, muitas vezes, utilizadas como sinônimos, apesar de terem significados distintos. Faça uma pesquisa para responder às seguintes questões:**

a) Qual é a diferença entre pilha e bateria? A bateria é um conjunto de pilhas ligadas em série.

b) Por que alguns equipamentos funcionam com baterias e não com pilhas?
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CORROSÃO DE METAIS: UM EXEMPLO DE PILHA

A formação da ferrugem nos mais diversos objetos de aço representa um grande prejuízo e é tratada tecnicamente como um caso de corrosão eletroquímica. Há algumas semelhanças entre as transformações que ocorrem na corrosão de um objeto metálico e o funcionamento de uma pilha. Trata-se de dois processos análogos. A compreensão desses fenômenos é importante para o desenvolvimento de métodos de proteção dos materiais metálicos.

Corrosão eletroquímica

As primeiras pilhas, construídas pelo químico e físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), eram constituídas de discos de cobre e zinco, ferro e zinco ou prata e zinco, intercalados por discos de papelão umedecidos com solução salina.

Nesse tipo de pilha, o disco de zinco (ânodo) oxida-se formando cátions Zn^{2+}. Diferentemente das pilhas de Daniell estudadas neste capítulo, entretanto, não existem nessas pilhas íons em solução que possam ser reduzidos. A redução que ocorre no cátodo é a do gás oxigênio, presente no ar atmosférico.

Cátodo: $O_2(g) + 2\,H_2O(\ell) + 4\,e^- \longrightarrow 4\,OH^-(aq)$ $\quad E° = +0{,}40\ V$

Ânodo: $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$ $\quad E° = +0{,}76\ V$

Note que foram representados os potenciais de semicélula nas condições-padrão, ou seja, com os íons que participam dos processos em concentração de 1 mol/L na solução, o gás oxigênio na pressão de 1 atm e o sistema à temperatura de 25 °C. Essas condições não estão presentes nessa pilha, pois a solução salina é inicialmente neutra (somente $NaC\ell$ e água), não há $Zn^{2+}(aq)$ e o $O_2(g)$ compõe cerca de 20% do ar atmosférico.

O cátodo de cobre, de prata ou de ferro funciona apenas como coletor dos elétrons provenientes da oxidação do zinco, transferindo-os para o oxigênio do ar. Essa transferência é mais eficiente que a reação de oxirredução direta entre o oxigênio e o zinco, pois o cobre é um metal menos reativo, e o eletrodo de zinco fica rapidamente recoberto por uma camada de óxido de zinco (ZnO), que isola o metal do contato com o ar.

O funcionamento dessa pilha é semelhante ao dispositivo mostrado na figura **A**. Os tomates fazem o papel do eletrólito. A concentração de íons H^+ em seu interior é responsável pela sua acidez (pH entre 4,0 e 4,4). A placa de zinco se oxida, e na placa de cobre ocorre a redução do H^+ presente no eletrólito. A corrente gerada é suficiente para colocar em funcionamento relógios, calculadoras, entre outros objetos.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Pilhas formadas por placas de zinco e cobre, em série, conectadas e imersas em meio ácido (tomate). Conectando um voltímetro ao circuito elétrico, é possível determinar a diferença de potencial entre os eletrodos.

Tipos de corrosão

O termo **corrosão** é empregado para designar o processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural dos materiais por um ataque eletroquímico, químico ou eletrolítico. Assim, a corrosão pode ser classificada em: eletroquímica, química e eletrolítica.

A **corrosão eletroquímica** é um processo espontâneo, caracterizado por ocorrer na presença de água. Ela se dá quando o metal entra em contato com um eletrólito, formando uma pilha de corrosão. Exemplo: formação da ferrugem.

A **corrosão química**, também conhecida como corrosão seca, por não necessitar de água, corresponde ao ataque de um agente químico diretamente sobre o material. Exemplo: degradação de polímeros (plásticos, borracha, entre outros) pela ação de solventes ou agentes oxidantes.

A **corrosão eletrolítica** caracteriza-se por ser um processo eletroquímico que ocorre por aplicação de corrente elétrica externa. Trata-se, portanto, de um processo não espontâneo, provocado por **correntes de fuga**, geralmente geradas devido a deficiências de isolamento. Esse tipo de corrosão ocorre com frequência em tubulações de petróleo e de água potável, em tanques de postos de gasolina, etc., provocando furos nas instalações.

Não escreva no livro.

PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO

Evitar a corrosão dos metais, especialmente a do aço, é um desafio de grande importância econômica e ambiental. Atualmente, estima-se que um terço da produção de aço é utilizado para repor estruturas enferrujadas. Isso significa não só um custo econômico para a sociedade, mas também um prejuízo ambiental, pois a produção de aço envolve uma série de impactos ambientais, desde a exploração do minério até a grande quantidade de energia envolvida na redução dos óxidos de ferro nos fornos siderúrgicos.

Os sistemas de proteção buscam evitar os processos anódicos (oxidação do aço) ou catódicos (redução do oxigênio na presença de água). Muitos são os métodos empregados, com custos variados, e a conveniência deles depende da aplicação do aço em questão. Nenhum método, entretanto, é completamente eficaz, e os materiais de aço estão, de toda forma, fadados a sofrer oxidação.

Proteção anódica

Um método muito comum de inibição da corrosão é o que evita o contato do oxigênio atmosférico com a superfície do metal – processo conhecido como **proteção anódica**.

O revestimento de metais com uma camada de tinta é um método bastante utilizado, principalmente na conservação de grades e portões de edifícios e casas, os quais recebem uma camada de tinta laranja, o zarcão (figura **A**), que depois é coberto por uma tinta para acabamento.

A tinta zarcão é uma suspensão oleosa de Pb_3O_4, um óxido insolúvel, que adere bem à superfície do metal. Como em toda tinta, entretanto, há desgaste físico ou químico pela ação da chuva, da temperatura ou de choques mecânicos. Uma vez exposto ao ar, o metal fica vulnerável à oxidação, o que exige manutenção constante.

Outro método bastante utilizado é a formação de uma camada protetora de óxido de cromo(III) e óxido de ferro(III) sobre a superfície metálica. Essa camada é produzida pela reação entre cromato de sódio e ferro.

$$2\ Fe(s) + 2\ Na_2CrO_4(aq) + 2\ H_2O(\ell) \longrightarrow Fe_2O_3(s) + Cr_2O_3(s) + 4\ NaOH(aq)$$

Esses óxidos são impermeáveis ao oxigênio e à água e evitam a corrosão. O ânion cromato (CrO_4^{2-}) é bastante tóxico, e a indústria metalúrgica que executa o processo deve ter cuidado para não contaminar a região.

O aço inoxidável contém os metais crômio e níquel em sua composição. Esses metais formam óxidos insolúveis que protegem o aço da ação da umidade e do oxigênio. Esse aço, porém, é relativamente caro e tem aplicações restritas.

Fernando Favoretto/Criar Imagem

Chavalit Phetcharee/iStock/Getty Images

(**A**) O zarcão é utilizado como revestimento na pintura de grades e portões. (**B**) Muitas ferramentas são produzidas com aço inoxidável.

Processo análogo protege o alumínio e explica a aparente inércia desse metal à corrosão. Apesar de ser mais reativo do que o ferro, quando o alumínio se oxida, uma camada aderente de óxido de alumínio é depositada sobre sua superfície.

Reatividade do alumínio

O alumínio é muito mais suscetível à corrosão que o ferro. Contudo, nossa experiência cotidiana mostra que ele parece ser menos reativo, por aparentemente não "enferrujar" como o ferro e, por isso, ser o metal de escolha utilizado em esquadrias metálicas, por exemplo, que ficam suscetíveis a intempéries.

Essa aparente menor reatividade ocorre porque, nas peças de alumínio, o metal, ao oxidar, forma uma fina camada de óxido de alumínio ($A\ell_2O_3$) na superfície, que o protege da corrosão.

No entanto, a presença de alguns íons, entre eles o cloreto, é capaz de romper a camada de óxido de alumínio que reveste o metal. É por isso que a corrosão do alumínio ocorre mais rapidamente em áreas litorâneas.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Quando uma bola de papel alumínio é imersa em uma solução de nitrato de cobre(II), a formação de uma película de $A\ell_2O_3$ impede a oxidação do metal **C**. Porém, ao se adicionar cloreto de sódio à solução **D**, a reação de oxidação ocorre rapidamente.

Não escreva no livro.

Galvanização

São comuns peças de aço galvanizado. Esse material apresenta um processo de inibição de corrosão bastante eficiente e fundamentalmente distinto da proteção anódica das camadas de tinta ou de óxidos metálicos.

O aço é envolto por uma camada de zinco metálico, um metal mais reativo (melhor redutor) do que o ferro. Desse modo, o zinco atua como o ânodo do processo de corrosão eletroquímico, com o ferro sendo o cátodo.

Esse método é conhecido como **proteção catódica**, pois o metal a ser preservado passa a atuar como cátodo, não sofrendo oxidação. O zinco é considerado o **metal de sacrifício**, pois será oxidado para preservar o aço que estrutura a peça.



Reinaldo Vignati/ID/BR

O zinco (metal de sacrifício) oxida-se mais facilmente que o ferro. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C.; Treichel, P. M. *Chemistry and chemical reactivity*. 3. ed. Philadelphia: Saunder College Publishing, 1996. p. 984.

Apesar de ser mais reativo do que o ferro presente no aço, o zinco sofre corrosão mais lentamente, pois forma-se uma película aderente ao metal de $Zn(OH)_2$, bastante insolúvel em água, que impede o contato do oxigênio (O_2) e da água com o metal, evitando a reação de redução. A ferrugem ($Fe_2O_3 \cdot H_2O$), ao contrário, solta-se facilmente da superfície metálica, expondo o metal à ação dos agentes oxidantes.

A deposição do zinco sobre o aço pode ser realizada por imersão da peça em zinco fundido ou por eletrodeposição do metal. Esse segundo método será estudado com maior detalhamento no próximo capítulo.

Outros exemplos de proteção catódica

Em grandes estruturas de aço, como as de navios e tubulações (oleodutos, por exemplo), são utilizados metais de sacrifício, como o zinco ou o magnésio. Esses metais não recobrem toda a estrutura de aço, mas são colocados apenas na quantidade suficiente para suprir a estrutura de aço com elétrons, evitando a oxidação do ferro.

Nos cascos dos navios, muitas vezes são colocadas algumas placas de zinco sobre a estrutura. Já em oleodutos, blocos de magnésio são conectados em vários pontos.

Embora o desgaste do metal de sacrifício gere a necessidade de substituição constante, reduzem-se os riscos de acidente por corrosão da estrutura, e transtornos maiores são evitados, já que antes era necessário interromper a atividade para executar possíveis reparos.

Pode-se substituir os metais de sacrifício por uma aplicação de corrente elétrica às estruturas de aço a serem protegidas. A presença de elétrons inibe a oxidação do ferro.

João Prudente/Pulsar Imagens

Tanques de armazenamento de combustível protegidos da corrosão por pintura (inibição anódica) em Paulínia (SP). Foto de 2020.

ROTEIRO

4. **Qual é a diferença entre proteção anódica e proteção catódica contra a corrosão?**

5. **Qual dos seguintes procedimentos ajuda a evitar a corrosão de uma haste de ferro mergulhada em água?**

a) Redução da quantidade de oxigênio na água.

b) Pintura da haste.

4. Na proteção anódica, reveste-se o ânodo com uma camada de tinta ou óxido protetor. Já na proteção catódica conecta-se o metal a ser protegido a um outro metal de menor potencial-padrão de redução, o qual será oxidado preferencialmente.

5. Ambos, pois em **a** reduz-se a quantidade do principal agente oxidante responsável pela corrosão; em **b**, ao pintar a haste, protege-se o ânodo da oxidação.

Folha de flandres ou lata

A lata é obtida por meio de uma lâmina metálica, a folha de flandres, a qual consiste em uma chapa de aço coberta por uma camada de estanho.

O estanho é menos reativo que o aço, e é coberto por uma camada de óxido que impede o contato do metal com os agentes oxidantes.

A superfície de estanho está voltada para o interior da lata. O lado exterior pode ser coberto por uma camada de estanho ou por uma tinta protetora.

Quando a lata é amassada, a lâmina de estanho pode se romper, expondo o aço ao conteúdo da lata. Como o aço está em contato com um metal menos reativo, que atua como cátodo, sua oxidação é rápida.

Portanto, em latas amassadas, é possível encontrar ferrugem no produto que ela contiver, comprometendo sua qualidade.

foto-ruhrgebiet/iStock/Getty Images

hawk111/iStock/Getty Images

Latas amassadas expõem o ferro e o estanho ao que estiver contido nelas. Nessas condições, o ferro se oxida mais rapidamente por ser mais reativo.

Metais pouco reativos também se oxidam

Objetos de prata, cobre e bronze (liga metálica contendo estanho e cobre) também sofrem oxidação, apesar da baixa reatividade desses metais.

O cobre e o bronze apresentam uma deposição esverdeada sobre sua superfície, conhecida como **azinhavre** ou **zinabre**. O azinhavre é formado pelo carbonato básico de cobre, $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$, proveniente da oxidação do metal em contato com a umidade, o oxigênio e o gás carbônico atmosféricos.

Já objetos de prata ficam escurecidos devido à deposição de sulfeto de prata (Ag_2S). Esse composto se forma na presença de substâncias que contêm enxofre, as quais podem estar presentes no ar, em alguns alimentos, como cebola e alho, ou, ainda, em nosso suor. Há, também, a possibilidade da formação de óxido de prata (Ag_2O), que é preto.

Para limpar objetos de cobre ou prata, pode-se colocá-los em uma panela com solução de bicarbonato de sódio e papel-alumínio, aquecendo-os levemente. O alumínio, por ser mais reativo (melhor redutor), oxida-se, reduzindo os cátions de cobre ou prata à forma metálica.

Latas de alumínio no Brasil

As primeiras latas [foram] fabricadas no Brasil [...] no ano de 1988 [...]. A lata de alumínio chegou às mãos do consumidor brasileiro apenas em 1989 [...].

O estudo e o desenvolvimento da indústria de latas de alumínio foram iniciados na década de [19]80, [...] em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Tratava-se, à época, de um equipamento singular e único em toda a América Latina, criado para produzir chapas especiais destinadas à fabricação de latas de alumínio para bebidas gaseificadas. [...]

Em 1988, depois de aperfeiçoadas tecnicamente, as chapas de alumínio produzidas em Pindamonhangaba foram avaliadas em dois laboratórios no exterior [...]. Em 1982, o Brasil tornou-se autossuficiente na fabricação de alumínio primário – condição fundamental para a implantação de fábricas de chapas e, consequentemente, de latas de alumínio. Desde aquele ano, houve um grande incentivo para o uso do metal com aplicação em diversos produtos que eram importados pelo país ou que utilizavam outras matérias-primas.

Fonte: Abralatas – Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade. *A história de sucesso da lata de alumínio no Brasil e no mundo*. Brasília: Abralatas, jun. 2004. Disponível em: https://abralatas.org.br/wp-content/uploads/2004/06/Abralatas_RevistaDaLata_ed2004.pdf. Acesso em: 2 maio 2025.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 Observe a representação da pilha a seguir, chamada de célula galvânica, e responda às questões propostas.



AMj Studio/ID/BR

a) Qual espécie é oxidada? Qual é reduzida?

b) Escreva as semirreações que se processam no cátodo e no ânodo.

c) Determine a diferença de potencial da pilha nas condições-padrão.

Dados: $E^o(Fe^{2+}|Fe) = -0{,}44$ V;
$E^o(Ag^+|Ag) = 0{,}80$ V.

Resolução

a) Observa-se na imagem que o ferro metálico (Fe) perde elétrons, formando íons Fe^{2+}, enquanto os íons prata (Ag^+), por sua vez, ganham um elétron, formando prata metálica. Dessa forma, o ferro é a espécie oxidada, e a prata é a espécie reduzida.

b) Sabendo que a oxidação acontece no ânodo da pilha e a redução no cátodo, tem-se:

Ânodo (−): $Fe(s) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$

Cátodo (+): $Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$

c) $\Delta E^o = E^o(Ag^+|Ag) - E^o(Fe^{2+}|Fe)$
$\Delta E^o = 0{,}80 - (-0{,}44) = 1{,}24$ V

2 O enxofre, elemento bastante comum em regiões de atividade vulcânica, participa da composição de várias substâncias e íons, tais como: S_8, H_2S, SO_2, H_2SO_4, H_2SO_3, SO_4^{2-} e $A\ell_2(SO_4)_3$. Determine os Nox do S em cada uma dessas espécies químicas.

Respectivamente: 0, −2, +4, +6, +4, +6 e +6.

3 Em determinado laboratório, são encontrados dois recipientes metálicos, um de chumbo e outro de zinco. Considere cinco soluções aquosas, cada uma delas contendo apenas um destes solutos: $NaC\ell$, $MnC\ell_2$, $CdC\ell_2$, $NiC\ell_2$ e $CuC\ell_2$. Consultando uma tabela de potencial-padrão de redução, defina quais soluções poderiam ser armazenadas adequadamente em cada um dos recipientes metálicos. Justifique sua resposta.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 As pilhas de óxido de mercúrio são constituídas basicamente de zinco e óxido de mercúrio(II). A composição da pilha permite que ela seja fabricada em um tamanho bem compacto, uma vez que tanto o zinco quanto o óxido de mercúrio(II) podem ser transformados em pó. Assim, essas pilhas são bastante utilizadas em aparelhos pequenos, como relógios, calculadoras e cronômetros. A imagem a seguir mostra uma representação dessa pilha.



AMj Studio/ID/BR

As semirreações não balanceadas dessa pilha podem ser representadas da seguinte forma:

$$Zn(s) + OH^-(aq) \longrightarrow ZnO(s) + H_2O(\ell) + 2\,e^-$$
$$HgO(s) + H_2O(\ell) + 2\,e^- \longrightarrow Hg(\ell) + OH^-(aq)$$

4. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Determine a equação global balanceada e indique o polo positivo e o polo negativo da pilha.

b) As pilhas e baterias podem ser descartadas em lixo comum? Por quê? Justifique sua resposta.

5 A bateria de chumbo/ácido é comumente empregada em veículos, sendo a responsável pela ignição e pelo acionamento inicial do motor. Ela foi uma das primeiras baterias recarregáveis. No caso dos veículos, o alternador é o responsável por transformar a energia mecânica proveniente do motor em energia elétrica para recarregar as baterias.

Considere que cada pilha de uma dessas baterias é formada por um eletrodo poroso de chumbo onde ocorre a semirreação:

5. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

$$Pb(s) + HSO_4^-(aq) \longrightarrow$$
$$\longrightarrow PbSO_4(s) + H^+(aq) + 2\,e^- \qquad E = 0{,}30\text{ V}$$

E no outro eletrodo, revestido por óxido de chumbo(IV), a reação que ocorre pode ser representada por:

$$PbO_2(s) + 3\,H^+(aq) + HSO_4^-(aq) + 2\,e^- \longrightarrow$$
$$\longrightarrow PbSO_4(s) + 2\,H_2O(\ell) \qquad E = 1{,}70\text{ V}$$

Os dois eletrodos estão imersos em uma solução aquosa de ácido sulfúrico com densidade de, aproximadamente, 1,3 g/cm³.

Sobre essa bateria, faça o que é pedido a seguir.

a) Escreva a equação global da bateria, determinando a ddp de cada célula.

4. b) Não podem ser descartadas em lixo comum, pois há espécies químicas que podem contaminar o ambiente. No caso da pilha exemplificada, o descarte inadequado pode causar contaminação do solo, da água e de seres vivos por mercúrio.

Não escreva no livro.

5. b) São necessárias seis pilhas em série para que a ddp seja 12,0 V (6 · 2,0 V).

b) A bateria utilizada nos veículos usualmente possui ddp de 12 V. Explique qual arranjo permitiria essa diferença de potencial a partir das semicélulas apresentadas. **5. c)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

c) Indique o cátodo, o ânodo, o polo positivo e o polo negativo da bateria chumbo/ácido.

d) Qual é o papel da solução de ácido sulfúrico para o funcionamento da bateria? Explique com base nas reações das semicélulas.

6 **As baterias são associações de pilhas, em série ou em paralelo. Pilhas associadas em série fornecem maiores valores de ddp, enquanto as associadas em paralelo fornecem maiores valores de corrente elétrica. Sabendo que as pilhas alcalinas apresentam tensão elétrica de 1,5 V, determine quantas pilhas são necessárias e como devem ser conectadas para se obter uma bateria capaz de gerar uma diferença de potencial de 9,0 V.** 6 pilhas.

7 **Um cozinheiro, ao terminar de lavar a louça, procurou remover a maior parte da água da esponja de aço e, em seguida, esfregou-a sobre um pedaço de sabão em pedra, de forma que toda a sua superfície ficasse recoberta por uma camada de sabão. Qual era seu objetivo ao executar tal procedimento?**

8 **A proteção catódica é empregada em peças metálicas sujeitas à corrosão. Tal proteção envolve o uso de um metal, denominado ânodo de sacrifício, que fica em contato com o metal que se deseja proteger. Dentre os metais cobre, magnésio e zinco, qual(is) pode(m) ser utilizado(s) na proteção do ferro? Justifique sua resposta.**

Dados: potenciais-padrão de redução:

$E^o(Fe^{2+}|Fe) = -0{,}44$ V; $E^o(Cu^{2+}|Cu) = 0{,}34$ V;

$E^o(Mg^{2+}|Mg) = -2{,}37$ V; $E^o(Zn^{2+}|Zn) = -0{,}76$ V.

9 **A foto a seguir ilustra um experimento realizado por estudantes do 2º ano do Ensino Médio. Eles introduziram dois pregos distintos em dois tubos de ensaio contendo água. Em um dos tubos, antes da introdução dos pregos, borbulhou-se nitrogênio na água, para diminuir a quantidade de oxigênio. Após uma semana, os sistemas apresentavam aspectos semelhantes aos observados na imagem.**

7. Ele procurou remover a água e, ao esfregar com sabão, reduziu a superfície do metal em contato com o oxigênio do ar, retardando assim a corrosão do material.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

8. Exceto o cobre, que possui potencial-padrão de redução superior ao do ferro, todos os demais podem ser utilizados. Esses apresentam potenciais-padrão de redução inferiores ao do ferro.

9. a) O tubo **B**, pois a presença de oxigênio acelera a corrosão do ferro (tubo **A**).

a) Qual dos tubos de ensaio representa o sistema com menor concentração de oxigênio? Justifique.

b) Mesmo na ausência de oxigênio, a água é capaz de promover a oxidação do ferro, embora a reação seja mais lenta. Escreva a semirreação catódica para o processo. **9. b)** $2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$

10. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

10 **A corrosão eletroquímica é um processo que ocorre quando um metal se encontra em contato com um eletrólito. Sobre a superfície metálica acontecem, simultaneamente, a reação anódica e a catódica.**

Dadas as semirreações envolvidas no processo de corrosão do ferro, em meio ácido:

$Fe^{2+}(aq) + 2\ e^- \longrightarrow Fe(s)$

$O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^- \longrightarrow 2\ H_2O(\ell)$

a) Escreva as semirreações anódica, catódica e a equação global do processo.

b) Sabendo que a diferença de potencial da equação global, obtida no item **a**, em condições-padrão, é igual a 1,67 V e que o potencial-padrão de redução do Fe^{2+} a Fe é igual a −0,44 V, determine o potencial-padrão de redução do oxigênio, em meio ácido. 1,23 V.

11 **A figura a seguir representa uma célula eletroquímica em cores-fantasia.**



AMj Studio/ID/BR

Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**). **11. a)** F; **b)** F; **c)** V; **d)** F; **e)** V; **f)** F.

a) A barra de níquel é o cátodo.

b) Os íons Ag^+ atuam como agentes redutores.

c) O níquel se oxida.

d) A ponte salina permite a movimentação de elétrons.

e) Os íons K^+ da ponte salina migram em direção à semicélula onde ocorre redução, e o NO_3^-, para aquela onde ocorre oxidação.

f) Os elétrons movem-se do cátodo para o ânodo.

12 **Os potenciais-padrão de redução do $Cu^{2+}|Cu$ e do $A\ell^{3+}|A\ell$ são, respectivamente, 0,34 V e −1,66 V. Considere uma pilha construída com tais espécies e faça o que é pedido a seguir.** **a)** $A\ell(s)|A\ell^{3+}(aq)\ ||\ Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$

a) Represente o diagrama dessa pilha.

b) Escreva as semirreações que se processam em cada eletrodo. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

c) Escreva a equação global da pilha. $2\ A\ell(s) + 3\ Cu^{2+}(aq) \rightarrow 2\ A\ell^{3+}(aq) + 3\ Cu(s)$

d) Determine a ddp dessa pilha. 2,00 V

5. d) A solução aquosa de ácido sulfúrico age como eletrólito da pilha. Os cátions H^+ são consumidos no cátodo e parcialmente regenerados no ânodo, fazendo um fluxo de prótons no sentido do ânodo para o cátodo, fechando o circuito.

Não escreva no livro.

ELETRÓLISE

2. Porque o minério contém o metal, na forma de cátion, ligado a um ânion. Para separar esses íons e reduzir o metal, é consumida uma grande quantidade de energia. A reciclagem é um processo mais simples, em que o metal é fundido e eventuais impurezas são removidas, de modo que ele fique pronto para ser moldado na forma desejada.

ENERGIA ELÉTRICA GERANDO TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS

Você já se perguntou como ocorre a recarga da bateria de seu celular? Tem alguma ideia do que ocorre no interior do equipamento?

Para entender o processo de recarga, é necessário lembrar que o termo "bateria" se refere a um conjunto de pilhas armazenadas em uma disposição específica. Seu funcionamento está baseado em reações de oxirredução.

Quando a bateria do celular está alimentando o dispositivo, ocorrem reações de oxirredução (redox) espontâneas, gerando um movimento de elétrons. No processo, a energia química é convertida em energia elétrica.

Durante a recarga, no entanto, ocorre o oposto: a energia elétrica é utilizada para promover a ocorrência de reações não espontâneas. De forma simplificada, é possível afirmar que a energia elétrica é utilizada para que os produtos da reação redox espontânea sejam convertidos novamente em reagentes.

Processos como o da recarga de pilhas e baterias, em que a energia elétrica é utilizada para promover reações de oxirredução não espontâneas, são denominados **eletrólise**.

Além das baterias, a eletrólise é usada em muitos outros processos, como a produção de cloro e hidrogênio na indústria de cloro e soda, a extração de metais como o alumínio a partir de seus minérios e a galvanoplastia, que é o revestimento de objetos com uma camada fina de metal.

Neste capítulo, você vai compreender os princípios fundamentais da eletrólise e conhecer algumas aplicações desse processo.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

PARA COMEÇAR

1. Apenas alguns metais nobres, como o ouro, a prata e a platina, são encontrados na natureza na forma metálica. A maioria dos demais é encontrada na natureza na forma de minérios, com número de oxidação positivo. Qual tipo de reação o metal presente no minério deve sofrer para que se possa obter o metal puro?

2. Sob o ponto de vista do processo industrial, por que a reciclagem dos metais é mais vantajosa do que fabricar o metal a partir do seu minério?

3. Quais são as vantagens de utilizar pilhas e baterias recarregáveis nos aparelhos?

1. O metal presente no minério deve sofrer uma redução.

Durante a recarga, ocorrem reações de oxirredução dentro das baterias dos celulares.

Sklo Studio/Shutterstock.com/ID/BR

ELETRÓLISE ÍGNEA E ELETRÓLISE EM SOLUÇÃO AQUOSA

Considere uma bateria de chumbo de 12 V, à qual são conectados dois eletrodos de platina que estão mergulhados em cloreto de sódio ($NaC\ell$) fundido, com temperatura superior a 802 °C, que é a temperatura de fusão do $NaC\ell$ a 1 atm.

Observa-se que há condução de corrente elétrica no líquido e, simultaneamente, ocorre a formação de sódio metálico no polo (−) e de gás cloro no polo (+).



AMj Studio/D/BR

Eletrodos de platina imersos em $NaC\ell$ fundido, conectados a uma bateria de 12 V. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Burdge, J. R. *Química*: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

Cátodo (−): $Na^+(\ell) + e^- \longrightarrow Na(\ell)$

Ânodo (+): $2\ C\ell^-(\ell) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$

Equação global: $2\ NaC\ell(\ell) \longrightarrow 2\ Na(\ell) + C\ell_2(g)$

Pela análise da equação global, conclui-se que houve a decomposição do cloreto de sódio ocasionada pela passagem de corrente elétrica através da substância no estado líquido.

Os cátions Na^+ são atraídos pelo polo negativo (cátodo), o qual recebe elétrons que fluem da bateria. Cada cátion Na^+ sofre redução para formar sódio metálico no estado líquido. Os ânions $C\ell^-$ são atraídos pelo polo positivo (ânodo), transferindo elétrons para o ânodo, fechando o circuito. Os ânions $C\ell^-$ são oxidados, produzindo gás cloro.

A passagem de corrente elétrica por uma substância iônica no estado líquido ocasiona a sua decomposição, conhecida por eletrólise ígnea.

A decomposição do cloreto de sódio é um processo não espontâneo, que ocorre a partir da aplicação da energia elétrica fornecida, nesse caso, pela bateria. A reação do metal sódio com o cloro, formando o cloreto de sódio, por outro lado, é bastante espontânea. O sódio é um forte agente redutor, sendo oxidado facilmente, enquanto o cloro é um forte oxidante e tende a ser reduzido.

Pilha elétrica, eletrólise e a descoberta dos elementos

[...]

Em 20 de março de 1800, [o químico e físico italiano] Alessandro Volta comunicou, em carta enviada à Royal Society of London, os resultados experimentais que levaram à invenção da pilha elétrica. [...]

[...]

Na época, a divulgação do invento despertou profundo interesse, tanto junto ao público leigo como entre os cientistas. [...] Do ponto de vista experimental, sua aplicação na Química forneceu resultados imediatos. Antes mesmo da publicação da comunicação de Volta, a utilização da pilha possibilitou a decomposição da água em seus componentes, resolvendo longa polêmica sobre sua composição. Nos anos seguintes, o emprego das pilhas propiciou o desenvolvimento de um novo e importante ramo da Química, a Eletroquímica. A aplicação dos novos métodos desenvolvidos possibilitou a obtenção de vários elementos químicos impossíveis de serem obtidos pelos meios químicos tradicionais. Até 1810, com a aplicação da eletrólise, já haviam sido isolados os elementos sódio, potássio, cálcio e bário.

Oliveira, L. A. A.; Valle, G. G.; Zanluqui, L. A. Construção de pilhas elétricas simples: um experimento integrado de Química e Física. *Eclética Química*, São Paulo, v. 26, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702001000100018&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 30 set. 2024.

Não escreva no livro.

Eletrólise ígnea

A descoberta da eletrólise ígnea no início do século XIX permitiu a obtenção de diversos elementos que, por serem muito reativos, não eram conhecidos. Os metais alcalinos, os metais alcalinoterrosos e o alumínio só puderam ser obtidos após o advento da eletrólise. Esses metais são fortes redutores e se oxidam facilmente. Pela dificuldade em se encontrar um redutor químico que reaja espontaneamente com o cátion de um metal alcalino para produzir o metal correspondente, aplica-se corrente elétrica para promover essa reação.

Na eletrólise, a passagem de corrente elétrica ocasiona uma transformação química. Um exemplo é a eletrólise ígnea do fluoreto de potássio (KF), esquematizada a seguir.

AMj Studio/ID/BR



Esquema da eletrólise ígnea do fluoreto de potássio. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Burdge, J. R. *Química*: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

Na eletrólise, a **redução** ocorre no **cátodo**, que é o **polo negativo** do dispositivo. É para esse eletrodo que os cátions se dirigem, recebendo os elétrons provenientes da fonte elétrica. Já a **oxidação** acontece no **ânodo**, que é o **polo positivo** da célula eletrolítica. Os ânions deslocam-se para o polo positivo, descarregando-se, ou seja, eles perdem elétrons, oxidando.

Analisando os potenciais-padrão de redução, apresentados a seguir, é possível notar que se trata de um processo não espontâneo. Atente para o fato de as condições do experimento representado serem muito diferentes das condições-padrão, uma vez que o processo não está ocorrendo em solução aquosa e a temperatura não é de 25 °C. Ainda que os valores de potencial-padrão não possam ser considerados, é possível verificar que o ânion F^- é o mais fraco redutor, enquanto o K^+ é um péssimo oxidante, sendo a reação de decomposição, portanto, um processo não espontâneo.

Cátodo (−), redução:	$K^+(\ell) + e^- \longrightarrow K(\ell)$	$E° = -2{,}93$ V
Ânodo (+), oxidação:	$2\,F^-(\ell) \longrightarrow F_2(g) + 2\,e^-$	$E° = -2{,}87$ V
Equação global:	$2\,K^+(\ell) + 2\,F^-(\ell) \longrightarrow 2\,K(\ell) + F_2(g)$	$\Delta E° = -5{,}80$ V

A eletrólise ígnea (ou a utilização de um metal com alto caráter redutor) é o método usado para obtenção do alumínio e dos metais dos grupos 1 e 2 da Tabela Periódica. O metal redutor, no entanto, também é obtido por eletrólise. Um exemplo é o potássio metálico, que pode ser usado para a obtenção de alumínio ou magnésio.

$$6\,K + Al_2O_3 \longrightarrow 2\,Al + 3\,K_2O$$
$$2\,K + MgO \longrightarrow Mg + K_2O$$

AÇÃO E CIDADANIA

Produção *versus* reciclagem do alumínio

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre, perdendo apenas para o oxigênio e o silício. Muitos de seus compostos encontrados na natureza constituem pedras preciosas.

O alumínio é obtido, em sua forma metálica, a partir da bauxita ($Al_2O_3 \cdot x\,H_2O$), seu minério mais abundante, por meio da eletrólise ígnea, que envolve alto consumo de energia.

A opção mais econômica é a reciclagem, que consome somente 5% da energia que seria consumida na produção por eletrólise.

Desde 2022, a reciclagem de latinhas de alumínio no Brasil vem se mantendo muito próxima de 100% da produção. Isso representa aproximadamente 390 mil toneladas de alumínio, o que mantém o país na liderança mundial, a qual ocupa desde 2001. A atividade injeta, em média, R$ 6 bilhões por ano na economia nacional, além de contribuir com a geração de trabalho para mais de 800 mil catadores. Há também vantagem ambiental no reaproveitamento, que permite a redução de 95% nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e no consumo de energia elétrica em relação à obtenção de alumínio primário.

1. **Sua comunidade (família, colegas e funcionários da escola, vizinhos, etc.) descarta o lixo que produz em locais adequados para coleta seletiva?**
2. **De que forma você poderia contribuir para incentivar a coleta seletiva em sua comunidade?**

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
2. Resposta pessoal. Os estudantes podem divulgar os benefícios da coleta seletiva, indicar pontos de recolhimento de materiais recicláveis, entre outros.

Eletrólise em solução aquosa

Apesar de bastante usada na obtenção de metais muito reativos, a eletrólise é um processo caro, pois, além da energia elétrica envolvida, há a necessidade de manter os compostos iônicos no estado líquido e em ausência de oxigênio, o que requer altas temperaturas e sistemas isolados do ar.

Entretanto, muitos desses compostos iônicos, como o cloreto de sódio, são bastante solúveis em água. Essas soluções conduzem corrente elétrica, pois os compostos iônicos solúveis são **eletrólitos**.

O que ocorre durante a passagem de corrente elétrica em uma solução aquosa de NaCℓ, de concentração 1 mol/L, quando são usados eletrodos de platina? Há eletrólise? Há formação de sódio e de gás cloro?

No cátodo, não há formação de sódio metálico, mas de gás hidrogênio. Essa formação ocorre porque, além dos cátions Na^+, há na solução cátions H^+ provenientes da autoionização da água. Além disso, as próprias moléculas de água podem sofrer redução no polo negativo.

Cátodo (–), redução:

$Na^+(aq) + e^- \longrightarrow Na(s)$ $\quad E° = -2{,}71\ V$

$2\ H^+(aq) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g)$ $\quad E° = 0{,}00\ V$

$2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$ $\quad E° = -0{,}83\ V$

Representação sem proporção de tamanho.



AMj Studio/ID/BR

Representação da eletrólise aquosa do NaCℓ. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Burdge, J. R. *Química*: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

A espécie reduzida nesse caso é a água, pois seu potencial de redução é bem maior que o do cátion Na^+. Os cátions H^+, apesar de terem maior potencial de redução, estão em baixíssima concentração (10^{-7} mol/L), reduzindo a sua relevância no processo, principalmente se forem levados em conta os fatores cinéticos. É importante lembrar que os valores de potencial-padrão não podem ser estritamente considerados nas condições da eletrólise, pois são estabelecidos para concentrações de 1,0 mol/L, a 25 °C e 1 atm.

A formação de ânions OH^- nas proximidades do cátodo pode ser verificada com o uso de um indicador ácido-base, como a fenolftaleína. Algumas gotas desse indicador tornam rosa a solução nessa região.

No ânodo, além do ânion $C\ell^-$, outras espécies podem ser oxidadas, como o ânion OH^- proveniente da autoionização da água, bem como as moléculas da própria água.

Ânodo (+), oxidação:

$2\ C\ell^-(aq) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$ $\quad E° = -1{,}36\ V$

$2\ H_2O(\ell) \longrightarrow 4\ H^+(aq) + O_2(g) + 4\ e^-$ $\quad E° = -1{,}23\ V$

$4\ OH^-(aq) \longrightarrow 2\ H_2O + O_2(g) + 4\ e^-$ $\quad E° = -0{,}40\ V$

O ânion OH^- quase não se descarrega no ânodo, pois está em baixa concentração (10^{-7} mol/L) no início do experimento. A água, apesar de ter potencial de oxidação maior que o ânion $C\ell^-$ (que é menos negativo), praticamente não sofre oxidação. Isso se deve possivelmente a fatores cinéticos: a oxidação do $C\ell^-$ é mais rápida que a da água, observando-se experimentalmente a formação do gás cloro em solução aquosa. A formação de $O_2(g)$ só ocorreria em meio alcalino ou em baixa concentração de $C\ell^-(aq)$.

1. Na eletrólise, a redução ocorre no polo negativo, o cátodo, enquanto a oxidação ocorre no polo positivo, o ânodo.

2. A autoionização da água ocorre em baixíssima extensão, logo a concentração de íons na água pura é ínfima. Para que ocorra a eletrólise, deve haver movimento de íons em solução, sendo necessário adicionar um eletrólito ao meio.

ROTEIRO

1. No processo de eletrólise, em que polos ocorrem a redução e a oxidação? Qual deles é o cátodo e qual é o ânodo?

2. Explique por que é necessário utilizar um eletrólito para promover a decomposição da água por eletrólise.

Prioridade de descarga dos íons em solução aquosa

Para prever os produtos formados durante uma eletrólise aquosa, é preciso avaliar as espécies presentes em solução.

Para a oxidação, que ocorre no eletrodo positivo, deve-se comparar o caráter oxidante dos ânions presentes e da própria água. O potencial-padrão de oxidação

Não escreva no livro.

é um parâmetro que auxilia bastante na comparação. Não podem ser menosprezados, entretanto, os fatores cinéticos e as concentrações de cada espécie.

Para o processo de redução, que acontece no eletrodo negativo, a comparação se limita aos cátions presentes e à água. Novamente, os valores de potencial-padrão de redução podem ser aplicados, mas os fatores cinéticos e as concentrações de cada espécie também precisam ser considerados.

Por exemplo, os cátions dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos e o $A\ell^{3+}$ não se descarregam em solução aquosa, pois, na presença deles em solução, ocorre a redução da água em meio neutro ou do $H^+(aq)$ em meio ácido formando $H_2(g)$. Por isso, utiliza-se a eletrólise ígnea para a produção desses metais.

Da mesma forma, os ânions oxigenados e o fluoreto não são oxidados em solução aquosa, já que ocorre a formação de $O_2(g)$ no eletrodo positivo a partir da oxidação da água em meio neutro ou dos íons hidroxila em meio alcalino.

Eletrólise da água

A água é uma substância composta que pode ser decomposta por eletrólise, gerando gás hidrogênio e gás oxigênio. A água, entretanto, não é um bom condutor de eletricidade, inviabilizando a eletrólise da substância pura, o que torna necessário o emprego de um eletrólito.

A análise do potencial-padrão de redução permite determinar quais eletrólitos são adequados para a eletrólise da água, de modo que não haja formação de outros produtos nos eletrodos senão o hidrogênio e o oxigênio gasosos.

Se o eletrodo for inerte, verifica-se no cátodo a formação do dobro do volume de gás recolhido no ânodo. Lembre-se de que, nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume de um gás só depende do número de moléculas da substância gasosa. Essa observação é coerente com o fato de a água apresentar o dobro de átomos de hidrogênio em relação aos de oxigênio em sua composição (H_2O) e com a proposta de que as moléculas de hidrogênio e oxigênio são ambas diatômicas (H_2 e O_2, respectivamente).

As equações a seguir representam os fenômenos que ocorrem em cada eletrodo.

Charles D. Winters/Science Source/Fotoarena

Eletrólise da água. No tubo à esquerda, há formação de gás oxigênio; no da direita, de gás hidrogênio.

Cátodo (−):	$4\ H_2O(\ell) + 4\ e^-$	$\longrightarrow$	$2\ H_2(g) + 4\ OH^-(aq)$
Ânodo (+):	$2\ H_2O(\ell)$	$\longrightarrow$	$4\ H^+(aq) + O_2(g) + 4\ e^-$
Equação global:	$2\ H_2O(\ell)$	$\longrightarrow$	$2\ H_2(g) + O_2(g)$

ATIVIDADE RESOLVIDA

Considere a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II). São dadas as semirreações e seus respectivos potenciais-padrão de redução:

$Cu^{2+}(aq) + 2\ e^- \longrightarrow Cu(s)$ $\quad E° = +0{,}34\ V$

$2\ H^+(aq) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g)$ $\quad E° = +0{,}00\ V$

$2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$ $\quad E° = -0{,}83\ V$

$O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^- \longrightarrow 2\ H_2O(\ell)$ $\quad E° = +1{,}23\ V$

$O_2(g) + 2\ H_2O(\ell) + 4\ e^- \longrightarrow 4\ OH^-(aq)$ $\quad E° = +0{,}40\ V$

Indique quais reações podem ocorrer no cátodo e no ânodo, respectivamente, e as reações que efetivamente se processam em cada um dos eletrodos.

Resolução

As espécies que podem sofrer redução no **cátodo** são: Cu^{2+}, H^+ e H_2O.

$Cu^{2+}(aq) + 2\ e^- \longrightarrow Cu(s)$ $\quad E° = +0{,}34\ V$

$2\ H^+(aq) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g)$ $\quad E° = +0{,}00\ V$

$2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$ $\quad E° = -0{,}83\ V$

Como o potencial de redução do Cu^{2+} é o mais alto, essa semirreação se processa no eletrodo negativo da célula.

No **ânodo**, pode ocorrer a oxidação do H_2O e dos íons OH^- e SO_4^{2-}. Como no SO_4^{2-} o S apresenta seu Nox máximo (+6), sua oxidação é improvável. As reações prováveis nesse eletrodo são:

$2\ H_2O(\ell) \longrightarrow O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^-$ $\quad E° = +1{,}23\ V$

$4\ OH^-(aq) \longrightarrow O_2(g) + 2\ H_2O(\ell) + 4\ e^-$ $\quad E° = -0{,}40\ V$

Apesar de a oxidação dos íons OH^- ser mais favorável (potencial de oxidação mais alto), esses íons se encontram em baixa concentração em solução aquosa (provêm do processo de autoionização da água). Portanto, nesse eletrodo, ocorre a oxidação da água.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

SERIAM O SÓDIO E O POTÁSSIO METAIS?

A influência de Lavoisier na Química do século XIX

No início do século XIX, as ideias do francês Antoine Lavoisier (1743-1794) repercutiam entre a maioria dos químicos. Dentre elas, a definição de elemento químico orientou os químicos a definirem as substâncias simples, que não poderiam ser decompostas por qualquer procedimento experimental, como elementos. Contudo, essa classificação não era definitiva. Algumas substâncias consideradas como simples em um dado momento histórico poderiam ser posteriormente verificadas como sendo compostas, caso novos experimentos revelassem isso.

Lavoisier listou todas as substâncias simples conhecidas até então. Apesar disso, não incluiu em sua lista duas substâncias muito conhecidas na época, a potassa e a soda, que eram utilizadas na produção de vidro e sabão. Lavoisier acreditava que deveriam ser substâncias compostas, ainda que não houvesse nenhuma evidência experimental que confirmasse essa ideia. Além disso, a composição dessas substâncias era desconhecida pelos químicos da época. A suposição de Lavoisier levaria o químico inglês Humphry Davy (1778-1829) a investigar como poderia decompor essas substâncias.

A pilha de Volta e a descoberta do sódio e potássio

Por volta de 1800, um novo instrumento científico começou a circular pela Europa, a pilha elétrica, inventada pelo químico e físico italiano Alessandro Volta (1745-1827). Ela conseguia produzir corrente elétrica a partir de chapas de dois metais diferentes postos em contato. Químicos vislumbraram a possibilidade de utilizar esse instrumento para decompor substâncias, algo que se tornou mais plausível após a eletrólise da água realizada pelos ingleses William Nicholson (1753-1815) e Anthony Carlisle (1768-1840).

Nesse contexto, Davy começou a utilizar a pilha elétrica para decompor substâncias, como sais e minerais, que se sabia na época que eram substâncias compostas e quais eram seus constituintes. Essas investigações permitiram a Davy compreender como a pilha elétrica poderia levar à descoberta dos elementos que compõem as substâncias.

Após alguns anos dessas investigações, Davy empregou pilhas elétricas com até 150 placas de cobre e zinco em uma porção de potassa sólida que havia absorvido umidade do ar. Embora na época não houvesse uma compreensão sobre sua composição, Davy acreditava que ela era constituída de nitrogênio combinado com enxofre ou fósforo. No entanto, ao passar a corrente elétrica, observou que a potassa começava a fundir e surgiam pequenos glóbulos, com aparência metálica. Alguns deles até mesmo se incendiavam com uma chama brilhante. O mesmo procedimento foi adotado para a soda, e o que se observou foi semelhante à potassa. Em ambos os casos, formava-se também oxigênio no decorrer da eletrólise, que, quando em contato com as novas substâncias, voltava a formar potassa e soda.

Davy teve dificuldade em analisar suas novas substâncias, pois elas reagiam rapidamente com o ar atmosférico, o que foi resolvido armazenando-as em um solvente oriundo do petróleo. Davy propôs que soda e potassa seriam substâncias compostas e que ambas conteriam oxigênio, distinguindo-se pelo fato de possuírem dois novos elementos químicos, o sódio (na soda) e o potássio (na potassa). Os dois nomes foram justificados por Davy como derivados dos materiais dos quais essas novas substâncias eram extraídas.

Ele também avaliou as propriedades físicas do sódio e do potássio, verificando que ambos eram excelentes condutores de calor e eletricidade, brilhantes e maleáveis, características típicas de metais. As novas substâncias também se combinavam com outras substâncias de modo semelhante a outros metais conhecidos. Contudo, diferentemente destes últimos, possuíam densidades extremamente baixas, menores que a da água. Esse poderia ser um argumento para não classificá-las como metais, mas Davy defendeu que deveria ser levado em conta o conjunto de propriedades em comum com os metais como critério.

Nos anos posteriores, Humphry Davy ainda seria responsável por descobrir, utilizando a pilha elétrica, o cálcio, o estrôncio, o bário e o magnésio, os quais ele também classificou como metais, ampliando a lista de substâncias simples de Lavoisier.

Para discutir

1 **Como as ideias de Lavoisier influenciaram a busca pela decomposição da soda e da potassa?**

2 **Que importância a pilha elétrica teve nos trabalhos de Humphry Davy?**

3 **Por que o sódio e o potássio foram classificados como metais?**

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3. Embora eles tivessem densidades muito menores em relação aos metais conhecidos na época, as demais propriedades eram muito semelhantes às dos metais, como o brilho, a boa condução de eletricidade, luz e calor, etc.

Não escreva no livro.

COMPARAÇÃO ENTRE A ELETRÓLISE E O FUNCIONAMENTO DAS PILHAS

As pilhas e os processos eletrolíticos são sistemas que envolvem reações de oxirredução. Cada processo, no entanto, apresenta suas particularidades.

A pilha é um dispositivo que gera energia elétrica a partir de energia química, proveniente de uma reação de oxirredução. Para tanto, essa reação precisa ser espontânea nas condições do dispositivo.

As semicélulas eletroquímicas devem estar em contato elétrico. O contato exterior é eletrônico, por meio de fios condutores de eletricidade, permitindo a utilização da corrente elétrica gerada para realização de trabalho elétrico. Internamente, ocorre o contato iônico efetuado pela ponte salina (ou similar), que fecha o circuito elétrico e garante a neutralidade de cargas em cada semicélula.

O polo positivo da pilha é o cátodo, eletrodo em que ocorre a semirreação de redução, enquanto a oxidação acontece no ânodo, polo negativo da pilha.

AMj Studio/ID/BR



Representação sem proporção de tamanho.

Representação de pilha formada por zinco metálico imerso em solução aquosa de Zn^{2+} a 1,0 mol/L e por cobre metálico imerso em solução aquosa de Cu^{2+} a 1,0 mol/L. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L. *et al. Chemistry*: the central science. 15. ed. New York: Pearson, 2022.

Na eletrólise, a energia elétrica proveniente de uma fonte adequada – que pode ser uma pilha ou uma bateria – ocasiona uma reação química, geralmente não espontânea.

Na cuba eletrolítica, o cátodo é o eletrodo em que ocorre a redução (polo negativo), enquanto no ânodo acontece o processo de oxidação (polo positivo).

AMj Studio/ID/BR



Representação sem proporção de tamanho.

Representação da eletrólise do $CuC\ell_2$. Observa-se a formação de gás cloro no ânodo, enquanto no cátodo há a deposição de cobre metálico representado pela cor marrom. Cores-fantasia.

Brown, T. L. *et al. Chemistry*: the central science. 15. ed. New York: Pearson, 2022.

Não escreva no livro.

Pintura eletrolítica

A pintura dos veículos automotivos é feita atualmente por eletrodeposição, para atender às exigências anticorrosivas da indústria automobilística.

As tintas são constituídas essencialmente por uma resina (molécula orgânica com unidades que se repetem) e pigmentos. A resina é responsável pela aderência da tinta à superfície metálica. Já os pigmentos conferem cor e cobertura à tinta.

As tintas utilizadas para eletrodeposição contêm resinas com grupos carregados eletricamente (positivos ou negativos).

A peça metálica a ser pintada é imersa em um tanque contendo solução aquosa de tinta. No tanque, a peça, que atua como um dos eletrodos do processo (o outro eletrodo é de aço ou grafita), é submetida a uma diferença de potencial. Devido ao princípio da atração elétrica entre cargas opostas, as partículas carregadas de tinta migram para o eletrodo de carga oposta.

Embora a eletrodeposição de tintas possa ser anódica, a catódica é mais utilizada nos processos industriais. Na eletrodeposição anódica, a resina com grupos carregados negativamente migra para a carroceria, que atua como ânodo, eletrodo positivo da célula eletrolítica. Na catódica, a carroceria atua como cátodo, eletrodo negativo, para onde migram os grupos positivamente carregados da tinta.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA ELETRÓLISE

Obtenção de metais por eletrólise ígnea

A descoberta da eletrólise ígnea, no início do século XIX, foi fundamental para a obtenção da forma elementar de metais muito reativos, como os metais alcalinos, os alcalinoterrosos e o alumínio.

Alumínio

O metal alumínio, atualmente muito difundido e com inúmeras aplicações em diversos setores, como transporte, construção civil, eletroeletrônico, metalurgia, entre outros, foi obtido pela primeira vez em 1827. Apesar de ser o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre, durante boa parte do século XIX o alumínio foi considerado um metal raro devido à dificuldade de sua obtenção.

Seu principal minério é a bauxita, formada por óxido de alumínio hidratado ($A\ell_2O_3 \cdot n\ H_2O$) e impurezas, como Fe_2O_3 e SiO_2. O tratamento do óxido de alumínio com ácido clorídrico gera o cloreto de alumínio ($A\ell C\ell_3$). O método mais comum de obtenção do metal naquele século era a redução desse sal com potássio ou sódio metálicos, obtidos por eletrólise ígnea.

A seguir estão equacionadas essas reações.

$$A\ell_2O_3(s) + 6\ HC\ell(aq) \longrightarrow 2\ A\ell C\ell_3(aq) + 3\ H_2O(\ell)$$
$$A\ell C\ell_3(s) + 3\ K(s) \longrightarrow 3\ KC\ell(s) + A\ell(s)$$

Esse processo era muito caro e ineficiente, sendo inviável comercialmente, e restringia o alumínio aos estudos acadêmicos ou à fabricação de joias. A eletrólise ígnea do $A\ell_2O_3$ também era inviável devido à sua alta temperatura de fusão, superior a 2000 °C.

Em 1886, foi desenvolvido um método de produção do alumínio que se tornou viável economicamente: o americano Charles M. Hall (1863-1914), com auxílio de sua irmã, Julia B. Hall (1869-1926), e o francês Paul Héroult (1863-1914) perceberam, de forma independente, que a adição do mineral criolita ($Na_3A\ell F_6$) ao óxido de alumínio permitia a realização da eletrólise em temperaturas ao redor de 1000 °C. Ainda assim, esse método consome muita energia elétrica.

O processo Hall-Héroult (imagens **A** e **B**) consiste na eletrólise do $A\ell_2O_3$ dissolvido em criolita fundida em uma cuba eletrolítica de aço revestida com carbono. Os ânodos são de grafita, sendo consumidos pelo oxigênio formado no processo.



No esquema (**A**), o ânodo é de grafita, enquanto o cátodo é de aço coberto de carbono; na temperatura da cuba, o alumínio (temperatura de fusão de 660 °C) é obtido no estado líquido e, por ser mais denso que a mistura eletrolítica, deposita-se no fundo. Em (**B**), fluxograma da obtenção de 1 tonelada de alumínio metálico. Cores-fantasia.

As principais reações que ocorrem nos eletrodos são:

Cátodo (−), redução: $A\ell^{3+}(\ell) + 3\ e^- \longrightarrow A\ell(\ell)$

Ânodo (+), oxidação: $2\ O^{2-}(\ell) \longrightarrow O_2(g) + 4\ e^-$

Equação global: $2\ A\ell_2O_3(\ell) \longrightarrow 4\ A\ell(\ell) + 3\ O_2(g)$

Não escreva no livro.

1. Resposta pessoal. Podem ser citados a igualdade salarial para pessoas que executam as mesmas funções, incentivos na concessão de bolsas de estudo para o trabalho científico em universidades e institutos de pesquisa, a divulgação do trabalho das mulheres que atuam nas ciências para que sejam exemplo para as meninas, entre outros.

CIÊNCIA SE DISCUTE

O efeito Matilda e a produção industrial do alumínio

O **efeito Matilda** refere-se à atitude preconceituosa de não se dar o devido crédito ou reconhecer o valor das contribuições realizadas por mulheres nas ciências. O termo foi cunhado pela historiadora da Ciência Margaret W. Rossiter (1944-), no início da década de 1990, em homenagem à ativista pelos direitos das mulheres Matilda Joslyn Gage (1826-1898). Embora seu nome seja emblemático como ativista no movimento pelo sufrágio universal, Matilda publicou em 1870 um artigo intitulado "A mulher como inventora" (*Woman as inventor*), no qual questiona a crença de que as mulheres não teriam inventividade ou criatividade. O artigo ainda seria republicado pela autora em 1883, incluindo críticas às restrições legais impostas às mulheres com relação a direitos sobre patentes.

Um exemplo notável do efeito Matilda pode ser observado no desenvolvimento da eletrólise para a produção de alumínio. O processo Hall-Héroult é amplamente reconhecido como a base da produção moderna de alumínio. No entanto, as contribuições significativas de Julia Brainerd Hall (1869-1926), irmã de Charles Martin Hall, foram apagadas da narrativa histórica. Julia Hall colaborou com o irmão no desenvolvimento do processo e no registro da documentação para obtenção da patente. Apesar de sua contribuição, seu nome é raramente mencionado nos registros históricos.

Infelizmente, os exemplos do efeito Matilda não se limitam à história de Julia Hall. Nos últimos anos, denúncias sobre o fenômeno têm contribuído, ainda que muito timidamente, para mudanças na literatura acadêmica. Nomes como o da química britânica Rosalind Franklin (1920-1958) são frequentemente utilizados como exemplo para denunciar o preconceito. Ela produziu imagens de difração de raios X que foram cruciais para a elucidação da estrutura do DNA, mas suas descobertas só tiveram reconhecimento póstumo.

Fonte de pesquisa: FERNANDES, L. S. Julia Hall e o desenvolvimento do processo Hall-Héroult: o efeito Matilda na história da indústria química. *Química Nova na Escola*, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 117-122, maio 2023. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc_45_2/06-HQ-71-21.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.

1. Converse com os colegas sobre como o preconceito pode prejudicar e afastar as mulheres que querem ser cientistas. Em seguida, liste as atitudes que você considera que a sociedade deve tomar para que haja igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no meio científico.

Anodização

Conforme visto, o alumínio apresenta maior resistência à corrosão devido à camada de óxido de alumínio ($A\ell_2O_3$), bastante resistente e aderente, que se forma na superfície do metal, prevenindo a oxidação do material. A deposição do óxido de alumínio ocorre naturalmente, mas pode ser feita via eletrólise, garantindo um melhor acabamento para a peça.

A deposição do respectivo óxido sobre a peça metálica é conhecida por **proteção anódica** e, quando ocorre em uma cuba eletrolítica, é designada **anodização**.

A peça é o próprio ânodo de uma cuba eletrolítica que contém solução aquosa de ácido sulfúrico. A aplicação de corrente elétrica leva à formação de oxigênio no ânodo, que imediatamente reage com o metal, havendo a formação do óxido.

Ânodo (+):

$$2\ H_2O(\ell) \longrightarrow 4\ H^+(aq) + O_2(g) + 4\ e^-$$

$$2\ A\ell(s)\ (\text{ânodo}) + 3\ O_2(g) \longrightarrow 2\ A\ell_2O_3(s)$$



AMj Studio/ID/BR

Esquema da anodização com H_2SO_4 a 10% e 3 °C. Cores-fantasia.

No caso do alumínio, o $A\ell_2O_3$ formado é bastante poroso, podendo ser tingido com a aplicação de um corante. O corante é fixado com o selamento dos poros por meio de um tratamento da peça em água quente.

Refino eletrolítico do cobre



FabrikaSimf/Shutterstock.com/ID/BR

O cobre é utilizado em fios elétricos por ser um excelente condutor elétrico, além de resistente à corrosão e à deformação e bastante maleável.

O cobre utilizado em fiações elétricas requer uma alta pureza. O fio de cobre deve ter teor superior a 99,9% do metal. O cobre metálico obtido diretamente a partir do minério apresenta pureza de 99%, devendo passar por uma etapa de purificação eletrolítica para poder ser utilizado como condutor de eletricidade.

A purificação por eletrólise garante a eliminação de impurezas metálicas mais reativas do que o cobre, geralmente ferro e zinco, e menos reativas do que esse metal – prata, ouro e platina.

O cobre a ser refinado é o ânodo da cuba eletrolítica, a qual contém uma solução de $CuSO_4$ e H_2SO_4 como eletrólito. O cátodo é uma placa de cobre de alta pureza.

Na oxidação do ânodo, o cobre e as impurezas reativas passam para a solução na forma de cátions, enquanto ouro, prata e platina se depositam no fundo da cuba eletrolítica, formando a chamada "lama anódica". Esses metais são tratados e vendidos posteriormente.

No cátodo, apenas os cátions Cu^{2+} se reduzem a Cu (que se deposita), pois apresentam potencial de redução bem superior aos do Zn^{2+}, Fe^{2+} e H^+, também presentes em solução. Desse modo, obtém-se o cobre eletrolítico com elevado teor de pureza.

PARA EXPLORAR

Assista

Eletrólise da salmoura

O vídeo, do Grupo de Pesquisa em Educação Química do Instituto de Química da USP (Gepeq-USP), simula o processo de eletrólise da salmoura, utilizado na indústria cloro-álcalis.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ILiYTIN6w5g. Acesso em: 30 set. 2024.



AMj Studio/ID/BR

Representação do refino do cobre. Cores-fantasia.

Brown, T. L. *et al. Chemistry*: the central science. 15. ed. New York: Pearson, 2022.

Eletrólise da salmoura

A eletrólise industrial de uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCℓ) produz duas das dez substâncias mais utilizadas na indústria química – a soda cáustica (nomenclatura usual do NaOH) e o gás cloro ($C\ell_2$). É, portanto, um processo industrial estratégico para o desenvolvimento da indústria química de um país.

A eletrólise de uma solução de NaCℓ leva à formação de cloro, hidrogênio e de uma solução de NaOH, como pode ser observado a seguir.

Cátodo (−), redução: $2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \longrightarrow 2\ OH^-(aq) + H_2(g)$

Ânodo (+), oxidação: $2\ C\ell^-(aq) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$

Equação global: $2\ H_2O(\ell) + 2\ C\ell^-(aq) \longrightarrow 2\ OH^-(aq) + H_2(g) + C\ell_2(g)$

ROTEIRO

3. A cada tonelada de sucata eletrônica, é possível recuperar mais de 50 kg de cobre por meio da eletrólise, o que propicia uma economia relevante. No decorrer do processo, alguns metais presentes no cobre impuro permanecem em solução na forma de íons; outros constituem a lama anódica. Explique que propriedade caracteriza tais comportamentos.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Há mais de um método comumente empregado na eletrólise do cloreto de sódio. Em todos eles, procura-se isolar os produtos gasosos formados no cátodo (H_2) e no ânodo ($C\ell_2$), para evitar possíveis explosões. Deve-se impedir o contato do gás cloro com a solução eletrolítica, o que resultaria no hipoclorito de sódio ($NaC\ell O$) como produto secundário.

$$2\ NaOH(aq) + C\ell_2(g) \longrightarrow NaC\ell(aq) + NaC\ell O(aq) + H_2O(\ell)$$

Um desses processos é o realizado em células de cátodo de mercúrio, as quais têm a vantagem de produzir NaOH de elevada pureza (figura **A**). Os íons Na^+ (cátions sódio) são reduzidos a Na (sódio metálico), mesmo em solução aquosa. Nesse caso, o mercúrio dissolve o sódio metálico e forma um amálgama, o qual é bombeado para outro compartimento, onde entra em contato com água. Esta reage com o sódio, produzindo uma solução de soda cáustica de concentração 50%. O mercúrio é reutilizado como eletrodo.

$$2\ NaHg(\ell) + 2\ H_2O(\ell) \longrightarrow NaOH(aq) + H_2(g) + Hg(\ell)$$



Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Esquema de célula de cátodo de mercúrio para produção de $C\ell_2$ e NaOH. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Silva, I. M. C. B. Métodos de preparação industrial de solventes e reagentes químicos: hidróxido de sódio. *Revista Virtual de Química*, v. 4, n. 1, 2012. Disponível em: https://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/228/217. Acesso em: 18 out. 2024.

Esse processo, entretanto, resulta em sério problema ambiental, pois forma grande quantidade de resíduos de mercúrio, responsável pela contaminação de muitas regiões próximas a essas indústrias.

Outro processo é o realizado em células de membrana permeável a íons, a qual separa os dois eletrodos (figura **B**). Enquanto a salmoura é colocada continuamente no ânodo, a solução de NaOH é retirada no cátodo. Esses dois métodos resultam em um NaOH com pequeno teor de $NaC\ell$ como impureza.



AMj Studio/ID/BR

Esquema de célula de membrana. Cores-fantasia.

Brown, T. L. *et al. Chemistry*: the central science. 15. ed. New York: Pearson, 2022.

Desinfecção por eletrólise

A salinização no tratamento de água de piscinas é um processo que utiliza a eletrólise para manter a água limpa e segura para os banhistas. Nesse sistema, adiciona-se cloreto de sódio à água da piscina. Quando a água salinizada passa por um sistema de eletrólise, uma corrente elétrica é aplicada, formando cloro, o qual atua como desinfetante devido ao seu caráter oxidante. O sistema é interrompido automaticamente quando a quantidade de cloro livre na água atinge os níveis ideais. Esse método é vantajoso porque reduz a necessidade de adicionar cloro manualmente e minimiza o odor forte associado aos produtos químicos tradicionais.

A desinfecção por eletrólise também é considerada uma opção mais ecológica. O processo contínuo de geração de cloro a partir do sal dissolvido na água garante uma concentração constante de desinfetante. Isso reduz o impacto ambiental, uma vez que diminui a necessidade de produção de cloro e seu transporte em embalagens plásticas.

Algumas desvantagens desse método são o custo da instalação do sistema de eletrólise e a corrosão dos componentes metálicos da piscina. Outro ponto importante é a segurança elétrica do processo, sendo necessário garantir a correta instalação e o aterramento do sistema para evitar choques elétricos.

ROTEIRO

4. Sem realizar cálculos, o que se pode afirmar sobre o valor da diferença de potencial-padrão dos sistemas apresentados nos esquemas **I** e **II** da atividade resolvida? Justifique sua resposta.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Nos esquemas **I** e **II**, apresentados a seguir, um deles representa uma pilha, e o outro, uma eletrólise.

Considere os seguintes potenciais-padrões de redução: $E°(Pb^{2+}|Pb) = -0{,}13$ V; $E°(Zn^{2+}|Zn) = -0{,}76$ V; $E°(K^{+}|K) = -2{,}93$ V; $E°(I_2|I^{-}) = +0{,}53$ V.



Reinaldo Vignati/ID/BR

a) Qual esquema representa a pilha? E qual representa a eletrólise? Justifique sua resposta.

b) Com relação ao esquema que representa a eletrólise, escreva as semirreações que se processam no cátodo e no ânodo da célula eletrolítica.

c) Com o objetivo de demonstrar os produtos formados no ânodo e no cátodo no processo de eletrólise, uma professora selecionou dois indicadores específicos: amido em suspensão e fenolftaleína em solução alcoólica. Adicionou junto ao cátodo gotas de fenolftaleína e, junto ao ânodo, gotas da suspensão de amido. Que evidências de formação de produtos devem ter sido observadas para cada um dos indicadores selecionados?

Dado: Em presença de amido, um meio contendo iodo torna-se azul.

Resolução:

a) O esquema **I** representa a pilha. São observadas duas semicélulas, e o voltímetro é utilizado para medir a diferença de potencial (ddp) fornecida pelo sistema.

O esquema **II** corresponde à eletrólise. A reação ocorre em uma única célula eletrolítica, que é alimentada por uma fonte de energia. A energia elétrica fornecida ao sistema permite a ocorrência de uma reação não espontânea.

b) A água tem prioridade de descarga sobre o íon K^+, logo a semirreação catódica é:

$$2\,H_2O(\ell) + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g) + 2\,OH^-(aq)$$

No ânodo, o iodeto tem prioridade de descarga, logo a semirreação anódica é:

$$2\,I^-(aq) \longrightarrow I_2(aq) + 2e^-$$

c) No cátodo, a fenolftaleína adquire a cor rosa porque ocorre a formação de íons OH^- decorrentes da redução de H_2O. No ânodo, a suspensão de amido adquire a cor azul porque ocorre a formação de I_2.

4. O valor da ddp no esquema **I** é positivo, pois a reação é espontânea; já no esquema **II** o valor é negativo, pois a reação não é espontânea, dependendo de uma fonte de energia elétrica (no caso, uma bateria) para ocorrer.

Não escreva no livro.

Cobreação de um objeto metálico

Conforme visto, a corrente elétrica fornecida por uma bateria ou por outro tipo de gerador pode provocar reações de oxirredução, como acontece no processo de eletrólise. Como você imagina que um objeto de metal menos nobre possa ser recoberto por um metal nobre, como ouro, prata ou cobre?

Nesta atividade, você vai observar como é possível cobrir a superfície de um objeto metálico com uma camada de outro metal por meio da eletrólise.

Material

- solução de sulfato de cobre(II) penta-hidratado ($CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$) a 1 mol/L
- objeto metálico não encapado ou pintado (chave, prego, clipe de papel, etc.)
- béquer ou frasco transparente de 100 mL
- conjunto de pelo menos três pilhas médias ligadas em série (podem ser recarregáveis) ou fonte de corrente contínua de qualquer tensão entre 4,5 V e 12 V
- 2 fios com as pontas desencapadas
- par de garras jacaré ou pedaço de fita isolante
- peça de cobre

Como fazer



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

1. O(A) professor(a) fará o experimento de forma demonstrativa, conectando os fios, as pilhas e os objetos metálicos da forma mostrada na imagem.
2. Coloque a solução de sulfato de cobre(II) em um béquer ou frasco transparente até cerca de três quartos de sua capacidade.
3. Prenda o objeto metálico ao fio ligado ao polo negativo do conjunto de pilhas. O objeto de cobre deve ser ligado ao fio do polo positivo.
4. Mergulhe os dois objetos na solução, tomando cuidado para não encostar um no outro.
5. Analise o aspecto dos objetos a cada 2 minutos; após 8 minutos, retire os dois fios da solução e anote as mudanças no objeto metálico ligado ao polo negativo.
6. Troque a posição do objeto metálico com o objeto de cobre. Mergulhe novamente os dois objetos por 8 minutos e registre as mudanças.

Para concluir

1. Houve deposição de cobre na peça metálica quando ele foi ligado ao polo negativo. Já no polo positivo, o cobre da peça metálica retornou para a solução na forma de íon.

1 **De acordo com as mudanças registradas no experimento, o que aconteceu com o objeto metálico quando ele foi mergulhado na solução ligado ao polo negativo? E ligado ao polo positivo?**

2 **Represente por meio de equação química os processos que ocorreram no experimento.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Discuta as modificações que devem ser realizadas neste procedimento, caso se deseje depositar prata sobre um objeto metálico.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

A RECICLAGEM DO ALUMÍNIO

Como foi visto na página 244, apesar de ser um metal abundante no planeta, o alumínio não é encontrado naturalmente na forma metálica. Ele é obtido por meio da eletrólise da bauxita. Por outro lado, o alumínio é um material reciclável. Além disso, ao contrário do que acontece com outros materiais recicláveis – como a maioria dos plásticos –, o alumínio mantém todas as suas propriedades após a reciclagem. Uma lata de alumínio pode ser reciclada infinitas vezes.

O Brasil possui a terceira maior reserva de bauxita do mundo, e é o quarto maior produtor mundial de alumina. As maiores reservas se encontram na Guiné e na Austrália. Cerca de 90% da bauxita extraída no Brasil vem de jazidas localizadas no Pará. Outras jazidas importantes estão localizadas em Goiás e Minas Gerais.

Scott McIntyre/Bloomberg/Getty Images

Bauxita sendo transportada para o beneficiamento.

O processo de reciclagem

A reciclagem do alumínio é composta de cinco etapas:

1. **Coleta:** Após o uso, todo o alumínio e os materiais que possuem esse metal podem ser encaminhados para reciclagem, desde que sejam descartados corretamente por meio da coleta seletiva. Não são só as latas de alumínio que podem ser recicladas; quaisquer objetos feitos desse metal podem ser reciclados, como esquadrias de janela, utensílios de cozinha, peças automotivas, etc.
2. **Retirada de impurezas:** Nessa etapa, o material reciclado passa por um processo semelhante à limpeza, em que são retiradas impurezas como canudos plásticos, areia, etiquetas e rótulos.
3. **Prensagem:** O material reciclado é prensado em grandes fardos, para que sejam transportados para os centros de fundição.
4. **Fundição:** Os fardos de alumínio são fundidos a uma temperatura de 700 °C. O alumínio líquido é transferido para moldes, formando os lingotes, que podem ser enviados para a indústria nesse formato ou como chapas de alumínio após passar por um processo de laminação.

SurfStyle/iStock/Getty Images

O alumínio derretido é colocado em moldes. Depois de esfriar, o metal solidifica, formando os lingotes.

Benefícios ambientais da reciclagem

A bauxita é um material bastante heterogêneo, composto principalmente de um ou mais hidróxidos de alumínio. A bauxita é a matéria-prima usada para a fabricação da alumina ($A\ell_2O_3$), que, por sua vez, é utilizada para a produção do alumínio metálico por meio do processo de eletrólise. Em geral, a partir de 4 toneladas de bauxita seca, são produzidas 2 toneladas de alumina. E essa quantidade de alumina permite produzir uma tonelada de alumínio.

Não escreva no livro.

A produção brasileira de alumínio em 2022 foi de 811 mil toneladas. Além dos impactos ambientais causados nos locais de exploração da bauxita, os números mostram que a produção de alumínio gera uma grande quantidade de rejeitos e subprodutos.

Um desses resíduos é a lama vermelha. Os elementos mais comuns presentes na lama vermelha são ferro, titânio, sílica e alumínio que não pôde ser extraído. Esse material é formado por partículas bem finas e é extremamente alcalino, podendo causar queimaduras ao entrar em contato com a pele.

O descarte da lama vermelha precisa ser feito em locais adequados, como as lagoas de disposição. A construção dessas lagoas apresenta alto custo, pois deve garantir que não ocorra transferência de material para o solo, para evitar a contaminação dos corpos-d'água da superfície e das águas subterrâneas. Esses locais precisam contar com sistemas de monitoramento e prevenção de acidentes. A cada ano são geradas cerca de 90 milhões de toneladas de lama vermelha no mundo.

Além disso, a produção de alumínio a partir da bauxita produz gases poluentes, como o gás carbônico (CO_2) e os perfluorcarbonetos (PFCs). A liberação desses gases na atmosfera contribui para o aquecimento global. Os PFCs são pelo menos 6 500 vezes mais potentes que o gás carbônico para a intensificação do efeito estufa.

Ao reciclar o alumínio, minimizam-se problemas como a geração de subprodutos poluentes, o descarte em aterros sanitários e a emissão de gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa. O processo de obtenção do alumínio a partir da bauxita produz uma quantidade de gases poluentes nove vezes maior do que a quantidade produzida no processo de reciclagem.

Outro benefício do processo de reciclagem de alumínio é a economia de energia. A reciclagem consome o equivalente a 5% da energia necessária para produzir o alumínio a partir da bauxita. Essa economia de energia também é benéfica para o ambiente, principalmente se as fontes de energia usadas na produção do metal forem não renováveis.

Então, devemos cumprir a nossa parte para que o Brasil continue sendo o campeão mundial na reciclagem de latas de alumínio, reciclando praticamente 100% das latas produzidas desde 2022.

Fontes de pesquisa: Ancat. *Atlas Brasileiro da Reciclagem 2022*. [*s. l.*], [2023]. Disponível em: https://atlasbrasileirodareciclagem.ancat.org.br/; Equipe eCycle. Impactos ambientais do alumínio e suas propriedades. *eCycle*, [*s. l.*], [2021]. Disponível em: https://www.ecycle.com.br/aluminio/; Monteiro, C. C.; Silva, J. P. A da. *Sumário Mineral Brasileiro 2018 – Alumínio*. Brasília, DF: Agência Nacional de Mineração, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/economia-mineral/publicacoes/sumario-mineral/pasta-sumario-brasileiro-mineral-2018/aluminio; Associação Brasileira do Alumínio. Mudanças climáticas. São Paulo, [2020]. Disponível em: https://abal.org.br/sustentabilidade/mudancas-climaticas/; Tudo sobre o processo de reciclagem do alumínio. Coppermetal, Capela do Socorro, [2022]. Disponível em: https://www.coppermetal.com.br/blog/reciclagem-de-aluminio/. Acessos em: 30 set. 2024.

Para discutir

1 **Quais procedimentos podemos adotar ao descartar objetos de alumínio para facilitar o processo de reciclagem?** Os objetos de alumínio descartados devem estar isentos de impurezas, separados de outros tipos de material e, se for possível, sem rótulos ou etiquetas.

2 **A lama vermelha é um rejeito perigoso gerado na produção do alumínio a partir da bauxita. No entanto, cientistas estão pesquisando formas de aproveitar esse rejeito na indústria. Pesquise estudos realizados por esses cientistas e escreva quais são as possibilidades de reutilização da lama vermelha no sistema produtivo.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Quais são os fatores citados no texto que demonstram as vantagens da reciclagem do alumínio para o ambiente?** A diminuição da geração de resíduos sólidos, como os constituintes da lama vermelha, e da liberação de gases poluentes para a atmosfera e a economia de energia.

4 **Pesquise por que outros materiais recicláveis não apresentam taxas de reciclagem próximas de 100% como as latas de alumínio. Em seguida, proponha ações por parte da sociedade, das empresas e do poder público para que outros materiais passem a ser reciclados em maior quantidade minimizando o impacto ambiental causado pelo seu descarte.**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
4. b) Semirreação catódica: $2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$; semirreação anódica: $2\ C\ell^-(aq) \rightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$.

1 **Com relação à eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, $CaC\ell_2$, indique:**

a) a semirreação de redução. $Ca^{2+}(\ell) + 2\ e^- \rightarrow Ca(s)$

b) a semirreação de oxidação. $2\ C\ell^-(\ell) \rightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$

c) a equação global. $Ca^{2+}(\ell) + 2\ C\ell^-(\ell) \rightarrow Ca(s) + C\ell_2(g)$

d) a substância produzida no polo negativo. $Ca(s)$

e) a substância produzida no polo positivo. $C\ell_2(g)$

2 **O esquema a seguir ilustra, de forma simplificada, o processo de eletrólise da água, em solução aquosa de sulfato de sódio, com o uso de eletrodos inertes.**

AMJ Studio/ID/BR



Analise o esquema e responda às questões a seguir.

a) Quais são os nomes e as polaridades dos eletrodos em que são formados os gases hidrogênio e oxigênio, respectivamente?
H_2 é formado no cátodo, polo negativo; O_2 é formado no ânodo, polo positivo.

b) Em que sentido se movimentam os íons na solução eletrolítica?
Cátions se movimentam em direção ao cátodo, e ânions, em direção ao ânodo.

c) Qual é o sentido do fluxo de elétrons ao longo do fio condutor? Do ânodo, eletrodo (+), para o cátodo, eletrodo (−).

d) Escreva as semirreações que se processam em cada um dos eletrodos, bem como a equação química global que representa o processo.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Em geral, as medalhas de ouro, utilizadas para premiar atletas em competições esportivas, são constituídas de prata e apenas recobertas com uma fina camada do metal nobre, obtida por deposição eletrolítica. Sobre a superfície de uma medalha de 550 g são depositados, aproximadamente, 6,0 g de ouro.**

Na eletrólise, a medalha cunhada em prata atua como o eletrodo em que o ouro se deposita. A solução eletrolítica é constituída de um sal de ouro(III).

Considere que o processo de eletrólise tenha sido conduzido em uma solução aquosa de ouro(III) contendo excesso de íons cloreto em meio ácido e que no outro eletrodo, constituído de platina, ocorra a formação de gás cloro.

a) Para este processo, indique:

- a polaridade do cátodo e do ânodo;
- qual eletrodo corresponde à medalha;
- qual eletrodo é constituído de platina;
- em qual eletrodo ocorre a formação de gás cloro e em qual ocorre a deposição de ouro.

b) Escreva as semirreações que se processam em cada um dos eletrodos.

4 **A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletrolítica, como a ilustrada a seguir.**

Reinaldo Vignati/ID/BR



Cores-fantasia.

Analise a célula eletrolítica representada para fazer o que se pede:

a) Que espécies são atraídas para o cátodo e para o ânodo da célula eletrolítica? Quais efetivamente descarregam? Explique.

b) Escreva as semirreações que se processam no cátodo e no ânodo da célula eletrolítica.

c) Qual solução alcalina é obtida a partir do dreno? Explique sua obtenção.
4. c) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 **O alumínio é um metal amplamente utilizado em inúmeros setores. Sua resistência à corrosão é devida à camada aderente e impermeável de óxido que se forma sobre a superfície do metal. Essa camada protetora pode se tornar mais espessa por meio de um processo denominado anodização (figura a seguir). Nesse processo, a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico gera, em um dos eletrodos, o gás oxigênio. Este reage com o alumínio formando o óxido correspondente.**

Reinaldo Vignati/ID/BR



Cores-fantasia.

3. a) O ânodo (+) é formado pelo eletrodo de platina e é onde ocorre a formação do $C\ell_2(g)$. O cátodo (−) é formado pela medalha de prata e é onde ocorre a deposição do ouro.
3. b) Semirreação catódica: $Au^{3+}(aq) + 3\ e^- \rightarrow Au(s)$; semirreação anódica: $2\ C\ell^-(aq) \rightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$.

Não escreva no livro.

5. b) No ânodo, ocorre oxidação da água: $2\ H_2O(\ell) \rightarrow O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^-$.
O gás oxigênio, produzido na oxidação da água, reage com o alumínio (peça) produzindo óxido de alumínio: $4\ A\ell(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ A\ell_2O_3(s)$.

Com base nessas informações, responda:

a) Em qual eletrodo o gás oxigênio é formado: no cátodo ou no ânodo? O gás oxigênio é formado no ânodo, que é a própria peça de alumínio.

b) Explique, utilizando as equações químicas adequadas, a formação de óxido de alumínio sobre a peça a ser anodizada.

c) Escreva a semirreação que justifica a formação de gás hidrogênio junto ao eletrodo de grafite.
$2\ H^+(aq) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g)$

6 **A obtenção industrial de alumínio é feita a partir da bauxita, que deve ser purificada para se obter óxido de alumínio. Em seguida, o óxido é misturado com criolita ($Na_3A\ell F_6$) e submetido à eletrólise. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafite ou carvão, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafite. Durante o processo, junto ao ânodo há formação de gás carbônico. Um diagrama da eletrólise está representado a seguir.**



Reinaldo Vignati/ID/BR

Cores-fantasia.

Sobre o processo de obtenção do alumínio, faça o que se pede:

a) Escreva a semirreação que ocorre junto ao eletrodo positivo de grafite e a equação química que justifica a formação de gás carbônico sobre sua superfície.

b) Em qual eletrodo o alumínio é obtido: no cátodo ou no ânodo? Escreva a semirreação que representa sua obtenção.

7 **Uma das formas de obtenção industrial do magnésio metálico é sua extração da água do mar. Isola-se o magnésio na forma de $MgC\ell_2$ da água do mar e, em seguida, realiza-se uma eletrólise ígnea. Sobre a reação de eletrólise, pode-se afirmar que o magnésio:**

a) é produzido no polo negativo. Alternativa **a**.

b) é obtido no ânodo.

c) obtido está na forma de Mg^{2+}.

d) é obtido por meio de uma reação de combustão.

8 **Para pratear eletroliticamente um objeto de ferro, passa-se uma corrente elétrica através de solução aquosa contendo íons Ag^+, em geral cianeto de prata, durante determinado período. Nessa solução são mergulhadas a peça metálica a ser prateada e uma barra de prata. No decorrer do processo, a prata se deposita sobre a peça de ferro.**



Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Cores-fantasia.

a) Indique o cátodo e o ânodo do processo.
Peça de ferro: cátodo (+); eletrodo de prata: ânodo (−).

b) Escreva a semirreação que se processa no cátodo.
$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$

c) Escreva a semirreação que se processa no ânodo.
$Ag(s) \rightarrow Ag^+(aq) + e^-$

d) Qual é o sentido do movimento dos íons prata na célula eletrolítica? Do ânodo para o cátodo.

9 **Muitas bijuterias de latão (liga metálica de cobre e estanho) recebem uma camada de ouro por eletrodeposição. O esquema a seguir representa uma célula eletrolítica que contém solução aquosa de nitrato de ouro(III) e dois eletrodos: a peça sobre a qual se deseja efetuar a eletrodeposição e um eletrodo de ouro, utilizado para a douração de uma peça de latão.**



Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Cores-fantasia.

a) Escreva a semirreação que se processa no cátodo.
$Au^{3+}(aq) + 3\ e^- \rightarrow Au(s)$

b) Escreva a semirreação que se processa no ânodo.
$Au(s) \rightarrow Au^{3+}(aq) + 3\ e^-$

c) Que mudanças seriam observadas no esquema caso o eletrodo de ouro fosse substituído por um eletrodo inerte de platina? Que reação ocorreria no ânodo? Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6. a) Semirreação de oxidação: $2\ O^{2-}(\ell) \rightarrow O_2(g) + 4\ e^-$; reação entre o eletrodo e o gás oxigênio: $C(graf) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$.
b) Alumínio metálico é obtido no cátodo. Semirreação catódica: $A\ell^{3+}(aq) + 3\ e^- \rightarrow A\ell(s)$.

Não escreva no livro.

ESTUDO DE CASO

A MANUTENÇÃO DA ESTÁTUA DA LIBERDADE

Localizada em uma pequena ilha em Nova York, a Estátua da Liberdade é um símbolo estadunidense icônico e conhecido mundialmente. Ela foi um presente do povo da França em celebração ao relacionamento entre os dois países, bem como ao aniversário de 100 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (EUA).

Em 1885, a estátua chegou desmontada aos EUA de navio, com suas partes armazenadas em caixas. Sua carapaça é composta de chapas de cobre moldadas e extremamente finas, com cerca de 2,4 mm de espessura. Em seu interior, há uma enorme escada em espiral, de onde os visitantes, ao subirem, podem observar as vigas de ferro que sustentam as chapas de cobre.

Assim que foi construída, a Estátua da Liberdade apresentava a notável coloração avermelhada do cobre. No entanto, por estar sujeita ao vento, à maresia e à poluição, após cerca de 20 anos, ela adquiriu a famosa cor esverdeada atual, devido à oxidação.

Durante o lento processo de oxidação, o cobre metálico reage com o gás oxigênio do ar, formando óxido de cobre(II) que, posteriormente, reage com vapor de água, produzindo hidróxido de cobre(II). Ainda em contato com o ar, o hidróxido de cobre(II) reage com gás carbônico atmosférico e, finalmente, gera um dos principais compostos que dão a cor verde à estátua: o carbonato de cobre(II).



Michelangelo DeSantis/Shutterstock.com/ID/BR

A Estátua da Liberdade está localizada na ilha da Liberdade, na cidade de Nova York (EUA). Foto de 2024.

Davi Carneiro/Shutterstock.com/ID/BR

Interior da Estátua da Liberdade. Foto de 2023.

Não escreva no livro.

1 **Escreva as equações químicas das três reações descritas no texto, identificando qual(is) delas é(são) de oxirredução.**

Tanto o óxido quanto o hidróxido e o carbonato de cobre(II) são insolúveis em água e formam uma fina camada que impede o contato do cobre metálico com os agentes oxidantes presentes no ambiente, impedindo que a parte externa da estátua se deteriore mais. No entanto, esse não é o caso da estrutura interna. Diferentemente do cobre, o ferro, quando oxida, forma uma massa amorfa que pode se desprender da barra metálica, gerando perdas significativas do metal ao longo do tempo.

2 **Sabendo que a oxidação do ferro na presença de gás oxigênio (O_2) gera o óxido de ferro, em que o elemento metálico tem seu maior número de oxidação, escreva a equação química responsável pela formação da ferrugem, indicando o agente oxidante e o agente redutor do processo.**

Internamente, os pontos de conexão entre as partes de ferro e cobre são os mais prejudicados. Para prender as barras de ferro à casca de cobre da estátua, foram utilizadas selas e rebites também de cobre. Incluiu-se uma camada isolante para que o ferro e o cobre metálico não entrassem em contato. No entanto, essa camada foi se deteriorando com o tempo, permitindo o contato dos dois metais. Devido ao processo chamado de corrosão galvânica, a oxidação do ferro foi acelerada. Esse tipo de corrosão ocorre quando dois metais estão em contato um com o outro em um ambiente oxidante, gerando uma célula eletroquímica, onde um metal age como cátodo e o outro age como ânodo.

3 **Na corrosão galvânica que ocorreu com o contato entre as vigas de ferro e as chapas de cobre da Estátua da Liberdade, identifique qual é o ânodo e qual é o cátodo da célula galvânica.**

4 **Converse com os colegas sobre a relação entre a corrosão galvânica e a utilização de metais de sacrifício na proteção contra corrosão de metais. Em seguida, escreva um parágrafo relatando suas conclusões sobre o tema.**

Além das perdas de massa de ferro, que deixam barras mais frágeis, a formação de ferrugem aumentou com o volume das vigas na região do contato com o cobre, fazendo com que as selas e as chapas sofressem deformações e, em alguns casos, o desprendimento dos rebites. Por isso, recentemente, o monumento sofreu uma série de reformas para a manutenção da estrutura interna da estátua, onde foram trocadas as vigas de ferro mais oxidadas e refeitas as camadas isolantes.

1. I. $2\ Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ CuO(s)$
II. $CuO(s) + H_2O(g) \rightarrow Cu(OH)_2(s)$
III. $Cu(OH)_2(s) + CO_2(g) \rightarrow CuCO_3(s) + H_2O(\ell)$
Apenas a reação **I** é de oxirredução.

2. $4\ Fe(s) + 3\ O_2(g) + 6\ H_2O(g) \rightarrow 4\ Fe(OH)_3(s)$
O Fe(s) é o agente redutor e o $O_2(g)$ é o agente oxidante.

3. As vigas de ferro formam o ânodo, e as chapas de cobre formam o cátodo.

4. Resposta pessoal. Os metais de sacrifício são usados em estruturas sujeitas a corrosão. Para proteger essa estrutura, metais com potencial de oxidação maior do que os constituintes da estrutura são colocados apenas na quantidade suficiente para suprir essa estrutura com elétrons, evitando a oxidação.

Representação do processo de deformação das chapas de cobre provocado pelo enferrujamento das vigas de ferro. Cores-fantasia.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Fonte de pesquisa: Reclothing the First Lady of Metals – Repair Details. Copper Development Association Inc. Disponível em: https://copper.org/education/liberty/liberty_reclothed2.php. Acesso em: 30 set. 2024.

QUESTÕES GLOBAIS

1. Na superfície do alumínio, forma-se uma camada de óxido de alumínio, que é pouco reativo e adere ao metal, protegendo-o da maresia (oxidante), ao contrário do que ocorre no caso da "ferrugem", que apresenta baixa aderência ao ferro metálico.

1 **Leia o trecho de texto a seguir.**

> A chamada maresia caracteriza-se pela grande quantidade de íons cloretos presentes na atmosfera marinha. [...] quando carregada pelos ventos ou pela impulsão provocada pela própria arrebentação, [a maresia] interage com os materiais expostos na orla de diversas maneiras.
>
> Sobre os metais, a maresia age desfavoravelmente: nas esquadrias de alumínio, aparecem pontos de ataque, com o surgimento de uma oxidação branca em alguns casos, que indica um desgaste localizado; nos aços e ligas de ferro, em geral, o ataque é muito mais severo, ocorrendo ferrugens frágeis, que podem ser destacadas com pequeno esforço [...].
>
> MIRANDA, L. R. de. Qual o efeito da maresia sobre os materiais usados na construção de casas próximas à costa? *Ciência Hoje*, n. 171, maio 2001. Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/qual-o-efeito-da-maresia-sobre-os-materiais-usados-na-construcao-de-casas-proximas-a-costa/. Acesso em: 30 set. 2024.

- Explique a diferença entre o efeito da maresia sobre o alumínio e sobre o ferro.

2 **(Uerj) Óculos com lentes fotocromáticas escurecem com o aumento da luminosidade ambiente. Em certas lentes esse processo ocorre devido aos cristais de cloreto de cobre(I) e cloreto de prata adicionados ao vidro. Quando a luminosidade aumenta, um elétron do ânion cloreto é transferido para o cátion prata, formando-se átomos de prata que produzem o escurecimento do vidro.**

Quando a luminosidade diminui, o clareamento do vidro ocorre segundo o processo abaixo.

$$\text{Etapa I: } C\ell + Cu^{+} \longrightarrow Cu^{2+} + C\ell^{-}$$
$$\text{Etapa II: } Cu^{2+} + Ag \longrightarrow Cu^{+} + Ag^{+}$$

No processo de clareamento do vidro fotocromático, os átomos de cloro e prata comportam-se, respectivamente, como: Alternativa **b**.

a) redutor e redutor.
b) oxidante e redutor.
c) redutor e oxidante.
d) oxidante e oxidante.

3 **(Enem) Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa.** Alternativa **b**.

SANTANA, V. M. S. A leitura e a química das substâncias. *Cadernos PDE*. Ivaiporã Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); Universidade Estadual de Londrina, 2010 (adaptado).

Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode

a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento.
b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento.
c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento.
d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento.
e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento.

4. Na camada superior, o Nox do N é +5, enquanto na camada inferior o Nox do N é +3. Os Nox da camada superior são maiores devido ao contato do gás oxigênio do ar, um forte agente oxidante, favorecendo a oxidação das espécies.

4 **(UFRJ) A análise da água de uma lagoa revelou a existência de duas camadas com composições químicas diferentes, como mostra o desenho a seguir.**

UFRJ. Fac-símile: ID/BR



Indique o número de oxidação do nitrogênio em cada uma das camadas da lagoa e apresente a razão pela qual alguns elementos exibem diferença de Nox entre as camadas.

5 **(Enem) A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), $CuSO_4$, com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais-padrão de redução ($E°$) para algumas semirreações de redução.**

Não escreva no livro.

Semirreação de redução	Potencial padrão de redução, $E°$(V)
$Ca^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Ca$	−2,87
$Fe^{3+} + 3e^- \longrightarrow Fe$	−0,04
$Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$	+0,34
$Cu^{+} + e^- \longrightarrow Cu$	+0,52
$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0,77

MOTTA, I. S. *Calda bordalesa*: utilidades e preparo. Dourados: Embrapa, 2008 (adaptado).

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é: Alternativa **e**.

a) $Ca^{2+}(aq) + 2\,Cu^{+}(aq) \longrightarrow Ca(s) + Cu^{2+}(s)$

b) $Ca^{2+}(aq) + 2\,Fe^{2+}(aq) \longrightarrow Ca(s) + 2\,Fe^{3+}(aq)$

c) $Cu^{2+}(aq) + 2\,Fe^{2+}(aq) \longrightarrow Cu(s) + 2\,Fe^{3+}(aq)$

d) $3\,Ca^{2+}(aq) + 2\,Fe(s) \longrightarrow Ca(s) + 2\,Fe^{3+}(aq)$

e) $3\,Cu^{2+}(aq) + 2\,Fe(s) \longrightarrow 3\,Cu(s) + 2\,Fe^{3+}(aq)$

6 **(UFC-CE)** As estátuas de metal, em geral confeccionadas em cobre metálico, apresentam coloração típica. Com o passar do tempo, todavia, observa-se o aparecimento de uma coloração verde que é atribuída ao produto da reação de oxidação do cobre pelo ar. Considerando que tintas protetoras contendo metal podem funcionar como ânodo de sacrifício e conhecendo-se o valor do potencial-padrão de redução da reação $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$; $E° = +0{,}34$ V, analise a tabela abaixo. Alternativa **e**.

Tinta	Metal presente na tinta	Semirreação de redução	Potencial padrão de redução, $E°$(V)
I	Pb	$Pb^{4+} + 2\,e^- \longrightarrow Pb^{2+}$	+1,67
II	Zn	$Zn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Zn$	−0,76
III	Sn	$Sn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Sn$	−0,14
IV	Fe	$Fe^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Fe$	−0,44
V	Ti	$Ti^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Ti$	−1,63

Considerando somente as informações contidas na questão, assinale a alternativa que apresenta a tinta mais eficaz na proteção de uma estátua de cobre.

a) Tinta I
b) Tinta II
c) Tinta III
d) Tinta IV
e) Tinta V

7 **(Fuvest-SP)** O cientista e escritor Oliver Sacks, em seu livro *Tio Tungstênio*, nos conta a seguinte passagem de sua infância:

> Ler sobre [Humphry] Davy e seus experimentos estimulou-me a fazer diversos outros experimentos eletroquímicos... Devolvi o brilho às colheres de prata de minha mãe colocando-as em um prato de alumínio com uma solução morna de bicarbonato de sódio [$NaHCO_3$].

Pode-se compreender o experimento descrito, sabendo-se que:

- objetos de prata, quando expostos ao ar, enegrecem devido à formação de Ag_2O e Ag_2S (compostos iônicos);
- as espécies químicas Na^+, $A\ell^{3+}$ e Ag^+ têm, nessa ordem, tendência crescente para receber elétrons.

Assim sendo, a reação de oxirredução, responsável pela devolução do brilho às colheres, pode ser representada por: Alternativa **a**.

a) $3\,Ag^+ + A\ell \longrightarrow 3\,Ag + A\ell^{3+}$

b) $3\,Ag + A\ell^{3+} \longrightarrow 3\,Ag^+ + A\ell$

c) $Ag + Na^+ \longrightarrow Ag^+ + Na$

d) $A\ell + 3\,Na^+ \longrightarrow A\ell^{3+} + 3\,Na$

e) $3\,Na + A\ell^{3+} \longrightarrow 3\,Na^+ + A\ell$

8 **(Enem)** [...] Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniell como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca, e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água [...]

Fonte: SACKS, O. *Tio Tungstênio*: memórias de uma infância química. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.

O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na

a) obtenção de ouro a partir de pepitas. Alternativa **c**.

b) obtenção de calcário a partir de rochas.

c) obtenção de alumínio a partir da bauxita.

d) obtenção de ferro a partir de seus óxidos.

e) obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio.

9 **(UFSCar-SP)** A figura apresenta a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de níquel(II), $NiC\ell_2$.

São dadas as semirreações de redução e seus respectivos potenciais:



UFSCar-SP. Fac-símile: ID/BR

$C\ell_2(g) + 2\,e^- \longrightarrow 2\,C\ell^-(aq)$ $\quad E° = 1{,}36$ V

$Ni^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Ni(s)$ $\quad E° = -0{,}24$ V

a) Indique as substâncias formadas no ânodo e no cátodo. Justifique.

b) Qual deve ser o mínimo potencial aplicado pela bateria para que ocorra a eletrólise? Justifique.

9. a) No ânodo, ocorre a oxidação, formando o gás $C\ell_2$; no cátodo, ocorre a redução, formando o metal Ni.
b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

EQUILÍBRIOS QUÍMICOS

Escalar montanhas pode ser um grande desafio para o corpo humano. Em altitudes elevadas, o ar é rarefeito, ou seja, apresenta menor concentração de gases, estando sob baixa pressão, por isso os alpinistas necessitam de um período de aclimatação, a fim de minimizar os efeitos da baixa quantidade de oxigênio disponível que entra nos pulmões. No corpo humano, o transporte de oxigênio é regulado pelo equilíbrio entre a hemoglobina e a oxiemoglobina.

Nesta unidade, você vai estudar como um equilíbrio químico se comporta diante de alterações no sistema, como ele pode ser modificado por condições, como de temperatura e pressão, e como ele está relacionado a diferentes grupos de substâncias.

OBJETIVOS

- Compreender o equilíbrio químico e determinar suas constantes.
- Reconhecer ácidos e bases, seus equilíbrios em solução aquosa, pH e sistema-tampão.
- Aplicar os conhecimentos de pH no cotidiano.
- Investigar o pH de soluções por meio de simulador.
- Reconhecer o funcionamento de um sistema-tampão.
- Compreender o conceito de equilíbrios heterogêneos e determinar o produto de solubilidade.
- Investigar a influência da temperatura na solubilidade de sais em um experimento.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. O equilíbrio químico, além de garantir o bom funcionamento do corpo humano, também pode afetar o rendimento na fabricação de produtos industriais ou o pH de sistemas aquosos. Sabendo disso, elabore uma hipótese sobre como a variação de um equilíbrio pode ser prejudicial para a economia ou para o meio ambiente.
2. Os conhecimentos científicos sobre equilíbrio químico e pH são muito importantes para questões ambientais, como no estudo da acidificação dos oceanos. Contudo, algumas pessoas utilizam esses conhecimentos para adulterar produtos, como o leite com prazo de validade vencido. Qual sua opinião sobre atitudes como essa? O que pode ser feito para combater essas ações negativas?

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.
2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Alpinistas chegando ao cume do Everest, no Nepal. Foto de 2021.

Vixit/Shutterstock.com/ID/BR

6

1 Estado de equilíbrio

2 Equilíbrios ácido-base

3 Equilíbrios em sistemas heterogêneos

1. São reações que ocorrem em dois sentidos simultaneamente, ou seja, no sentido direto e no sentido inverso.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ESTADO DE EQUILÍBRIO

PARA COMEÇAR

1. O que são reações reversíveis?
2. O que você entende por estado de equilíbrio?
3. Quais são as características de um sistema em equilíbrio?

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

RECONHECENDO OS EQUILÍBRIOS QUÍMICOS

Lentes fotocromáticas são muito procuradas por atletas, pois se adaptam às variações de luminosidade do ambiente e, desse modo, protegem a visão e ajudam a melhorar o desempenho nas atividades ao ar livre.

O escurecimento dessas lentes e outros processos são regulados pelos equilíbrios químicos – no caso das lentes fotocromáticas, envolve haletos de prata e luz solar.

Essas lentes são compostas de cristais que combinam halogênios (cloro, bromo ou iodo) com prata. Esse processo pode ser representado por:

$$2\ AgC\ell(s) \overset{h\upsilon}{\rightleftharpoons} 2\ Ag(s) + C\ell_2(g)$$

Os haletos de prata são transparentes e sensíveis à radiação ultravioleta que compõe a luz do Sol. Ao entrarem em contato com a luz solar ($h\upsilon$), ocorre a formação da prata metálica, o que torna a lente escura. Com a diminuição da luminosidade em que o sistema se encontra, há o favorecimento da formação do cloreto de prata e ocorre o clareamento da lente fotocromática.

Representação sem proporção de tamanho.

Lentes fotocromáticas escurecem ou clareiam rapidamente com a variação da luminosidade.

Yuri Arcurs/Alamy/Fotoarena

Reinaldo Vignati/ID/BR

Não escreva no livro.

Processos reversíveis

A dissolução é considerada um processo reversível. À medida que um sólido começa a se dissolver em um solvente, a concentração de partículas do soluto na solução aumenta, assim como suas chances de colisão com a superfície do sólido. Essas colisões podem fazer com que partículas de soluto se liguem novamente ao sólido, ocorrendo um processo chamado cristalização.

Essa situação pode ser descrita genericamente pelo esquema a seguir. Note que a dupla semisseta (⇌) representa um processo reversível e um sistema químico em equilíbrio.

$$\text{soluto} + \text{solvente} \underset{\text{cristalizar}}{\overset{\text{dissolver}}{\rightleftharpoons}} \text{solução}$$

Na natureza, há muitos sistemas em equilíbrio que, se perturbados, podem ocasionar sérios problemas ambientais. Como exemplo, pode-se citar o processo de formação das estalactites e estalagmites, o qual é reversível e depende da entrada e da saída de $CO_2(g)$ que se mistura na água da chuva.

O carbonato de cálcio ($CaCO_3$) reage com uma mistura de $H_2O(\ell)$ e $CO_2(aq)$ dissolvido, formando os íons Ca^{2+} e HCO_3^-. O dióxido de carbono pode deixar o sistema pela evaporação da água e, nesse caso, a reação de formação de carbonato de cálcio ($CaCO_3$) fica mais favorecida. Esse sistema em equilíbrio pode ser representado pela equação:

$$CaCO_3(s) + CO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\,HCO_3^-(aq)$$



AMJ Studio/ID/BR

Representação de reações reversíveis que ocorrem no processo de formação das estalactites e estalagmites. Cores-fantasia.

Stumpf, C. F.; Ribeiro, T. G. R. Formação de espeleotemas de sal como proposta de conscientização ambiental por meio da educação não formal em Geociências. *Terrae Didática*, v. 14, n. 4, out. 2018. Disponível em: https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v14_4/PDF14_4/TD144-284-17.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.

EQUILÍBRIO QUÍMICO

Um sistema em equilíbrio é identificado por algumas características importantes e obrigatórias:

- tanto a matéria quanto a energia permanecem constante, ou seja, o sistema é fechado.
- as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo; isso se dá porque, submicroscopicamente, as reações químicas ocorrem simultaneamente em ambos os sentidos e com a mesma rapidez, ou seja, o equilíbrio é dinâmico.

Para um sistema qualquer, o equilíbrio pode ser representado por

$$A + B \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightleftharpoons}} C + D$$

A rapidez varia do início da reação até atingir a situação de equilíbrio. O gráfico a seguir representa essa situação. Reação direta é aquela indicada na equação anterior pela semisseta da esquerda para a direita. A reação inversa é indicada pela semisseta da direita para a esquerda.

VARIAÇÃO DA RAPIDEZ DAS REAÇÕES EM FUNÇÃO DO TEMPO



O equilíbrio ocorre quando a rapidez da reação direta se iguala à rapidez da reação inversa.

Considerando a variação das concentrações dos reagentes e dos produtos, tem-se:

VARIAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO



Ao atingir a situação de equilíbrio, a concentração de todas as espécies envolvidas permanece inalteradas.

Os gráficos anteriores se referem a um sistema que, inicialmente, apresentava somente as substâncias **A** e **B** (reagentes). A rapidez de formação de **C** e **D**, maior no instante inicial, vai decrescendo com o passar do tempo. Isso ocorre porque a concentração dos reagentes vai diminuindo. A rapidez da reação inversa, que inicialmente era zero, vai aumentando.

O equilíbrio é atingido quando a rapidez da reação direta se iguala à rapidez da reação inversa.

1. a) $2\ NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$
b) Com a formação de gases, a pressão do sistema aumenta até que o equilíbrio seja atingido.
c) Não. No equilíbrio, as reações de decomposição do bicarbonato de sódio (com formação de dióxido de carbono) e de formação de bicarbonato de sódio ocorrem com a mesma rapidez.

ROTEIRO

1. O $NaHCO_3$ (bicarbonato de sódio) é uma substância sólida. Considere a sua decomposição por aquecimento em sistema fechado, formando carbonato de sódio, água e dióxido de carbono.

a) Equacione a reação envolvida.

b) O que deve ocorrer com a pressão do sistema até que o equilíbrio seja atingido?

c) Pode-se dizer que, uma vez estabelecido o equilíbrio, não haverá mais formação de dióxido de carbono? Justifique.



Não escreva no livro.

Equilíbrios homogêneos e equilíbrios heterogêneos

Os equilíbrios químicos podem ter todos os reagentes e produtos na mesma fase, como é o caso da reação de obtenção de amônia do gás nitrogênio e do gás hidrogênio.

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$$

Eles são chamados **equilíbrios homogêneos**.

Por sua vez, os **equilíbrios heterogêneos**, como o que está equacionado a seguir, apresentam reagentes e produtos em fases diferentes.

$$2\ NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$$

A seguir, apresentamos mais exemplos de equilíbrios heterogêneos.

Em **A**, a reação entre soluções aquosas de ácido clorídrico e de nitrato de prata forma precipitado branco de cloreto de prata.

$$HC\ell(aq) + AgNO_3(aq) \rightleftharpoons AgC\ell(s) + HNO_3(aq)$$

Em **B**, a reação entre soluções aquosas de sulfato de cobre(II) e hidróxido de sódio forma precipitado azul de hidróxido de cobre(II).

$$CuSO_4(aq) + 2\ NaOH(aq) \rightleftharpoons Na_2SO_4(aq) + Cu(OH)_2(s)$$

Em **C**, a reação de sulfato de ferro(III) com hidróxido de sódio forma precipitado castanho-avermelhado de hidróxido de ferro(III).

$$Fe_2(SO_4)_3(aq) + 6\ NaOH(aq) \rightleftharpoons 3\ Na_2SO_4(aq) + 2\ Fe(OH)_3(s)$$

Nos equilíbrios heterogêneos, reagentes e produtos nos estados sólido e líquido não interferem na situação de equilíbrio quando a quantidade deles varia, porque a concentração de cada um em mol/L equivale também à densidade, que é sempre a mesma. Seja o esquema representado a seguir.

	I	II	III
Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.	ID/BR 12 g de carbono (1 mol)	ID/BR 24 g de carbono (2 mol)	ID/BR 48 g de carbono (4 mol)
Volume ocupado pelo C(s)	$V = 6 \cdot 10^{-3}$ L	$V = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ L	$V = 2{,}4 \cdot 10^{-2}$ L

Por meio do cálculo das densidades e das concentrações, conclui-se que as concentrações são constantes.

Situação	Concentração	Densidade
I	$1{,}0\ mol/6 \cdot 10^{-3}\ L = 167\ mol/L$	2,0 kg/L
II	$2{,}0\ mol/1{,}2 \cdot 10^{-2}\ L = 167\ mol/L$	2,0 kg/L
III	$4{,}0\ mol/2{,}4 \cdot 10^{-2}\ L = 167\ mol/L$	2,0 kg/L



Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Sérgio Dotta Jr./ID/BR



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Nas imagens estão representadas as seguintes reações: (**A**) reação entre soluções aquosas de ácido clorídrico e de nitrato de prata; (**B**) reação entre soluções aquosas de sulfato de cobre(II) e de hidróxido de sódio; (**C**) reação entre soluções aquosas de sulfato de ferro(III) e de hidróxido de sódio.

Estabelecendo o equilíbrio químico

Em uma reação reversível, o equilíbrio químico é atingido quando a rapidez da reação direta e da reação inversa se tornam numericamente iguais, fazendo com que a concentração dos reagentes e dos produtos se mantenha constante. Mas como demonstrar esse processo de forma simplificada?

Nesta atividade, você e os colegas vão usar uma analogia para analisar a trajetória de uma reação química hipotética até seu equilíbrio.

Material

- 1 béquer de 100 mL
- 1 caneta para escrever no vidro
- 2 béqueres de 1 L
- 2 béqueres de 50 mL
- água
- corante alimentício

Como fazer

Parte I

1. Copiem as tabelas 1 e 2 no caderno.

TABELA 1: VOLUME DE ÁGUA INICIAL E FINAL NOS BÉQUERES *A* E *B*		
Situação	**Béquer *A***	**Béquer *B***
Volume inicial aproximado (mL)	//	//
Volume final aproximado (mL)	//	//

TABELA 2: VOLUME DE ÁGUA TRANSFERIDO EM CADA ETAPA		
Etapa	**Volume aproximado transferido de *A* para *B* (mL)**	**Volume aproximado transferido de *B* para *A* (mL)**
1	//	//
2	//	//
3	//	//
4	//	//

2. Marquem um dos béqueres de 1 L com a letra **A** e o outro com a letra **B**. Posicionem-nos lado a lado.

3. Coloquem cerca de 750 mL de água e 6 gotas de corante alimentício no béquer **A** (figura 1). No béquer **B**, adicionem 250 mL de água e 2 gotas de corante. O volume de água com corante contida nos béqueres **A** e **B** representará a concentração de reagentes e de produtos, respectivamente. Completem a tabela 1 com o volume inicial aproximado em cada um dos béqueres.



Mar de Palha/D/BR

Figura 1.

Não escreva no livro.

4. Você e os colegas farão a demonstração da analogia do andamento da reação, cada um com um béquer de 50 mL. Você vai mergulhar um dos béqueres de 50 mL no recipiente **A**, enchendo-o com a maior quantidade de água possível, sem inclinar o béquer grande. Seu colega deve fazer o mesmo simultaneamente no béquer **B** (figura 2).
5. Mostrem aos demais colegas os béqueres pequenos, para que todos possam ver a quantidade de água coletada em cada recipiente. Utilizem a graduação dos béqueres de 50 mL para estimar o volume de água que eles contêm.
6. Registrem esses valores na tabela 2 e, em seguida, despejem no béquer **A** o conteúdo coletado no béquer **B**, e vice-versa, lembrando que todos os movimentos devem ser feitos por vocês ao mesmo tempo (figura 3).
7. Repitam os passos 4 e 6, registrando na tabela 2 os volumes aproximados transferidos em cada etapa, até que as quantidades de líquido transferidas sejam constantes, o que representa que as velocidades de formação de **A** e **B** são iguais. Se necessário, acrescentem mais linhas à tabela 2.
8. Então, comparem as quantidades de água nos béqueres **A** e **B** e anotem na tabela 1 o volume aproximado final em **A** e **B**.



Mar de Palha/ID/BR

Figura 2.



Mar de Palha/ID/BR

Figura 3.

Parte II

1. Refaçam o procedimento, completando novas tabelas, mas desta vez iniciem com cerca de 750 mL de água com corante no béquer **A** e deixem o béquer **B** vazio (figura 4). Além disso, utilizem o béquer de 50 mL para transferir o líquido de **B** para **A** e passem a utilizar um béquer de 100 mL para fazer a transferências de **A** para **B**. Lembrem-se de encher os béqueres pequenos com a maior quantidade de água possível e de reportar aos demais colegas o quanto foi coletado.



Mar de Palha/ID/BR

Figura 4.

Para concluir

1 **Nessa demonstração, utilizou-se uma analogia para uma reação química reversível. Qual equação química não balanceada caracteriza essa reação? O que as transferências de água dos béqueres A para B e de B para A representam?**

2 **Na parte I, a quantidade de água transferida de A para B e de B para A foram iguais em cada etapa? O que isso representa? Qual fator influencia na quantidade de água transferida em cada etapa? Descreva utilizando os dados coletados.**

3 **Na analogia, em que momento as reações das partes I e II atingem o equilíbrio?**

4 **Na parte II, um dos béqueres utilizados para a transferência era de 100 mL e o outro era de 50 mL; na parte I, ambos os béqueres tinham capacidade de 50 mL. Como essa alteração modificou o experimento e o que representa o tamanho dos béqueres de transferência no experimento?**

5 **O valor da constante de equilíbrio é maior na parte I ou na parte II? Considerando que a reação química é a mesma em ambas as partes, que alteração hipotética poderia ter causado essa variação na constante de equilíbrio? Explique.**

1. A equação que descreve a reação química é $A \rightleftharpoons B$. A transferência de água do béquer **A** para o béquer **B** representa a reação química em que **A** se transforma em **B** ($A \rightarrow B$), enquanto a transferência de água do béquer **B** para o béquer **A** representa a transformação de **B** em **A** ($B \rightarrow A$).

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3. Na etapa em que as quantidades transferidas atingem um valor que se mantém constante nas etapas posteriores.

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

CONSTANTES DE EQUILÍBRIO

As constantes de equilíbrio, representadas por *K*, são determinadas por dados experimentais. Após a análise de uma grande quantidade de dados, chegou-se a uma expressão genérica para todos os equilíbrios:

$$K = \frac{[\text{produtos}]^a}{[\text{reagentes}]^b}$$

Nessa expressão, **a** e **b** são os coeficientes estequiométricos do produto e do reagente, respectivamente, na equação balanceada.

Para o equilíbrio a 425 °C de

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI(g)$$

a tabela a seguir apresenta como os valores das constantes são obtidos. Note que o coeficiente estequiométrico da substância se converte em expoente de sua concentração no cálculo da constante.

Experimento	Concentração no equilíbrio (mol/L)			$\frac{[HI]^2}{[H_2]^1 \cdot [I_2]^1}$
	$[H_2]$	$[I_2]$	[HI]	
I	0,0213	0,0213	0,1573	54,5
II	0,0427	0,0427	0,3148	54,3
III	0,0320	0,0320	0,2360	54,4
IV	0,0266	0,0266	0,1968	54,7
				Média = 54,5

Tabela elaborada para fins didáticos.

As concentrações de H_2, I_2 e HI são diferentes para cada experimento, mas a relação entre elas, dada por $\frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]}$, apresenta praticamente o mesmo valor, desde que mantida a temperatura. Essa expressão é denominada **lei do equilíbrio químico**.

A expressão da lei do equilíbrio químico, ou da **lei da ação das massas**, foi proposta pela primeira vez em 1863 pelos químicos noruegueses Cato Guldberg (1836-1902) e Peter Waage (1833-1900) e pode ser escrita para qualquer equilíbrio químico. A seguir são apresentados alguns exemplos.

$$2\ NO(g) + C\ell_2(g) \rightleftharpoons 2\ NOC\ell(g)$$

$$K = \frac{[NOC\ell]^2}{[NO]^2 \cdot [C\ell_2]}$$

$$2\ CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ CO_2(g)$$

$$K = \frac{[CO_2]^2}{[CO]^2 \cdot [O_2]}$$

$$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$$

$$K = \frac{[Fe^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$$

Espécies em fase sólida não são representadas porque não interferem no estado de equilíbrio.

Estudos a respeito da afinidade química

O título deste boxe refere-se ao trabalho original de Guldberg e Waage, *Studies concerning affinity*, publicado em norueguês, em 1864, e que, na época, teve pouca divulgação.

Nesse primeiro trabalho, eles sugeriram que, em uma reação como

$$A + B \rightleftharpoons A' + B',$$

a "afinidade química" ou a "força de reação" entre **A** e **B** não dependia somente da natureza química dos reagentes, mas também da quantidade dos reagentes na mistura reacional.

Portanto, a **lei da ação das massas** foi assim estabelecida: quando duas substâncias, **A** e **B**, reagem juntas em dada temperatura, em uma reação de substituição, a afinidade, ou força química entre elas, é proporcional às massas ativas **[A]** e **[B]**, cada uma elevada a uma força particular:

$$\text{Afinidade} = \alpha[A]^a[B]^b$$

Os termos α, **a** e **b** são constantes que, nas mesmas condições, dependem somente da natureza das substâncias.

O termo "massas ativas" foi definido, em um artigo posterior a 1879, como "a quantidade de substância na esfera da ação", ou seja, do sistema em equilíbrio.

Não escreva no livro.

Constantes de equilíbrio em termos de concentração (K_c)

As constantes de equilíbrio determinadas com base nas concentrações, em mol/L, são representadas por K_C. Para o equilíbrio

$$CO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s) + H_2O(\ell),$$

representa-se assim a expressão de K_C:

$$K_C = \frac{1}{[CO_2] \cdot [Ca(OH)_2]}.$$

Na expressão de K_C, não são representadas as concentrações de sólidos nem as de líquidos; e os coeficientes estequiométricos são os expoentes das concentrações, em mol/L, das substâncias correspondentes nas equações.



ID/BR

ATIVIDADE RESOLVIDA

Escreva as expressões da constante de equilíbrio em termos de concentração (K_C) para as reações representadas a seguir.

a) $2\ SO_3(g) \rightleftharpoons 2\ SO_2(g) + O_2(g)$

b) $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons 2\ CrO_4^{2-}(aq) + 2\ H^+(aq)$

Resolução

Para expressar a constante de equilíbrio K_C, não se consideram as espécies nos estados sólido e líquido. Assim, tem-se:

a) $K_C = \dfrac{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}{[SO_3]^2}$

b) $K_C = \dfrac{[CrO_4^{2-}]^2 \cdot [H^+]^2}{[Cr_2O_7^{2-}]}$

Constantes de equilíbrio e pressões parciais (K_p)

Para os equilíbrios envolvendo substâncias no estado gasoso, também se pode escrever a expressão da lei do equilíbrio químico em termos das pressões parciais, K_p. Para o equilíbrio

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g),$$

tem-se a constante em termos das concentrações

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

ou, em termos das pressões parciais,

$$K_p = \frac{(p_{NH_3})^2}{(p_{N_2}) \cdot (p_{H_2})^3}.$$

Para expressar a lei do equilíbrio em termos das pressões parciais, basta que uma das espécies do equilíbrio esteja no estado gasoso.



ID/BR

DE OLHO NO CONCEITO

Variação da constante de equilíbrio

A variação quantitativa da constante de equilíbrio em função da temperatura foi estudada pelo químico holandês Jacobus Henricus van't Hoff (1852-1911), na mesma época que Guldberg e Waage. Ele determinou que:

$$\log\frac{K_1}{K_2} = \frac{-\Delta H^0}{2{,}303 \cdot R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right),$$

em que K_1 é a constante de equilíbrio de uma reação na temperatura T_1, K_2 é a constante de equilíbrio da mesma reação na temperatura T_2, R é a constante dos gases ideais e ΔH^0 é a variação de entalpia-padrão da reação.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial (K_p) para as reações representadas a seguir:

a) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI(g)$

b) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$

Resolução

Para expressar a constante de equilíbrio K_p, somente as espécies no estado gasoso são consideradas; dessa forma, basta que uma esteja nesse estado. Para as reações descritas, tem-se:

a) $K_p = \dfrac{(p_{HI})^2}{p_{H_2} \cdot p_{I_2}}$

b) $K_p = p_{CO_2}$

Relação entre K_C e K_p

Embora K_C e K_p representem valores constantes à mesma temperatura, elas não são necessariamente iguais. A relação entre elas é dada considerando-se a equação de estado dos gases

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

e as expressões das constantes desses equilíbrios. Para o equilíbrio

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)\ ,$$

observe a relação entre K_C e K_p:

$$K_C = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$$

$$K_p = \frac{(pNO_2)^2}{pN_2O_4}$$

Aplicando a equação dos gases para o NO_2:

$$p_{NO_2} = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} = [NO_2] \cdot R \cdot T$$

Fazendo o mesmo para o N_2O_4 e substituindo na equação de K_p, tem-se:

$$K_p = \frac{([NO_2] \cdot R \cdot T)^2}{([N_2O_4] \cdot R \cdot T)^1}$$

$$K_p = \underbrace{\frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}}_{K_C} (R \cdot T)^{2-1} \quad \Rightarrow \quad K_p = K_C\,(R \cdot T)^1$$

Generalizando:

$$K_p = K_C \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}\ ,$$

em que Δn corresponde à variação da quantidade de matéria referente aos coeficientes estequiométricos do equilíbrio.

Fenômenos relacionados ao equilíbrio

Ao realizar um mergulho, a pressão no ambiente aquático aumenta 1 atm a cada dez metros de profundidade. Dessa forma, quando se está a 10 m de profundidade, a pressão passa a ser de duas atmosferas (2 atm): 1 atm da pressão que estamos acostumados a suportar ao nível do mar, mais 1 atm da pressão causada pelos dez metros da coluna de água.

Quando se volta para a superfície rapidamente, os gases que estavam dissolvidos no sangue devido à alta pressão no fundo do mar, saem como em uma garrafa de água gaseificada. Se esse fenômeno, chamado de embolia gasosa, ocorrer de forma intensa, pode ocasionar a morte do indivíduo.

Não escreva no livro.

CÁLCULO DAS CONSTANTES DE EQUILÍBRIO

Os valores numéricos das constantes de equilíbrio são determinados considerando as respectivas expressões. Cada uma delas é definida pela multiplicação das concentrações dos produtos, dividida pela multiplicação das concentrações dos reagentes, todas em mol/L, com os respectivos coeficientes estequiométricos aplicados como expoentes das concentrações, no estado de equilíbrio, no sentido direto da equação. Considere o seguinte equilíbrio genérico:

$$a\,A + b\,B \rightleftharpoons c\,C + d\,D$$

A expressão para o cálculo da constante é:

$$K_C = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Interpretação do valor de K_C e extensão da reação

A grandeza do valor numérico para K_C permite avaliar a extensão em que a reação prossegue para chegar ao estado de equilíbrio. A seguir são apresentadas duas situações de equilíbrio e as respectivas constantes a 25 °C.

- No equilíbrio

$$NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq),$$

tem-se:

$$K_C = 1{,}7 \cdot 10^{-5} = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]}.$$

Como K_C representa a relação entre as concentrações dos produtos e as dos reagentes e, nesse caso, é um valor menor que 1, o denominador da expressão (concentrações dos reagentes) deve ser maior que o numerador (concentrações dos produtos). Assim, pode-se concluir que as condições favorecem o equilíbrio no sentido dos reagentes, ou seja, no sentido da reação inversa, representada pela semisseta vermelha.

$$NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

- No equilíbrio

$$I_2(g) + C\ell_2(g) \rightleftharpoons 2\,IC\ell(g),$$

tem-se:

$$K_C = 2{,}0 \cdot 10^5 = \frac{[IC\ell]^2}{[I_2] \cdot [C\ell_2]}.$$

Nesse caso, pode-se inferir que o numerador da expressão (concentração dos produtos) é muito maior que o denominador (concentração dos reagentes). Assim, conclui-se que as condições favorecem o equilíbrio no sentido da formação dos produtos, ou seja, no sentido da reação direta, representada pela semisseta vermelha.

$$I_2(g) + C\ell_2(g) \rightleftharpoons 2\,IC\ell(g)$$

Portanto, quanto maior for o valor numérico de K_C, maior será a extensão da ocorrência da reação no sentido direto, isto é, no sentido da formação dos produtos.

2. Não. Sem a informação sobre os estados físicos das substâncias, não é possível escrever as expressões de equilíbrio, pois as substâncias em estado sólido não entram nas expressões de equilíbrio químico.

ROTEIRO

2. É possível escrever as expressões de K_c para os equilíbrios a seguir, sem ter a informação dos estados físicos das substâncias? Justifique.

a) $2\,NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

b) $CuO + H_2 \rightleftharpoons Cu + H_2O$

c) $2\,NO + C\ell_2 \rightleftharpoons 2\,NOC\ell$

d) $PC\ell_5 \rightleftharpoons PC\ell_3 + C\ell_2$

3. Escreva as expressões de K_p para os equilíbrios homogêneos da atividade anterior, sabendo que somente os compostos que contêm cobre estão no estado sólido.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

INFLUÊNCIAS SOCIAIS NA SÍNTESE INDUSTRIAL DA AMÔNIA NO SÉCULO XX

A agricultura no século XIX e a urgência em otimizar a produção

A prática da agricultura permite ao ser humano obter alimentos em grandes quantidades, desde que haja condições adequadas ao plantio. Para isso, destaca-se a utilização de substâncias que contêm nitrogênio, um nutriente essencial ao desenvolvimento das plantas.

Jens Otte/Shutterstock.com/ID/BR

Colônia de pássaros em rocha repleta de excrementos (guano) no Parque Nacional de Paracas, Peru. Foto de 2020.

Até o início do século XIX, os agricultores utilizavam restos da própria colheita e excrementos de animais como fontes de nitrogênio. Porém, com a expansão da industrialização na Europa, as pessoas passaram a viver concentradas nos grandes centros urbanos, longe das áreas de plantio. Concomitantemente, o século XIX foi caracterizado por grandes taxas de crescimento populacional, desproporcionais ao aumento na produção de alimentos. Assim, desenvolver novos meios para otimizar a produção das lavouras se tornou uma necessidade.

Para lidar com as dificuldades da fixação do nitrogênio, ou seja, o processo de converter esse elemento químico em espécies que possam ser incorporadas em moléculas orgânicas, os agricultores lançavam mão de duas alternativas: o salitre ($NaNO_3$), oriundo dos desertos chilenos, e o guano, matéria resultante do acúmulo de excrementos e de cadáveres de aves marinhas do litoral peruano, rico em nitrogênio, fosfato e potássio. Esses recursos naturais foram amplamente explorados e utilizados até o início do século XX. Entretanto, devido ao consumo crescente desses recursos, previu-se que se esgotariam em poucos anos, o que conduziu a uma busca por alternativas que os substituíssem. Entre as alternativas disponíveis na época, cogitou-se o uso da maior fonte de nitrogênio disponível, o ar atmosférico, para se obter nitrogênio fixo.

A obtenção de nitrogênio como matéria-prima para fertilizantes se tornou um grande desafio, pois as plantas, de modo geral, não são capazes de aproveitar o nitrogênio do ar, que contém aproximadamente 78% de gás nitrogênio (N_2), um gás inerte em virtude de sua elevada estabilidade química, dependendo, para isso, da atividade de algumas espécies de bactérias. Ao fim do século XIX, não havia tecnologia capaz de transformar de modo rentável o N_2 em outras substâncias reativas, como nitritos ou nitratos, para que as plantas as absorvessem.

A síntese da amônia a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio

Fixar nitrogênio foi uma tarefa árdua. Métodos baseados em descargas elétricas e em aumento da temperatura ou da pressão atmosférica foram testados sem sucesso. Uma das possibilidades era fixar o nitrogênio pela produção de amônia (NH_3), a partir das substâncias simples correspondentes, como demonstra o equilíbrio a seguir.

$$3\,H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) \qquad \Delta H_f^0 = -45{,}94\ \text{kJ/mol}$$



ID/BR

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

Não escreva no livro.

Ao estudar esse equilíbrio químico considerando suas variáveis cinéticas e termodinâmicas, bem como as tentativas realizadas por outros cientistas em fixar nitrogênio, o pesquisador alemão Fritz Haber (1868-1934) e seu assistente, o químico britânico Robert Le Rossignol (1884-1976), apresentaram aos representantes de uma indústria química, em 1909, um aparelho construído por eles que sintetizava amônia a partir de nitrogênio atmosférico e hidrogênio, sob catálise, à temperatura de 700 °C e pressão de 200 atm, demonstrando uma produção significativa e contínua de amônia líquida, cerca de 2,0 a 2,5 mL por minuto.

Embora o aparelho proposto por Haber e seu assistente produzisse uma pequena quantidade de amônia, o sucesso da demonstração foi tamanho que, em pouco tempo, Carl Bosch (1874-1941), engenheiro químico representante da empresa, iniciou os projetos para a elaboração da planta industrial. A planta foi baseada no equipamento de Haber para a síntese de amônia em larga escala e tinha o objetivo de produzir toneladas de amônia por dia.

Industrialmente, a fabricação de amônia passou a ser realizada utilizando um catalisador de Fe_3O_4 misturado com KOH, SiO_2 e $A\ell_2O_3$, em temperatura que variava entre 450 °C e 650 °C e pressão entre 200 atm e 400 atm.



Renaldo Vignati/ID/BR

No processo Haber-Bosch a amônia é obtida a −33 °C. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C. *et al. Chemistry and Chemical Reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage Learning Inc., 2023. p. 762.

A produção industrial da amônia, estimada no ano de 2024 em aproximadamente 188,44 milhões de toneladas, sendo boa parte dessa produção destinada à fabricação de fertilizantes, foi uma conquista obtida pela humanidade por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, possibilitando a fertilização de milhões de hectares mundo afora e, consequentemente, o aumento da produção para toneladas de alimentos.

Em reconhecimento aos seus esforços relacionados à produção da amônia, Haber e Bosch receberam o prêmio Nobel, em 1918 e em 1931, respectivamente, e o processo de síntese de amônia a partir de nitrogênio e de hidrogênio ficou conhecido como processo Haber-Bosch.

Fontes de pesquisa: Kotz, J. C. *et al. Chemistry and chemical reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage Learning Inc., 2023. p. 762-763; Tamanho do mercado de amônia e análise de ações – tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029). *Mordor Intelligence*, Índia, [202-]. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/ammonia-market. Acesso em: 12 out. 2024.

Para discutir

1 **De que maneira o crescimento populacional pode estar relacionado à síntese da amônia?**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Seria possível produzir os fertilizantes necessários à demanda agrícola se fossem utilizados apenas aparelhos como o construído por Haber e Le Rossignol? Por quê?**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Segundo o relatório *Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo* de 2024, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome em 2023, o equivalente a uma em cada onze pessoas no mundo e uma em cada cinco na África. Discuta com os colegas quais são os desafios atuais encontrados no mundo para equalizar a balança de produção sustentável com a oferta de alimentos à população.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

PRINCÍPIO DE LE CHÂTELIER

No desenvolvimento do processo para a produção de amônia (NH_3) a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, Haber investigou os fatores que poderiam ser alterados de modo a aumentar o rendimento da reação. Ao realizar diversos testes utilizando os valores da constante de equilíbrio a várias temperaturas, ele percebeu que a porcentagem de NH_3 no equilíbrio diminuía com o aumento da temperatura, mas aumentava com o aumento da pressão.

Observado nos sistemas em equilíbrio, esse fenômeno em que uma perturbação favorece o sentido do equilíbrio que minimiza ou compensa o efeito da modificação imposta é chamado **princípio de Le Châtelier**.

Esse princípio, identificado em 1884 de forma empírica pelo químico francês Henri Le Châtelier (1850-1936), permite prever como um sistema se comportará se houver uma alteração nas condições de equilíbrio.

Efeito da concentração

Um sistema em equilíbrio é um estado dinâmico. O princípio de Le Châtelier afirma que cada alteração nesse sistema provoca uma perturbação no equilíbrio, favorecendo o sentido da reação que minimize ou compense o efeito da variação. Consequentemente, uma diminuição da concentração de um dos produtos da reação favorecerá a reação direta, ou seja, o sentido de formação daquela substância.

Por exemplo, para o sistema em equilíbrio

$$2\ CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ CO_2(g)$$

,

observa-se maior rendimento em produtos quando se inicia a reação com altas concentrações de CO(g) ou de O_2(g), favorecendo a reação direta, de formação de produto.

No caso do sistema

$$CaO(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons CaCO_3(s)$$

,

o equilíbrio é favorecido no sentido da formação do produto quando se aumenta a concentração de CO_2(g), pois o óxido de cálcio e o carbonato de cálcio são sólidos e não influenciam o deslocamento do equilíbrio.

Efeito da pressão

É importante considerar-se a pressão de um sistema em equilíbrio somente quando estão presentes substâncias no estado gasoso. Isso porque, praticamente não há modificação do sistema quando se altera a pressão de um equilíbrio que envolve apenas sólidos e líquidos. Por exemplo, em altas pressões, os sistemas em equilíbrio que contêm substâncias gasosas, como

$$CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$$

,

são favorecidos no sentido de formar menor quantidade de substâncias gasosas. Nesse equilíbrio, o aumento da pressão favorece a formação dos produtos (sentido em que o sistema ocupa menor volume). Já a diminuição da pressão favorece a reação inversa, em que o sistema ocupa maior volume.



AMj Studio/ID/BR

Representação do equilíbrio de formação de H_2CO_3(aq) por aumento da pressão do sistema em equilíbrio que contém CO_2(g), em temperatura constante. Cores-fantasia.



ID/BR

Efeito da temperatura

Para verificar a influência da temperatura nos equilíbrios, considere a equação termoquímica que os representa. Por exemplo, no equilíbrio que envolve a formação da amônia, um processo exotérmico, representado pela equação

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g) + 572\ kJ$$

,

a formação do produto é aumentada quando se abaixa a temperatura. Como a energia é liberada na reação, ela passa a ser retirada com o resfriamento, e o equilíbrio deve compensar esse efeito, favorecendo a reação no sentido da formação de produtos. Nesse caso, K_C também é modificado.

Nos processos endotérmicos, como na decomposição do carbonato de cálcio,

$$CaCO_3(s) + 184\ kJ \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

,

Não escreva no livro.

aumentar a temperatura favorece a formação dos produtos. Como o processo é endotérmico, o aumento da temperatura implica a compensação do consumo da energia fornecida, o que acontece quando se formam os produtos.

O equilíbrio químico $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, que ocorre na atmosfera envolvendo dois gases poluentes, está representado na figura **B**. O gás tetróxido de dinitrogênio é quase incolor, já o dióxido de nitrogênio é castanho-avermelhado. Colocando o tubo que contém esses gases em um banho com gelo (figura **A**), a perturbação do equilíbrio favorece a reação no sentido da produção de N_2O_4. Ao colocar o tubo em um béquer com água quente (figura **C**), o NO_2 é produzido. Logo, a obtenção de N_2O_4 é um processo exotérmico. Já a reação inversa, de produção de NO_2, é endotérmica.



Fotografias: Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Ilustrações: ID/BR

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

Efeito dos catalisadores

Os **catalisadores** são substâncias que aumentam a rapidez das reações químicas ao modificarem os mecanismos e, consequentemente, as energias de ativação (E_a) delas, diminuindo-as. Por esse motivo, os catalisadores não alteram o equilíbrio, mas permitem que essa situação seja atingida mais rapidamente ao ser adicionado no início da reação. O diagrama a seguir mostra o que acontece em um equilíbrio com e sem catalisador, em relação à E_a.

DIFERENÇA DA ENERGIA DE ATIVAÇÃO (E_a) PARA UMA REAÇÃO COM CATALISADOR E SEM CATALISADOR



ID/BR

O uso de catalisadores nas reações químicas faz com que a energia de ativação diminua sem alterar os produtos.

É importante notar que o catalisador apenas influencia na rapidez da reação, sem alterar os produtos finais nem as suas quantidades.

COMPORTAMENTO DA CONSTANTE DE EQUILÍBRIO COM A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA



K_c é inversamente proporcional à temperatura para reações **exotérmicas**.



K_c é diretamente proporcional à temperatura para reações **endotérmicas**.

Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

PARA EXPLORAR

Acesse

Reações Reversíveis

Nesse simulador do projeto PhET Simulações Interativas, da Universidade do Colorado Boulder, é possível verificar graficamente como variações de temperatura e de concentração afetam o equilíbrio de uma reação.

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/reversible-reactions. Acesso em: 14 out. 2024.

ATIVIDADES

1. a) $NH_4NO_2(s) \rightleftharpoons N_2(g) + 2\,H_2O(g)$

1 O nitrito de amônio (NH_4NO_2) é uma substância sólida que se decompõe, por aquecimento, em gás nitrogênio e em água (ambos no estado gasoso).

a) Equacione essa reação. Considere que, em recipiente fechado e em condições controladas, seja estabelecido o equilíbrio da reação.

b) Classifique esse equilíbrio em homogêneo ou heterogêneo. Heterogêneo.

c) Qual é a expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações? $K_c = [N_2] \cdot [H_2O]^2$

d) Qual é a expressão da constante de equilíbrio em função das pressões parciais? $K_p = (p_{N_2}) \cdot (p_{H_2O})^2$

e) Sabendo que o aumento de temperatura favorece a decomposição do nitrito de sódio, o que deve ocorrer com o valor da constante de equilíbrio quando a temperatura é aumentada?
A constante de equilíbrio dessa reação também aumenta.

ATIVIDADE RESOLVIDA

2 Em um recipiente, à temperatura de 796 °C, os componentes gasosos de uma reação têm as seguintes pressões parciais: $p_{NOCl} = 3{,}46$ atm; $p_{NO} = 0{,}110$ atm; $p_{Cl_2} = 0{,}430$ atm. Verifique se a reação representada por

$$2\,NOCl(g) \rightleftharpoons 2\,NO(g) + Cl_2(g)$$

atingiu a situação de equilíbrio, sabendo que, nessa temperatura,

$$K_p = 3{,}29 \cdot 10^{-4}.$$

Resolução

$$K_p = \frac{(p_{NO})^2 \cdot (p_{Cl_2})}{(p_{NOCl})^2} = \frac{(0{,}110)^2 \cdot 0{,}430}{(3{,}46)^2}$$

$$K_p = 4{,}3 \cdot 10^{-4}$$

Como o valor de K_p calculado é diferente do valor de K_p na temperatura indicada no enunciado, conclui-se que o sistema não atingiu a situação de equilíbrio.

3 O gás oxigênio (O_2) dissolvido no sangue humano forma um complexo com a molécula de hemoglobina (Hb), chamado de oxiemoglobina (HbO_2), que é capaz de carregar oxigênio para os tecidos. Essa reação pode ser representada de forma simplificada por:

$$Hb(aq) + O_2(aq) \rightleftharpoons HbO_2(aq)$$

a) Escreva a constante de equilíbrio em função das concentrações para esse equilíbrio. $K_c = [HbO_2] / [Hb]\,[O_2]$

b) Segundo o princípio de Le Châtelier, qual seria o efeito da diminuição na concentração de oxigênio que ocorre em grandes altitudes?

3. b) O equilíbrio seria deslocado no sentido da reação inversa, reduzindo a quantidade de oxiemoglobina disponível no sangue, causando hipóxia nos tecidos.

c) Alpinistas costumam fazer um processo de aclimatação, permanecendo em locais de altitude mais elevada por alguns dias antes de escalarem grandes picos. Por que essa prática é benéfica?

3. c) Ao permanecerem em locais de maior altitude, em que a pressão parcial de oxigênio no ar é menor, os alpinistas forçam o organismo a produzir mais moléculas de hemoglobina, favorecendo a formação de oxiemoglobina e facilitando a oxigenação dos tecidos na escalada.

4 Represente em um gráfico a variação da pressão parcial do $O_2(g)$ em função do tempo até o estabelecimento do equilíbrio para a reação de decomposição da água, representada por:

$$H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g)$$

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 A tabela a seguir apresenta os valores de constantes de equilíbrio em diferentes temperaturas para dois equilíbrios.

Equilíbrio	Temperatura (°C)	K_c
I. $2\,NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$	0	76
	25	8,8
II. $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO(g)$	1700	$4{,}1 \cdot 10^{-4}$
	2200	$3{,}6 \cdot 10^{-3}$

a) Indique o equilíbrio que representa um processo endotérmico. Equilíbrio **II** (aumenta a temperatura, aumenta o valor de K_c).

b) Os equilíbrios **I** e **II** são alterados pela variação de pressão? Em caso afirmativo, como?
Somente o equilíbrio **I** é alterado pela pressão. Aumentando a pressão, a formação de produtos é favorecida.

6 O metano (CH_4) pode ser obtido pela reação exotérmica entre CO e H_2:

$$CO(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$$

Explique como o rendimento da formação de metano pode ser afetado pelos seguintes fatores:

a) Aumento da temperatura. O rendimento diminui.

b) Aumento da pressão. O rendimento aumenta.

c) Introdução de um catalisador. O rendimento não é alterado.

d) Introdução de $H_2(g)$. O rendimento aumenta.

7 O gás nitrogênio utilizado na produção da amônia é retirado do ar atmosférico. Pela sua abundância e baixo custo, utiliza-se um excesso desse gás com o objetivo de aumentar o rendimento da obtenção da amônia. Copie o gráfico a seguir no caderno e complete-o, demonstrando o que ocorre no equilíbrio representado por $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$, quando $N_2(g)$ é adicionado ao sistema.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.



ID/BR

Não escreva no livro.

EQUILÍBRIOS ÁCIDO-BASE

ÁCIDOS E BASES NO COTIDIANO

Chás medicinais, artesanato e culinária são exemplos de manifestações da cultura regional conhecidas como sabedoria popular. É possível aliar os saberes populares ao conhecimento científico no estudo das ciências? Por exemplo, na preparação do molho de tomate, alimento muito presente em nossa culinária, a tradição popular recomenda o uso de bicarbonato de sódio para diminuir a acidez. Outro exemplo é a adição de suco de limão à bananada para aumentar a durabilidade da receita.

Nesses casos, os saberes populares apresentam fundamento científico, visto que o bicarbonato de sódio é um sal capaz de neutralizar o caráter ácido do tomate e o suco de limão é uma solução aquosa que contém ácido cítrico e ácido ascórbico, conservantes também utilizados industrialmente. Além desse uso, o ácido ascórbico se mostra útil na estabilização dos pigmentos de corantes naturais empregados nas manifestações culturais indígenas.

Conhecer as propriedades do equilíbrio ácido-base pode ser uma ferramenta importante para solucionar questões do cotidiano. Além disso, o estudo desse equilíbrio permite a compreensão de fenômenos que vão desde funções básicas do corpo humano até a manutenção das águas oceânicas.

Pinturas corporais indígenas

PARA COMEÇAR

1. O que são substâncias ácidas? E básicas?
2. Qual a finalidade do pH? Por que ele é importante para os seres vivos?
3. O que é um sistema-tampão?

1, **2** e **3**. Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Indígenas da etnia Guarani Mbya na Aldeia Mata Verde Bonita fazendo pintura corporal. Maricá (RJ). Foto de 2021.

Luciana Whitaker/Pulsar Imagens

Não escreva no livro.

ÁCIDOS E BASES SEGUNDO A TEORIA DE ARRHENIUS

A **Teoria de Dissociação Iônica de Arrhenius**, desenvolvida pelo químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927), permitiu relacionar o comportamento dos ácidos à formação do íon $H^+(aq)$, quando esse tipo de substância era acrescentado à água. Isso possibilitou concluir que o ácido é um composto que reage com a água produzindo o íon $H^+(aq)$ como único cátion.

O íon $H^+(aq)$ forma-se quando um átomo de hidrogênio perde um elétron e, por isso, equivale a um próton. A estabilidade desse íon deve-se à sua solvatação, processo em que os íons H^+ ficam cercados por moléculas de água, formando $H^+(aq)$.

O íon $H^+(aq)$ é o responsável pelas características dos ácidos. Note, no exemplo a seguir, a equação que descreve a reação de ionização de um ácido, no caso o ácido bromídrico (HBr).

$$HBr(g) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + Br^-(aq)$$





Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Observe que as lâmpadas só acendem quando o HCℓ (imagem **A**) e o NaOH (imagem **B**) estão dissolvidos em água, ou seja, na presença de íons livres. Cores-fantasia.

De acordo com a teoria de Arrhenius, uma base é definida como uma substância que, em solução aquosa, fornece o ânion **OH^-** (**hidróxido**) para a solução.

Segundo essa teoria, as bases, quando dissolvidas em água, sofrem dissociação iônica, liberando um cátion e o ânion hidróxido (OH^-), como descrito nos dois exemplos de equações de dissociação iônica:

$$NaOH(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$Ca(OH)_2(s) \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+}(aq) + 2\,OH^-(aq)$$

Em 1923, uma teoria mais abrangente sobre ácidos e bases foi proposta pelo químico dinamarquês Johannes Nicolaus Brönsted (1879-1947) e pelo químico inglês Thomas Martin Lowry (1874-1936). De acordo com essa teoria, a definição de ácidos e bases ocorre em função da capacidade das espécies químicas (compostos moleculares ou íons) de doarem ou receberem próton (íon H^+ ou núcleo de hidrogênio) e não se restringe a sistemas aquosos.

ÁCIDOS E BASES SEGUNDO A TEORIA DE BRÖNSTED-LOWRY

Segundo a teoria de Brönsted-Lowry:

- **Ácido** é uma espécie química doadora de próton (H^+).
- **Base** é uma espécie química receptora de próton (H^+).
- **Reações ácido-base** são aquelas em que há transferência de prótons.

Por essa teoria, as reações de neutralização seriam uma transferência de prótons (H^+) entre um ácido e uma base, tendo como consequência a formação de dois pares ácido-base conjugados, os quais compreendem espécies que diferem em um H^+. É comum representar esse íon associado a uma única molécula de água, formando o cátion **hidrônio** ou **hidroxônio** (H_3O^+) em solução aquosa.

$$H^+(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow \mathbf{H_3O^+}\,(aq)$$



Fórmula estrutural do cátion hidrônio.

Não escreva no livro.

DE OLHO NO CONCEITO

Dissociação e ionização

"Dissociar" significa "separar". A palavra "ionização" se refere a um fenômeno em que há formação de um ou mais íons.

Quando uma substância, como o cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), é colocada em água, ocorre tanto a dissociação quanto a ionização.

O hidrogênio se separa do cloreto (dissociação), e nessa separação há formação de íons (ionização). A solução resultante é chamada de ácido clorídrico. Alguns autores preferem designar o fenômeno como ionização; outros, como dissociação.

Independentemente da nomenclatura, é importante notar que a presença de íons em solução contribui para a condutibilidade do meio. O ácido clorídrico é classificado como eletrólito forte por apresentar alta condutibilidade elétrica em solução aquosa.

Acompanhe, a seguir, dois exemplos.

1



2



1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ROTEIRO

1. **Equacione a reação entre o ácido fluorídrico e a água. Indique o ácido e a base de Brönsted-Lowry e os pares conjugados presentes no equilíbrio.**
2. **Explique a afirmativa: O ácido acético satisfaz requisitos para ser considerado ácido pela Teoria de Dissociação de Arrhenius e pela teoria de Brönsted-Lowry.**

Essa teoria possibilita classificar a força dos ácidos de acordo com a sua capacidade de doar prótons (transferir prótons).

Um ácido forte deve apresentar uma grande tendência de transferir prótons, encontrando-se quase totalmente desprotonado em solução. É o caso do $HC\ell$ (exemplo **1**), que, no equilíbrio, está muito dissociado.

Assim, em uma reação ácido-base, a espécie que tem grande tendência para doar H^+ é considerada ácido forte e sua base conjugada é fraca. Da mesma forma, a espécie com pouca tendência para doar H^+ (ácido fraco) apresentará base conjugada forte.

O comportamento ácido ou básico de uma espécie depende também do outro reagente. Nos exemplos anteriores, a água atua como base (exemplo **1**) ou como ácido (exemplo **2**).

Teoria eletrônica [de Lewis]

Como consequência de sua teoria do par eletrônico para explicar as ligações químicas, G. N. [Gilbert Newton] Lewis propôs uma teoria ácido-base em 1923 [...]. Considerava que ácido (A) é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico e que base (B) é aquela capaz de doar um par eletrônico (representado por **:**).

De maneira geral:

$$A + :B = A:B$$

[...]

Essa reação e muitas outras semelhantes passaram então a ser consideradas reações ácido-base [...].

[...]

Em 1938, Lewis retornou ao tema ácido-base, especificando os critérios fenomenológicos (ou macroscópicos) para esse comportamento:

- A reação entre um ácido e uma base (neutralização) é rápida.
- Um ácido (ou uma base) pode deslocar de seus compostos um ácido (ou uma base) mais fraco(a).
- Ácidos e bases podem ser titulados um com o outro por meio de indicadores.
- Ácidos e bases são capazes de atuar como catalisadores.

Esses critérios são uma síntese brilhante do comportamento ácido-base e Lewis une essas observações fenomenológicas com a interpretação molecular [...].

CHAGAS, A. P. Teorias ácido-base do século XX. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 9, p. 29, maio 1999. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc09/historia.pdf. Acesso em: 14 out. 2024.

CONSTANTES DE IONIZAÇÃO DE ÁCIDOS E DE DISSOCIAÇÃO DE BASES

Ácidos pouco ionizados e bases pouco dissociadas em água são considerados fracos e estabelecem um equilíbrio reversível entre as espécies não dissociadas e os seus íons. A aplicação da lei da ação das massas permite avaliar a condição desse equilíbrio e comparar a força dos ácidos e das bases.

Constante de ionização dos ácidos

A **constante de ionização do ácido** (K_a) indica a extensão de sua ionização sob determinada temperatura.

Considere um monoácido fraco genericamente representado por HA, cuja ionização em solução aquosa é representada da seguinte forma:

$$HA(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

A constante de ionização do ácido (K_a) é expressa por:

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [A^-]}{[HA]}$$

Essa expressão indica que, quanto maior for o grau de ionização, maior será a concentração dos íons presentes no equilíbrio (maior o numerador) e menor a concentração do ácido não ionizado (menor o denominador). Como consequência, quanto maior for a constante K_a maior a força do ácido a certa temperatura.

Se um ácido apresentar mais de um hidrogênio ionizável (ácido poliprótico ou poliácido), cada etapa de ionização apresentará uma constante específica.

O ácido diprótico (H_2SO_3), por exemplo, apresenta duas etapas de ionização:

1ª etapa: $H_2SO_3(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HSO_3^-(aq)$

$$K_{a_1} = \frac{[H^+] \cdot [HSO_3^-]}{[H_2SO_3]} = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$$

2ª etapa: $HSO_3^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + SO_3^{2-}(aq)$

$$K_{a_2} = \frac{[H^+] \cdot [SO_3^{2-}]}{[HSO_3^-]} = 6{,}2 \cdot 10^{-8}$$

Cada etapa do processo apresenta uma constante de ionização (K_{a_1} e K_{a_2}) que decrescem sensivelmente ($K_{a_2} < K_{a_1}$), de modo que, na solução, a concentração de íons H^+ deve ser praticamente igual à da primeira etapa.

Constante de dissociação das bases

Bases fortes, como o hidróxido de sódio (NaOH), dissolvem-se em água com dissociação de praticamente 100% de seus aglomerados. As bases fracas apresentam um baixo grau de dissociação e, ao serem colocadas em água, os íons formados e as espécies químicas não dissociadas estabelecem um equilíbrio químico.

Considere a dissociação da monobase fraca (B) quando misturada em água.

$$B(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons BH^+(aq) + OH^-(aq)$$

A **constante de dissociação da base** (K_b) é expressa por:

$$K_b = \frac{[BH^+] \cdot [OH^-]}{[B]}$$

A concentração de água é constante na solução diluída da base, e o seu valor é incorporado ao valor da constante do equilíbrio considerado (K_b).

O valor da constante de dissociação da base (K_b) dá ideia da força de uma base. Quanto maior for o valor de K_b, maior será a força da base e maior a $[OH^-]$ na solução.

As constantes K_a e K_b, assim como todas as constantes de equilíbrio, dependem da temperatura.

Não escreva no livro.

EQUILÍBRIO IÔNICO E PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA

Uma solução aquosa de bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) pode ser usada como antiácido, pois esse sal apresenta caráter básico. De onde surgem os íons OH^- em solução se o bicarbonato de sódio não apresenta esses íons em sua composição? A resposta a essa pergunta é encontrada no estudo do equilíbrio químico existente em água líquida, como será descrito a seguir.

Equilíbrio iônico da água

A água apresenta caráter anfótero, isto é, ela pode se comportar como ácido (doadora de prótons) ou como base (receptora de prótons). A transferência de prótons entre moléculas de água ocorre sempre, independentemente de ela estar ou não pura. Esse processo é chamado de **autoionização da água** e foi proposto pelo físico alemão Friedrich Kohlrausch (1840-1910) ao observar que a água pura conduzia eletricidade, ainda que em pequena escala.

Na equação representada a seguir, uma das moléculas de água cede um próton (íon H^+), transformando-se no íon hidroxila (OH^-), e que a outra molécula de água recebe um próton, produzindo o íon hidrônio (H_3O^+).

$$H_2O(\ell) + H_2O(\ell) \overset{H^+}{\rightleftharpoons} H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

Esse processo de autoionização da água é ilustrado pelo modelo a seguir.



AMj Studio/ID/BR

Representação da autoionização da água. Cores-fantasia.

De forma simplificada, esse equilíbrio pode ser representado da seguinte maneira:

$$H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

Nessa representação, percebe-se que, na água pura, a concentração de íons H^+ (ou H_3O^+) é sempre igual à concentração de íons OH^- (proporção de 1:1). A autoionização da água, entretanto, ocorre com uma fração muito pequena das moléculas dessa substância.

Nota-se que a água pura conta com uma pequena concentração de íons H^+ e OH^- em equilíbrio com moléculas de água. Um aumento na concentração de íons H^+ e uma diminuição na concentração de íons OH^- na água a torna um meio ácido. Havendo diminuição na concentração de íons H^+ e aumento na de íons OH^-, o meio torna-se alcalino (básico).

Água: o líquido vital

A água é, sem dúvida, o mais comum e mais importante de todos os compostos. Graças às propriedades da água, a vida foi capaz de surgir e se desenvolver [na Terra].

Essas propriedades são extremamente peculiares: a água sólida (gelo) é menos densa do que o líquido – por essa razão, o gelo boia sobre a água líquida. Embora extremamente trivial, é exatamente o oposto do observado na grande maioria das substâncias. E, graças a essa habilidade, os peixes e plantas de lagos e rios que congelam, no inverno, não morrem, pois a capa de gelo que se forma sobre o lago funciona como uma barreira de proteção contra o frio. [...] O simples fato de a água ser líquida à temperatura ambiente já é completamente intrigante. Todos os compostos análogos à molécula H_2O são gases. [...]

[...]

O estado líquido da água tem uma estrutura complexa e dinâmica, que envolve associação entre as moléculas. A forte e extensa ligação de hidrogênio entre as moléculas [...] produz um valor muito alto de certas propriedades físicas, tais como temperatura de ebulição, viscosidade, tensão superficial, calor específico, entre outras. Se comparado com análogos, a temperatura de ebulição da água deveria ser −200 °C! A água, também, é um dos líquidos com a maior tensão superficial conhecida – que faz com que as gotas sejam esféricas e que alguns insetos possam caminhar sobre ela. Por capilaridade, a água consegue subir até a mais alta folha de uma árvore, contrariando a atração gravitacional da Terra. [...]

Uma das propriedades mais importantes da água líquida é a sua capacidade de dissolver substâncias polares ou iônicas para formar soluções aquosas. [...]

Água: o líquido vital. *QMCWEB* – Revista eletrônica do Departamento de Química (UFSC), Florianópolis, ano 4, 5 ago. 2010. Disponível em: https://alonsogoes.files.wordpress.com/2008/07/www-qmc-ufsc-br_qmcweb_artigos_agua-html.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.



AMj Studio/ID/BR

Moléculas de água associam-se por meio de ligações de hidrogênio. Cores-fantasia.

Produto iônico da água: K_w

Por meio de medidas de condutividade elétrica realizadas a 25 °C, foi possível determinar que as concentrações dos íons H^+ e OH^- são iguais a $1{,}0 \cdot 10^{-7}$ mol/L na água pura. Isso indica que, no equilíbrio, a molécula H_2O encontra-se pouco dissociada, o que justifica a baixa condutibilidade elétrica desse líquido. A 25 °C, em cada 1 bilhão (10^9) de moléculas de água, aproximadamente duas se ionizam.

A constante desse equilíbrio é denominada **constante de dissociação da água** ou **constante de autoprotólise** ou, ainda, **produto iônico da água**. Essa constante é representada por K_w, cujo valor pode ser calculado pela seguinte expressão matemática:

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$$

Considerando a temperatura de 25 °C, tem-se:

$$K_w = (1{,}0 \cdot 10^{-7}) \cdot (1{,}0 \cdot 10^{-7}) = 1{,}0 \cdot 10^{-14}$$

Vale a pena ressaltar que o valor de K_w, assim como o de todas as constantes de equilíbrio, varia com a temperatura. A tabela a seguir fornece alguns exemplos dessa variação.

VARIAÇÃO DE K_w EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA			
Temperatura (°C)	**$[H^+]$*, em mol/L**	**$[OH^-]$*, em mol/L**	**K_w**
10	$0{,}53 \cdot 10^{-7}$	$0{,}53 \cdot 10^{-7}$	$0{,}28 \cdot 10^{-14}$
15	$0{,}67 \cdot 10^{-7}$	$0{,}67 \cdot 10^{-7}$	$0{,}45 \cdot 10^{-14}$
20	$0{,}82 \cdot 10^{-7}$	$0{,}82 \cdot 10^{-7}$	$0{,}68 \cdot 10^{-14}$
25	$1{,}00 \cdot 10^{-7}$	$1{,}00 \cdot 10^{-7}$	$1{,}01 \cdot 10^{-14}$
30	$1{,}21 \cdot 10^{-7}$	$1{,}21 \cdot 10^{-7}$	$1{,}47 \cdot 10^{-14}$
50	$2{,}34 \cdot 10^{-7}$	$2{,}34 \cdot 10^{-7}$	$5{,}48 \cdot 10^{-14}$

* Concentrações calculadas com base nos valores de K_w.

Fonte de pesquisa: Kotz, J. C. *et al. Chemistry and Chemical Reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage Learning Inc, 2023. p. 780.

As concentrações de íons H^+ e OH^- na água líquida aumentam com o aumento da temperatura, indicando que a autoionização da água é um processo endotérmico. Assim, quanto maior a temperatura, maior o valor de K_w.

ATIVIDADE RESOLVIDA

O valor do produto iônico da água ($K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$) corresponde a $1{,}0 \cdot 10^{-14}$, na temperatura de 25 °C. Nessa condição, quando um líquido tem caráter neutro (nem ácido e nem básico), podemos afirmar que $[H^+] = [OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ mol/L. Considerando essas informações e os dados da tabela a seguir, classifique os líquidos apresentados quanto ao caráter ácido, básico ou neutro.

Líquidos a 25 °C	$[H^+]$ mol/L	$[OH^-]$ mol/L
Água do mar	$1{,}0 \cdot 10^{-8}$	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$
Café	$1{,}0 \cdot 10^{-5}$	$1{,}0 \cdot 10^{-9}$
Refrigerante	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	$1{,}0 \cdot 10^{-10}$
Leite	$1{,}0 \cdot 10^{-7}$	$1{,}0 \cdot 10^{-7}$

Resolução

Como soluções neutras apresentam a mesma concentração de íons H^+ e OH^-, ou seja, $[H^+] = [OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ na temperatura de 25 °C, temos que:

- Soluções ácidas apresentam $[H^+] > [OH^-]$, isto é, $[H^+] > 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ ou $[OH^-] < 1{,}0 \cdot 10^{-7}$.
- Soluções básicas apresentam $[OH^-] > [H^+]$, isto é, $[OH^-] + 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ ou $[H^+] < 1{,}0 \cdot 10^{-7}$.

Dessa forma, comparando as concentrações dos íons presentes nos líquidos da tabela, conclui-se que:

- líquidos ácidos: café e refrigerante
- líquido alcalino (básico): água do mar
- líquido neutro: leite

Não escreva no livro.

DETERMINAÇÃO DO pH

Os valores de $[H^+]$ e $[OH^-]$ das soluções aquosas variam normalmente em uma extensa faixa de números com expoentes negativos. O vinagre, a água e o sangue, por exemplo, têm $[H^+]$ de aproximadamente $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol/L, $1{,}0 \cdot 10^{-7}$ mol/L e $4{,}0 \cdot 10^{-8}$ mol/L, respectivamente.

Em 1909, o químico dinamarquês Soren Sorensen (1868-1939) propôs a transformação desses valores em uma escala mais fácil de ser trabalhada por meio do uso de logaritmos: a escala de **pH**. A letra **p**, minúscula, refere-se a **potencial** (ou potência), e a letra **H**, maiúscula, a **hidrogeniônico**.

O pH de uma solução é definido como:

$$pH = -\log [H^+] \Rightarrow [H^+] = 10^{-pH}, \text{ em mol/L}$$

De forma semelhante, define-se o pOH (potencial hidroxiliônico) como:

$$pOH = -\log [OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 10^{-pOH}, \text{ em mol/L}$$

O pH e o caráter ácido ou básico

O valor do pH está intimamente ligado ao caráter ácido, básico ou neutro das soluções. Considerando-as a 25 °C, temos:

- **Soluções neutras ou água pura**: $[H^+] = [OH^-]$.
  $[H^+] = [OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ mol/L^{-1}
  $pH = -\log 10^{-7} = -(-7) = 7$
  $pOH = -\log 10^{-7} = -(-7) = 7$
- **Soluções ácidas**: $[H^+] > [OH^-]$.
  $[H^+] > 10^{-7}$ mol/L$^{-1} \Rightarrow pH < 7$
  $[OH^-] < 10^{-7}$ mol/L$^{-1} \Rightarrow pOH > 7$
- **Soluções básicas**: $[H^+] < [OH^-]$.
  $[H^+] < 10^{-7}$ mol/L$^{-1} \Rightarrow pH > 7$
  $[OH^-] > 10^{-7}$ mol/L$^{-1} \Rightarrow pOH < 7$

  Exemplos
  $[H^+] = 10^{-4}$ mol/L$^{-1} \Rightarrow pH = 4 \Rightarrow$ solução ácida
  $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/L$^{-1} \Rightarrow pOH = 2 \Rightarrow$ solução básica

DE OLHO NO CONCEITO

Logaritmo

O logaritmo tem a propriedade de transformar multiplicações e quocientes em somas e subtrações, entre outras mudanças possíveis, facilitando alguns cálculos.

Nas igualdades $10 = 10^1$, $100 = 10^2$, $1\,000 = 10^3$, os valores dos números crescem em progressão geométrica, enquanto os expoentes, isto é, seus logaritmos na base 10, crescem em progressão aritmética.

Para $\log_{10} a = x$, tem-se: $10^x = a$.

Nessa expressão:

10 = base do logaritmo;

a = logaritmando;

x = logaritmo.

Assim, $\log 1 = 0$, pois $10^0 = 1$; $\log 10 = 1$, pois $10^1 = 10$, e assim por diante.

Veja algumas propriedades dos logaritmos.

- $\log (a \cdot b) = \log a + \log b$
- $\log \left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$
- $\log 10^a = a$; $\log 10^{-a} = -a$

ROTEIRO

3. Uma solução aquosa diluída de hidróxido de sódio apresenta concentração de íons OH^- igual a $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Quantos mL de solução de HCℓ $2{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol/L seriam necessários para a neutralização total de 50 mL da solução alcalina?

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

A escala de pH

A escala de pH é a mais utilizada para comparar a acidez ou a alcalinidade dos sistemas. Note alguns exemplos apresentados a seguir, medidos a 25 °C.

	Café	Soro fisiológico	Água destilada	Água do mar
	artisteer/Stock/Getty Images	Daniel Cymbalista/ Fotoarena	Fernando Favoretto/ Criar Imagem	 Ernesto Reghran/Pulsar Imagens
$[H^+]$	10^{-5} mol/L	10^{-6} mol/L	10^{-7} mol/L	10^{-8} mol/L
pH	$-\log 10^{-5} = 5$	$-\log 10^{-6} = 6$	$-\log 10^{-7} = 7$	$-\log 10^{-8} = 8$
$[OH^-]$	10^{-9} mol/L	10^{-8} mol/L	10^{-7} mol/L	10^{-6} mol/L
pOH	$-\log 10^{-9} = 9$	$-\log 10^{-8} = 8$	$-\log 10^{-7} = 7$	$-\log 10^{-6} = 6$
pH + pOH	14	14	14	14
Meio	ácido	ácido	neutro	básico

É importante ressaltar que os valores de pH e pOH podem ser decimais e, no quadro, foram utilizados valores médios aproximados, o que facilita a análise. Além disso, a maior parte das soluções analisadas apresenta valores compreendidos entre 0 e 14, mas é possível preparar soluções fora dessa faixa de pH.

Exemplos de sistemas ácidos e alcalinos, a 25 °C

ID/BR





A soma de pH e pOH resulta no valor 14 em todos os sistemas apresentados. Essa relação entre os potenciais hidrogeniônico e hidroxiliônico é constante à temperatura de 25 °C.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Burdge, J. R. *Química*: a ciência central. 9 ed. Pearson Prentice Hall: São Paulo, 2005.

Como $K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$, pode-se afirmar que o logaritmo negativo do produto iônico é igual ao logaritmo negativo de 10^{-14}.

Então:

$-\log [H^+] \cdot [OH^-] = -\log 10^{-14}$

$-\log [H^+] + (-\log [OH^-]) = -\log 10^{-14}$

$pH + pOH = 14$

Não escreva no livro.

INDICADORES ÁCIDO-BASE

A determinação precisa do pH pode ser feita por meio de um aparelho chamado medidor de pH ou peagâmetro. A leitura se dá em função da condutividade elétrica da solução. O aparelho é calibrado para converter os valores medidos em milivolts para a escala usual de pH de 0 a 14.

Valores aproximados de pH, entretanto, geralmente podem ser obtidos com o uso de indicadores ácido-base, que são substâncias naturais e sintéticas cujas cores mudam em função do pH do meio. As cores das hortênsias, por exemplo, são determinadas pelo pH do solo, pois apresentam substâncias que atuam como indicadores ácido-base.

Geralmente, o indicador ácido-base é um ácido fraco ou uma base fraca. Considere, como exemplo, um ácido fraco – representado genericamente por HInd, o qual, em solução aquosa, está em equilíbrio com seu ânion – representado por Ind^-.

$$\underset{\text{cor A (meio ácido)}}{HInd}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + \underset{\text{cor B (meio básico)}}{Ind^-}(aq)$$

Para que atuem como indicadores, é necessário ainda que o ácido e o seu ânion apresentem cores diferentes (**A** e **B**). Ao entrar em contato com um meio ácido, o sentido de formação do ácido HInd é favorecido, intensificando a cor **A**. Em meio alcalino, entretanto, o sentido de reposição dos íons H_3O^+ – os quais são retirados pelos íons OH^- da solução básica – é favorecido e, com isso, ocorre o aumento da concentração dos íons Ind^-, intensificando a cor **B**.

Se o indicador é uma base fraca, o equilíbrio que ocorre é genericamente representado por:

$$\underset{\text{cor A (meio básico)}}{IndOH}(aq) \rightleftharpoons OH^-(aq) + \underset{\text{cor B (meio ácido)}}{Ind^+}(aq)$$

H_Ko/Shutterstock.com/ID/BR

Há várias substâncias que atuam como indicadores. Também é muito comum o uso do **indicador universal** – uma mistura de alguns indicadores, normalmente secos, em tiras de papel, as quais, ao serem mergulhadas na solução analisada, adquirem cores que devem ser comparadas a uma escala-padrão com os respectivos valores de pH.

Indicadores naturais

O uso de indicadores ácido-base é uma prática que se iniciou no século XVII com o químico irlandês Robert Boyle (1627-1691). Inicialmente, ele preparou um extrato de violetas e o gotejou sobre um papel branco. Em seguida, ele pingou algumas gotas de vinagre sobre a mancha violeta e verificou que o papel se tornou vermelho. Repetiu o processo com algumas gotas de outras soluções sobre o papel com o extrato de violetas e observou as cores obtidas. Esse foi o início do uso de extratos naturais como indicadores ácido-base.

Atualmente, sabemos que as antocianinas são os pigmentos responsáveis pela coloração de diversas flores e que seus extratos apresentam cores que variam em função da acidez ou da alcalinidade do meio, o que explica a mudança de cores de extratos vegetais observada por Boyle.

Esses indicadores estão presentes em nosso dia a dia. O chá preto, por exemplo, muda de cor com a adição de gotas de suco de limão. O extrato de repolho roxo passa dessa cor para verde quando a ele se adiciona uma base, e passa de roxo para vermelho ao ser misturado a uma solução ácida. Os indicadores naturais podem ser obtidos a partir de algumas frutas, flores, legumes ou raízes, alguns sob aquecimento. Sem aquecimento, é comum o uso de solventes como água e álcool etílico. Por exemplo, você pode fazer o extrato de repolho roxo fervendo suas folhas com um pouco de água. Espere esfriar o líquido de coloração roxa, teste-o colocando em contato com vinagre (ácido) e observe a mudança de cor. Por meio do mesmo procedimento, você consegue produzir um ótimo indicador ácido-base com uma beterraba.

Turtle Rock Scientific/Science Source/Fotoarena

Indicador ácido-base feito do extrato de repolho roxo.

CÁLCULO DE pH DE SOLUÇÕES DE ÁCIDOS E BASES

Para calcular o pH das soluções ácidas e básicas, dois aspectos devem ser considerados: a concentração das soluções e os respectivos graus de ionização do ácido ou de dissociação da base.

Soluções de ácidos fortes

Acompanhe a análise do pH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol/L, cujo grau de ionização é considerado igual a 100% a 25 °C. Os íons H^+ presentes nessa solução são provenientes das ionizações da água e do ácido. A $[H^+]$ decorrente da autoionização da água ($1{,}0 \cdot 10^{-7}$ mol/L), porém, é desprezível, de forma que a $[H^+]$ da solução é quase toda gerada na ionização do ácido (0,1 mol/L).

Portanto, temos:

$$HC\ell(aq) \rightarrow H^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

Nessa solução, 0,1 mol/L de $HC\ell$ ioniza-se, formando 0,1 mol/L de H^+ e 0,1 mol/L de $C\ell^-$.

$$[H^+] \text{ da solução} = (1{,}0 \cdot 10^{-7} + 0{,}1) \text{ mol/L} \simeq 0{,}1 \text{ mol/L}$$

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \text{ a } 25\ °C$$

$$0{,}1 \cdot [OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-13} \text{ mol/L}$$

$$pH = -\log 10^{-1} \Rightarrow \mathbf{pH = 1} \text{ e } \mathbf{pOH = 13}$$

A adição de uma solução de ácido forte à água altera seu equilíbrio iônico. O aumento na concentração de íons H_3O^+ pela adição de ácido é acompanhado da diminuição da concentração dos íons OH^- por meio da reação destes com os íons H_3O^+ adicionados. Esse processo pode ser representado pelo gráfico ao lado.

ID/BR



A concentração de H^+ passa a ser maior do que a concentração de OH^-, indicando que a solução é ácida.

Soluções de bases fortes

Considere a dissolução de 0,01 mol/L de NaOH. A concentração de íons OH^- em solução é igual a 0,01 mol/L, pois a concentração de OH^- proveniente da água ($1{,}0 \cdot 10^{-7}$ mol/L) é desprezível também nesse caso. Então:

$$NaOH(aq) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

Nessa solução, 0,01 mol · L^{-1} de NaOH produz 0,01 mol/L de íons OH^- e de íons Na^+.

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \text{ a } 25\ °C$$

$$[H^+] \cdot 0{,}01 = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = 1{,}0 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L}$$

$$pH = -\log 10^{-12}$$

$$\mathbf{pH = 12} \text{ e } \mathbf{pOH = 2}$$

Outra forma de resolução consiste na determinação do pOH a partir da concentração de OH^-, já que se trata de uma solução alcalina.

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 10^{-2}$$

$$pOH = 2 \text{ e } pH = 14 - 2 = 12$$

Soluções de ácidos fracos e de bases fracas

Para determinar a concentração de íons H^+ em solução de ácidos fracos, é necessário conhecer a concentração inicial do ácido, o grau de ionização (α) ou a constante de ionização (K_a), bem como considerar o equilíbrio entre o ácido HA e sua base conjugada A^-. De forma análoga, é possível determinar a $[OH^-]$ e o pH ou pOH de soluções de bases fracas.

Não escreva no livro.

TITULAÇÃO ÁCIDO-BASE

A determinação experimental da concentração de uma solução pode ser feita por meio de um procedimento denominado **titulação**, o qual envolve a adição de uma solução de concentração conhecida – o **titulante** – a uma solução de concentração desconhecida – o **titulado**.

Um volume do titulado é medido de forma precisa, com o uso de uma pipeta volumétrica ou graduada, e transferido para um frasco, geralmente um erlenmeyer, com algumas gotas de um indicador ácido-base adequado.

O titulante é colocado em uma bureta (cilindro de vidro graduado, que permite o acompanhamento do volume adicionado). O gotejamento do titulante deve ocorrer até o ponto de equivalência, situação em que a quantidade de íons de OH^- (ou H^+), em mol, adicionada como titulante, iguala-se à quantidade de íons H^+ (ou OH^-), em mol, encontrada inicialmente na solução titulada.

O **ponto de equivalência** ocorre quando a quantidade adicionada de titulante, em mol, é igual à determinada pela proporção estequiométrica para reação com o titulado. Soluções ácidas são sempre neutralizadas com titulantes básicos de concentração conhecida. Soluções básicas são sempre neutralizadas com titulantes ácidos de concentração conhecida.

Um indicador pode ser usado para acusar o momento em que o titulado foi totalmente neutralizado. Esse ponto é conhecido como **ponto de viragem** do indicador e nesse momento, interrompe-se a adição de titulante e lê-se o volume gasto.

Sérgio Dotta Jr./ID/BR

Na titulação, o titulante geralmente é colocado na bureta, e o titulado, no erlenmeyer.

ATIVIDADE RESOLVIDA

Suponha que a titulação de 5,0 mL de uma amostra de ácido clorídrico ($HC\ell$) tenha consumido 50 mL de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração 0,1 mol/L. Como calcular, com base nesses dados, a concentração do ácido?

Resolução

O primeiro passo consiste em determinar a proporção, em mol, em que os reagentes participam da reação. Para isso, é preciso conhecer a equação química da reação.

$$\underset{\text{ácido clorídrico}}{HC\ell(aq)} + \underset{\text{hidróxido de sódio}}{NaOH(aq)} \rightleftharpoons \underset{\text{cloreto de sódio}}{NaC\ell(aq)} + \underset{\text{água}}{H_2O(\ell)}$$

Portanto, para cada mol de ácido clorídrico, é necessário 1 mol de hidróxido de sódio.

A quantidade de matéria de hidróxido de sódio gasta na titulação é determinada pela relação:

1,0 L de solução = 1000 mL de solução ——— 0,1 mol de NaOH

50 mL de solução ——— x

x = 0,005 mol de NaOH

Para manter a proporção, a quantidade de matéria de ácido clorídrico deve ser a mesma: 0,005 mol.

5,0 mL de ácido clorídrico ——— 0,005 mol de $HC\ell$

1,0 L de ácido clorídrico = 1000 mL de ácido clorídrico ——— y

y = 1,0 mol de $HC\ell$

Portanto, a concentração da amostra de ácido clorídrico titulado é 1,0 mol/L.

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ROTEIRO

4. Uma amostra de sangue analisada por titulação apresentou uma concentração de íons H_3O^+ igual a $5{,}0 \cdot 10^{-8}$ mol/L. Determine o pH dessa amostra, sabendo que log 5 = 0,7.

Investigando o pH de soluções

A escala de pH é utilizada para descrever o grau de acidez de uma solução. Como é possível relacionar a concentração das soluções com o pH, utilizando instrumentos de medida? Nesta atividade, você e os colegas vão realizar a simulação de um peagâmetro para investigar o pH de diferentes soluções, bem como sua variação após a adição de água.

Material

- dispositivo com acesso à internet, para utilizar o simulador de peagâmetro. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html. Acesso em: 15 out. 2024.

Como fazer

1. Acessem a simulação da escala de pH pelo *link* e selecionem a opção "Macro".
2. Escolham "água" para que 0,5 L dessa substância seja adicionado no recipiente. Vocês também podem abrir a torneira da direita para despejar água na cuba.
3. Posicionem o instrumento ligado à faixa de pH na solução para medir o pH. Observem, no visor do peagâmetro, o valor do pH calculado pelo equipamento. Qual é o pH da água pura? Ela é considerada ácida, neutra ou básica?



Phet Colorado. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html. Acesso em: 15 out. 2024.

Simulador de peagâmetro.

4. Copiem a tabela, a seguir, no caderno e utilizem os dados coletados na simulação para completá-la. Para diluir uma amostra, adicione água, abrindo a torneira da direita.

Amostra (0,5 L)	pH	A amostra é acida, básica ou neutra?	pH após adição de 0,25 L de água	pH após adição de 0,5 L de água	A amostra diluída é acida, básica ou neutra?
Suco de laranja	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////////
Leite	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////////
Sabonete	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////////
Canja de galinha	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////////
Sangue	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////////

5. Em seguida, selecionem "café". Qual é o pH do café nesse caso? Ele é considerado ácido, neutro ou básico?
6. Testem a seguinte hipótese: É possível diluir o café até um ponto em que ele se torne básico? Em caso afirmativo, qual é o volume de água necessário? Se for preciso, utilizem a torneira da esquerda para drenar parte da solução.

Para concluir

1 **Com base nos dados coletados, elabore uma regra para a variação do pH após adição de água a uma solução qualquer.**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Você imaginava obter o resultado a que chegou ao analisar soluções de café no item 6 de *Como fazer*? O que se pode concluir dessa investigação? Reúna-se com alguns colegas e discutam o resultado obtido.**
Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **A mistura de partes iguais de sabonete e leite resultaria em uma amostra ácida, neutra ou básica? Explique seu raciocínio.**
Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

SISTEMA-TAMPÃO OU SOLUÇÃO-TAMPÃO

Quando se adiciona ácido ou base à água, mesmo em pequenas quantidades, o pH da solução se altera bruscamente. Já a adição de pequenas quantidades de ácido ou base ao plasma sanguíneo praticamente não produz alterações no pH. Isso acontece porque, no plasma, há espécies químicas capazes de reagir tanto com ácidos quanto com bases, constituindo um **sistema-tampão** ou **solução-tampão**, que evita variações bruscas ou significativas do pH.

O sangue humano é uma complexa mistura de substâncias que apresenta um pH tamponado em aproximadamente 7,4. Se o pH do sangue ficar abaixo de 6,8 ou acima de 8, o organismo tem risco de morrer.

Assim, os sistemas-tampão são especialmente importantes nos processos bioquímicos e fisiológicos que ocorrem em organismos vivos. Muitas das reações que acontecem nos seres vivos são extremamente sensíveis às variações do meio e só se realizam em uma estreita faixa de pH.

Efeito do íon comum

O que ocorre quando acetato de sódio ($NaCH_3COO$) é adicionado a uma solução aquosa diluída de ácido acético (CH_3COOH)? O acetato de sódio é um eletrólito forte, encontrando-se 100% dissociado em solução.

$$\underset{\text{acetato de sódio}}{NaCH_3COO(s)} \xrightarrow{H_2O(\ell)} Na^+(aq) + \underset{\text{íon acetato}}{CH_3COO^-(aq)}$$

Já o ácido acético é um eletrólito fraco e encontra-se pouco ionizado em solução aquosa.

$$\underset{\text{ácido acético}}{CH_3COOH(aq)} \rightleftharpoons H^+(aq) + \underset{\text{íon acetato}}{CH_3COO^-(aq)};\ K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$$

A adição de íons CH_3COO^- altera o equilíbrio no sentido de consumi-los, isto é, no sentido de formação de ácido não ionizado.

O íon sódio liberado na dissolução do sal não interfere no equilíbrio existente na solução de ácido acético porque não faz parte do equilíbrio e não reage com nenhuma espécie presente no equilíbrio.

O íon acetato, entretanto, é um íon comum ao equilíbrio de ionização do ácido acético, e sua adição ao sistema favorece a alteração do equilíbrio representado no sentido de consumir esses íons, diminuindo o grau de ionização do ácido acético. Assim, o **efeito do íon comum** (acetato) provoca a alteração no pH da solução ácida pela presença de sua base conjugada. A ionização do ácido torna-se ainda menor com a presença do íon comum proveniente da dissolução do acetato de sódio. Dessa forma, a concentração de íons $H^+(aq)$ diminui e o pH aumenta.

Tampões fisiológicos

Os sistemas tamponantes são tão essenciais para a existência dos organismos vivos que a ameaça mais imediata à sobrevivência de uma pessoa com ferimentos graves ou queimaduras é a mudança do pH do sangue. [...]

Os processos metabólicos normalmente mantêm o pH do sangue humano dentro de um pequeno intervalo (7,35–7,45). Para controlar o pH do sangue, o corpo usa principalmente o sistema iônico ácido carbônico/hidrogenocarbonato (bicarbonato). A razão normal entre HCO_3^- e H_2CO_3 no sangue é 20:1 [...]. Quando a concentração de HCO_3^- aumenta muito em relação à de H_2CO_3, o pH do sangue sobe. Se o pH sobe acima da faixa normal, a condição é chamada de alcalose. [...] Quando o pH do sangue está abaixo da faixa normal, ocorre acidose. Como essas condições são muito perigosas, é crítico determinar a causa do desbalanço do pH [...].

Atkins, P.; Jones, L.; Laverman, L. *Princípios de química*: questionando a vida moderna e o meio ambiente [recurso eletrônico]. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

PARA EXPLORAR

Acesse

Projeto Coral Vivo

O Projeto Coral Vivo realiza estudos, como o de controle do pH, que servem de subsídio para a gestão de unidades de conservação e uso sustentável de recifes, buscando a compreensão das relações da sociedade com os ambientes de coral. O projeto é liderado por pesquisadores de diversas instituições, em especial do Museu Nacional e Instituto de Geologia da UFRJ, do Instituto de Química da UFF-RJ, e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Núcleo de Educação Ambiental). O *site* do projeto traz várias publicações e notícias atualizadas.

Disponível em: http://coralvivo.org.br. Acesso em: 15 out. 2024.

Como funciona um sistema-tampão

Os sistemas-tampão resistem a variações de pH ao serem diluídos ou ao receberem pequenas quantidades de ácidos ou de bases. Um sistema-tampão pode ser formado, desde que:

- contenha um ácido capaz de reagir com os íons $OH^-(aq)$ adicionados e uma base capaz de reagir com íons $H^+(aq)$ adicionados, de modo que o pH da solução praticamente não sofra alteração;
- não ocorra reação entre o ácido e a base que o constituem.

Dessa forma, esse sistema geralmente é preparado por um par ácido-base assim conjugado:

- um ácido fraco e sua base conjugada, como ácido acético e íon acetato, respectivamente;
- uma base fraca e seu ácido conjugado, como hidróxido de amônio e íon amônio, respectivamente.

Para entender como funciona um sistema-tampão, considere o tampão obtido pela dissolução de 0,1 mol de ácido acético e 0,1 mol de acetato de sódio em água suficiente para formar 1 L de solução, na qual a concentração de íons acetato deve-se praticamente à dissociação do sal. Como a ionização do ácido acético é desprezível diante da concentração relativamente alta de acetato (0,1 mol/L), pode-se desconsiderar a hidrólise do íon acetato em face da concentração relativamente alta de ácido acético (0,1 mol/L).

Dessa forma, a constante de ionização do ácido pode ser representada pela expressão que relaciona as concentrações do ácido acético e do acetato de sódio:

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \text{ ou } K_a = \frac{[H^+] \cdot [NaCH_3COO]}{[CH_3COOH]}$$

Para esse sistema-tampão, considere duas possibilidades de adição.

- **Pequena quantidade de ácido forte**: Isso eleva a concentração de íons H^+ na solução, que são consumidos pelos íons acetato do tampão. Assim, o pH praticamente não varia. Os íons H_3O^+ transferem facilmente prótons para os íons CH_3COO^- porque o H_3O^+ é um ácido muito mais forte do que o CH_3COOH, e a constante de equilíbrio dessa reação é bem alta.

$$H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell);\ K_c = 5{,}6 \cdot 10^4$$

- **Pequena quantidade de base forte**: A adição de uma base eleva a concentração de íons OH^- na solução. Esses reagem com o ácido acético presente no tampão, e o pH praticamente não varia. Os íons OH^- removem facilmente prótons das moléculas de CH_3COOH porque o íon OH^- é uma base muito mais forte do que o íon CH_3COO^- e a constante de equilíbrio dessa reação também é alta.

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_2O(\ell);\ K_c = 1{,}8 \cdot 10^9$$

O raciocínio aplicado ao tampão ácido também pode ser empregado na obtenção de uma solução-tampão formada por uma base fraca e seu ácido conjugado, fornecido como sal. Um tampão desse tipo pode ser obtido pela mistura de cloreto de amônio ($NH_4C\ell$) com uma solução aquosa de amônia, na qual ocorrem os seguintes processos:

$$NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \qquad \textbf{(I)}$$

$$NH_4C\ell(s) \rightarrow NH_4^+(aq) + C\ell^-(aq) \qquad \textbf{(II)}$$

Ao se adicionar uma base ao sistema, os íons OH^- são consumidos pelos íons NH_4^+, presentes na solução. Ao se adicionarem íons H_3O^+ ao sistema, estes são consumidos pelas moléculas de NH_3, que capturam os prótons e se transformam em íons. Assim, o pH praticamente não varia.

Há um limite para as quantidades de ácido e de base adicionadas a um sistema-tampão, chamado de **capacidade do tampão**, que é a quantidade de matéria de um ácido forte ou de uma base forte necessária para que 1 L da solução-tampão sofra uma variação de 1 unidade de pH.

AÇÃO E CIDADANIA

O pH da saliva e as cáries

A capacidade tamponante da saliva é a propriedade que faz com que ela mantenha seu pH constante no intervalo 6,8–7,0. Essa capacidade é explicada pelos tampões, que neutralizam o excesso de ácidos e de bases. Um dos tampões envolve o sistema bicarbonato/ácido carbônico.

$$H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons$$
$$\rightleftharpoons H_2O + CO_2$$

O elevado poder tamponante da saliva mantém a saúde da mucosa bucal e dos dentes. Os sistemas-tampão atuam para manter o pH acima de 6. A diminuição do pH na boca pode ser causada pela ingestão de frutos cítricos e de bebidas gaseificadas ou, indiretamente, pelo consumo de alimentos ricos em carboidratos fermentáveis, que se transformam em ácidos sob ação de bactérias. Esses ácidos causam erosão do esmalte dos dentes, propiciando o surgimento das cáries.

1. **De acordo com o texto, quais são os tipos de alimento que diminuem o pH na boca?**
2. **Pesquise na internet sobre a importância de se escovar os dentes pela manhã, logo que acordamos e após as refeições.**

1. Frutos cítricos, bebidas gaseificadas e alimentos ricos em carboidratos fermentáveis.
2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

QUÍMICA E BIOLOGIA

A ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS

[...]

A capacidade do oceano de absorver CO_2 da atmosfera é regulada por dois tipos de processos, denominados bomba física e bomba biológica. A bomba física está relacionada à solubilidade do CO_2 na água do mar. Uma vez dissolvido, o CO_2 reage com a água para formar ácido carbônico (H_2CO_3) que se transforma em íons H^+ e HCO_3^-. Em uma situação de equilíbrio, os íons H^+ em excesso reagem com os íons carbonato (CO_3^{2-}) para formar bicarbonato (HCO_3^-), evitando assim a acidificação da água. A bomba biológica ocorre depois dessa dissolução e diz respeito à assimilação do gás durante a "produção primária" marinha (fotossíntese) e ao transporte dos detritos produzidos pelo fitoplâncton para o oceano profundo. Dessa forma, a bomba biológica possibilita que o CO_2 seja absorvido da atmosfera. A integração entre os mecanismos da bomba física e a bomba biológica permite que os oceanos moderem os impactos do clima na vida terrestre. Sem a interação entre a atmosfera e o oceano a concentração de CO_2 na atmosfera seria muito mais elevada que a atual.

Com o aumento da concentração de CO_2 na atmosfera, a dissolução desse gás na superfície marinha também aumenta.

[...]

As consequências da acidificação dos oceanos nos organismos marinhos dependem de suas características metabólicas e estruturais, níveis de atividade e aspectos do ciclo de vida. Estudos sobre os efeitos da acidificação foram realizados em diversos grupos de organismos marinhos revelando impactos no metabolismo, crescimento e calcificação, expressão gênica, sistema imunológico e estrutura da comunidade, que poderiam produzir efeitos devastadores na cadeia alimentar e nos ecossistemas. [...] Os organismos potencialmente mais sensíveis são os que possuem esqueletos calcários (compostos por calcita ou aragonita), já que, em pH mais baixo, a produção do esqueleto pode ser severamente comprometida pela dificuldade em se depositar carbonato de cálcio. As estruturas calcárias expostas à água também podem ser dissolvidas, reduzindo a capacidade de sustentação e proteção do organismo. [...]

TURRA, A.; MAIA, R. A. Impacto das mudanças climáticas sobre os oceanos. *In*: JACOBI, P. R. *et al.* (org.). *Temas atuais em mudanças climáticas para os ensinos Fundamental e Médio*. São Paulo: IEE-USP, 2015. p. 57-59. Disponível em: https://livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/315/276/1178. Acesso em: 15 out. 2024.



Buttchi 3 Sha Life/Shutterstock.com/ID/BR

Os ecossistemas de corais são mais sensíveis às alterações causadas pela acidificação dos oceanos. Okinawa, Japão. Foto de 2016.

Conecte as ideias

1 **Suponha que a principal fonte de renda de famílias de pescadores costeiros seja a pesca e a venda de peixes e frutos do mar, como lagostas, camarões e ostras. Com a acidificação dos oceanos, essas famílias seriam prejudicadas? Como? Reescreva um trecho do texto em sua resposta.**

Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **As implicações da acidificação dos oceanos dependem das características de cada espécie. De acordo com o texto, como esse processo de acidificação afetaria organismos com esqueleto calcário?**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Que medidas podem ser tomadas a fim de minimizar os impactos da acidificação do oceanos? Se necessário, faça uma pesquisa.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **Um químico precisa de 1 L de uma solução de ácido clorídrico com pH = 6. Em seu laboratório, ele verificou que já existia uma solução desse ácido, porém, de pH = 4. Determine o volume de água, em litros, a ser adicionado a essa solução para transformá-la em uma solução final de pH 6.**

Resolução:

HCℓ é um ácido forte. Assim, podemos considerar que o seu grau de ionização é igual a 100% e, portanto, $[HC\ell] = [H^+]$

Sabemos que: $pH = -\log[H^+] \rightarrow [H^+] = 10^{-pH}$

Solução inicial: $pH = 4 \rightarrow [H^+]_{inicial} = 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$

Solução final: $pH = 6 \rightarrow [H^+]_{final} = 10^{-6}\ mol \cdot L^{-1}$

A quantidade de HCℓ não altera com a diluição, pois esta ocorre com adição de água, apenas. Portanto,

$n_{HC\ell}$ (inicial) = $n_{HC\ell}$ (final)

Como $n = [\ ] \cdot V$, temos que

$$[H^+]_{inicial} \cdot V_{inicial} = [H^+]_{final} \cdot V_{final}$$
$$10^{-4} \cdot 1 = 10^{-6} \cdot V_{final}$$

$V_{final} = 10^2 = 100$ L

Como o volume inicial era de 1 L e o volume após a diluição é de 100 L, o volume de água adicionado de água é a diferença entre esses valores (100 − 1), isto é, deve-se adicionar 99 L de água.

2 **O pH é um dos fatores importantes para medir a qualidade da água e sua relação com o desenvolvimento dos peixes. A maioria dos peixes vive em águas cujo pH varia entre 6,0 e 8,5. Valores abaixo de 4,0 ou acima de 11,0 inviabilizam a sobrevivência desses animais. Sobre esse assunto, responda:**

a) A decomposição de matéria orgânica, como restos de alimentos, e a excreção dos peixes liberam amônia na água. Considerando apenas o aumento da concentração de amônia na água, o pH tende a aumentar ou diminuir nesse ambiente aquático? Explique. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

b) Com o passar do tempo, a amônia é consumida por bactérias nitrificantes e transformada em ácido nitroso e nítrico, fazendo com que o pH da água varie. Nessa transformação, o pH da água vai aumentar ou diminuir? Explique.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Além de serem encontrados na maioria das frutas, o ácido cítrico ($K_a = 8{,}0 \cdot 10^{-4}$) e o ácido ascórbico ($K_a = 8{,}0 \cdot 10^{-5}$) são produzidos industrialmente para diversas aplicações, inclusive como acidulantes de alguns produtos.**

Considerando 1 litro de soluções de mesma concentração desses dois ácidos, pede-se:

a) Qual deles apresenta o maior grau de ionização? Justifique sua resposta.
O ácido cítrico é o ácido mais forte por apresentar maior valor de K_a e, portanto, deve ter o maior grau de ionização.

6. b) O ácido cítrico é um ácido fraco que, em conjunto com os sais (bicarbonato e carbonato de sódio), forma um sistema-tampão.

b) Qual das duas soluções apresenta o maior valor de pH? Justifique sua resposta sem a realização de cálculos numéricos. Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **O gráfico a seguir representa a variação da constante de ionização da água (K_w) em função da temperatura. Determine a concentração de íons H_3O^+ e OH^- na água pura a 45 °C.**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.



ID/BR

5 **Agentes de limpeza alcalinos são comumente usados na remoção de sujeira pesada. Entretanto, eles devem ser utilizados com muito cuidado por serem corrosivos e poderem causar ferimentos graves no organismo humano.** **5. a)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Observe alguns exemplos de agentes de limpeza com seus respectivos valores de pH. **5. b)** O produto mais nocivo é o de maior caráter alcalino por apresentar a maior $[OH^-]$ e maior valor de pH. Trata-se do limpador de forno.

- Detergente líquido: pH = 8
- Limpador multiuso: pH = 11
- Limpador de forno: pH = 13

a) Calcule a concentração de íons OH^-, em mol/L, presente nos três produtos. Dado $K_w = 1{,}0 \cdot 10^{-14}$.

b) Dentre os produtos de limpeza citados, indique qual deve ser o mais nocivo e, por isso, deve-se evitar o contato direto do produto com a pele. Justifique sua resposta.

c) Determine a relação entre os valores de $[OH^-]$ do limpador multiuso e do detergente líquido.

5. c) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6 **A bula de um medicamento utilizado para diminuir a acidez estomacal traz a seguinte composição:**

Cada 5 g do medicamento contém:	
bicarbonato de sódio	2,31 g
ácido cítrico (anidro)	2,19 g
carbonato de sódio	0,50 g

Em relação a esse medicamento, pergunta-se:

a) Qual é a função dos sais bicarbonato de sódio e carbonato de sódio no medicamento?

b) Se o medicamento é utilizado para diminuir a acidez estomacal, por que há um ácido (cítrico) em sua composição?

6. a) Ambos são sais de ácido fraco e base forte, de forma que sofrem hidrólise básica em contato com a água, diminuindo a acidez e o desconforto estomacal.

Não escreva no livro.

7. a) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor. **7. b)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor. **7. c)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7 **O ácido ascórbico ($C_6H_8O_6$), conhecido como vitamina C, está associado a diversas funções metabólicas essenciais. A ingestão adequada de ácido ascórbico evita o escorbuto e fornece proteção antioxidante. Todas as frutas e verduras contêm alguma quantidade de ácido ascórbico, e nas frutas cítricas ele é componente importante.**

Considerando que 150 mL de suco de laranja fresco contém 29,6 mg de vitamina C, a 25 °C, pede-se:

a) a concentração de ácido ascórbico, em mol · L^{-1}, no suco de laranja considerado.

b) a concentração de íons H^+, em mol · L^{-1}, no suco de laranja considerado.

c) o pH do suco de laranja considerado.

Dados: K_a **do ácido ascórbico (a 25 °C) = 8,0 · 10^{-5}; massa molar do ácido ascórbico = 176 g · mol^{-1}; log 3 = 0,5.**

8 **De modo geral, as plantas podem ser cultivadas em uma faixa relativamente ampla de pH. No entanto, a faixa ótima de pH depende de cada cultura, como pode ser observado na tabela a seguir. Analise-a e responda aos itens a seguir.**



Faixas de pH do solo mais adequadas para algumas culturas.

8. a) A maioria das culturas apresenta faixas ótimas de pH abaixo de 7, isto é, preferem solos levemente ácidos.

a) A maioria das culturas se desenvolve melhor em solos ácidos ou básicos?

b) Indique a faixa de pH ideal para a maioria das culturas. **8. b)** A maioria das culturas apresentadas na tabela tem pH mais adequado entre 5,5 e 7,0.

c) Quais culturas podem ser cultivadas em solos em que a concentração de íons OH^- é superior a 10^{-7} mol/L? Abacate, maçã, pera, pêssego e alfafa.

d) Quais culturas apresentam melhor produtividade na estreita faixa de pH em que a $[H^+]$ varia de $3 \cdot 10^{-7}$ mol/L a $1 \cdot 10^{-6}$ mol/L? **Dado:** log 3 = 0,5 Cebola e quiabo.

9 **Atividades antropogênicas aceleraram o aumento da concentração de CO_2 na atmosfera, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, atividades industriais e uso da terra. Os oceanos absorvem cerca de 30% desse CO_2, reduzindo o impacto desse gás de efeito estufa sobre as mudanças climáticas. Entretanto, provocou um desastroso impacto sobre a química e a biota marinha. Estudos indicam que, se não diminuirmos as emissões de CO_2, o pH da água do mar diminuirá em 0,3 unidade de pH até o final do século XXI.**

a) Escreva o equilíbrio químico que relaciona a dissolução de CO_2 na água e a acidificação das águas oceânicas. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

b) Calcule o aumento da concentração de íons H^+ com o decréscimo de 0,3 unidade de pH. Considerando que o pH atual da água do mar seja 8,0, determine a concentração de íons H^+ se o pH passasse a 7,7.
Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

CAPÍTULO 3

EQUILÍBRIOS EM SISTEMAS HETEROGÊNEOS

PARA COMEÇAR

1. O que são equilíbrios heterogêneos?
2. Como o aumento da concentração de CO_2 na atmosfera altera o pH da água do mar?
3. Como se formam os cálculos renais?

1. Equilíbrios heterogêneos ocorrem entre substâncias em diferentes fases (sólida, líquida, gasosa), que coexistem em equilíbrio químico.

2. O CO_2 na atmosfera dissolve-se no oceano, formando ácido carbônico, que diminui o pH da água, tornando-a mais ácida.

3. Cálculos renais se formam pela cristalização de minerais e sais presentes na urina, quando há desequilíbrio na concentração dessas substâncias.

ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS

Os recifes de corais constituem cerca de 30% da costa do planeta e desempenham um papel crucial na preservação da biodiversidade marinha. A sobrevivência dos recifes de corais depende de sua relação de mutualismo com as zooxantelas, algas unicelulares que vivem nos tecidos desses corais. Ao realizar fotossíntese, as zooxantelas fornecem nutrientes e oxigênio aos corais, enquanto estes fornecem dióxido de carbono e outros nutrientes de que as algas precisam. Por meio desse benefício mútuo, forma-se o exoesqueleto de calcário dos corais, que serve de proteção para ambos e abriga o ecossistema mais diverso do ambiente marinho, hábitat e berçário de inúmeras espécies marinhas. As zooxantelas são responsáveis pela beleza e pela variedade das cores dos corais.

Atualmente, a estabilidade dos recifes está sendo impactada pelas mudanças climáticas, principalmente por meio de eventos extremos como as ondas de calor marinhas. Quando expostos a temperaturas elevadas por um longo período, os corais expulsam as zooxantelas, ficam esbranquiçados – fenômeno conhecido como branqueamento dos corais – e perdem uma importante fonte alimentar, o que pode causar a morte deles. Em 2020, foi registrada uma forte onda de calor no nordeste brasileiro, que provocou um branqueamento de corais nunca visto na região até aquele momento.

Essa crise na relação entre corais e zooxantelas tem sido intensificada pela alta concentração de CO_2 na atmosfera. Os oceanos absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono presente na atmosfera, provocando a diminuição do pH de suas águas, processo chamado de **acidificação dos oceanos**. Estudos indicam que corais, equinodermos, crustáceos e moluscos são afetados negativamente pela acidificação moderada do oceano de maneiras e intensidades variadas.

A formação e a corrosão de estruturas calcárias, como as dos corais, constituem um equilíbrio heterogêneo – assunto que será estudado nesse capítulo.

Processo de branqueamento de recifes de corais, na Indonésia, causado pela acidificação dos oceanos.

Scubazoo/SPL/Fotoarena

Não escreva no livro.

EQUILÍBRIOS HETEROGÊNEOS

Equilíbrios homogêneos envolvem reagentes e produtos que se misturam uniformemente formando uma única fase. É o que ocorre em sistemas gasosos e nos equilíbrios em que todos os participantes se encontram dissolvidos em uma mesma fase líquida, como a maioria dos equilíbrios estudados até aqui.

A solubilidade de gases em líquidos ou a formação de precipitados em solução aquosa, entretanto, são exemplos de processos que envolvem equilíbrios em sistemas com mais de uma fase, os quais são chamados de **equilíbrios heterogêneos** (imagens **A** e **B**).



Orinoco-art/Klaus Hoffmann/Stock/Getty Images

Johnandersonphoto/iStock/Getty Images

A água com gás (**A**) e o coral no fundo do mar (**B**) constituem sistemas heterogêneos.

K_c para equilíbrios heterogêneos

Os sistemas heterogêneos, assim como os homogêneos, também são capazes de alcançar um estado de equilíbrio dinâmico, tornando possível associar a eles uma constante de equilíbrio.

Tem-se, como exemplo, a análise da decomposição térmica do bicarbonato de sódio, $NaHCO_3(s)$, em um sistema fechado.

$$2\ NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

Nesse equilíbrio heterogêneo coexistem duas fases: uma sólida, constituída de carbonato e bicarbonato de sódio, e outra gasosa, formada pelo vapor de água e pelo dióxido de carbono. A expressão da constante de equilíbrio para essa reação é a seguinte:

$$K_c = [H_2O] \cdot [CO_2]$$

Lembre-se de que sólidos e líquidos puros não fazem parte da expressão da constante K_c. As concentrações dessas substâncias não mudam significativamente, isto é, são constantes e já estão incorporadas no valor da constante de equilíbrio. Alterações na quantidade dessas substâncias também não alteram o estado de equilíbrio, mas é importante ressaltar que a presença delas no sistema é fundamental para o estabelecimento do equilíbrio heterogêneo.

QUÍMICA E BIOLOGIA

Cálculos renais

O corpo humano tem componentes como ácido úrico, cálcio, oxalato e cistina, normalmente eliminados pela urina. Em alguns casos, porém, o organismo começa a reter alguns desses componentes, formando cristais denominados cálculos renais. Os cálculos de oxalato de cálcio (CaC_2O_4) são os mais frequentes. O equilíbrio do sólido e de seus íons em solução aquosa pode ser expresso pela equação:

$$CaC_2O_4(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$$

Quando pequenos, os cristais formados podem ser expelidos naturalmente pela urina sem serem percebidos. No entanto, há casos em que o indivíduo apresenta sintomas. As manifestações mais comuns dessa condição são: desconforto e sangramento ao urinar, febre e dores intensas na região lombar.

Como evitar

A formação dos cálculos ocorre por meio de um processo complexo e multifatorial. Distúrbios metabólicos, infecções urinárias de repetição, histórico familiar, hipertensão, diabetes, obesidade e dieta estão entre os fatores de risco para a formação de "pedra nos rins".

Um bom padrão alimentar e um estilo de vida saudável representam estratégias necessárias a serem adotadas por indivíduos com tendência à doença do cálculo renal. Cerca de 50% dos pacientes que já tiveram um cálculo renal terão outro se não fizerem tratamento preventivo. Nesses casos, o ideal é ser avaliado periodicamente por um médico urologista.

1. **Pesquise que medidas relacionadas à dieta e ao estilo de vida podem ser adotadas para evitar problemas como o cálculo renal e escreva um parágrafo resumindo essas medidas.**

Aumentar a ingestão de frutas e legumes, não exagerar no sal e nos alimentos ultraprocessados, não fumar, praticar atividades físicas com regularidade e beber água em quantidade adequada.

K_p para equilíbrios heterogêneos

A constante de equilíbrio em função das pressões parciais (K_p) somente é aplicada a equilíbrios que envolvam participantes gasosos. Em casos de equilíbrios heterogêneos que envolvem gases, apenas as pressões dos componentes gasosos participam da expressão de K_p.

Por exemplo, considere a formação de cloreto de amônio a partir de amônia e gás clorídrico e note a expressão da constante K_p.

$$NH_3(g) + HC\ell(g) \rightleftharpoons NH_4C\ell(s);\ K_p = \frac{1}{p_{NH_3} \cdot p_{HC\ell}}$$

SOLUBILIDADE DE GASES EM LÍQUIDOS

Além de interagir e de reagir com o solvente, os equilíbrios que envolvem gases sofrem grande influência da temperatura e da pressão a que estão submetidos, a saber:

- **temperatura:** a solubilidade da grande maioria dos gases diminui com o aumento da temperatura, sob pressão constante. Quando um gás se dissolve no líquido, estabelecem-se interações intermoleculares e o processo libera energia. O processo inverso – ruptura das interações intermoleculares – é endotérmico, de modo que o aumento de temperatura favorece o escape de gás da solução.
- **pressão:** a solubilidade de gases em líquidos aumenta com o aumento de pressão. Um equilíbrio químico que envolve espécies gasosas, quando submetido a um aumento de pressão, é favorecido no sentido em que há diminuição de volume, ou seja, no sentido da dissolução do gás no líquido.

Quantitativamente, é possível estabelecer a relação entre a solubilidade do gás e sua pressão parcial pela Lei de Henry:

$$\text{Solubilidade do gás} = k \cdot \text{(pressão parcial)}$$

Nessa expressão, k é uma constante de proporcionalidade (constante de Henry) que depende da natureza do solvente, do gás e da temperatura.

Solubilidade do gás carbônico em água e a acidificação da água dos oceanos

A solubilidade dos gases em água aumenta quando ocorrem interações intermoleculares que resultam em reações químicas. É o que ocorre na dissolução do gás carbônico (CO_2) em água, como representado nas equações a seguir.

(I) $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$

(II) $CO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$

(III) $HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

O equilíbrio heterogêneo **(I)**, que representa a dissolução do CO_2 gasoso na água, depende da temperatura e da pressão. Com o incremento de $CO_2(g)$ ao equilíbrio **(I)**, o sentido da formação dos produtos é favorecido nos três equilíbrios, aumentando a concentração de íons H^+ e acidificando o sistema aquoso.

A rapidez de formação e dissolução de carbonato de cálcio, presente na carapaça e no exoesqueleto de diversas espécies marinhas, depende das concentrações de íons cálcio e íons carbonato **(IV)** e também da concentração de íons H^+ **(V)**.

(IV) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

(V) $CaCO_3(s) + 2\ H^+(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$

Desde a era pré-industrial, estima-se que a concentração de gás carbônico na atmosfera tenha aumentado cerca de 40%, resultando em redução de pH

PARA EXPLORAR

Leia

Nova onda de branqueamento afeta corais brasileiros

A matéria, publicada em março de 2024, por Vitor Abdala, na *Agência Brasil*, relata o processo de branqueamento de corais no Brasil, um problema que vem se agravando com o aquecimento global.

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-03/nova-onda-de-branqueamento-afeta-corais-brasileiros. Acesso em: 2 out. 2024.

Não escreva no livro.

das águas superficiais em cerca de 0,1 unidade. Caso dobre a concentração de gás carbônico na atmosfera, a redução de pH seria da ordem de 0,3-0,4 unidade, de acordo com as projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com trágicas consequências ao ecossistema marinho. As fotografias mostram a consequência desse problema para algumas espécies marinhas.

Fotografias: NOAA/SPL/Fotoarena

Estrutura saudável e estrutura danificada de um animal marinho, decorrente da acidificação dos oceanos.

PERTURBAÇÃO DE EQUILÍBRIOS HETEROGÊNEOS

O princípio de Le Châtelier pode ser aplicado aos equilíbrios heterogêneos, como será estudado a seguir.

Efeito da adição ou remoção de reagente ou produto

A ureia, $CO(NH_2)_2$, substância sintetizada da amônia e do gás carbônico, atualmente é a principal fonte de nitrogênio para a agricultura brasileira.

$$CO_2(g) + 2\ NH_3(g) \rightleftharpoons NH_4(NH_2CO_2)(s) \rightleftharpoons CO(NH_2)_2(s) + H_2O(g)$$

A formação de ureia é favorecida pela adição de $CO_2(g)$ e $NH_3(g)$ e pela remoção de $H_2O(g)$.

Nessa síntese, é desejável que haja o favorecimento da reação direta, o que pode ser obtido pela remoção de vapor de água e/ou pela adição de dióxido de carbono e de amônia ao sistema.

Efeito da pressão

A primeira etapa do processo de obtenção da ureia corresponde à formação de carbamato de amônio sólido, $NH_4(NH_2CO_2)$, a partir de $CO_2(g)$ e $NH_3(g)$. A reação direta desse equilíbrio é favorecida pelo aumento de pressão no sistema, pois nesse sentido há formação do sólido $NH_4(NH_2CO_2)$, que ocupa volume bem menor do que os gases CO_2 e NH_3. O volume de sólido praticamente não sofre influência de alterações de pressão.

$$CO_2(g) + 2\ NH_3(g) \rightleftharpoons NH_4(NH_2CO_2)(s)$$

O aumento de pressão favorece o sentido que ocupa menor volume.

Efeito da temperatura

A segunda etapa do processo de obtenção da ureia corresponde à decomposição do carbamato de amônio em ureia e água por meio de um processo endotérmico:

$$NH_4(NH_2CO_2)(s \rightleftharpoons CO(NH_2)_2(s) + H_2O(g);\ \Delta H > 0$$

O aumento de temperatura favorece o processo endotérmico.

Nessa etapa, a temperatura elevada favorece a formação de ureia, uma vez que, sendo um sistema endotérmico ($\Delta H > 0$), os produtos têm maior conteúdo energético do que os reagentes.

Não escreva no livro.

PRODUTO DE SOLUBILIDADE (K_{ps})

A constante associada ao equilíbrio dinâmico entre um sólido e seus íons em solução saturada é chamada **constante de solubilidade** ou **constante do produto de solubilidade** e é representada por K_{ps}.

O K_{ps} é usado apenas para substâncias pouco solúveis e, portanto, seus valores são geralmente muito baixos. Lembre-se de que a concentração do sólido é constante e já está embutida no valor de K_{ps}, por isso não participa da expressão do produto de solubilidade.

Considerando a dissolução de um sólido genérico de fórmula A_mB_n, temos:

$A_mB_n(s) \rightleftharpoons m\,A^{n+}(aq) + n\,B^{m-}(aq)$ $\qquad K_{ps} = [A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$

Observe os equilíbrios de dissolução do PbI_2 e do $Ca_3(PO_4)_2$ e seus valores de K_{ps} a 25 ºC.

$PbI_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2\,I^-(aq)$ $\qquad K_{ps} = [Pb^{2+}] \cdot [I^-]^2 = 9{,}8 \cdot 10^{-9}$

$Ca_3(PO_4)_2(s) \rightleftharpoons 3\,Ca^{2+}(aq) + 2\,PO_4^{3-}(aq)$ $\qquad K_{ps} = [Ca^{2+}]^3 \cdot [PO_4^{3-}]^2 = 2{,}7 \cdot 10^{-33}$

A determinação do K_{ps} serve de parâmetro para comparar a solubilidade de diferentes sólidos em água, controlar a formação de precipitados, analisar e separar misturas de sólidos. A solubilidade de uma substância é resultado das interações entre soluto e solvente, e depende de diversos fatores como temperatura, pH do meio reacional, tamanho das partículas, efeito do íon comum, etc.

Relação entre produto de solubilidade (K_{ps}) e solubilidade (S)

A **constante do produto de solubilidade (K_{ps})** é a constante de equilíbrio associada ao equilíbrio entre um sólido iônico pouco solúvel e sua solução saturada. A **solubilidade molar (S)** de uma substância, por sua vez, é a quantidade de matéria do sólido que se dissolve para formar um litro de solução saturada. Ambos dependem da temperatura do sistema.

Considere o equilíbrio a seguir, em que são dissolvidos x mol/L de PbI_2 em água. Nessa dissolução, encontram-se x mol/L de íons Pb^{2+} e $2x$ mol/L de íons I^- na solução saturada.

$$PbI_2(s) \underset{\text{produz}}{\overset{\rightleftharpoons}{\longrightarrow}} Pb^{2+}(aq) + 2\,I^-(aq)$$

$$x\ (\text{mol/L}) \qquad x\ (\text{mol/L}) \quad \text{e} \quad 2x\ (\text{mol/L})$$

$$K_{ps} = [Pb^{2+}] \cdot [I^-]^2 \Rightarrow K_{ps} = (x) \cdot (2x)^2 = 4x^3 \Rightarrow K_{ps} = 4x^3$$

Nesse caso, a relação entre o produto de solubilidade e a solubilidade molar é: $K_{ps} = 4x^3$.

Os valores de K_{ps} são importantes em diversos setores. Na indústria farmacêutica, em particular, é de fundamental importância o conhecimento da biodisponibilidade de determinadas espécies químicas, pois medicamentos que apresentam baixa solubilidade podem representar baixa absorção e efeitos terapêuticos pouco efetivos. Da mesma forma, também é importante avaliar a dosagem de espécies tóxicas presentes nos medicamentos e seus efeitos colaterais.

Um trágico caso envolvendo um laboratório farmacêutico mobilizou os noticiários brasileiros em 2003. Cerca de 150 pessoas foram intoxicadas e pelo menos 10 faleceram em decorrência da ingestão de um contraste à base de sulfato de bário ($BaSO_4$), ao realizarem exames radiológicos. O sulfato de bário é praticamente insolúvel tanto em água quanto em meio ácido. Apesar dos íons Ba^{2+} serem extremamente tóxicos, a quantidade ingerida no contraste é muitas vezes menor do que a dose letal e sua utilização não representa perigo nenhum. Mas como explicar o ocorrido?

A investigação mostrou que o contraste estava contaminado com carbonato de bário ($BaCO_3$). Apesar de ser praticamente insolúvel em água, ele reage com o ácido clorídrico presente no suco gástrico, liberando os íons Ba^{2+} no estômago.

O laboratório farmacêutico tentou reduzir custos ao sintetizar $BaSO_4$ a partir de carbonato de bário, mas não fez todos os testes e ajustes com a devida responsabilidade, provocando o envenenamento dos pacientes.

Medimage/SPL/Fotoarena

Filme de raios X do trato intestinal de uma pessoa após a ingestão de contraste.

ROTEIRO

1. A constante de equilíbrio associada à dissolução de um sólido pouco solúvel em água é chamada de produto de solubilidade, porque a sua expressão corresponde ao produto das concentrações de seus íons, cada uma delas elevada aos respectivos índices na fórmula da substância. Por que a concentração do sólido não participa da expressão do produto de solubilidade?

A concentração do sólido não participa da expressão da constante porque seu valor é constante e já está embutido no valor do produto de solubilidade, que é constante em determinada temperatura-padrão. Por isso, o denominador da expressão da constante de solubilidade é sempre igual a 1.

Não escreva no livro.

A influência da temperatura na solubilidade dos sais

Vimos que a solubilidade dos gases em líquidos diminui com o aumento da temperatura. E no caso dos sólidos, como a temperatura influencia a solubilidade? Nesta atividade, você vai estudar o efeito da temperatura na solubilidade do sulfato de cobre(II) e do sulfato de sódio.

Material

- 2 cubas ou recipientes de plástico transparente
- 2 pinças de madeira
- 2 tubos de ensaio do mesmo tamanho
- água
- caneta esferográfica
- colher plástica pequena
- estante para tubos de ensaio
- fita-crepe
- água quente
- gelo
- 2 recipientes de vidro
- régua
- solução saturada de sulfato de sódio ($Na_2SO_4 \cdot 7\ H_2O$) – sal de Glauber)
- sulfato de cobre(II) pentaidratado ($CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$)

Como fazer

1. Copie no caderno a tabela a seguir.

	Temperatura ambiente	Temperatura alta	Temperatura baixa
Tubo A [sulfato de cobre(II)]	////////////////////// //////////////////////	////////////////////// //////////////////////	////////////////////// //////////////////////
Tubo B [sulfato de sódio]	////////////////////// //////////////////////	////////////////////// //////////////////////	////////////////////// //////////////////////

2. Identifique os tubos de ensaio como **A** e **B**, utilizando fita-crepe e caneta esferográfica.

3. No tubo **A,** introduza, com cuidado, duas colheres cheias de sulfato de cobre(II) e adicione água até um oitavo do volume do tubo de ensaio.

4. No tubo **B,** coloque solução de sulfato de sódio até aproximadamente um oitavo do volume do tubo.

5. Observe se houve formação de corpo de fundo. Se necessário, meça a altura do sólido não dissolvido com a régua e anote o resultado na coluna "Temperatura ambiente" da tabela.

6. Usando as pinças de madeira, coloque os dois tubos de ensaio em um recipiente com água quente.

7. Aguarde cinco minutos e, então, retire os tubos de ensaio do recipiente e anote as mudanças observadas. Deixe-os em repouso na estante de tubos. Meça a altura do precipitado (se existir) e complete a coluna "Temperatura alta" da tabela.

8. Espere até que os tubos de ensaio esfriem e introduza-os em um recipiente com água e gelo por aproximadamente dez minutos. Observe as modificações ocorridas. Em seguida, meça a altura atingida pelos sólidos não dissolvidos, se existirem, e complete a coluna "Temperatura baixa".

Fonte de pesquisa: Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC-USP). Experimentoteca. Disponível em: https://sites.usp.br/cdcc/wp-content/uploads/sites/512/2019/08/solubilidade-temperatura.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

ATENÇÃO!

Equipamentos de segurança
Óculos de segurança e avental de algodão com mangas compridas.



Sérgio Dotta Jr./ID/BR

ATENÇÃO!

Resíduos
Guarde as soluções devidamente separadas nos recipientes de vidro e rotule-as. As soluções podem ser utilizadas em outras atividades experimentais.

Para concluir

1 **De acordo com os resultados obtidos no experimento, o que é possível concluir sobre o efeito da temperatura na dissolução do sulfato de cobre(II)?** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Qual é o efeito da temperatura na dissolução do sulfato de sódio?**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

DESPOLUIÇÃO DA ÁGUA POR PRECIPITAÇÃO

O tratamento de efluentes é um processo importante para evitar a poluição de corpos de água por contaminantes tóxicos para os seres humanos e outros animais, além de preservar os recursos naturais. Efluentes são resíduos geralmente líquidos, produzidos por atividades humanas, como as industriais e a agropecuária, que são despejados no ambiente. Os efluentes podem apresentar materiais orgânicos e inorgânicos. Os resíduos orgânicos podem conter excesso de nutrientes, que provocam a multiplicação descontrolada de algas e de outros microrganismos aquáticos, desequilibrando o ambiente. Os inorgânicos, por sua vez, podem conter metais pesados, que são tóxicos para os seres humanos e para outros seres vivos.

Esses metais, como o cromo, o manganês, o cádmio, o níquel e o chumbo, quando dissolvidos em água, podem ser facilmente disseminados por meio da cadeia alimentar, acumulando-se no organismo de diversas espécies aquáticas (bioacumulação). A contaminação da água por metais também pode diminuir a realização da fotossíntese das espécies aquáticas, uma vez que essas partículas podem aumentar a turbidez da água, resultando em menor incidência de raios solares. Além disso, resíduos que contêm metais pesados também afetam a saúde humana, pois podem atingir fontes de abastecimento de água dos municípios. Em excesso, os metais podem causar dermatites, náuseas, desmaios, entre outros problemas de saúde.

Delfim Martins/Pulsar Imagens

Estação de tratamento de efluentes de indústria de papel e celulose em Aracruz (ES). Foto de 2019.

Não escreva no livro.

Atualmente, as atividades de setores industriais, como mineração, siderurgia, petroquímica, são algumas das principais responsáveis pelo aumento da concentração de metais pesados na água, quando os efluentes não são tratados corretamente. Nesse contexto, o Brasil dispõe de uma legislação ambiental estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que define as diretrizes e responsabilidades em relação ao tratamento de efluentes. As indústrias que não aplicarem os procedimentos adequados de tratamento de efluentes podem ser multadas e terem suas atividades paralisadas.

Spline_x/Shutterstock.com/ID/BR

Amostra de óxido de cálcio (CaO).

O tratamento de efluentes industriais envolve diversos processos para a remoção de contaminantes. A remoção de metais pesados dissolvidos em água, por exemplo, pode ser feita por precipitação. Nesse processo, é adicionada ao efluente uma substância que vai reagir com os íons metálicos dissolvidos em água, formando um produto insolúvel em água, que vai precipitar e, posteriormente, pode ser removido por meio da decantação e da filtração.

Como a solubilidade de uma substância também depende do pH do meio, pode ser necessário realizar outros procedimentos para correção do pH e posterior precipitação dos metais na faixa de pH mais adequada.

Uma das substâncias utilizadas na precipitação de metais é o óxido de cálcio (CaO), conhecido popularmente como cal. Ela reage com a água, formando hidróxido de cálcio (ou cal hidratada), de acordo com a equação a seguir.

$$CaO(s) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons Ca(OH)_2(aq)$$

O hidróxido de cálcio é solúvel em água, levando à formação dos íons Ca^{2+} e OH^-, e aumentando o pH do meio, conforme a equação a seguir.

$$Ca(OH)_2(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)$$

Os íons OH^- presentes no meio reagem com os íons dos metais presentes na água, formando um precipitado insolúvel. Preste atenção ao exemplo a seguir, para o chumbo (Pb), que precipita numa faixa de pH de 7-11.

$$Pb^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \rightleftharpoons Pb(OH)_2(s) \downarrow$$

Apesar de atualmente existirem outros métodos para remover metais de efluentes, como a adsorção, a precipitação química ainda é muito utilizada devido à simplicidade da operação quando comparada com outros métodos. O método a ser empregado depende da quantidade de efluente a ser tratado, bem como da natureza e da quantidade dos contaminantes.

PARA EXPLORAR

Leia

Tratamento de resíduos industriais

A reportagem, publicada em janeiro de 2024, por Wilson Galvão, na sala de imprensa virtual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aborda o desenvolvimento de um material para tratar resíduos da indústria.

Disponível em: https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/77804/tratamento-de-residuos-industriais. Acesso em: 2 out. 2024.

Para discutir

1. **Quais são as principais consequências da liberação de efluentes não tratados em corpos de água para os ecossistemas aquáticos?**
2. **Descreva com suas palavras o processo de precipitação de metais pesados durante o tratamento de efluentes.**
3. **Com um colega, discutam quais medidas poderiam ser adotadas para reduzir a contaminação por metais pesados em ambientes aquáticos.**

1. A contaminação dos corpos de água causa a intoxicação de espécies aquáticas, diminui a incidência de luz na água, reduzindo a realização da fotossíntese por plantas e algas.

2. Adição de reagentes, como a cal, que aumentam o pH do meio e promovem a formação de precipitado, que será posteriormente retirado por decantação e filtração.

3. Resposta pessoal. Algumas medidas que podem ser adotadas: fortalecer a educação ambiental, orientando a sociedade a fazer escolhas mais conscientes de compra e descarte de produtos que contêm metais pesados; reforçar a fiscalização do cumprimento da legislação; investir em pesquisas que aprimoram os métodos de tratamento; adotar o uso de reagentes menos poluentes nas indústrias; aumentar a eficiência dos processos industriais; entre outras.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **A metilamina ($H_3C—NH_2$) é uma substância gasosa formada na decomposição de certas proteínas. É uma das responsáveis pelo desagradável cheiro de peixe quando ele se decompõe. A dissolução da metilamina na água é representada pelo seguinte equilíbrio heterogêneo:**

$$H_3C—NH_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3C\text{-}NH_3^+(aq) + OH^-(aq)$$

a) Por que a dissolução da metilamina em água representa um equilíbrio heterogêneo?

b) Após a dissolução da metilamina na água, a solução resultante terá um pH maior, menor ou igual a 7? Justifique sua resposta.

c) De que modo seria possível diminuir o cheiro desagradável da metilamina que fica nas mãos ao entrar em contato com um peixe em decomposição?

Resolução

a) Trata-se de um equilíbrio heterogêneo por envolver duas fases: fase gasosa (metilamina) e fase aquosa (íon metilamônio).

b) Maior que 7, uma vez que a reação forma o íon hidróxido, que torna o meio mais alcalino.

c) É possível lavar as mãos com soluções levemente ácidas, como vinagre. A acidez ajuda a neutralizar a amina básica, reduzindo o odor desagradável.

2 **O dióxido de cloro ($C\ell O_2$) é comumente usado no branqueamento de celulose e fibras têxteis, mas também na higienização da água por suas propriedades biocidas e desinfetantes. Pode ser produzido a partir de gás cloro e clorito de sódio ($NaC\ell O_2$), de acordo com o processo representado abaixo.**

$$C\ell_2(g) + 2\ NaC\ell O_2(s) \rightleftharpoons 2\ C\ell O_2(g) + 2\ NaC\ell(s)$$

Considere o sistema acima em equilíbrio e assinale a alternativa correta. Alternativa **e**.

a) A retirada de uma pequena porção de cloreto de sódio, isto é, a retirada parcial de $NaC\ell$ do sistema em equilíbrio, desfavorece a formação de dióxido de cloro.

b) A constante de equilíbrio em termos de pressão (K_p) é numericamente igual à constante de equilíbrio em termos de concentração (K_c), em qualquer temperatura, para o sistema representado.

c) A adição de pequena quantidade de clorito de sódio ($NaC\ell O_2$) ao sistema em equilíbrio, a uma certa temperatura, favorece a formação de dióxido de cloro, o que faz com que aumente o valor da constante de equilíbrio K_c.

d) Um aumento da temperatura do sistema não provoca alteração no valor de K_p desde que todas as demais condições para a conservação do equilíbrio químico sejam mantidas.

e) Sob temperatura constante, a adição ou a retirada das substâncias gasosas do sistema em equilíbrio provoca alteração do estado de equilíbrio, mas o valor de K_p não se altera.

3 **O sulfato de alumínio utilizado como floculante em estações de tratamento de água poderia ser substituído por cloreto de ferro(III). Estudos apontam que a velocidade de formação dos flocos de cloreto de ferro(III) é significativamente superior em relação ao sulfato de alumínio. Apesar do aumento no custo global dos coagulantes ser da ordem de 60% e da pequena diferença nas eficiências, visando à elevação da qualidade da água decantada, ao baixo consumo de alcalinizante e à menor geração de iodo, esses estudos recomendam o emprego do cloreto de ferro(III) em unidades potabilizadoras.**

Determine a concentração mínima de íons OH^- necessária para iniciar a precipitação de hidróxido de ferro(III) em uma solução 0,001 mol/L de cloreto de ferro(III), a 25 °C.

Dado: Constante de solubilidade (K_{PS}) do hidróxido de ferro(III), a 25 °C = $1{,}0 \cdot 10^{-39}$ 10^{-12} mol/L

4 **Uma solução saturada de base, representada por $B(OH)_2$, apresenta pH = 10 a 25 °C. A equação do equilíbrio de solubilidade é representada por:**

$$B(OH)_2(s) \rightleftharpoons B^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)$$

A constante do produto de solubilidade (K_{PS}) da base $B(OH)_2$ é: Alternativa **a**.

a) $5 \cdot 10^{-13}$
b) $2 \cdot 10^{-13}$
c) $6 \cdot 10^{-12}$
d) $1 \cdot 10^{-12}$
e) $3 \cdot 10^{-10}$

5 **A fluoretação das águas de abastecimento público é um importante meio coletivo de uso de fluoreto (F^-) no Brasil. Todo município com estação de tratamento de água deve agregar fluoreto à água (Lei Federal n. 6 050, de 24 maio 1974). A importância dessa medida pode ser observada em cidades com água fluoretada, nas quais a prevalência de cárie é menor do que naquelas onde a água não é fluoretada. Recomenda-se a adição de 1 parte por milhão (1 ppm) de fluoreto à água, o que corresponde a $5 \cdot 10^{-5}$ mol de íons F^- a cada litro de água.** $1{,}6 \cdot 10^{-2}$ mol/L

Considere uma amostra em que o teor de íons de cálcio (Ca^{2+}) na água é de $4 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Avalie se haverá precipitação de CaF_2 nessa água que contém fluoreto na concentração recomendada, a uma certa temperatura. **Dado:** K_{PS} do CaF_2, a temperatura ambiente, igual a = $4 \cdot 10^{-11}$.

6 **O azul de bromotimol é um indicador ácido-base que apresenta faixa de viragem entre pH 6 e pH 7,6, como pode ser observado no esquema abaixo.**



ID/BR

Fonte de pesquisa: Domingos, H. C. T. Azul de bromotimol, $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$. Química Nova Interativa, [*s. l.*], 2016. Disponível em: https://qnint.sbq.org.br/novo/index.php?hash=molecula.315. Acesso em: 15 out. 2024.

Não escreva no livro.

7. Temperaturas elevadas diminuem a solubilidade de CO_2, que tende a sair do equilíbrio na forma gasosa. O equilíbrio é deslocado no sentido de formar mais CO_2, favorecendo a formação de $CaCO_3$, o qual se deposita no interior de canos e caldeiras, formando as incrustações.

Trata-se de um bom indicador utilizado em laboratório para medir o pH de ácidos e bases fracas, sendo também utilizado em algumas situações como na medida de pH da água de aquários.

Na montagem de um aquário de água salgada durante o inverno, um aspirante a aquarista testou o pH da água do mar com o azul de bromotimol e fotografou a amostra (amostra 1). Plantou vegetais aquáticos e colocou um borbulhador de CO_2 para favorecer a fotossíntese dessas plantas no aquário. Após algum tempo, testou o pH da água com o indicador, fotografou a nova amostra (amostra 2) e verificou que o pH estava neutro. Então, colocou os peixes no aquário, adicionou ração e manteve o borbulhamento contínuo de CO_2. Após alguns dias, novamente testou o pH com o indicador e observou uma nova mudança de cor (amostra 3). Foi quando percebeu que se esquecera de colocar no aquário uma lâmpada, para acender durante a noite, e um termostato, para aquecer a água do aquário, e concluiu que deveria colocar pouca ração por dia, pois era visível o acúmulo de ração em processo de fermentação.

a) As amostras na foto a seguir não estão na ordem em que foram tiradas. Associe-as à sequência de amostras 1, 2 e 3 observada pelo aquarista.

Turtle Rock Scientific/Science Source/Fotoarena

b) A mudança de cor observada ao longo dos dias deve estar associada principalmente a qual transformação química ocorrida na água do aquário? Equacione o processo. **6. b)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

c) Cite dois outros fatores que podem ter influído na alteração de pH da água do aquário.

6. a) Amostra 1: solução azul; amostra 2: solução esverdeada; amostra 3: solução amarela.

7 **Em regiões de solo calcário, as águas contêm íons de cálcio liberados na dissolução de carbonato de cálcio pela ação da água da chuva, a qual é ligeiramente ácida pela presença de gás carbônico atmosférico. O equilíbrio que representa essa dissolução está representado a seguir.**

$$CaCO_3(s) + CO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons$$
$$\rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\,HCO_3^-(aq)$$

A água rica em íons de cálcio é chamada de **água dura** e pode causar depósitos praticamente insolúveis em caldeiras de aquecimento e tubulações de água quente, sendo indesejável em alguns processos industriais. Explique do que seriam formadas as incrustações e por que temperaturas elevadas favorecem a formação delas. Utilize o equilíbrio apresentado anteriormente em sua explicação.

6. c) A temperatura típica do inverno (baixa) deve ter contribuído para o aumento da solubilidade do dióxido de carbono na água. Além disso, deve ter ocorrido fermentação da ração, fenômeno que também libera CO_2.

8 **Considere quatro frascos contendo, cada um deles, um sistema bifásico constituído de solução aquosa saturada de sulfato de cálcio em equilíbrio com sólido não dissolvido. Em cada frasco foi adicionado certo volume de solução aquosa saturada dos seguintes sais: $NaC\ell$, $NaNO_3$, $Ca(NO_3)_2$ e $CaSO_4$. Indique qual das soluções aquosas adicionadas provocou um aumento da massa de sulfato de cálcio sólido nos frascos.** Alternativa **c**.

a) $NaC\ell(aq)$

b) $NaNO_3(aq)$

c) $Ca(NO_3)_2(aq)$

d) $CaSO_4(aq)$

9. a) Trata-se da formação da água oxigenada. O nome mais adequado é peróxido de hidrogênio, pois o termo "água oxigenada" se refere a uma mistura de peróxido de hidrogênio e água (mistura de duas substâncias).

9 **Leia o texto a seguir e responda às questões.**

> [...] algumas espécies de corais precisam de microalgas para viver, fornecendo abrigo e nutrientes e recebendo alimento em contrapartida. As algas se instalam sobre os corais e, como todas as plantas, elas fazem fotossíntese. Todavia, quando a temperatura da água está acima do normal (ao redor de 31 °C), as algas deixam de fazer fotossíntese e produzem água oxigenada, que é tóxica para o coral. Em contrapartida, os corais expulsam as algas e, sem elas, seus esqueletos, de cor branca, ficam expostos ao ambiente, podendo levar à morte [desses organismos]. Embora o fenômeno em si desperte curiosidade e atenção, devido à atual relevância das questões ambientais associadas ao aquecimento global, é curiosa a menção à formação natural de uma substância que parece ser artificial ou produzida somente nos laboratórios e nas indústrias. [...]
>
> Pinheiro, P. C. Aumentando o interesse do alunado pela Química escolar e implantação da nova proposta curricular mineira: desenvolvimento e resultados de Projeto Seminal realizado no PIBID-UFSJ. *Química Nova na Escola, v. 34*, n. 4, p. 173-183, nov. 2012. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_4/03-PIBID-126-12.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.

a) O texto menciona a formação de "uma substância que parece ser artificial ou produzida somente nos laboratórios e nas indústrias". A qual "substância" o texto se refere? Qual é o nome mais adequado para se referir a ela?

b) A água dos oceanos tem pH próximo de 8 devido à presença de vários tipos de íons nela dissolvidos. Considerando $K_w = 1{,}0 \times 10^{-14}$, calcule a concentração de íons OH^- de uma amostra de água do mar que apresenta pH igual a 8. 10^{-6} mol/L

c) Relacione o aumento da concentração de CO_2 na atmosfera, o aquecimento global e a diminuição de corais. Leve em consideração que os esqueletos de corais são formados por carbonato de cálcio, substância praticamente insolúvel em água. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ESTUDO DE CASO

COMPRIMIDOS E ANTIÁCIDOS: O QUE ELES PODEM NOS CONTAR SOBRE O CONTROLE DO pH

Lembro-me muito bem do primeiro caso clínico que acompanhei quando ainda era estagiário de enfermagem. Logo pela manhã, chegou à ala de emergência do hospital uma menina de seis anos de idade, desorientada e hiperventilando, que havia ingerido acidentalmente vários comprimidos de ácido acetilsalicílico.

Quando ingerido em excesso, o ácido acetilsalicílico leva ao aumento da acidez do sangue. A acidez é medida em uma escala logarítmica negativa da concentração de prótons H^+, chamada pH, a qual varia entre 0 e 14. Quanto mais ácido for um meio, mais baixo será o pH. Cada alteração de uma unidade na escala de pH representa uma variação de 10 vezes na concentração de H^+. Assim, mesmo pequenas alterações do pH implicam grandes mudanças na concentração de H^+.

Concentração de H^+	Escala de pH
10^0 mol/L	0
10^{-1} mol/L	1
10^{-2} mol/L	2
10^{-3} mol/L	3
10^{-4} mol/L	4
10^{-5} mol/L	5
10^{-6} mol/L	6
10^{-7} mol/L	7
10^{-8} mol/L	8
10^{-9} mol/L	9
10^{-10} mol/L	10
10^{-11} mol/L	11
10^{-12} mol/L	12
10^{-13} mol/L	13
10^{-14} mol/L	14

Reinaldo Vignati/ID/BR

Relação da escala de pH com a concentração de H^+.

Nosso organismo tem uma tolerância muito baixa a mudanças de pH, sobretudo porque as enzimas que catalisam as inúmeras reações bioquímicas que ocorrem em nosso corpo se desnaturam quando o pH ou a temperatura se alteram. Nosso sangue, por exemplo, tem um pH que varia normalmente entre 7,35 e 7,45. Alterações dentro da faixa de pH 6,8 a 8 ainda são compatíveis com a vida, apesar de trazerem sérias complicações, mas acima disso podem ser fatais. Por isso, no caso da menina, era necessário agir rápido e elevar o pH de seu sangue para o nível normal.

Não escreva no livro.



Reinaldo Vignati/ID/BR

A desnaturação de uma proteína corresponde à alteração da sua estrutura terciária, o que afeta seu funcionamento. Cores-fantasia.

Reece, J. B. *et al.* *Biologia de Campbell* [recurso eletrônico]. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Em grupo, resolvam as atividades a seguir.

1 Considerando o exposto anteriormente, quais são as variações máximas na concentração de H^+ no sangue toleradas por nosso organismo? Respondam com base no que vocês aprenderam sobre a relação entre a escala de pH e a concentração de H^+.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 Em nosso organismo, o pH do sangue arterial – aquele que carrega o gás oxigênio para os tecidos – é 7,4. Já o pH do sangue venoso – aquele que carrega o gás carbônico, produto da respiração celular e que será eliminado pelos pulmões – é 7,35. Pesquisem como esses gases são transportados na corrente sanguínea e, com base nisso e em seus conhecimentos sobre ionização de ácidos e bases, elaborem uma explicação para a diferença de pH entre os sangues arterial e venoso.

2. O oxigênio é transportado no sangue pela hemoglobina, enquanto cerca de 70% do gás carbônico é transportado dissolvido no sangue, formando ácido carbônico (H_2CO_3). Esse ácido se ioniza no sangue, formando íons H^+ e bicarbonato (HCO_3^-). Isso faz com que o sangue venoso tenha uma concentração maior de íons H^+ do que o sangue arterial, sendo, portanto, mais ácido que esse último.
$CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$
Cerca de 25% do CO_2 transportado pelo sangue se encontra ligado à hemoglobina e os demais 5% do CO_2 estão dissolvidos no sangue.

3 Determinem quais são o ácido fraco, a base conjugada e a equação de equilíbrio entre eles que fazem o sangue funcionar como um tampão. Depois, com base em seus conhecimentos sobre as soluções-tampão, expliquem como esse sistema de tamponamento do sangue agiu quando a menina ingeriu os comprimidos de ácido acetilsalicílico.

3. O ácido fraco que é formado no sangue em decorrência do transporte de CO_2 na corrente sanguínea é o ácido carbônico (H_2CO_3). Ele e sua base conjugada (o ânion bicarbonato, HCO_3^-) são os principais responsáveis pela capacidade de tamponamento do sangue. A equação de equilíbrio entre eles é: $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. Quando a garotinha ingeriu os comprimidos, ocorreu a ionização do ácido acetilsalicílico no sangue, aumentando sua concentração de íons H^+. Esses íons H^+ então se ligaram à base conjugada HCO_3^-, formando H_2CO_3 e, portanto, favorecendo o equilíbrio no sentido de formação de reagentes. O tamponamento funciona quando os íons H^+ "excedentes", que foram adicionados ao sangue pela ingestão de ácido acetilsalicílico, são consumidos pela base conjugada HCO_3^-, não ficando livres na solução e, por conseguinte, não alterando o pH. Caso sejam adicionados mais íons H^+ que a quantidade de base conjugada existente no sangue, eles ficam livres, diminuindo o pH. A ingestão em excesso de ácido acetilsalicílico pode levar o indivíduo a óbito. Doses de 20 a 30 gramas podem ser letais para adultos.

4 Considerem a reação de ionização do ácido fraco, que é responsável pelo tamponamento do sangue, bem como a reação de formação desse ácido. Analisando essas reações, vocês conseguem imaginar por que a menina estava hiperventilando quando chegou ao hospital? Expliquem o raciocínio de vocês. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 Como o pH sanguíneo se alteraria e como agiria o sistema de tamponamento do sangue caso a menina tivesse ingerido grandes quantidades de antiácido (bicarbonato de sódio), em vez de ácido acetilsalicílico? E o que aconteceria com a ventilação pulmonar nesse caso?
Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6 Imaginem duas situações: um paciente que chega ao hospital com um quadro de hipoventilação por causa de uma crise de asma, e outro paciente com hiperventilação em razão de uma crise de ansiedade grave. Ambos apresentam alterações no pH sanguíneo. Qual deles teve o pH sanguíneo aumentado e qual deles teve o pH sanguíneo diminuído? Expliquem o raciocínio.
Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7 Expliquem como a injeção intravenosa de bicarbonato de sódio restabeleceu o nível normal do pH do sangue da menina. Caso esse procedimento médico não tivesse ocorrido, como os rins dela atuariam na reabsorção de íons HCO_3^- e na excreção de íons H^+? Justifiquem a resposta de vocês.
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

QUESTÕES GLOBAIS

1 **(Enem)** O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido (pH entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala a seguir.

Cor	vermelho	rosa	roxo	azul	verde	amarelo
pH	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11	12 13	14

Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados:

Material	Cor
I. amoníaco	verde
II. leite de magnésia	azul
III. vinagre	vermelho
IV. leite de vaca	rosa

Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, podem-se esperar como resultado as cores Alternativa **d**.

a) rosa ou amarelo.
b) vermelho ou roxo.
c) verde ou vermelho.
d) rosa ou vermelho.
e) roxo ou azul.

2 **(Enem)** De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, respectivamente, caráter

a) ácido/básico/básico/ácido.
b) ácido/básico/ácido/básico.
c) básico/ácido/básico/ácido.
d) ácido/ácido/básico/básico.
e) básico/básico/ácido/ácido. Alternativa **e**.

3 **(UEL-PR)** As substâncias ácidas, tipicamente classificadas como fortes ou fracas, de acordo com seu comportamento em meio aquoso, apresentam diversas aplicações no cotidiano. O ácido clorídrico, por exemplo, é um ácido forte, bastante usado como agente de limpeza de pisos e azulejos. Também é encontrado no suco gástrico com a função de auxiliar na digestão. Por outro lado, os ácidos fracos, como o ácido hialurônico e o ácido kójico, são importantes constituintes de cremes cosméticos formulados com o intuito de auxiliar a esfoliação e o clareamento de manchas da pele.

A figura a seguir representa o comportamento dos ácidos hialurônico e kójico adicionados em igual volume de água, após estabelecido o equilíbrio, considerando-se apenas 10 moléculas de cada um.



A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. **3. a)** e **b)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Com base na figura, calcule o percentual de ionização para cada um dos ácidos fracos e indique, justificando, qual é o ácido mais fraco.

b) Descreva o comportamento de 3 moléculas de um ácido forte, como o ácido clorídrico ($HC\ell$), em água, após estabelecido o equilíbrio.

4 **(UEMG)** "Em 11 de março de 2020, a covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, após ela atingir 118 países. No mundo, foram confirmados 26 622 706 casos de covid-19 (199 881 novos em relação ao dia anterior) e 874 708 mortes (5 037 novas em relação ao dia anterior) até 14 de julho de 2020. Já no Brasil, até essa data, foram notificados 1 926 824 casos (41 857 novos em relação ao dia anterior) e 74 133 óbitos (1 300 novas em relação ao dia anterior) ocasionados pelo SARS-CoV2 em todas as regiões do país".

(Câmara, M. S. C. *et al. A Química da Covid-19*. Disponível em: https://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/EBOOK. Acesso em: 16 jan. 2022).

Alguns produtos químicos são utilizados para desinfecção de ambientes para prevenção da covid-19, é o caso do hipoclorito de sódio, também conhecido como água sanitária, que deve ser diluído em água para formar uma espécie química com carga elétrica neutra, o que contribui, significativamente, para uma maior permeabilidade no vírus, fazendo sua oxidação.

As reações que ocorrem desde a diluição do hipoclorito de sódio em água até o equilíbrio são:

$$NaC\ell O_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} + HC\ell O_{(aq)}$$

$$HOC\ell_{(aq)} \rightleftharpoons OC\ell^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$$

Após o equilíbrio, os produtos formados, que são capazes de oxidar o vírus, tem caráter: Alternativa **a**.

a) Ácido.
b) Básico.
c) Neutro.
d) Óxido.

5 **(Enem)** Ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, NH_4NO_3, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação da amônia com gás oxigênio, um processo que ocorre em três etapas, todas exotérmicas.

Não escreva no livro.

Etapa 1: $4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 4\ NO(g) + 6\ H_2O(\ell)$

Etapa 2: $2\ NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$

Etapa 3: $3\ NO_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ HNO_3(aq) + NO(g)$

Na primeira etapa, forma-se NO, o qual reage com mais oxigênio formando NO_2, um óxido ácido, que reage com a água formando HNO_3 e NO. O composto NO é, portanto, um subproduto da reação. É importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com o oxigênio, formando NO_2. Alternativa **d**.

Atkins, P.; Jones, L. *Princípios de química*: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar a

a) pressão de oxigênio, na etapa 1.

b) concentração de NO_2, na etapa 3.

c) quantidade de amônia, na etapa 1.

d) quantidade de oxigênio, na etapa 2.

e) temperatura dos reagentes, na etapa 1.

6 **(UFJF-MG) A grande quantidade de CO_2 produzida por veículos e processos industriais é responsável pelo efeito estufa. Outro efeito atribuído ao aumento da concentração de CO_2 se refere à reação do CO_2 da atmosfera com a água do mar, que pode ser representado pelo equilíbrio a seguir e interpretado segundo o princípio de Le Chatelier:** Alternativa **c**.

$$CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-$$

Sobre as consequências do aumento da concentração de CO_2 na atmosfera, assinale a alternativa **CORRETA**:

a) O aumento da concentração de CO_2 na atmosfera está causando uma diminuição na acidez dos oceanos.

b) O aumento da concentração de CO_2 na atmosfera não está afetando o equilíbrio.

c) O pH médio dos oceanos está diminuindo devido ao aumento da concentração de CO_2 na atmosfera.

d) O aumento do CO_2 na atmosfera está diminuindo a quantidade de bicarbonato na água do mar.

e) O aumento da concentração de CO_2 na atmosfera desloca o equilíbrio para o lado esquerdo da equação química.

7 **(UERR) O produto de solubilidade (K_{ps}) é a constante de equilíbrio para uma reação com soluto pouco solúvel em água, mas que forma uma solução saturada dos íons dissolvidos em solução. A tabela a seguir apresenta os valores de K_{ps} a 25 °C para vários sais.**

Substância	Fórmula	K_{ps}
I	$BaCO_3$	$5{,}0 \cdot 10^{-9}$
II	$CaCO_3$	$4{,}9 \cdot 10^{-9}$
III	$CaSO_4$	$2{,}4 \cdot 10^{-5}$
IV	$BaSO_4$	$1{,}1 \cdot 10^{-10}$
V	$PbSO_4$	$6{,}3 \cdot 10^{-7}$

Daniel C. Harris. *Análise química quantitativa*, 2001. (com adaptações)

Tendo como referência as informações precedentes, assinale a opção correta. Alternativa **b**.

a) A uma temperatura de 25 °C, os sais sulfatos são mais solúveis em água do que os carbonatos.

b) Entre as substâncias apresentadas na tabela, o sulfato de cálcio é o sal mais solúvel em água.

c) Uma solução de sulfato de bário a 25 °C, com concentração de $1{,}1 \times 10^{-11}$ mol/L, é classificada como supersaturada.

d) O sal IV é mais solúvel em água que os sais I e II.

e) Uma solução de carbonato de cálcio a 25 °C, com concentração de $4{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L, é classificada como insaturada.

8 **(Unemat-MT) Ao contrário do que se imagina, mesmo nos locais mais limpos, como o Ártico, a água da chuva é levemente ácida (pH 5,6). O pH mede o teor de íons positivos de hidrogênio de uma solução. A tabela do pH vai do zero ao quatorze: quanto maior for a concentração daqueles íons, menor será o pH, logo, mais ácida a chuva. Em várias cidades do oeste da Europa e do leste dos EUA, a chuva chegou a ter pH entre 2 e 3, ou seja, entre o do vinagre e o do suco de limão.**

Disponível em: https://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/artigos_urbano/chuva_acida.html. Acesso em: fev. 2020.

Considerando que o pH da água da chuva pode variar de acordo com a região, a figura 1 mostra hipoteticamente os valores de pH de amostras da água da chuva, atribuídos a diferentes locais:

FIGURA 1	
Região	**pH**
1	3
2	5
3	7
4	8
5	10

Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. Alternativa **a**.

a) a amostra de água da região 1 é 100 vezes mais ácida do que a amostra de água da região 2.

b) a amostra de água da região 5 é 10 vezes mais ácida do que a amostra de água da região 4.

c) são consideradas de caráter 'ácido' as amostras das regiões 1, 2 e 3 apenas.

d) são consideradas de caráter 'básico' as amostras 3, 4 e 5 apenas.

e) a amostra de água da região 4 é 1 vez mais básica do que a amostra de água da região 3.

A QUÍMICA DA VIDA

Desde tempos imemoriais, a humanidade se questiona sobre a origem da vida. Ao longo de bilhões de anos, nosso planeta passou por grandes transformações, desde sua formação até o surgimento da vida e, posteriormente, o desenvolvimento do ser humano. Nesse contexto, as interações químicas desempenharam um importante papel, moldando os elementos que eventualmente se uniriam para dar origem aos primeiros seres vivos.

No entanto, a vida não é apenas produto de reações químicas. Ela é uma "sinfonia" de interações complexas. Do ciclo do carbono, que conecta a respiração das árvores à atmosfera e aos oceanos, ao ciclo do nitrogênio, que alimenta a fertilidade do solo, cada elemento segue uma jornada interconectada, passando por processos físicos, químicos e biológicos que garantem seu equilíbrio e sua disponibilidade, sustentando a vida no planeta.

Os ciclos desses elementos e as moléculas orgânicas serão alguns dos assuntos estudados nesta unidade.

1. As interações químicas desempenharam um papel crucial na formação dos primeiros seres vivos, moldando os elementos que eventualmente se uniriam para dar origem à vida.

OBJETIVOS

- Analisar ciclos biogeoquímicos e interpretar efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos.
- Compreender as funções orgânicas, suas aplicações, seus benefícios e os riscos à saúde e aos ambientes.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. Qual é a importância das interações químicas na formação da vida na Terra, de acordo com o texto?
2. Imagine que, em um ambiente isolado, os ciclos biogeoquímicos sejam interrompidos. Como isso afetaria a vida no planeta Terra?
3. Como podemos observar a influência das interações químicas em processos cotidianos, como a digestão dos alimentos ou a fotossíntese nas plantas?
4. Pesquise exemplos de como as interações químicas podem influenciar a evolução e a adaptação das espécies ao longo do tempo.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes concluam que a interrupção dos ciclos biogeoquímicos afetaria a disponibilidade de nutrientes essenciais para os seres vivos, comprometendo seu equilíbrio e sua sobrevivência. **3.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor. **4.** Resposta pessoal. Um exemplo são as mutações genéticas resultantes de alterações nas sequências de DNA, que são essencialmente reações químicas. Essas mutações podem conferir vantagens adaptativas ou desvantagens, moldando gradualmente as características de uma espécie.

Casal de tuiuiús com filhotes no ninho. Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, Poconé (MT). Foto de 2022. Altura do tuiuiú: 1,60 m.

André Dib/Pulsar Imagens

UNIDADE 7

1 Ciclos biogeoquímicos

2 Carbono e cadeias carbônicas

3 Hidrocarbonetos

4 Funções orgânicas

CAPÍTULO 1

1. São os processos que permitem a retirada e a devolução, ou seja, a reciclagem de diversos elementos.
3. Eles são responsáveis pelo transporte e pela interação dos elementos presentes na atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera com o meio ambiente e os seres vivos.

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

PARA COMEÇAR

1. O que são ciclos biogeoquímicos?
2. Quais são os principais elementos envolvidos nos ciclos biogeoquímicos?
3. Como esses ciclos impactam o ambiente?

2. Hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio.

INTRODUÇÃO AOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Existem, na natureza, cerca de noventa elementos químicos conhecidos. Boa parte deles circula na biosfera, entre os compartimentos bióticos e abióticos. O circuito percorrido por um dado elemento dentro da biosfera é chamado **ciclo biogeoquímico**.

Diversos elementos estão presentes nas rochas. Devido ao intemperismo, processo que leva à desintegração das rochas, esses elementos podem retornar à atmosfera, sob a forma de gases, ou às águas de rios, lagos e mares, sob a forma de íons. Do meio abiótico, esses elementos são absorvidos pelos seres vivos por vários processos, como a fotossíntese e a respiração. Daí, seguem o caminho da cadeia alimentar, passando pelos consumidores e, depois, pelos decompositores, quando são devolvidos ao meio abiótico. O ser humano também participa de diversos ciclos biogeoquímicos e, dependendo da forma como realiza suas atividades, a alteração pode ocorrer em maior ou menor intensidade nesses ciclos.

Neste capítulo, você vai estudar o ciclo da água, o do carbono, o do oxigênio e o do nitrogênio, que estão entre os principais ciclos biogeoquímicos.

Na biosfera, encontram-se os seres vivos, que participam dos ciclos biogeoquímicos e os alteram. Como na foto, a água da chuva sobre as folhas das plantas pode cair no solo ou evaporar, dois processos que fazem parte do ciclo da água.

Gerson Gerloff/Pulsar Imagens

Não escreva no livro.

CICLO DA ÁGUA

A maior parte da água presente na Terra (cerca de 97,5%) está nos oceanos e nos mares, a água salgada. Uma pequena parte (1,75%) encontra-se nas geleiras, onde a água se apresenta no estado sólido. Apenas uma ínfima parte (0,75%) está nos rios, lagos e aquíferos (reservas de água subterrânea) na forma de água doce, disponível para os seres vivos, ou sob a forma gasosa, compondo o vapor de água na atmosfera.

O ciclo da água envolve três estados físicos. A água sob a forma de vapor resulta da **transpiração** dos seres vivos e da **evaporação** dos rios, lagos e, principalmente, dos mares e oceanos. A água sob a forma de vapor retorna ao estado líquido por meio da **condensação**. Uma parte da água que evapora dos oceanos é levada aos continentes, onde se precipita e, então, infiltra-se no solo ou retorna aos oceanos pelo **escoamento** das águas fluviais ou das águas provenientes do degelo. A imagem a seguir ilustra esse processo.

Cidades-esponjas



Paulo Cesar Pereira/ID/BR

Esquema do ciclo da água. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Reece, J. B. *et al.* *Campbell Biology*. 12. ed. New York: Pearson, 2020. p. 1251.

Propriedades da água e suas implicações

O elevado calor específico da água faz com que apenas 2,5 m de coluna de água do oceano seja equivalente a toda [a] capacidade calorífica da atmosfera que está sobre o oceano [...]. Em outras palavras, o oceano retém cerca de 1 100 vezes mais calor que a atmosfera. Durante o verão, o calor é estocado nos oceanos e, durante o inverno, parte desse calor é transferida de volta para a atmosfera, amenizando, assim, a temperatura do ar. Apenas compreendendo o significado do elevado calor específico da água, somado ao seu grande volume, já podemos perceber por que o oceano age como moderador climático, diminuindo a amplitude das variações de temperatura entre as estações do ano e transferindo calor das regiões tropicais para as subtropicais e polares por meio das correntes marinhas. Se não fossem os oceanos, nosso planeta teria dias muito quentes e noites muito frias.

Campos, M. L. A. M.; Jardim, W. F. Aspectos relevantes da biogeoquímica da hidrosfera. *Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 5, p. 18-27, nov. 2003. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/05/hidrosfera.pdf. Acesso em: 21 ago. 2024.

DE OLHO NO CONCEITO

Calor específico

Para saber quanto varia a temperatura de determinada substância, independentemente de sua massa, aplicamos a propriedade denominada calor específico, *c*, que é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que a massa unitária de uma substância sofra uma variação unitária de temperatura para mais ou para menos.

Construindo um terrário para observar o ciclo da água

Um terrário fechado permite a simulação de um ambiente natural em microescala. Nesta atividade, você e os colegas vão identificar o ciclo da água em um terrário.

Material

- vidro de boca larga (ou garrafa PET transparente cortada ao meio)
- pequenas pedras (pedriscos) ou argila expandida em quantidade suficiente para preencher o fundo do recipiente
- carvão vegetal triturado em quantidade suficiente para formar uma fina camada no recipiente
- terra vegetal (terra adubada) em volume três a quatro vezes superior ao das pedras
- duas ou três mudas de plantas de espécies diferentes, como musgo, avenca, begônia ou qualquer outra espécie de pequeno porte
- cartolina
- elásticos
- pedaço de plástico transparente ou de cor clara em tamanho um pouco maior que o da boca do recipiente
- pá ou colher
- água filtrada

Como fazer

1. Sob a orientação do(a) professor(a), forme com os colegas grupos de três a quatro integrantes. As atividades de montagem do terrário devem ser distribuídas entre os integrantes do grupo, de modo que todos participem.
2. Lavem, enxáguem e sequem o recipiente, de maneira que não reste nenhum vestígio de sabão. Coloquem as pedras ou a argila expandida no fundo do recipiente, formando uma camada. Sobre essa camada, coloquem o carvão vegetal triturado e, por fim, a terra.
3. Com a pá ou a colher, abram buracos na terra e plantem as mudas. Molhem a terra, deixando-a úmida, mas não encharcada. Cubram o terrário com o plástico e utilizem o elástico para fixá-lo na boca do recipiente. Coloquem o terrário em um local que receba luz solar apenas indiretamente.
4. Durante uma semana, observem o terrário diariamente e anotem as mudanças que vocês observam em relação à água.
5. Cada grupo registrará, no caderno, as condições do terrário no dia da montagem, como as espécies plantadas, o estado de hidratação da terra (mais encharcada ou mais seca) e a espessura das diversas camadas de solo, entre outras.
6. Todos os dias, ao chegar à escola, após o intervalo e antes do horário de saída, anotem outros aspectos além dos citados: se existem pequenas gotas de água sobre as folhas dos vegetais ou no plástico, se o vidro está embaçado, se a terra parece seca, etc.
7. Ao final de uma semana e após responder às perguntas da seção *Para concluir*, cada grupo deverá fazer, em uma cartolina, um esquema do terrário e indicar com setas e legendas o ciclo da água presente nele.

ATENÇÃO!
As observações devem ser feitas sem a remoção do plástico.

Vagner Coelho/ID/BR

Aspecto final do terrário. Cores-fantasia.

Para concluir

1. Resposta pessoal. Foi possível observar a água acumulada no fundo do recipiente ou nas gotículas que embaçam o interior do vidro.

1 **Em que parte do recipiente foi possível observar melhor a presença de água no terrário?**

2 **A quantidade de água colocada inicialmente se manteve constante até o final das observações? Justifiquem a resposta.**

3 **Estabeleçam analogias entre a observação do terrário e os fenômenos que acontecem na Terra envolvendo a água.**

2. Espera-se que os estudantes respondam afirmativamente, pois o terrário é um sistema fechado, no qual a água, o ar e os nutrientes são reciclados.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes utilizem as observações realizadas para relacioná-las às etapas do ciclo da água. As gotículas que embaçam o interior do vidro podem ser comparadas à transpiração dos seres vivos, por exemplo.

Não escreva no livro.

CICLO DO CARBONO

O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes nos seres vivos. Sob a forma de gás carbônico (CO_2), está presente também na atmosfera e dissolvido na água. Participa, ainda, da composição de rochas da litosfera e de **combustíveis fósseis** (carvão mineral, gás natural e petróleo).

Os organismos fotossintetizantes transformam o CO_2 atmosférico ou aquele dissolvido na água em matéria orgânica, que chega aos consumidores via cadeia alimentar. Os processos de degradação dos nutrientes, que acontecem no interior das células dos seres vivos, geram CO_2 como resíduo. Esse CO_2, em geral, é eliminado no ambiente, na atmosfera ou dissolvido na água. A água e a atmosfera estão constantemente trocando CO_2 entre si.

O carbono é incorporado ao solo quando os animais, as plantas e outros seres morrem. As bactérias e os fungos decompõem os restos desses seres, produzindo CO_2, que é liberado na atmosfera e na hidrosfera. Há milhões de anos, uma parte dos restos orgânicos, sob condições especiais de decomposição, transformou-se em carvão mineral, gás natural ou em petróleo. Esses combustíveis fósseis são utilizados pelos seres humanos e, ao serem queimados, liberam CO_2 na atmosfera. A imagem ao lado resume o ciclo do carbono.



Paulo Cesar Pereira/ID/BR

Esquema do ciclo do carbono. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Reece, J. B. *et al. Campbell Biology*. 12. ed. New York: Pearson, 2020. p. 1251.

AÇÃO E CIDADANIA

ONU: gases de efeito estufa no planeta bateram recorde em 2022 e não há sinal de mudança

Relatório anual da Organização Meteorológica Mundial (OMM) – agência da Organização das Nações Unidas (ONU) – indica que os gases de efeito estufa atingiram recordes no ano passado e não há sinal de que o cenário será revertido.

Houve alta nas emissões de dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O), três dos principais causadores das mudanças climáticas. Em 2022, as emissões de CO_2 em todo o planeta chegaram a ser 50% mais altas que os registros pré-industriais pela primeira vez na história.

[...]

O CO_2, responsável por cerca de 60% do efeito estufa, é gerado pela queima de carvão mineral, petróleo e gases naturais. Isso inclui atividades de produção de energia para transportes, construções e eletricidade, assim como da agropecuária e das indústrias. As mudanças no uso do solo e o despejo de resíduos nas águas também contribuem.

[...]

Lacerda, N. ONU: gases de efeito estufa no planeta bateram recorde em 2022 e não há sinal de mudança. *Brasil de Fato*, São Paulo, 15 nov. 2023. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2023/11/15/onu-gases-de-efeito-estufa-no-planeta-bateram-recorde-em-2022-e-nao-ha-sinal-de-mudanca. Acesso em: 28 maio 2024.

1. Discuta com os colegas sobre as possíveis razões para que a emissão de gases de efeito estufa, como o CO_2, não tenha diminuído nos últimos tempos.

1. A emissão de CO_2 não diminuiu globalmente porque a matriz energética continua sendo majoritariamente a dos combustíveis fósseis.

2. Faça uma pesquisa para descobrir as principais fontes de emissão de CO_2 em sua comunidade escolar. Com base nos dados obtidos, discuta com os colegas sobre quais ações podem ser realizadas para a redução de CO_2 na atmosfera. Divulgue essas ações na comunidade escolar.

2. Resposta variável. Comente com os estudantes que as ações locais são importantes, mas sem mudanças globais o cenário citado no texto não será revertido.

Não escreva no livro.

COMPOSIÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO



ID/BR

Composição do ar atmosférico.

Fonte de pesquisa: Grimm, A. M. A atmosfera. Universidade Federal do Paraná, 1999. Disponível em: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-2.html. Acesso em: 31 maio 2024.

CICLO DO OXIGÊNIO

A atmosfera da Terra é um sistema complexo, com variações de temperatura e de pressão em uma faixa larga de altitude. Essa característica, somada a outros fatores, permite que a composição da atmosfera não seja uniforme.

Para entender os processos químicos que ocorrem na atmosfera, deve-se ter em mente as propriedades químicas do segundo principal componente da atmosfera, conforme o gráfico ao lado.

A energia de ligação no O_2 é muito menor que no N_2 e, por isso, o gás oxigênio é muito mais reativo, o que faz com que os átomos de oxigênio liguem-se com diferentes elementos formando óxidos, presentes na litosfera.

A maior parte do gás oxigênio (O_2) é produzida pela **fotossíntese**. Além do gás oxigênio, que representa cerca de 21% do volume da atmosfera, o elemento oxigênio está presente em outros gases, como o ozônio (O_3) e o gás carbônico (CO_2).

O gás oxigênio é permanentemente trocado entre os organismos e as fontes inorgânicas. Durante a **respiração** dos organismos aeróbios, o O_2 é consumido. Por meio da fotossíntese, o O_2 volta para a atmosfera, fechando o ciclo, como mostra a imagem a seguir.



Paulo Cesar Pereira/ID/BR

Esquema do ciclo do oxigênio. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Manahan, S. E. *Environmental chemistry*. 11. ed. New York: CRC Press, 2022.

Além disso, na atmosfera externa, acima de aproximadamente 120 quilômetros de elevação, ocorre o processo de fotodissociação da molécula de oxigênio, que é a quebra da ligação química resultante da absorção de um fóton. Nesse processo, não há formação de íons, e a quebra da ligação deixa metade dos elétrons em cada um dos átomos, formando duas partículas neutras.

A maior parte da dissociação ocorre em elevações mais altas. A 400 quilômetros, estima-se que apenas 1% do oxigênio esteja na forma de O_2; o restante é oxigênio atômico, O. Abaixo de 130 quilômetros, O_2 é mais abundante que O.

ROTEIRO

1. **Escreva um texto curto mostrando a importância dos processos bioquímicos para o ciclo do oxigênio.**

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem os processos de fotossíntese e de respiração.

Não escreva no livro.

CICLO DO NITROGÊNIO

O nitrogênio é outro importante elemento constituinte dos seres vivos, como parte das proteínas e dos ácidos nucleicos. O elemento nitrogênio encontra-se fundamentalmente no gás nitrogênio (N_2), que corresponde a quase 78% dos gases da atmosfera, mas também está presente nos restos orgânicos em decomposição.

O N_2 atmosférico não pode ser absorvido diretamente pelos seres vivos. Apenas um pequeno grupo de organismos tem essa capacidade, como as bactérias dos gêneros *Azotobacter*, *Clostridium* e *Rhizobium* e as cianobactérias *Nostoc* e *Anabaena*. As **bactérias fixadoras de nitrogênio** do gênero *Rhizobium* vivem nas raízes das leguminosas, onde estabelecem simbiose, formando nódulos. O solo se enriquece de nitrogênio pela atividade das bactérias que decompõem a matéria orgânica e liberam o nitrogênio sob a forma de amônia (NH_3).

As **bactérias nitrificantes**, presentes no solo, transformam essa amônia em nitritos e, depois, em nitratos, que serão utilizados pelas plantas na formação da matéria orgânica nitrogenada. Esse processo ocorre em duas fases. Na primeira, as bactérias do gênero *Nitrosomonas* realizam a oxidação da amônia, transformando-a em nitritos (NO_2^-). Na segunda, bactérias do gênero *Nitrobacter* oxidam os nitritos, formando nitratos (NO_3^-).

Uma parte desses nitratos presentes no solo e na água é absorvida pelas plantas e transformada em proteínas, entrando, assim, na cadeia trófica. Os animais, quando se alimentam de plantas, incorporam esse nitrogênio, que será utilizado na síntese de suas próprias proteínas. O nitrogênio retorna ao ambiente pela excreção animal (sob a forma de excretas nitrogenadas, como a ureia e o ácido úrico) e pela morte de plantas e de animais.

Tanto as excretas quanto os restos de animais e plantas mortos sofrem a ação de agentes decompositores, como fungos e bactérias, originando, assim, a amônia, que é transformada em nitratos. Os nitratos e os nitritos podem ser transformados em nitrogênio gasoso pela ação de **bactérias desnitrificantes**, voltando, então, para a atmosfera.

O gás nitrogênio também é fixado por descargas elétricas atmosféricas e por indústrias. Os raios transformam o gás nitrogênio em substâncias nitrogenadas, como a amônia, que são levadas ao solo pelas chuvas. Já o nitrogênio fixado industrialmente é utilizado na fabricação de adubos. O esquema a seguir mostra como ocorre o ciclo do nitrogênio.



Paulo Cesar Pereira/ID/BR

Esquema do ciclo do nitrogênio. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Reece, J. B. *et al.* *Campbell Biology*. 12. ed. New York: Pearson, 2020. p. 1251.

ROTEIRO

2. Escreva um texto curto destacando o papel das bactérias do gênero *Rhizobium* no ciclo do nitrogênio.

2. Resposta variável. As bactérias do gênero *Rhizobium* auxiliam as plantas leguminosas a retirar o nitrogênio da atmosfera, necessário para seu desenvolvimento.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

JOHANNA DÖBEREINER E O SUCESSO DA SOJA BRASILEIRA

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brasil é atualmente o maior produtor de soja do mundo. Esse título se deve em grande parte ao trabalho de Johanna Döbereiner (1924-2000), engenheira agrônoma tcheca naturalizada brasileira, cujos estudos com bactérias fixadoras de nitrogênio impulsionaram o uso desses microrganismos no cultivo da soja, reduzindo os custos com adubos nitrogenados e aumentando a produtividade agrícola do Brasil. Segundo a cientista, se o Brasil utilizasse adubos nitrogenados na produção de soja, não conseguiria exportar grande parte de sua produção. O preço baixo da soja produzida no Brasil é consequência de seu menor custo de produção.

Os estudos de Johanna também foram importantes para o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Foi observando a cana-de-açúcar que ela percebeu que esse cultivo apresentava plantas verdes e viçosas sem que fosse feita a adubação nitrogenada. Ela então dedicou-se a pesquisar como seria possível obter algo semelhante com a soja.

Alexandre Campbell/Folhapress

"Sou uma camponesa no laboratório", dizia Johanna Döbereiner. Na foto de 1995, a cientista em seu laboratório no Rio de Janeiro (RJ).

Terminada a Segunda Guerra Mundial, a população de língua alemã foi intensamente perseguida na Checoslováquia [...]. Foi o que aconteceu com Johanna, que seguiu com os avós para a Alemanha Oriental, onde trabalhou para o sustento dos três, numa fazenda, ordenhando vacas e espalhando esterco para adubar o solo. Com a morte dos avós, [...] Johanna foi, então, para a região de Munique. Trabalhou inicialmente numa pequena propriedade rural e, depois, numa fazenda maior, que produzia variedades melhoradas de trigo. Em 1947, iniciou o curso de Agronomia na Universidade de Munique, onde conheceu o estudante de Medicina Veterinária Jürgen, com quem se casou em 1950. Nesse mesmo ano, seguindo os passos do pai, emigrou para o Brasil [...].

Não escreva no livro.

Ao chegar ao Brasil, em 1951, a doutora Johanna começou a trabalhar no Laboratório de Microbiologia de Solos do antigo DNPEA, do Ministério da Agricultura. [...] Entre 1963 e 1969, quando poucos cientistas acreditavam que a fixação biológica de nitrogênio (FBN) poderia competir com fertilizantes minerais, Johanna Döbereiner iniciou um programa de pesquisas sobre os aspectos limitantes da fixação biológica de nitrogênio [...] em leguminosas tropicais. O programa brasileiro de melhoramento da soja, iniciado em 1964, foi influenciado – como tantas outras pesquisas nas regiões tropicais – pelos trabalhos de Johanna Döbereiner, tendo representado, na época, uma quebra de paradigma.

Totalmente baseado no processo de FBN, o programa brasileiro de melhoramento da soja desenvolveu-se no sentido inverso ao da orientação dos EUA, [...] que elaborava tecnologias de produção apoiadas no uso intensivo de adubos nitrogenados. Os estudos da dra. Johanna permitiram que a fixação do nitrogênio pelas plantas fosse feita pela bactéria *Rhizobium*. Dessa forma, a soja gerava seu próprio adubo.

A alternativa brasileira de estabelecer simbioses eficientes com rizóbios permitiu a eliminação dos adubos nitrogenados na cultura da soja, o que representa uma economia anual de mais de 2 bilhões de dólares para o Brasil. Foi assim que os produtores brasileiros de soja puderam ver diminuídos seus custos de produção e a soja conseguiu competir com sucesso no mercado internacional. A crise de energia aumentou o interesse na pesquisa sobre FBN, estendendo-a às associações entre gramíneas e microrganismos diazotróficos. Foi constante a presença da dra. Döbereiner nesses estudos, desde as descobertas iniciais da ocorrência de *Azotobacter paspali* [bactéria fixadora de nitrogênio] em associação com raízes de *Paspalum notatum* [capim-bahia], até as associações de várias bactérias diazotróficas em simbiose endofítica com plantas não leguminosas. Foram descobertas nove espécies de bactérias diazotróficas associadas a gramíneas, cereais e tuberosas. Os melhores resultados ocorreram com algumas espécies de cana-de-açúcar. O trabalho da dra. Döbereiner permitiu o desenvolvimento de parcerias nacionais e internacionais com a Alemanha, os Estados Unidos e a Bélgica, assim como com outros países do Terceiro Mundo no qual a Embrapa Agrobiologia é considerada centro de excelência.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Johanna Döbereiner. *In*: Memória Embrapa, [20--]. Disponível em: https://www.embrapa.br/memoria-embrapa/personagens/johanna-dobereiner. Acesso em: 30 maio 2024.

PARA EXPLORAR

Assista

A brasileira que revolucionou a agronomia mundial

O vídeo de 2019, do jornal *Nexo*, conta a história de vida da agrônoma Johanna Döbereiner. Duração: 6 min 27 s.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-cKxCK-QmDU. Acesso em: 2 maio 2025.

Acesse

De camponesa a cientista indicada ao Prêmio Nobel

Linha do tempo da trajetória de Johanna Döbereiner.

Disponível em: https://www.embrapa.br/johanna-dobereiner/linha-do-tempo. Acesso em: 3 out. 2024.

Para discutir

1 **De acordo com o texto, Johanna Döbereiner trabalhou no campo antes de se dedicar à pesquisa no Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária (DNPEA), precursor da atual Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). De que maneira essa experiência de vida pode ter contribuído para a formação científica de Johanna?**

2 **O texto também afirma que o programa brasileiro de melhoramento de soja, influenciado pelos trabalhos de Johanna, representou uma quebra de paradigma para a época. O que isso significa?**

3 **Em 1959, Johanna Döbereiner apresentou os resultados de sua pesquisa em um congresso sobre solos, mostrando que as bactérias fixadoras de nitrogênio precisavam de uma temperatura mínima de 25 °C para seu crescimento. Relacione esse resultado com o fato de a Região Centro-Oeste do Brasil ser grande produtora de soja.**

4 **Em sua opinião, de que maneira Johanna contribuiu para o reconhecimento da pesquisa científica realizada no Brasil?**

1. O texto afirma que Johanna trabalhou adubando solo em uma fazenda na Alemanha Oriental e utilizando variedades melhoradas de trigo em Munique. Essa vivência no campo impulsionou seu interesse pela agronomia, levando-a a estudar a associação de várias plantas com as bactérias fixadoras de nitrogênio para melhorar a adubação dos solos em cultivos agrícolas.

2. Na década de 1960, o uso intensivo de fertilizantes químicos nitrogenados era o paradigma que guiava a produção mundial de soja. Assim, o programa brasileiro de melhoramento de soja, que era pautado no uso de bactérias fixadoras de nitrogênio, representou uma ruptura do modelo agrícola imposto pelos Estados Unidos.

3. A Região Centro-Oeste mantém uma média anual de temperatura de 22 °C, o que favorece o cultivo da soja e o crescimento das bactérias fixadoras de nitrogênio.

4. Resposta pessoal. Os trabalhos de Johanna possibilitaram ao Brasil se destacar mundialmente na produção de soja e de outros cultivos, como a cana-de-açúcar, evidenciando os resultados obtidos pela ciência brasileira, em especial os da Embrapa, que é hoje uma instituição de pesquisa reconhecida internacionalmente.

ATIVIDADES

1 **Elabore um texto curto relacionando os seguintes termos: respiração, fotossíntese, ciclo do carbono e ciclo do oxigênio.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2 **Em relação ao ciclo do nitrogênio, responda às questões.**

a) Qual é a importância do nitrogênio para a constituição dos seres vivos?

2. a) O nitrogênio faz parte de proteínas e ácidos nucleicos.

b) Elabore um texto ou um esquema sobre como a atividade humana interfere no ciclo do nitrogênio e quais são as consequências dessa interferência para o ecossistema. Para isso, faça pesquisas em *sites* confiáveis.

2. b) A maioria dos seres vivos não é capaz de incorporar o nitrogênio gasoso. As bactérias do gênero *Rhizobium*, fixadoras de nitrogênio, vivem nas raízes de leguminosas, onde formam nódulos. Essas bactérias são capazes de fixar o nitrogênio gasoso sob a forma de compostos nitrogenados assimiláveis por essas plantas. Ao morrer, as plantas liberam compostos nitrogenados no solo, disponibilizando-os para outras plantas. Os animais se alimentam dos vegetais e, desse modo, incorporam esses compostos.

3 **Os ciclos biogeoquímicos permitem que os elementos circulem pela natureza. Descreva o papel dos decompositores nesses ciclos.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **Leia o texto e responda às questões a seguir.**

Animais marinhos correm sério risco com aquecimento dos oceanos

A temperatura da superfície dos oceanos atingiu 20,96 °C em julho, um novo recorde de calor, segundo o serviço meteorológico Copernicus, da União Europeia. [...]

A professora Kyssyanne Samihra Santos Oliveira, do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), destaca que o aquecimento dos oceanos é provocado por uma junção entre o El Niño e o aumento das emissões de gases de efeito estufa.

[...]

Kyssyanne ressalta que os animais marinhos ainda sofrem com a decomposição de nutrientes descartados pelo ser humano, como [...] o esgoto que é jogado no mar. A professora esclarece que essas substâncias acabam consumindo mais oxigênio e prejudicando a biodiversidade.

"A gente está observando uma redução de oxigênio, principalmente nas regiões costeiras, por causa desse aporte de nutrientes e do descarte da matéria orgânica. Então, além do próprio aumento da temperatura afetar a biodiversidade marinha, a redução da concentração de oxigênio afeta invertebrados, vertebrados, todos os níveis de peixes e mamíferos marinhos", expõe a professora.

[...]

Portela, M. E. Animais marinhos correm sério risco com aquecimento dos oceanos. *Metrópoles*, 14 ago. 2023. Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/animais-marinhos-correm-serio-risco-com-aquecimento-dos-oceanos. Acesso em: 28 maio 2024.

a) Segundo o texto, quais são os impactos causados pela diminuição de oxigênio nos oceanos?

b) Muitas atividades humanas têm alterado os ciclos biogeoquímicos que ocorrem na Terra há milhões de anos. Como é possível estimar os efeitos dessas mudanças?

5 **Leia a tira e responda às questões a seguir.**



Humor com Ciência/Acervo do cartunista

5. a) O ciclo da água pode ser considerado sem fim, pois enquanto houver a fonte de calor, no caso o Sol, e a água no planeta Terra, as etapas do ciclo da água ocorrerão infinitamente.
b) Nas imagens é possível observar a evaporação e a precipitação da água.

Humor com Ciência. Disponível em: https://www.humorcomciencia.com/tagtirinha/ciclo-da-agua/. Acesso em: 30 maio 2024.

a) Elabore uma explicação que responda ao questionamento do título da tira.

b) Identifique as etapas do ciclo da água representadas nas imagens.

5. c) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

c) Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), cerca de 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao consumo humano nem à irrigação de plantações. A falta de água para o consumo pode ser um dos grandes problemas deste século. Escreva um breve texto argumentando como as atividades humanas interferem no ciclo da água. Em seu texto, procure discutir que medidas podem ser tomadas pelo ser humano para diminuir essa interferência.

4. a) O oxigênio dos oceanos é fundamental para a sobrevivência dos animais marinhos, para a manutenção das cadeias alimentares e para a regulação do ciclo do carbono. A diminuição da concentração de oxigênio nos oceanos pode causar mudanças na produtividade desse curso de água, na biodiversidade e nos ciclos biogeoquímicos. **b)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

1. O carbono é o principal constituinte dos carboidratos, lipídios e proteínas, que são os constituintes dos organismos animais e vegetais.

CARBONO E CADEIAS CARBÔNICAS

2. Não, pois nesse caso os alimentos ou produtos em geral são classificados como orgânicos por não receberem, durante seu cultivo, aplicações de pesticidas, de adubos industrializados e de outras substâncias que podem ser nocivas à saúde humana. O uso do termo "orgânico", nesse caso, não é contraposto ao termo "inorgânico".

A VERSATILIDADE DO CARBONO

O termo **orgânico** vem sendo largamente utilizado para designar sistemas sustentáveis de agricultura que não permitem o uso de produtos químicos sintéticos que sejam prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. A Química Orgânica estuda os compostos que contêm átomos de carbono em sua constituição; nesse contexto, o mesmo termo, orgânico, serve para designar, por exemplo, todo tipo de algodão, pois, assim como outras fibras vegetais, o algodão consiste em 90% de celulose, que é um polímero de glicose (várias moléculas de glicose unidas). Muitas das características que fazem do algodão um tecido tão desejável se devem à estrutura desse polímero. O algodão naturalmente colorido, por exemplo, ainda elimina a necessidade de tingimento, o que permite a fabricação de tecidos hipoalergênicos, sem a adição de corantes em sua composição, e economiza uma imensa quantidade de água e de energia que seria gasta nas grandes caldeiras onde os fios do algodão são cozidos.

Assim como no algodão, o carbono está presente nos alimentos, nos combustíveis, em medicamentos, nos plásticos e em diversos outros materiais. Mais de 95% de todas as substâncias conhecidas contêm carbono em sua constituição.

Neste capítulo, você vai estudar o que torna o carbono um elemento tão versátil a ponto de fazer parte de uma imensa variedade de produtos, tanto naturais quanto industrializados.

3. Não, pois a degradabilidade depende da forma como estão ligados os átomos em um composto. Os plásticos não biodegradáveis, por exemplo, são formados principalmente por carbono, mas sua degradação é bastante lenta.

PARA COMEÇAR

1. Por que o carbono é um elemento químico abundante nos organismos animais e vegetais?
2. Em alguns supermercados e lojas, é possível encontrar produtos chamados "orgânicos". Seria correto considerar como "inorgânicos" os demais produtos não classificados dessa maneira?
3. O fato de um composto ser feito de carbono faz com que ele seja facilmente degradável?

Algodão naturalmente colorido cultivado em plantação agroecológica, em que o agricultor utiliza recursos existentes em sua área em vez de produtos químicos industrializados. Campina Grande (PB). Foto de 2022. Altura do algodoeiro: 1,5 m.

Sérgio Cobel da Silva/EMBRAPA/SCT

Não escreva no livro.

Química e Biologia: 1. A lavagem correta das mãos e dos alimentos, por exemplo, deve ser estimulada para a prevenção da transmissão de bactérias. Além disso, os antibióticos só devem ser usados com prescrição médica, cumprindo rigorosamente as instruções de uso. Nas instituições de saúde, os profissionais de saúde devem estar atentos ao uso de luvas e de equipamentos de proteção na manipulação de pacientes, e à higiene adequada de todos os espaços.

QUÍMICA E BIOLOGIA

Reações químicas e antibióticos

Chethan Shivakumar/The Times Of India/AFP

A cientista Ada Yonath recebeu o Nobel de Química por seus trabalhos.

Os antibióticos são compostos usados para tratar infecções causadas por bactérias. Eles atuam matando as bactérias que causam a infecção ou impedindo a reprodução desses microrganismos. Em 2009, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a cientistas que utilizaram a Química para explicar mecanismos biológicos em ribossomos, tornando possível o desenvolvimento de novos antibióticos capazes de combater bactérias resistentes aos antibióticos atuais. A israelense Ada Yonath (1939-) estava entre os cientistas que receberam o prêmio. Ada diz que decidiu estudar Química por ser a ciência que melhor responde às perguntas relacionadas à vida. Ela ainda ressalta que o entendimento da Biologia depende da Química, uma vez que a explicação do que acontece nos processos celulares envolve a compreensão de reações químicas.

1. **Pesquise sobre a resistência das bactérias aos antibióticos e escreva medidas que podem ser tomadas para minimizar esse problema.**

ROTEIRO

1. **Explique a afirmação: "Todas as substâncias orgânicas contêm átomos de carbono, mas nem todas as substâncias que contêm átomos de carbono são orgânicas".**

1. A afirmação significa que o carbono, além de estar presente nas moléculas orgânicas, também pode estar presente em substâncias inorgânicas e sintéticas.

INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA

A Química Orgânica é entendida, hoje, como a parte da Química que estuda os compostos de carbono. Entretanto, há substâncias que apresentam átomos de carbono que são estudadas principalmente pela Química Inorgânica, que tem como foco de pesquisa os compostos de origem mineral. Entre essas substâncias estão o carbonato de cálcio ($CaCO_3$), presente no mármore; o dióxido de carbono (CO_2), encontrado em pequena concentração na atmosfera; e o bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$), substância usada como antiácido e como fermento químico.

A Teoria da Força Vital

No século XVIII, o cientista francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) descobriu que muitos dos compostos encontrados nos seres vivos tinham em comum o fato de serem constituídos de carbono.

Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), renomado químico sueco, foi o primeiro a estabelecer uma delimitação dos estudos referentes à Química Orgânica. Berzelius foi o responsável por difundir no meio científico a **Teoria do Vitalismo**, segundo a qual os processos capazes de gerar vida dependeriam de materiais que estão presentes nos seres vivos e de um conteúdo não material que não poderia ser criado pelo ser humano. Esse conteúdo não material foi chamado de **força vital**.

A Teoria da Força Vital, porém, era um empecilho para o desenvolvimento da Química Orgânica, pois propunha que substâncias orgânicas só poderiam ser obtidas de organismos vivos. De acordo com Berzelius, a força vital seria inerente à célula viva e ninguém poderia criá-la em laboratório.

Desenvolvimento da Química Orgânica

Em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler (1800-1882), que trabalhou com Berzelius, sintetizou, de forma acidental, um composto orgânico chamado **ureia**, comumente encontrado na urina e no sangue de diversos tipos de animais.

A reação feita por Wöhler pode ser representada pela equação química abaixo, na qual o cianato de amônio é aquecido.

$$\underset{\text{cianato de amônio}}{NH_4CNO} \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{ureia}}{(NH_2)_2CO}$$

O trabalho de Wöhler foi questionado, pois ele havia obtido o cianato de amônio de materiais orgânicos, como chifres e sangue. Quase vinte anos depois, com os trabalhos de Adolph Kolbe (1818-1884), que produziu ácido acético (um composto orgânico) a partir de compostos inorgânicos e com métodos de destilação, os vitalistas foram por fim "vencidos".

A Química Orgânica começou então sua evolução com o desenvolvimento de novos estudos voltados tanto ao isolamento e à identificação de compostos quanto às maneiras de prepará-los em laboratório.

Atualmente, a Química Orgânica é a ciência responsável por estudar a maior parte dos compostos de carbono, incluindo muitos compostos que não estão associados a organismos vegetais ou animais. Graças aos estudos dessa área da Química, são conhecidos, hoje, milhões de substâncias orgânicas.

O CARBONO E AS LIGAÇÕES COVALENTES

Como o carbono é o elemento presente em todas as moléculas de substâncias orgânicas, o conhecimento de suas características é fundamental para entendermos as propriedades dessas substâncias.

Não escreva no livro.

O carbono é tetravalente

Em 1857, o químico alemão Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829-1896) propôs e confirmou a tetravalência do carbono.

Hoje podemos justificar essa tetravalência com base no número de elétrons que o carbono apresenta na camada de valência.

Como seu número atômico é 6, o número de elétrons na primeira camada é 2, e na camada de valência, 4.

O fato de o carbono possuir quatro elétrons na última camada confere a ele a capacidade de formar um total de quatro ligações para adquirir configuração eletrônica de gás nobre e, segundo o modelo do octeto, adquirir estabilidade. As ligações que o carbono forma com outros ametais são ligações covalentes, ou seja, cada átomo compartilha quatro pares de elétrons e pode se ligar com até quatro átomos de outros elementos químicos. O carbono, portanto, é tetravalente.

As possibilidades que o átomo de carbono tem de formar suas quatro ligações e adquirir configuração eletrônica de um gás nobre são:

quatro ligações simples

duas ligações simples e uma ligação dupla

duas ligações duplas

uma ligação simples e uma ligação tripla


AMJ Studio/ID/BR

O átomo de carbono: $Z = 6$, $A = 12$. As esferas de cor amarela representam os elétrons; as verdes, os prótons; e as pretas, os nêutrons. Representação em cores-fantasia e fora de escala.

Exemplos


fórmula estrutural da ureia


fórmula estrutural do etanol

O modelo de Lewis

Em 1916, o químico estadunidense Gilbert Newton Lewis (1875-1946) propôs a representação de cada ligação covalente por meio de um par de elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos.

A representação da estrutura eletrônica dos átomos feita por Lewis consiste em escrever de maneira explícita todos os elétrons da camada de valência para cada átomo. Em seguida, as ligações covalentes são representadas por meio do compartilhamento entre os átomos, seguindo o modelo do octeto.

Essa representação foi denominada **fórmula eletrônica de Lewis**. Nela, a formação da ligação covalente se dá sempre com o objetivo de que os átomos alcancem a configuração de gás nobre por meio do compartilhamento de elétrons.

Observe, na tabela a seguir, a representação de Lewis e a fórmula estrutural de algumas moléculas orgânicas.

	REPRESENTAÇÃO DE LEWIS	FÓRMULA ESTRUTURAL
Metano (CH_4)		
Eteno (C_2H_4)		
Etanol (C_2H_5OH)		

Note que, no caso do etanol, o oxigênio apresenta dois pares de elétrons que não se ligam. Esse fator será importante para determinar a estrutura das moléculas.

ROTEIRO

2. Faça a representação de Lewis para uma molécula orgânica na qual dois átomos de carbono se ligam entre si por meio de uma ligação tripla. A ligação restante para cada carbono é feita com o hidrogênio.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Formas de representação de uma molécula orgânica

As moléculas orgânicas podem ser representadas de vários modos. Vamos considerar dois exemplos: o propano e o propeno. As formas mais comuns de representação dessas moléculas são mostradas a seguir.

Fórmula estrutural tridimensional: Representa-se a estrutura tridimensional das ligações simples dos átomos da molécula na forma tetraédrica, e as ligações duplas são representadas no plano.



Nessa forma de representação, as ligações que se projetam para trás do plano da folha de papel são indicadas por uma ligação tracejada em formato de cunha (). As que se projetam para a frente do plano da folha de papel são representadas por uma ligação em negrito em formato de cunha ().

Fórmula estrutural plana: Todas as ligações da molécula são mostradas no plano.


propano


propeno

Fórmula estrutural condensada: Os átomos da molécula são representados, e as ligações ficam apenas indicadas de acordo com o número de átomos de hidrogênio ligados a cada átomo de carbono.

$CH_3CH_2CH_3$ propano CH_2CHCH_3 propeno

Fórmula estrutural parcialmente condensada: Apenas as ligações entre os átomos de carbono são apresentadas de forma explícita.

$CH_3 — CH_2 — CH_3$ propano $CH_2 = CH — CH_3$ propeno

Fórmula bastão: Apenas as ligações entre os átomos de carbono são representadas.


propano propeno

Fórmula molecular: Indica o número de átomos de cada elemento presente na molécula.

C_3H_8 propano C_3H_6 propeno

A geometria das moléculas orgânicas

A geometria das moléculas orgânicas (e consequentemente a representação tridimensional delas) pode ser prevista por meio dos elétrons de valência. Para isso, será usado o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, já estudado nesta obra.

Não escreva no livro.

Para os compostos de carbono, quando temos um átomo de carbono fazendo somente ligações simples, como é o caso do metano (CH_4), a disposição espacial é tetraédrica, pois essa forma geométrica é a que apresenta maior distância entre os átomos de hidrogênio, que se posicionam nos vértices do tetraedro.

A tabela abaixo pode ser usada para determinar a geometria de boa parte das moléculas orgânicas. Nas moléculas reais, há um desvio desse valor em função da repulsão dos pares eletrônicos.

Tipo de ligação do átomo central	Disposição espacial das ligações	Geometria das ligações	Ângulo de ligação
		Tetraédrica	109,5°
		Trigonal plana	120°
		Linear	180°
		Linear	180°

Observe, a seguir, alguns exemplos de geometria de moléculas orgânicas e seus respectivos ângulos de ligação (representações em cores-fantasia).



metanal (formaldeído)



eteno



metano

Ilustrações: AMJ Studio/ID/BR

Ligações de carbono com átomos de outros elementos químicos

O número de ligações que o carbono forma nos compostos orgânicos é fixo: são sempre quatro ligações. O nitrogênio, na maior parte das vezes, forma três ligações; o oxigênio, duas ligações; e o hidrogênio forma apenas uma, assim como o cloro e os outros halogênios.

A tabela a seguir mostra os principais elementos formadores da matéria orgânica e quantas ligações covalentes podem formar.

Elemento	Número de elétrons na camada de valência	Número de ligações covalentes possíveis	Possibilidades
H	1	1	H —
C	4	4	
N	5	3	
O, S	6	2	— O — O = — S — S =
Halogênios	7	1	F — Cℓ — Br — I —

Geometria molecular

O formato espacial que uma molécula assume – ou seja, sua geometria molecular – está associado ao arranjo dos átomos que a constituem, à natureza das interações entre esses átomos e à presença ou não de pares eletrônicos isolados.

A geometria de uma molécula é fundamental para entender suas propriedades físico-químicas, interações intermoleculares, sua reatividade, etc., e explicar, por exemplo, o comportamento de uma substância composta dessa molécula.

De que forma os ângulos de ligação do átomo de carbono definem como ele pode se ligar a outros átomos de carbono para formar cadeias e anéis?

Material

- folhas de papel sulfite ou cartolina
- tesoura
- cola
- régua
- lápis

Como fazer

1. Em uma folha de papel sulfite ou cartolina, desenhe a figura a seguir, usando uma régua.



Ilustrações: AM Produções Gráficas/ID/BR

2. Recorte a figura e dobre-a nas linhas tracejadas.



RESÍDUOS

Os modelos podem ser guardados e utilizados em outras atividades.

3. Cole as abas do poliedro. O sólido formado deverá ter o mesmo aspecto da figura ao lado.



4. Faça pelo menos seis desses modelos. Utilizando de um a seis poliedros, procure dispô-los de modos diferentes, para que você visualize, por exemplo, cadeias carbônicas lineares e cadeias cíclicas.

Para concluir

1. O poliedro formado é um tetraedro. Como o carbono estabelece uma ligação simples com cada um dos quatro átomos de hidrogênio, pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, a molécula adquire um formato tetraédrico. No modelo utilizado, o carbono estaria no interior do tetraedro, e cada um dos átomos de hidrogênio, em um de seus vértices.

1 **Qual é o nome do poliedro formado? Explique por que ele pode ser utilizado para representar a geometria de uma molécula de metano (CH_4) e em que posições desse poliedro estariam o átomo de carbono e os quatro átomos de hidrogênio dessa molécula.**

2 **Desenhe a molécula de metano utilizando esferas para representar os átomos de hidrogênio e de carbono, e traços para representar as ligações covalentes entre esses átomos. Em seguida, represente essa mesma molécula dentro de um tetraedro.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Faça uma cadeia com três dos modelos produzidos neste experimento e desenhe em seu caderno uma cadeia com três átomos de carbono e seus respectivos átomos de hidrogênio, utilizando os símbolos atômicos (C para cada carbono e H para cada hidrogênio) e traços (—) para representar as ligações covalentes entre esses átomos.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CARBONO E CADEIAS CARBÔNICAS

Classificação do átomo de carbono nas cadeias

Os átomos de carbono são classificados de acordo com o número de outros átomos de carbono com os quais estejam ligados:

- **Carbono primário:** está ligado a um único átomo de carbono da cadeia.
- **Carbono secundário:** liga-se a dois outros átomos de carbono.
- **Carbono terciário:** está ligado a três outros átomos de carbono.
- **Carbono quaternário:** liga-se a quatro outros átomos de carbono.

Nos dois casos seguintes, estão marcados com **p** os átomos de carbono primários, com **s** os secundários, com **t** os terciários e com **q** os quaternários.





Classificação das cadeias carbônicas

Cadeias abertas (ou acíclicas)

As cadeias carbônicas abertas (ou acíclicas) não apresentam nenhum tipo de ciclo. Exemplos:





As cadeias abertas podem ser classificadas segundo os seguintes critérios:

- **Disposição dos átomos na cadeia**. Nesse caso, as cadeias abertas podem ser normais ou ramificadas.

  Nas **cadeias normais**, os átomos de carbono estão ligados em uma sequência que se representa linearmente, havendo, portanto, apenas duas extremidades na cadeia que os contém. Exemplos:

  $H_3C — CH_2 — CH = CH_2$ $H_3C — CH_2 — OH$

  As **cadeias ramificadas** apresentam mais de duas extremidades da cadeia com átomos de carbono. Exemplos:







- **Tipo de ligação entre os átomos de carbono**. Nas cadeias abertas, existem átomos de carbono unidos por ligações simples, duplas ou triplas.

  Quando há apenas ligações simples, temos uma cadeia carbônica **saturada**. Exemplos:





$CH_3CH_2CH_2CH_3$

  Quando há uma ou mais ligações duplas ou triplas entre carbonos, a cadeia carbônica é **insaturada**. Exemplos:



$CH \equiv CH$

Cadeias cíclicas

As cadeias cíclicas são aquelas nas quais os átomos de carbono se ligam em uma estrutura fechada, podendo ou não serem aromáticas.

Os compostos aromáticos foram descobertos em 1825 por Michael Faraday (1791-1867). O aromático mais simples e um dos mais importantes é o **benzeno**, que possui fórmula molecular C_6H_6.

Embora essa fórmula indique que se trata de um composto insaturado, a estrutura da molécula de benzeno permaneceu desconhecida ainda por muitos anos depois da descoberta de sua fórmula molecular.

Chegou-se a cogitar que o benzeno poderia ter a estrutura de uma cadeia aberta com muitas insaturações. No entanto, compostos insaturados são altamente reativos, comportamento que não acontecia com o benzeno.

Em 1865, Kekulé propôs para essa substância uma estrutura cíclica de seis átomos de carbono, com ligações duplas e simples alternadas:



No benzeno ocorre uma deslocalização dos elétrons ao longo da cadeia carbônica. Isso faz com que todas as ligações tenham o mesmo caráter, que é intermediário entre as ligações simples e as duplas. Uma das maneiras de representar o benzeno é a que mostra as ligações duplas deslocalizadas, ou seja:



O termo "aromático", atribuído ao benzeno logo que ele foi isolado, deve-se ao seu odor e ao de alguns dos compostos que apresentam esse tipo de estrutura.

Hoje, apesar de essa denominação ter sido mantida, a classificação de uma molécula como aromática é critério químico. Um composto é classificado como aromático quando apresenta **anel benzênico** em sua estrutura.

Além do benzeno, encontramos em nosso cotidiano algumas substâncias aromáticas importantes: o tolueno (também chamado de metilbenzeno), usado na indústria de tintas, vernizes e como solvente de maneira geral; o estireno, matéria-prima para a obtenção do poliestireno; e o naftaleno (substância presente na naftalina), que apresenta dois anéis aromáticos condensados e é utilizado na indústria de corantes.



tolueno



estireno

naftaleno

Cadeias cíclicas alifáticas (ou cadeias alicíclicas)

São considerados alifáticos os compostos que não possuem anel benzênico em suas estruturas. Assim, todos os compostos de cadeia aberta são considerados alifáticos, bem como os de cadeia cíclica não aromática.

Os compostos alifáticos de cadeia cíclica são também chamados de **alicíclicos**. As cadeias desses compostos podem ser classificadas de modo análogo aos compostos de cadeia aberta, ou seja, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas. Veja alguns exemplos a seguir.



cadeia normal saturada



cadeia ramificada saturada



cadeia normal insaturada

Cadeias heterogêneas ou homogêneas

Quando há, além de átomos de carbono, átomos de outros elementos ligados entre átomos de carbono (heteroátomo), a cadeia é chamada de **heterogênea**. Caso não possua heteroátomos, a cadeia é classificada como **homogênea**. Exemplos de cadeias heterogêneas:

$H_3C — CH_2 — O — CH_3$

$CH_3CH_2NHCH_3$



ROTEIRO

3. **Escreva a fórmula estrutural de uma cadeia com cinco átomos de carbono que seja:**

a) aberta, saturada, ramificada e heterogênea;

b) cíclica, insaturada, normal e homogênea.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Propriedades físico-químicas

Os compostos orgânicos têm características muito peculiares e podem ser identificados por meio de suas propriedades físicas e químicas. As propriedades, de forma geral, podem ser determinadas levando-se em consideração algumas características, como composição química e estrutura molecular. Essas características devem ser avaliadas em conjunto para uma correta identificação dos compostos.

Como o número de substâncias orgânicas é muito grande, elas foram classificadas em grupos chamados de **funções orgânicas**. Cada função pode ser identificada pela presença de um átomo ou de um grupo de átomos, chamado grupo funcional. As tabelas a seguir apresentam algumas funções orgânicas.

COMPOSTOS OXIGENADOS: FORMADOS SOMENTE POR C, H E O	
Exemplo	**Nome da função orgânica**
	Álcool
	Aldeído
	Cetona
	Ácido carboxílico
	Éter
	Éster

HIDROCARBONETOS: FORMADOS SOMENTE POR C E H	
Exemplo	**Nome da função orgânica**
	Alacano: apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbono.
	Alceno: apresenta ligação dupla entre átomos de carbono.
	Alcino: apresenta ligação tripla entre átomos de carbono.

NITROGENADOS: FORMADOS POR C, H E N	
Exemplo	**Nome da função orgânica**
	Amina
	Amida

Fonte de pesquisa: Nelson, D. L.; Cox, M. M. *Lehninger Principles of Biochemistry*. 4. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2004. p. 14.

Temperaturas de fusão e de ebulição

Considere a reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, como a mostrada a seguir.



ácido acético — **hidróxido de sódio** — **acetato de sódio** — **água**

As substâncias orgânicas são formadas, na maioria das vezes, por estruturas que apresentam apenas ligações covalentes. É o caso do ácido acético usado como reagente na equação acima. A polaridade das moléculas que formam a substância tem influência direta nas temperaturas de fusão e de ebulição dessa substância.

O produto orgânico da reação acima é o acetato de sódio (um sal orgânico) – substância iônica.

Algumas informações sobre as propriedades do ácido acético, do acetato de sódio e de dois hidrocarbonetos com dois átomos de carbono estão na tabela ao lado.

Composto	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
ácido acético	16,6	118
acetato de sódio	324	*
etano	−182,8	−88,6
eteno	−169,2	−103,8

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. *Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC-Press, 2017. Seção 3. Versão eletrônica.

* Valores superiores a 400 °C promovem a decomposição da substância.

Observe que as moléculas de ácido carboxílico se associam por ligações de hidrogênio, enquanto os hidrocarbonetos se associam por forças de London. A maior intensidade das forças intermoleculares contribui para o fato de os ácidos carboxílicos apresentarem temperatura de ebulição muito maior que a de um hidrocarboneto com o mesmo número de átomos de carbono.

O acetato de sódio apresenta propriedades típicas da maior parte das substâncias iônicas: é sólido nas condições ambientes e condutor de corrente elétrica quando dissolvido em água ou no estado líquido (isto é, em temperaturas superiores à sua temperatura de fusão).

Quanto mais intensas são as forças que mantêm associadas as moléculas de uma substância, maior é a temperatura de fusão dessa substância.

Solubilidade

A solubilidade de uma substância em outra depende da estrutura dos aglomerados que as formam.

O etanol (álcool etílico) se dissolve em água em quaisquer proporções. O óleo de cozinha, por sua vez, tem uma solubilidade em água muito pequena.

Em geral, semelhanças de tamanho e de polaridade contribuem para uma solubilidade maior. As moléculas de etanol, por exemplo, são polares.

$H_3C—CH_2—OH$

etanol

A presença do grupo OH nessa molécula possibilita ligações de hidrogênio entre moléculas de etanol e de água, contribuindo para a miscibilidade de uma substância na outra.

Pode-se justificar a baixa solubilidade do óleo de cozinha em água pelo fato de que, enquanto as moléculas de água são polares e se associam por ligações de hidrogênio, as moléculas de óleo têm baixíssima polaridade.

À medida que a cadeia carbônica dos monoalcoóis (alcoóis que têm apenas um grupo OH) aumenta, sua solubilidade em água diminui consideravelmente. Enquanto o etanol é solúvel em água em quaisquer proporções, o butan-1-ol tem solubilidade de, aproximadamente, 80 g/L, a 25 °C. Isso pode ser explicado pelo fato de o butan-1-ol apresentar uma extremidade hidrófila (aquela que possui o grupo OH) e uma cadeia carbônica hidrófoba maior que a do etanol. (**Hidrófila**: que tem afinidade com a água. **Hidrófoba**: que não tem afinidade com a água.)

$H_3C—CH_2—CH_2—CH_2—OH$

butan-1-ol

O ácido acético é solúvel em água em quaisquer proporções. Veja sua fórmula estrutural:



ácido acético

O ácido caproico (hexanoico), substância obtida da pele de cabras, é parcialmente solúvel em água. Isso se deve ao aumento da cadeia carbônica (parte hidrófoba da molécula). Veja a fórmula estrutural desse ácido:



ácido caproico

A glicose apresenta muitos grupos OH em sua estrutura química. Observe a fórmula ao lado.



glicose

Quando a glicose é misturada com a água, há formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de glicose e as de água, o que facilita a dissolução.

O benzeno (substância apolar), cujas moléculas estão associadas por forças do tipo **dipolo instantâneo-dipolo induzido**, tem solubilidade baixa em água, cujas moléculas estão associadas por ligações de hidrogênio.

ATIVIDADE RESOLVIDA

O cortisol e a adrenalina são dois hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins. Os hormônios podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis, dependendo de sua estrutura molecular. Os lipossolúveis se difundem para dentro das células-alvo, uma vez que a membrana plasmática é composta de uma bicamada fosfolipídica, parcialmente apolar. No caso dos hormônios hidrossolúveis, essa entrada é dificultada pela polaridade do composto, e a interação com a célula-alvo se dá por meio de uma proteína receptora, localizada na membrana celular. Observe as estruturas moleculares dos hormônios cortisol e adrenalina representadas a seguir. Com base nessas representações, qual deles deve ser capaz de se difundir livremente na célula-alvo?



cortisol



adrenalina

Resolução

Apesar de tanto o cortisol quanto a adrenalina terem grupos OH em suas estruturas, a cadeia carbônica do cortisol é maior que a da adrenalina, o que lhe confere caráter apolar e permite que ele entre na célula-alvo por difusão.

ROTEIRO

4. Quais são as principais características que devem ser consideradas para a previsão das propriedades físicas dos compostos orgânicos?

4. As principais características que devem ser consideradas para a previsão das propriedades físicas dos compostos orgânicos são a composição química e a estrutura de suas moléculas.

Não escreva no livro.

QUÍMICA E LÍNGUA PORTUGUESA

UMA PALAVRA, VÁRIOS SIGNIFICADOS

Eduardo Zappia/Pulsar Imagens

Estima-se que 90% dos agricultores orgânicos no Brasil sejam pequenos produtores ligados a ONGs e cooperativas. Na fotografia, produtora rural na comunidade quilombola Macacu. Garopaba (SC), 2020.

Uma palavra pode ter diferentes **acepções**. O termo "bateria", por exemplo, pode referir-se ao dispositivo que armazena energia mediante procedimentos eletroquímicos (como a bateria de um automóvel); a um conjunto específico de instrumentos musicais de percussão; a uma grande quantidade de algo (como em "o paciente precisou fazer uma bateria de exames").

"Acepção" é cada um dos muitos sentidos associados a palavras ou expressões cuja significação pode variar de acordo com o contexto em que são usadas. Alguns sinônimos de "acepção" são "interpretação" e "sentido".

Em 1777, o químico sueco Torbern O. Bergman (1735-1784) definiu Química Orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos e Química Inorgânica como a química dos minerais. Entretanto, na primeira metade do século XIX, cientistas descobriram que os compostos orgânicos podiam ser sintetizados em laboratório. Com o passar dos anos e a aceitação desses resultados pela comunidade científica, a definição de Química Orgânica foi alterada para a parte da Química que estuda os compostos de carbono.

A palavra "orgânico" em uma embalagem de produto alimentício, no entanto, não possui esse significado. Ela indica que aquele alimento foi produzido de acordo com normas bastante específicas. No Brasil, a produção de alimentos orgânicos está regulamentada pela Lei Federal n. 10 831, de 23 de dezembro de 2003.

De acordo com a referida lei, para que um sistema de produção agropecuária seja classificado como orgânico, ele deve adotar técnicas que otimizem o uso dos recursos naturais e socioeconômicos; respeitar a integridade cultural das comunidades rurais; ter por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica; empregar, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, sem o uso de materiais sintéticos, organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, entre outros.

QIMA IBD/Ministério da Agricultura e Pecuária/Governo Federal

Conforme a legislação brasileira, o consumidor reconhece o produto orgânico pela presença do selo de certificação ou pela declaração de cadastro do produtor orgânico familiar.

Para que o alimento possa ser comercializado como orgânico, ele precisa estar certificado por uma agência legalmente instituída. Mas os custos dessa certificação representam um obstáculo para os pequenos produtores, responsáveis por grande parte da produção orgânica no país. Além da filiação desses produtores à agência certificadora e da inscrição dos produtos, esses custos incluem diárias de inspeção, despesas de deslocamento de auditores e análises de resíduos nos produtos. O próprio uso do selo de certificação também tem um custo, podendo variar entre 2 mil e 30 mil reais por ano. Esses valores gastos para a certificação aumentam ainda mais em casos como o cultivo feito por vários produtores em áreas diferentes, a permissão para a venda dos produtos no exterior, etc.

Fontes de pesquisa: Borguini, R. G.; Torres, E. A. F. S. Alimentos orgânicos: qualidade nutritiva e segurança do alimento. *Segurança Alimentar e Nutricional*, Campinas, v. 13, n. 2, p. 64-75, 2006. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/1833/1886; Brasil. *Lei da Agricultura Orgânica n. 10831/2003*. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm; Custo da certificação orgânica. Centro de Inteligência em Orgânicos, 21 ago. 2021. Disponível em: https://ciorganicos.com.br/noticia/custo-da-certificacao-organica/. Acessos em: 21 jun. 2024.

Conecte as ideias

2. Na frase, a expressão "produtos químicos" está sendo utilizada com alguns sentidos, como produtos químicos de origem sintética, produtos tóxicos ou nocivos, agrotóxicos, etc.

1 **Pesquise em um dicionário as diferentes acepções da palavra "fenômeno". Indique qual delas se aplica ao termo em cada frase a seguir.**

a) "Segundo o químico, o fenômeno não oferece risco à saúde das pessoas."

b) "Ele é um fenômeno em esportes."

1. a) Tudo o que se observa na natureza.
b) Ser ou objeto com algo de anormal ou extraordinário.

2. **É comum deparar-se, em noticiários e embalagens de produtos comercializados, com a expressão "alimentos cultivados sem o uso de produtos químicos". Qual é a acepção da expressão "produtos químicos" nesse caso? Converse com um colega para responder a essa questão e, depois, socializem a resposta com o restante da turma.**

3. **Quando não é possível consumir alimentos "orgânicos", uma opção para diminuir a ingestão de aditivos agrícolas sintéticos é comprar frutas, legumes e verduras da época. Alimentos fora da época costumam receber cargas maiores de aditivos. Faça uma pesquisa e monte um calendário com a melhor época para consumir os alimentos de que você mais gosta.**

Resposta pessoal. Os estudantes podem realizar a pesquisa na comunidade – em feiras livres, por exemplo.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 Indique qual das substâncias a seguir deve apresentar maior temperatura de ebulição e qual é mais solúvel em água. Justifique suas escolhas.

a) CH_3OH

b) CH_3CH_3

c) CH_3CHCH_3OH

Resolução

A substância CH_3CH_3 é apolar, portanto não é solúvel em água. Ela também é a substância que apresenta menor temperatura de ebulição entre as três alternativas, pois a presença do grupo –OH indica que os outros compostos formam ligações de hidrogênio entre suas moléculas, fazendo com que elas tenham temperaturas de ebulição maiores.

Quanto maior a cadeia carbônica, maior é o ponto de ebulição e menor é a solubilidade da substância em água. Portanto, comparando os compostos CH_3OH e CH_3CHCH_3OH, podemos concluir que o CH_3OH é o mais solúvel em água e que o CH_3CHCH_3OH é o que apresenta a maior temperatura de ebulição.

2 Observe as fórmulas químicas abaixo e indique se as substâncias são orgânicas ou inorgânicas e escreva o porquê de sua indicação.

a) CaO (óxido de cálcio)

b) glicerol



c) H_2O (água)

d) $BaCO_3$ (carbonato de bário)

e) CH_3CONa (acetato de sódio)

2. a) Inorgânica, pois não contém carbono.
b) Orgânica.
c) Inorgânica, pois não contém carbono.
d) Inorgânica, porque é um carbonato.
e) Orgânica.

3 Represente as estruturas de Lewis para os compostos a seguir. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Etano, C_2H_6

b) Metanol, CH_3OH

c) Propanona, CH_3COCH_3

4 Usando o modelo da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, preveja a geometria ao redor de cada carbono das moléculas indicadas a seguir.

a) C_2H_2 (etino) Os dois átomos são lineares.

b) C_3H_6O (propanona)

c) $C_2H_5C\ell$ (cloroetano)

b) O átomo ligado à carbonila apresenta geometria trigonal plana. Os outros átomos apresentam geometria tetraédrica.
c) Os átomos apresentam geometria tetraédrica.

5 Friedrich Wöhler comprovou que compostos orgânicos podem ser obtidos por meio de reações de síntese quando sintetizou a ureia, de maneira acidental. No caso, o cianato de prata (AgOCN) reagiu com o cloreto de amônio ($NH_4C\ell$) sob aquecimento, fornecendo como produto a ureia, $CO(NH_2)_2$.

Utilizando essas informações, escreva a reação de formação da ureia. $AgOCN + NH_4C\ell \rightarrow N_2H_4CO + AgC\ell$

6 Observe as fórmulas abaixo e indique a que grupo funcional pertence cada uma das substâncias representadas por elas.

a) 

b) $CH_3—O—CH_2CH_3$

c) $CH_3CH_2CH_2OH$

d) $CH_3—\underset{\underset{O}{\|}}{C}—CH_2—CH_3$

e) 

f) 

6. a) Aldeído.
b) Éter.
c) Álcool.
d) Cetona.
e) Ácido carboxílico.
f) Amina.

7 Observe cada uma das fórmulas a seguir.

$CH_3—O—CH_3$

$CH_3—CH_2—OH$

a) Identifique a função orgânica a que pertence cada uma dessas duas substâncias.

b) Qual dessas substâncias deve ter maior temperatura de ebulição? Justifique.

7. a) Éter e álcool, respectivamente.
b) O álcool deve ter maior temperatura de ebulição, pois sua massa molar é igual à do éter e suas moléculas se associam por ligações de hidrogênio.

8 As vitaminas são nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo humano. A ingestão de vitaminas deve se dar por meio de uma alimentação balanceada, mas, em casos específicos, um médico pode receitar ao paciente a suplementação de uma ou mais vitaminas. É essencial que essa suplementação seja feita com acompanhamento médico, pois a ingestão exagerada de determinadas vitaminas pode levar a quadros de hipervitaminose, com náuseas, vômitos e aumento da pressão arterial, por exemplo. O procedimento para tratar a intoxicação por uma vitamina depende do grupo do qual ela faz parte, que pode ser o grupo das vitaminas hidrossolúveis ou o das lipossolúveis. No caso de intoxicação por vitaminas hidrossolúveis, basta interromper a administração da vitamina, pois seu excesso é excretado pelos rins por meio da urina. O tratamento de uma intoxicação por vitaminas lipossolúveis, por sua vez, é mais demorado, pois são compostos de difícil eliminação pelo organismo. Dentre as moléculas de vitaminas apresentadas a seguir, qual delas é mais facilmente eliminada pelo organismo? Justifique sua resposta.

Alternativa **c**. Por apresentar quatro grupos hidroxila, a vitamina C é polar e se dissolve facilmente em água.

Não escreva no livro.

a) 

(vitamina A)

b) 

(vitamina D3)

12. a) Quando o carbono se liga a ametais, ele compartilha seus elétrons da camada de valência.
b) Essencialmente ligações covalentes. Entretanto, com elementos muito eletronegativos, pode haver deslocamento da nuvem eletrônica, e a ligação covalente pode adquirir um caráter polar.

c) 

(vitamina C)

d) 

(vitamina K1)

9 **Quais das substâncias a seguir devem apresentar maior temperatura de ebulição? Justifique sua resposta.** **9. b)** $CH_3CH_2CH_3$, pois apresenta maior número de carbonos, aumentando a interação entre as moléculas.

a) CH_4 ou CH_3OH CH_3OH, pois é polar.

b) $CH_3CH_2CH_3$ ou CH_3CH_3

c) $CH_3CH_2CH_3$ ou $CH_3CH(OH)CH_3$ $CH_3CHOHCH_3$, pois é polar.

10 **O colesterol é um composto essencial para o organismo humano, pois é constituinte da membrana celular e molécula precursora de alguns hormônios, como o cortisol e a aldosterona. Sua fórmula estrutural é:**



a) Sabendo que a membrana celular dos animais é composta de fosfolipídios (moléculas com uma cauda hidrofóbica), indique qual propriedade físico-química do colesterol está relacionada com sua presença nas membranas celulares. Justifique.
A baixa polaridade, que permite a interação com compostos hidrofóbicos.

b) Qual região da molécula de colesterol permite que esse composto interaja com a água ou outras moléculas polares? O grupo OH.

11 **A substância de fórmula estrutural representada ao lado é chamada popularmente de limoneno e está presente na casca do limão.** Alternativa **e**.



A respeito do limoneno, pode-se afirmar que:

a) é um composto aromático.

b) tem cadeia carbônica saturada.

c) tem fórmula molecular $C_{10}H_{20}$.

d) tem cadeia carbônica normal.

e) tem cadeia carbônica homogênea.

12 **De acordo com seu conhecimento sobre ligações químicas e sabendo que o carbono possui quatro elétrons na última camada, responda:**

a) Para seguir o modelo do octeto, o átomo de carbono perde elétrons, ganha elétrons ou estes são compartilhados quando ele se liga a outros ametais?

b) Qual é a natureza da ligação química do átomo de carbono com os átomos de ametais?

13 **Considere o trecho:**

> [...] Um marco importante para a Química foi a descoberta da atividade inseticida do [...] DDT. Esse inseticida foi utilizado pela primeira vez em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para combater piolhos que infestavam tropas norte-americanas na Europa e que transmitiam uma doença chamada tifo exantemático [...]. O DDT é classificado como um organoclorado, composto por átomos de carbono (C), hidrogênio (H) e cloro (Cℓ).
>
> 
>
>
> Braibante, M. E. F.; Zappe, J. A. A química dos agrotóxicos. *Química Nova na Escola*, v. 34, n. 1, fev. 2012. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_1/03-QS-02-11.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

a) De acordo com a variação de eletronegatividade na Tabela Periódica, discuta como seria a polaridade das ligações entre os átomos de carbono e cloro e de carbono e hidrogênio.

b) Qual característica do DDT faz com que ele tenha grande persistência (resistência à degradação) em ambientes aquáticos?

13. a) Seriam polares. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio.
b) O DDT é um composto apolar.

Não escreva no livro.

HIDROCARBONETOS

PARA COMEÇAR

1. Qual é a relação entre petróleo e mudanças climáticas?
2. Qual é a importância do petróleo?
3. Qual seria uma alternativa ao uso dos derivados do petróleo como combustível de veículos?

1. O petróleo é um combustível fóssil, não renovável, e a queima de seus derivados – como a gasolina, o óleo *diesel*, entre outros – libera gás carbônico na atmosfera. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera intensifica o efeito estufa.

2. O petróleo é usado como fonte de energia. Dele são extraídos combustíveis como a gasolina, o óleo *diesel* e os combustíveis para aviação e navegação. Outros compostos extraídos do petróleo são utilizados como matérias-primas na produção de plásticos, alguns tipos de borrachas e o asfalto.

3. O etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar ou de outros vegetais é uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis em veículos, por ser uma fonte de energia renovável.

HIDROCARBONETOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Você certamente tem acompanhado os eventos climáticos extremos que estão se tornando frequentes no Brasil e no mundo. O relatório do IPCC (sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) de 2023 aponta as consequências devastadoras do aumento das emissões de gases do efeito estufa (GEE) em nosso planeta, com base em estudos de centenas de cientistas sobre ondas de calor, tempestades, seca, derretimento das geleiras, perda de florestas, escassez de água, inundações, etc. Nesse contexto, políticas voltadas para a questão climática precisam propor e implementar soluções eficazes de adaptação a esses eventos na proteção à biodiversidade, na segurança alimentar e na saúde da população.

"O mundo precisa parar de usar combustíveis fósseis – a principal causa da crise climática" é uma das 10 principais conclusões desse relatório. Mas o que são combustíveis fósseis?

Há milhões de anos, restos de algas e de outros pequenos organismos marinhos se depositaram no fundo dos mares. O calor gerado pelos processos geotérmicos da Terra, a pressão das camadas de rochas empilhadas umas sobre as outras e a ação de bactérias transformaram em petróleo essa matéria orgânica soterrada ao longo das eras geológicas, armazenando grandes quantidades de energia. Essa é a teoria mais aceita sobre a origem desse combustível fóssil, formado principalmente por **hidrocarbonetos**, nosso objeto de estudo neste capítulo.

Mercado Público de Porto Alegre (RS) durante a enchente de maio de 2024.

Carlos Quadros/Fotoarena

Não escreva no livro.

HIDROCARBONETOS

Atualmente conhecemos milhões de compostos orgânicos, muitos naturais e outros, artificiais. Eles são agrupados por suas funções, de acordo com sua estrutura e suas propriedades químicas. Vamos iniciar o estudo das funções orgânicas com os hidrocarbonetos.

Observe alguns produtos comerciais e as principais substâncias que fazem parte de sua composição.

Produto comercial	Aplicação	Composição principal	Fórmula molecular
GNV (gás natural veicular)	Combustível de veículos	metano	CH_4
Gás de cozinha	Combustível de fogão	propano	C_3H_8
		butano	C_4H_{10}
Gasolina	Combustível de veículos	isoctano	C_8H_{18}
Óleo *diesel*	Combustível de veículos	hexadecano	$C_{16}H_{34}$
Etileno	Amadurecimento de frutas	eteno	C_2H_4
Polietileno	Objetos de plástico	polietileno	$(C_2H_4)_n$

O que todas as fórmulas químicas apresentadas no quadro têm em comum? São exemplos de substâncias formadas por apenas dois elementos químicos: carbono e hidrogênio. Todas pertencem à mesma função orgânica: os hidrocarbonetos.

Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio.

A grande maioria dos hidrocarbonetos são apolares e não se misturam com a água (são imiscíveis entre si). Suas moléculas interagem fracamente por meio de interações intermoleculares do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.

1. Hidrocarbonetos possuem energia armazenada em suas ligações químicas. Ao entrarem em combustão (reação com gás oxigênio), liberam energia por meio desse processo exotérmico.

ROTEIRO

1. Os hidrocarbonetos são os principais constituintes de gás de cozinha, gasolina e óleo *diesel*. Por que são utilizados como combustíveis?

Nomenclatura sistemática de hidrocarbonetos não ramificados

A nomenclatura oficial dos compostos segue regras estabelecidas pela Iupac (sigla em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada). O nome de um composto é formado por três partes, conforme mostrado a seguir:

Prefixo + Infixo + Sufixo

↓ Quantidade de átomos de C

↓ Tipo de ligação

↓ Função

Exemplo:
$H_3C - CH_2 - CH_3$
propano

Quantidade de átomos de C	Prefixo
1	met
2	et
3	prop
4	but
5	pent
6	hex

Quantidade de átomos de C	Prefixo
7	hept
8	oct
9	non
10	dec
11	undec
12	dodec

Tipo de ligação	Infixo
só simples	an
uma dupla	en
duas duplas	dien
três duplas	trien
uma tripla	in
duas triplas	diin

Função	Sufixo
hidrocarboneto	o

Para compostos cíclicos ou insaturados, também são aplicadas as regras a seguir:

1. Numere a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima da insaturação, se houver. No caso de duas ou mais insaturações, a soma de suas posições deve ser a menor possível.



2. A posição da insaturação deve ser citada antes do infixo. Use os prefixos **di**, **tri** e **tetra** para indicar a ocorrência de mais de uma mesma insaturação.



3. Número e letra são separados por hífen e números por vírgula.
4. No caso de compostos cíclicos alifáticos, coloque a palavra "ciclo" antes do prefixo numérico.

Classificação dos hidrocarbonetos

Os compostos orgânicos, de forma geral, podem ser divididos em dois grandes grupos: **aromáticos** e **alifáticos**.

Características dos hidrocarbonetos aromáticos

Os compostos aromáticos constituem um conjunto de substâncias que apresentam aromaticidade, mas daremos ênfase apenas a uma parte delas: aquelas cujas moléculas apresentam anel benzênico.

O composto aromático mais simples é o benzeno, isolado pela primeira vez em 1825 pelo físico e químico britânico Michael Faraday (1791-1867). Faraday fez uma série de testes e descobriu que o benzeno apresentava o mesmo número de átomos de carbono e de hidrogênio: C_6H_6. Mas foi o químico alemão Friedrich August Kekulé (1829-1896) quem propôs a fórmula estrutural do benzeno, em 1865, depois de ter um *insight*, descrito no boxe *O sonho de Kekulé*.

A estrutura proposta por Kekulé para o benzeno consistia em um anel muito estável com seis átomos de carbono, em que três ligações duplas e três ligações simples se alternavam.



Benzeno

Quando duas ligações duplas são separadas por uma ligação simples, são chamadas de **duplas conjugadas**. Elas são especiais por apresentarem o **fenômeno da ressonância**, situação em que elétrons deslocalizados – elétrons das ligações π – podem se movimentar entre as duplas conjugadas.

Compostos aromáticos apresentam duplas conjugadas, responsáveis pela estabilidade e pelas propriedades físicas e químicas características dessas substâncias.

A molécula do benzeno é planar e hexagonal, e todas as ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento (1,4 Å), um valor intermediário entre ligações simples (1,5 Å) e ligações duplas (1,3 Å). Além da simetria de sua estrutura, a grande estabilidade do anel benzênico é explicada pela deslocalização dos elétrons das ligações π por toda a sua estrutura – a ressonância.

O benzeno pode ser representado por qualquer das duas estruturas de ressonância (com ligações duplas e simples intercaladas) ou pelo anel com um círculo interno representando a nuvem de elétrons deslocalizados, como representado a seguir. O anel assim formado chama-se anel benzênico.



Representação do benzeno com elétrons deslocalizados nas ligações.



Hidrocarbonetos aromáticos são os que apresentam anéis aromáticos, e a maioria apresenta um ou mais anéis benzênicos. Apresentam baixa reatividade química e nem sempre têm cheiro.

O sonho de Kekulé

"Eu estava sentado à mesa a escrever o meu compêndio, mas o trabalho não rendia; os meus pensamentos estavam noutro sítio. Virei a cadeira para a lareira e comecei a dormitar. Outra vez começaram os átomos às cambalhotas em frente dos meus olhos. Desta vez, os grupos mais pequenos mantinham-se modestamente a distância. A minha visão mental, aguçada por repetidas visões desta espécie, podia distinguir agora estruturas maiores com variadas conformações; longas filas, por vezes alinhadas e muito juntas; todas torcendo-se e voltando-se em movimentos serpenteantes. Mas olha! O que é aquilo? Uma das serpentes tinha filado a própria cauda e a forma que fazia rodopiava [...] diante dos meus olhos. Como se se tivesse produzido um relâmpago, acordei; ... passei o resto da noite a verificar as consequências da hipótese. Aprendamos a sonhar, senhores, pois então talvez nos apercebamos da verdade." – August Kekulé, 1865.

Boyd, R.; Morrison, R. T. *Química orgânica*. 12. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. p. 701.

Não escreva no livro.

São conhecidos diversos hidrocarbonetos aromáticos. Veja alguns exemplos.



O tolueno (C_7H_8) é um hidrocarboneto aromático mononuclear, pois possui apenas um anel benzênico.



O naftaleno ($C_{10}H_8$) é um hidrocarboneto aromático binuclear (formado por dois anéis benzênicos) com anéis condensados. Os anéis condensados apresentam átomos de carbono comuns a dois ou mais anéis.



O bifenilo ($C_{12}H_{10}$) é um hidrocarboneto aromático binuclear com anéis isolados, já que não há átomo de carbono comum aos dois anéis.

2. A principal característica dos compostos que apresentam ressonância é a presença de duplas conjugadas. Duplas conjugadas são as que são separadas por ligações simples, possibilitando o deslocamento de elétrons das ligações π.

3. Sim, todos os compostos aromáticos apresentam duplas conjugadas e, portanto, apresentam ressonância.

4. Não, o fenômeno da ressonância pode acontecer em qualquer composto que apresente duplas conjugadas, o que não é exclusividade dos compostos aromáticos.

Hidrocarbonetos alifáticos

Agora que você já sabe identificar os hidrocarbonetos aromáticos, podemos definir os alifáticos como os demais hidrocarbonetos.

Hidrocarbonetos alifáticos são os que não apresentam anéis aromáticos. Os de cadeia aberta são também chamados de alifáticos (acíclicos não aromáticos) e os de cadeia fechada são os alicíclicos (cíclicos não aromáticos).

ROTEIRO

2. Qual é a principal característica dos compostos que apresentam ressonância?

3. Todos os compostos aromáticos apresentam ressonância?

4. O fenômeno da ressonância só ocorre em compostos aromáticos?

Nomenclatura das classes de hidrocarbonetos

A classificação dos compostos orgânicos, assim como a nomenclatura, segue alguns critérios gerais. **Prefixo**, **infixo** (meio do nome) e **sufixo** indicam informações específicas. Por exemplo, o nome dos tipos de hidrocarboneto tem a seguinte configuração:

Prefixo	Infixo (tipo de ligação)	Sufixo (função química)
al = **al**ifático **cicl** = **cícl**ico não aromático **ar** = **ar**omático	an = ligação **simples** en = **1** ligação **dupla** in = **1** ligação **tripla** dien = **2** ligações **duplas** diin = **2** ligações **triplas**	o

ATIVIDADE RESOLVIDA

Considere as entalpias de hidrogenação dos compostos cíclicos representadas no diagrama de energia ao lado.

Hipoteticamente, a hidrogenação das três ligações duplas do cicloexatrieno na obtenção do cicloexano liberaria 85,8 kcal/mol. Entretanto, experimentalmente, verifica-se a liberação de apenas 49,8 kcal/mol, representando uma diferença de 36 kcal/mol entre o valor experimental e o teoricamente esperado. Como se explica essa diferença?



Reinaldo Vignati/D/BR

Fonte do gráfico: Caramori G. F.; Oliveira K. T. Aromaticidade: evolução histórica do conceito e critérios quantitativos. *Química Nova*, n. 7, p. 1871-1884, 2009.

Resolução

Na teoria, a hidrogenação das três ligações duplas do cicloexatrieno seria três vezes maior que a hidrogenação de uma única dupla, ou seja, $3 \cdot 28{,}6 = 85{,}8$ kcal. Entretanto, as três ligações duplas são conjugadas (duplas intercaladas por ligações simples), formando uma nuvem de elétrons deslocalizados, o que confere ao anel grande estabilidade devido a esse fenômeno da ressonância. Dessa forma, a diferença de 36 kcal/mol entre o valor encontrado experimentalmente e o valor teoricamente esperado corresponde à energia de ressonância.

A classificação dos hidrocarbonetos baseia-se nos critérios apresentados no quadro anterior. Os compostos que fazem parte da mesma classificação pertencem a uma mesma série homóloga e apresentam a mesma fórmula geral.

A fórmula geral dos hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos é $C_nH_{2n \pm x}$, em que *n* é o número de átomos de carbono e *x* corresponde a números inteiros pares (0, 2, 4, ...).

- **Alcanos**: hidrocarbonetos **alifáticos** que apresentam apenas ligações simples. Os alcanos são os principais componentes do petróleo, sendo o metano o primeiro dessa série homóloga e o principal constituinte do gás natural.
  Exemplos: CH_4, C_2H_6 (H_3C-CH_3), C_3H_8 ($H_3C-CH_2-CH_3$), C_4H_{10}, C_5H_{12}, etc.
  Fórmula geral: C_nH_{2n+2}
- **Alcenos**: hidrocarbonetos **alifáticos** que apresentam uma ligação dupla. Exemplos: C_2H_4 ($H_2C=CH_2$), C_3H_6 ($H_2C=CH-CH_3$), C_4H_8, C_5H_{10}, etc.
  Fórmula geral: C_nH_{2n}
- **Alcinos**: hidrocarbonetos **alifáticos** que apresentam uma ligação tripla.
  Exemplos: C_2H_2 ($HC\equiv CH$), C_3H_4 ($HC=C-CH_3$), C_4H_6, C_5H_8, etc.
  Fórmula geral: C_nH_{2n-2}
- **Alcadienos**: hidrocarbonetos **alifáticos** que apresentam duas ligações duplas.
  Exemplos: C_3H_4 ($H_2C=C=CH_2$), C_4H_6 ($H_2C=CH-CH=CH_2$), C_5H_8, etc.
  Fórmula geral: C_nH_{2n-2}
  Importante: Os alcadienos podem conter duplas em diferentes posições relativas. Essas ligações duplas são chamadas de acumuladas (duas duplas no mesmo carbono), isoladas (duplas separadas por várias ligações simples) ou conjugadas (duas duplas separadas por uma ligação simples).
- **Ciclanos**: hidrocarbonetos **alicíclicos** (cíclicos alifáticos, isto é, não aromáticos) que apresentam apenas ligações simples.
  Exemplos: C_3H_6 ($H_2C(CH_2)CH_2$ ou), C_4H_8, C_5H_{10}, etc.
  Fórmula geral: C_nH_{2n} (mesma fórmula geral dos alcenos)
- **Cicleno**s: hidrocarbonetos **alicíclicos** que apresentam uma ligação dupla no anel.
  Exemplos: C_3H_4 ($HC(CH)CH_2$ ou), C_4H_6, C_5H_8, etc.
  Fórmula geral: C_nH_{2n-2} (mesma fórmula geral dos alcinos)
- **Aromáticos**: hidrocarbonetos **aromáticos**, isto é, que apresentam **anel benzênico**.
  Exemplos: C_6H_6  , C_7H_8  , $C_{10}H_8$  , etc.

Parafinas

Os alcanos também são chamados de parafinas, do latim *parum affinis*, "pouco reativo". Os alcanos são os principais componentes do petróleo; portanto, gasolina, querosene, óleo *diesel* e óleos lubrificantes são formados principalmente por alcanos. O metano é o primeiro dessa série homóloga e o principal constituinte do gás natural veicular (GNV), usado como combustível para veículos. O butano é o quarto na série dos alcanos e está presente no gás liquefeito de petróleo (GLP), usado principalmente como gás de cozinha.

PARA EXPLORAR

Assista

10 anos de pré-sal – história e desenvolvimento de tecnologias

O vídeo da Petrobras, publicado em 2018, mostra a importância das tecnologias desenvolvidas pela empresa para a exploração do petróleo da camada pré-sal. Duração: 2 min 1 s.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IvdDXljliS8. Acesso em: 18 out. 2024.

ROTEIRO

5. Qual é o nome da série homóloga de um hidrocarboneto alifático que apresenta uma ligação dupla e uma ligação tripla? Qual é a sua fórmula geral?

Série homóloga dos alceninos.
Fórmula geral: C_nH_{2n-4}

ATIVIDADE RESOLVIDA

Construa a fórmula estrutural do alcano de menor massa molar que apresenta, em sua estrutura, um átomo de carbono secundário e um átomo de carbono quaternário. Em seguida, determine sua fórmula molecular e sua fórmula geral.

Resolução

Fórmula estrutural:



Fórmula molecular: C_6H_{14}
Fórmula geral: C_nH_{2n+2}

Não escreva no livro.

Grupos orgânicos substituintes e radicais orgânicos monovalentes

Os radicais orgânicos e inorgânicos são espécies químicas eletronicamente instáveis por apresentarem um ou mais elétrons desemparelhados e, por isso, são extremamente reativos.

Radicais livres são produzidos diariamente em nosso organismo durante a respiração, mas temos enzimas protetoras que conseguem controlar o nível desses radicais produzidos pelo nosso metabolismo. Eles também podem ser formados por diversos fatores externos, entre eles: fumo, bebidas, pesticidas, aditivos químicos, dietas inadequadas, radiação ultravioleta, etc.

Esses radicais podem danificar células sadias de nosso corpo e acredita-se que possam estar relacionados a algumas doenças e a processos degenerativos, como o envelhecimento precoce e a arteriosclerose. Evidências têm indicado que uma dieta rica em antioxidantes contribui para o combate aos radicais livres, pois a interação entre eles diminui os danos e riscos causados pelos radicais.

Alguns antioxidantes estão presentes em alimentos. Por exemplo, licopeno, bioflavonoides, isoflavonas, betacaroteno, vitaminas A, E e C, ácidos graxos ômega 3, entre outros, são encontrados em frutas, verduras e legumes e em algumas fontes de origem animal, como peixes de água fria, como truta e salmão.

Os radicais orgânicos monovalentes derivados de hidrocarbonetos são formados pelo rompimento de uma ligação covalente, quase sempre entre um átomo de carbono e um de hidrogênio, em que cada átomo permanece com seu próprio elétron após a cisão da ligação. Essa cisão é chamada de homólise.

A nomenclatura dos radicais menos complexos é constituída de sufixo **il** precedido pelo prefixo que indica a quantidade de átomos de carbono na estrutura.



No exemplo apresentado, o radical monovalente – grupo que apresenta um elétron desemparelhado ou uma valência livre – obtido a partir do metano chama-se metil. Quando há várias possibilidades de radicais com o mesmo número de átomos de carbono, utilizam-se prefixos específicos (iso, sec, terc, neo, ...).

Por serem instáveis, os radicais tendem a se ligar a outros radicais, formando cadeias carbônicas normais ou ramificadas. As ramificações são os **grupos substituintes** (grupos que, em geral, substituíram átomos de hidrogênio) e têm a mesma nomenclatura dos radicais livres. Os grupos substituintes derivados de alcanos são chamados de **grupos alquilas**, e os grupos substituintes derivados de aromáticos com valência livre no anel são chamados de **grupos arilas**.

Tatjana Baibakova/Shutterstock.com/ID/BR

Exemplos de alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.

6. Radicais livres são espécies químicas instáveis por terem elétrons desemparelhados, isto é, são estruturas independentes que precisam realizar ligações para se estabilizarem. Grupos substituintes não são instáveis, pois realizam todas as ligações necessárias para sua estabilidade; na prática, constituem as ramificações das cadeias carbônicas.

7. Tanto o radical livre como o grupo substituinte apresentam a mesma composição química: são representados pela mesma fórmula. No caso, metil corresponde ao grupo $-CH_3$.

ROTEIRO

6. Qual é a diferença entre radicais livres e grupos substituintes?

7. Por que metil pode ser o nome de um radical livre e também de um grupo substituinte?

ATIVIDADE RESOLVIDA

Construa a fórmula estrutural e dê o nome do hidrocarboneto formado pela união dos radicais etil e propil.

Resolução

Radical etil: $H_3C - CH_2 -$

Radical propil: $H_3C - CH_2 - CH_2 -$

Devemos unir os radicais citados por meio dos elétrons desemparelhados (por suas valências livres):

$H_3C - CH_2 - \ + \ - CH_2 - CH_2 - CH_3$

Molécula formada: $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

Nome: pentano (pent + an + o)

pent → 5 C; an → ligações simples; o → hidrocarboneto

Nomenclatura sistemática de hidrocarbonetos ramificados

1º passo — Escolher a cadeia principal

Deve ser a mais longa possível e com o maior número de insaturações e o maior número de ramificações.



2º passo — Numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da(s):

a) Insaturação, se houver.

b) Ramificação(ões).

- Ordem de prioridade: insaturação > ramificação.
- No caso de mais de uma insaturação e/ou mais de uma ramificação, deve-se utilizar a regra dos menores números (a soma de suas posições deve ser a menor possível).



3º passo — Nomear o composto

a) Citar as ramificações (grupos substituintes – ver fórmulas e nomes no quadro ao lado), precedidas de suas posições, em ordem alfabética.

Se houver mais de uma da mesma ramificação, utilizar prefixos para indicar as quantidades (di, tri, tetra, etc.).

b) Nomear a cadeia principal (prefixo + infixo + o). Ver regras na página 331.

Nome do composto: 4,5-dietil-3-metiloct-3-eno

GRUPOS SUBSTITUINTES DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS			
metil	**etil**	**propil**	**isopropil**
H_3C-	H_3C-CH_2-	$H_3C-CH_2-CH_2-$	$H_3C-CH(CH_3)-$
butil	**sec-butil**	**isobutil**	
$H_3C-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-$	$H_3C-CH_2-CH(CH_3)-$	$H_3C-CH(CH_3)-CH_2-$	
terc-butil	**etnil ou vinil**	**benzil**	**fenil**
$H_3C-C(CH_3)_3$	$H_2C=CH-$	$C_6H_5-CH_2-$	C_6H_5-

Nomenclatura sistemática de hidrocarbonetos cíclicos ramificados

Os hidrocarbonetos cíclicos ramificados apresentam nomenclatura análoga ao de hidrocarbonetos ramificados.



1,1-dimetilciclobutano



1,2-dimetil-benzeno



2-etil-1-metil-bezeno

(na nomenclatura, as ramificações aparecem em ordem alfabética)

Lembre-se da regra dos menores números.

No caso específico de benzeno dissubstituído (com 2 grupos substituintes), podemos usar prefixos para indicar a posição relativa dos grupos substituintes.

Prefixo	orto (o)	meta (m)	para (p)
Posição relativa	1,2	1,3	1,4



orto-dimetilbenzeno
ou o-dimetilbenzeno



meta-dimetilbenzeno
ou m-dimetilbenzeno



para-dimetilbenzeno
ou p-dimetilbenzeno

Ilustração: Erika Onodera/ID/BR

Não escreva no livro.

PETRÓLEO: FONTE DE HIDROCARBONETOS

Povos antigos já utilizavam o petróleo quando surgia na superfície do solo. Atualmente, a Petrobras retira o petróleo de águas profundas e ultraprofundas utilizando tecnologias de última geração, como robotização de processos, inteligência artificial, computação de alto desempenho e nanotecnologia. Até 2006, o petróleo extraído no Brasil era considerado de baixa qualidade, mas a descoberta de reservas de ótima qualidade – o pré-sal – implicou grande crescimento de retirada de hidrocarbonetos em águas ultraprofundas.

O pré-sal é constituído de rochas sedimentares que foram formadas há mais de 100 milhões de anos, época em que surgiram grandes e profundos lagos, nos quais se acumularam grandes quantidades de matéria orgânica de pequenos organismos marinhos. Essa matéria orgânica, misturada a sedimentos, formou as rochas que geraram o óleo e o gás do pré-sal. Uma intensa evaporação da água marinha propiciou uma acumulação de sais – a camada do pré-sal – que aprisionou o petróleo a uma profundidade próxima de 7 mil metros. Nessa profundidade, a pressão da água é muito alta, o que dificulta a retirada do petróleo. Muitas pesquisas foram e ainda estão sendo feitas no sentido de desenvolver tecnologias que possibilitem a retirada desse petróleo de alta qualidade. Em 2023, 78% do petróleo extraído no Brasil vinha da camada pré-sal.

O petróleo é uma mistura viscosa, na qual predominam os alcanos. Nele, há muitos compostos orgânicos: compostos cíclicos, incluindo aromáticos, e compostos com elevada massa molar contendo nitrogênio, oxigênio, enxofre e outros elementos. Além de ser utilizado como matéria-prima da indústria petroquímica na produção de plásticos, adubos, corantes, detergentes e uma grande variedade de produtos utilizados no dia a dia, tem sido a mais importante fonte de energia mundial nos últimos dois séculos.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Localização das jazidas de petróleo na camada pré-sal. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Branco, P. de M. Petróleo do Pré-Sal. *Ministério de Minas e Energia*, 18 ago. 2014. Disponível em: https://www.sgb.gov.br/petroleo-do-pre-sal#:~:text=As%20reservas%20do%20pr%C3%A9%2Dsal,conhecido%20acima%20da%20mesma%20camada. Acesso em: 18 out. 2024.

Extração do petróleo

A extração do petróleo é complexa e envolve algumas etapas:

- **Prospecção**: localização e análise das bacias sedimentares em que o petróleo pode ser encontrado e estudo de sua viabilidade comercial.
- **Perfuração**: geralmente é feita em plataformas marítimas equipadas de brocas rotativas de alta potência e sistemas de controle automatizados.
- **Extração**: o bombeamento do petróleo é feito na extração primária. Para extrair o petróleo residual, utilizam-se métodos de recuperação como injeção de água e CO_2. Estimativas em campos de produção de petróleo sugerem que apenas 30% do petróleo existente nos reservatórios é extraído, ainda que vários processos tenham sido desenvolvidos para aumentar a produtividade. Levantamentos sísmicos 4D e sensores em solo marinho têm sido usados para o modelo digital do reservatório, o que ajuda a mapear e aumentar o potencial de produção do campo.

Bruno Santos/Folhapress

Plataforma em Vitória (ES): unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo. Foto de 2024.

O transporte do petróleo

Para levar o petróleo para as refinarias e das refinarias para as indústrias petroquímicas, são utilizados navios petroleiros, terminais marinhos, oleodutos e gasodutos.

Os navios petroleiros são enormes e atracam em terminais marinhos para a transferência da carga dos navios. São capazes de transportar elevados volumes de combustível por longas distâncias por diversos continentes.

Oleodutos e gasodutos são sistemas que transportam, respectivamente, petróleo e gás natural, através de extensas tubulações de aço e de plástico. O Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) tem 3150 km de extensão. Por ele, importamos até 33 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Refino do petróleo

O petróleo, por ser constituído de uma grande diversidade de substâncias e não ter aplicabilidade na forma em que é extraído, deve ser processado e transformado nas **refinarias**. Nelas, o esquema de refino envolve principalmente processos de separação, conversão, tratamento e outros auxiliares.

Destilação fracionada do petróleo

A destilação fracionada é um processo de separação dos componentes de uma mistura de líquidos miscíveis baseado na diferença de temperaturas de ebulição desses líquidos. Na destilação fracionada do petróleo, não se obtêm substâncias puras, mas frações que contêm um conjunto de substâncias. Cada fração apresenta um intervalo de temperaturas de ebulição e aplicações específicas: gases combustíveis (C_1 a C_4), gasolina (C_5 a C_{12}), querosene (C_5 a C_{12}) e outros apresentados no esquema a seguir.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Representação da destilação fracionada do petróleo e de algumas frações em sua separação. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Bruice, P. Y. *Organic Chemistry*. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

8. A destilação fracionada é feita para separar as frações, pois cada fração tem uma aplicação específica.

9. Baseia-se na diferença das temperaturas de ebulição das substâncias.

10. Craqueamento catalítico é um processo químico de conversão de substâncias maiores em outras menores com o uso de catalisadores específicos. Esse processo ocorre para aumentar a produção de frações com maior demanda e valor comercial.

De forma muito simplificada, a **destilação fracionada** do petróleo é um método de separação de seus componentes em frações. Inicialmente, o petróleo é aquecido até a ebulição em uma caldeira de uma torre de fracionamento. As frações leves incluem substâncias com menor número de átomos de carbono e são recolhidas no topo da coluna de fracionamento por terem as menores temperaturas de ebulição. É o caso do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), formado principalmente por propano e butano e utilizado como gás de cozinha. As frações pesadas são formadas por substâncias com as temperaturas mais elevadas de ebulição e são recolhidas nos níveis inferiores da coluna, como no caso dos óleos lubrificantes usados em maquinário industrial e em automóveis. O que sobra (resíduo) é usado como asfalto na pavimentação de ruas e estradas.

ROTEIRO

8. Por que é feita a destilação fracionada do petróleo?

9. Em que propriedade física específica se baseia a destilação fracionada do petróleo?

10. O que é craqueamento catalítico?

Não escreva no livro.

Uma das frações mais importantes do refino do petróleo é a gasolina, constituída de diversos hidrocarbonetos, predominando os de fórmula C_7H_{16} e C_8H_{18}. Ao isoctano (2,2,4-trimetilpentano) foi atribuído o índice de octanagem 100, e ao heptano atribuiu-se índice de octanagem zero. Uma gasolina com índice de octanagem 80 tem o mesmo rendimento que uma mistura, em volume, de 80% de isoctano e 20% de heptano. Quanto maior a octanagem do combustível, maior sua capacidade de resistir em altas temperaturas sem sofrer detonação, dentro da câmara de combustão, e melhor o desempenho do motor.

Após a destilação, utilizam-se alguns processos de conversão de natureza química, com o objetivo de transformar uma fração (com menor potencial de uso e menor valor comercial) em outra (maior demanda comercial ou melhor qualidade do produto). Por exemplo, o **craqueamento catalítico** (*cracking* ou pirólise) é um processo complexo que consiste na "quebra" de "frações mais pesadas" (moléculas maiores) na obtenção de "frações mais leves" (moléculas menores) na presença de catalisadores específicos. Esse processo, além de permitir o aumento da quantidade e da qualidade da gasolina, produz outras substâncias utilizadas pela indústria petroquímica.

A QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A combustão é um processo exotérmico, e o principal produto da combustão da gasolina, do óleo *diesel* e de todos os combustíveis provenientes do petróleo é justamente a energia liberada no processo. Na combustão desses materiais, há formação de monóxido de carbono, fuligem e, principalmente, dióxido de carbono, além de água.

Combustão total ou completa:

combustível orgânico + comburente $\rightarrow CO_2 + H_2O$ + energia

Combustão parcial ou incompleta:

combustível orgânico + comburente $\rightarrow CO_2 + CO$ + C(fuligem) $+ H_2O$ + energia

Principais fontes de energia elétrica nos estados brasileiros

O problema é que a grande quantidade de carbono e de energia armazenada em milhões de anos (no petróleo) vem sendo liberada nas últimas duas centenas de anos pela queima intensiva de combustíveis fósseis, interferindo no ciclo longo do carbono. O aumento expressivo de dióxido de carbono (GEE) na atmosfera está provocando um aumento do efeito estufa e consequente aquecimento global. O aumento da temperatura média do planeta tem provocado uma série de eventos climáticos extremos: ondas de calor e de muito frio, secas e enchentes, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar, escassez de água, etc. Todos esses eventos trazem consigo uma série de consequências socioeconômicas.

A maioria dos países no mundo possui uma matriz energética composta, principalmente, de fontes de energia não renováveis. Em 2021, o consumo mundial de fontes de energia renováveis foi de apenas 15%. A matriz energética brasileira é bem diferente da mundial, pois as nossas fontes renováveis – carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana, lenha, eólica, solar – correspondem a quase 50% de nossa matriz energética. É consenso que a demanda global de petróleo deve decrescer e que fontes renováveis de energia devem ser estimuladas para reduzir a emissão de GEE.

Privilegiado por ter água, vento e incidência solar, o Brasil é um dos países com possibilidade de zerar suas emissões líquidas de carbono até 2050 – nosso compromisso no Acordo de Paris – e de contribuir para a transição energética sustentável mundial.

O Acordo de Paris é um tratado global, adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, durante a 21ª Conferência das Partes (COP21). Esse acordo regulamenta medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. Os governos se comprometeram em atuar no sentido de manter o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e tentar limitar o aumento a 1,5 °C.

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (2022)



Reinaldo Vignati/ID/BR

Fonte de pesquisa: Matriz Energética Brasileira. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica. Acesso em: 18 out. 2024.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

PETRÓLEO E PROBLEMAS AMBIENTAIS

Marcelo de Oliveira Soares e colaboradores (2020)/Acervo do fotógrafo

Peixe envolto por petróleo encontrado na praia em Icapuí (CE). Foto de 2020.

Vazamentos de petróleo são causados por acidentes com navios petroleiros, embarcações ou plataformas de petróleo. Esses acidentes provocam contaminação que pode se estender por anos nos ecossistemas marinhos. Além de afetar diretamente os organismos, o petróleo, por ser menos denso e não se misturar com a água, permanece na superfície, formando manchas que bloqueiam a passagem da luz, prejudicando a fotossíntese das algas.

Em 2019, um grave problema ambiental foi causado por um extenso derramamento de petróleo na costa do Ceará. O óleo permaneceu na superfície do mar, espalhando-se com os ventos e provocando grande prejuízo ambiental, econômico e social. Até março de 2020, as manchas já tinham se dispersado por cerca de 2 900 km, do Maranhão ao Rio de Janeiro, contaminando a fauna marinha.

Ecossistemas como recifes de corais e manguezais, que apresentam grande biodiversidade, são bastante afetados mesmo com quantidades pequenas de petróleo. Um estudo feito em 2023 por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará apontou alterações morfológicas, contaminação por metais e hidrocarbonetos tóxicos, diminuição na riqueza geral das espécies e nas taxas de sobrevivência, e aumento oportunista de organismos mais tolerantes a óleos.

Portanto, é imprescindível a adoção de medidas de manutenção de embarcações e plataformas, bem como a criação de protocolos de emergência claros para conter os avanços do petróleo rapidamente. Quanto maior o tempo para tomada de uma ação de contenção e limpeza, maiores são os impactos sobre a natureza.



Reinaldo Vignati/D/BR

2. As comunidades que vivem da pesca marinha ou da coleta de crustáceos em manguezais têm sua subsistência inviabilizada pela contaminação desses ecossistemas.

Efeitos causados nos organismos pela contaminação por petróleo.

Fonte de pesquisa: Soares, M. O.; Rabelo, E. F. Severe ecological impacts caused by one of the worst orphan oil spills worldwide. *Marine Environmental Research*, v. 187, p. 105936, 2023.

Para discutir

1. Porque os derramamentos liberam uma grande quantidade de petróleo, que é dispersada na água pela ação dos ventos. Além disso, trata-se de um material de difícil remoção, dificultando a limpeza dos locais atingidos.

1 Por que é difícil combater o efeito dos derramamentos de petróleo?

2 Quais são os impactos sociais causados por derramamentos de petróleo que atingem a costa?

3 Pesquise a contenção dos derramamentos de petróleo no mar e descreva as técnicas utilizadas.

Resposta pessoal. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

CARVÃO MINERAL: FONTE DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS

O carvão mineral é um combustível fóssil sólido formado a partir de matéria orgânica de vegetais que foram soterrados em bacias sedimentares há milhões de anos. Pela ação de microrganismos em ambiente anaeróbico, sob pressão e temperatura elevadas, restos de vegetais sofreram carbonificação (enriquecimento em carbono) ao longo das eras geológicas. Quanto maior o tempo de carbonificação, maior a qualidade do carvão. Os vários tipos de carvão correspondem aos diversos estágios de carbonificação: turfa (60% a 65% em massa de C), linhito (65% a 80% em massa de C), hulha (80% a 90% em massa de C) e antracito (90% a 95% em massa de C). O carvão mineral é abundante na Região Sul do Brasil e é usado como combustível na combustão para produção de energia em usinas termelétricas.

Por meio de destilação seca do carvão, são obtidas substâncias gasosas (CH_4, C_2H_6, H_2, etc.), líquidas (águas amoniacais e alcatrão da hulha) e sólida (carvão coque). As águas amoniacais são usadas na produção de adubo e o carvão coque é utilizado na indústria siderúrgica.

Uma parte da fração líquida é o alcatrão da hulha, um líquido escuro e viscoso, fonte de hidrocarbonetos aromáticos, como o benzeno, e vários hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), como naftaleno, tolueno, fenantreno e antraceno. O benzeno tem grande aplicação industrial na produção de corantes, detergentes, explosivos, pesticidas, solventes, plásticos, etc. Apesar de o carvão mineral ser uma fonte de hidrocarbonetos aromáticos, o petróleo ainda é a principal fonte dessas substâncias.

AÇÃO E CIDADANIA

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs)

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) correspondem a mais de uma centena de compostos orgânicos que contêm dois ou mais anéis aromáticos condensados.



Os HPAs são lançados na atmosfera por atividades naturais, como fumaça de erupção vulcânica, ou por ações humanas, como incêndios e a queima incompleta de matéria orgânica ou de derivados do petróleo. Outra fonte importante é a fumaça de cigarros. Esses compostos encontram-se na natureza como contaminantes de solo, ar, água e alimentos. Os HPAs são poluentes orgânicos de importância ambiental e de interesse toxicológico, pois muitos deles apresentam atividade cancerígena e mutagênica.

Estudos têm comprovado a presença dos HPAs em alimentos e bebidas, maiores fontes de exposição humana a esses compostos. Temperaturas elevadas utilizadas no cozimento e fritura de alimentos também podem levar à contaminação com HPAs.

1. Que medidas garantiriam menor exposição aos HPAs? Evitar o tabagismo e a fritura como modo de preparo dos alimentos, e tomar medidas para o controle da poluição atmosférica.

ISOMERIA

Em 1820, o químico alemão Justus von Liebig (1803-1873) sintetizou um reagente explosivo de prata, de fórmula molecular AgCNO, o qual chamou de fulminato de prata. Simultaneamente, Friedrich Wöhler (1800-1882), também químico alemão, sintetizou o cianato de prata, de fórmula AgNCO. Ambos enviaram artigos relatando suas sínteses ao periódico *Annales de Chimie* (Anais de Química), e o editor, físico e químico francês Louis Gay-Lussac (1778-1850) estranhou a grande diferença entre as propriedades dos compostos, embora a fórmula química proposta para ambos fosse a mesma. O resultado dos trabalhos de Liebig e Wöhler gerou controvérsia, mas análises demonstraram que ambos estavam corretos.

Como se explica o fato de substâncias diferentes apresentarem a mesma fórmula química?

Alguns anos depois desses trabalhos, o químico sueco Jacob Berzelius (1779-1848), um dos fundadores da química moderna, sintetizou compostos com propriedades físicas e químicas diferentes que apresentavam a mesma fórmula molecular. Nomeou esses compostos de isômeros (do grego *iso*, "mesmo", e *meros*, "partes") e teria dito que "por substâncias isoméricas, eu entendo aquelas que possuem a mesma composição química e o mesmo peso atômico [molecular], mas diferentes propriedades".

Isomeria é o fenômeno em que duas ou mais substâncias diferentes, com propriedades distintas, apresentam a mesma fórmula química (molecular). Pode ser classificada em:

- **Isomeria constitucional ou isomeria plana:** são os casos em que as substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, mas suas fórmulas estruturais planas são diferentes (apresentam diferentes sequências de átomos).
- **Isomeria espacial ou estereoisomeria:** são os casos em que as substâncias apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural plana, mas diferem quanto ao arranjo espacial de seus átomos.

O Tangram e a isomeria

O Tangram é um jogo chinês com sete peças: cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Quantas figuras de animais, objetos e plantas é possível montar com as sete peças do Tangram? Ao lado você tem algumas possibilidades, mas certamente há muito mais. Mas qual é a relação entre Tangram e isomeria?

Imagine quantos arranjos diferentes seria possível fazer com quantidades variáveis de átomos de carbono, considerando variações de posição das insaturações e das ramificações, diferentes classificações de cadeias carbônicas, arranjos espaciais de acordo com a geometria das ligações e outras variáveis. São incontáveis possibilidades.

De quantas maneiras podemos montar estruturas diferentes com a fórmula molecular C_4H_8?



Iryna/iStock/Getty Images

Representação de algumas figuras possíveis de serem montadas com as peças do Tangram.

Isômeros com fórmulas molecular C_4H_8



but-1-eno



2-metilpropeno (isobutileno)



metilciclopropano



cis-but-2-eno



trans-but-2-eno

ciclobutano

Você deve ter notado as diferenças entre as estruturas do cis-but-2-eno e trans-but-2-eno.

Eles são isômeros geométricos, um tipo de isomeria espacial muito importante que será analisado nos próximos capítulos. Neste capítulo focaremos em apenas dois tipos de isomeria plana, de forma que representaremos esses dois isômeros espaciais por sua fórmula estrutural plana representada ao lado. Entretanto, são substâncias diferentes com diferentes propriedades.

$H_3C-CH=CH-CH_3$

but-2-eno

Classificação dos isômeros planos

A classificação dos isômeros planos baseia-se na diferença que há entre eles.

Os **isômeros planos de cadeia** são diferentes na classificação da cadeia carbônica, mas devem pertencer à mesma função orgânica. Suas propriedades físicas são diferentes.

$H_2C=CH-CH_2-CH_3$

nome: but-1-eno
cadeia: aberta, insaturada e normal
*T*e (°C): −6,3

nome: ciclobutano
cadeia: cíclica, saturada e normal
*T*e (°C): 12,5



nome: metilpropeno
cadeia: aberta, insaturada e ramificada
*T*e (°C): −6,9

Os **isômeros planos de posição** diferem quanto à posição da(s) insaturação(ões) ou da(s) ramificação(ões), mas devem pertencer à mesma função orgânica.

$H_2C=CH-CH_2-CH_3$
nome: but-1-eno
posição da insaturação: ligação dupla no carbono 1
*T*e (°C): −6,3

$H_3C-CH=CH-CH_3$
nome: but-2-eno
posição da insaturação: ligação dupla no carbono 2
*T*e (°C): *cis*-but-2-eno = 3,7
trans-but-e-eno = 0,9

Observe mais um exemplo de isomeria de posição, cuja diferença se encontra na posição das ramificações:



nome: 2,2-dimetilbutano
posição da ramificação:
dois grupos metila no carbono 2
*T*e (°C): 50



nome: 2,3-dimetilbutano
posição da ramificação:
um grupo metila no carbono 2 e outro no carbono 3
*T*e (°C): 58

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Não escreva no livro.

Destilação seca da madeira

Quase todos os sólidos que nos rodeiam, tais como madeira, rocha, vidro e outros, são misturas. Alguns podem ter seus componentes separados por destilação que, feita sem solvente, é chamada de **destilação seca**. Quais serão os produtos formados usando, por exemplo, a madeira?

Esse processo, quando aplicado à madeira, compreende duas fases de aquecimento: a primeira vai até aproximadamente 230 °C, quando ocorre a secagem da madeira, e a segunda é o que foi chamado de destilação seca, acima de 230 °C, quando ocorre a decomposição de substâncias orgânicas como a celulose e a lignina.

A destilação seca da madeira ocorre por aquecimento da madeira em presença de pouco oxigênio, evitando sua combustão. Três frações são obtidas quando destilamos a madeira:

- **Fração gasosa** (15% a 20% da massa da madeira): constituída por uma fase gasosa, contendo principalmente $H_2O(v)$, $H_2(g)$, $CO(g)$, $CH_4(g)$, eteno, etano e outros hidrocarbonetos de baixa massa molar, e uma fase oleosa, contendo vapores do ácido pirolenhoso.
- **Fração líquida:** constituída de uma fase aquosa, contendo substâncias orgânicas solúveis na água, e uma fase oleosa, contendo alcatrão da madeira, formado, sobretudo, por compostos com elevada massa molar, principalmente compostos aromáticos.
- **Fração sólida:** constituída principalmente de carvão.

Material

- 2 tubos de ensaio
- 2 tubos de vidro em L
- 1 béquer de 250 mL
- 2 rolhas de borracha
- tripé e tela de amianto
- bico de Bunsen
- suporte universal
- garra e mufa
- palitos de dente
- água fria

ATENÇÃO!

Cuidado com o uso do bico de Bunsen para evitar queimaduras.

Como fazer

1. A atividade será feita de forma demonstrativa pelo(a) professor(a). Monte a aparelhagem como demonstrado na figura.

   Ao tubo de ensaio maior, conecte uma rolha de borracha que deve ter 2 furos, nos quais serão acoplados dois tubos finos de vidro recurvados no formato de L. Um dos tubinhos recurvados deve ser acoplado a uma rolha que se encaixará no tubo de ensaio menor, contendo cerca de 15 palitos de dente. O outro tubo recurvado ficará com a extremidade livre (ponto A) para observação da saída de gases.



Reinaldo Vignat/ID/BR

2. Prenda o sistema com os dois tubos de ensaio a um suporte universal, como na figura. Observe a inclinação e o posicionamento dos tubos.
3. Coloque água fria no béquer e mergulhe uma parte do tubo maior. O béquer deve ficar apoiado sobre uma tela de amianto e tripé ou em algum outro suporte.
4. Acenda o bico de Bunsen e aqueça o material contido no tubo pequeno. Observe o que ocorre nos dois tubos de ensaio.
5. Após algum tempo de aquecimento, acenda um palito de fósforo e aproxime-o da saída do tubo de vidro recurvado, indicada pelo ponto **A** na figura. Reacenda o fósforo sempre que necessário.
6. Mantenha o aquecimento até cessar o desprendimento de gás.
7. Espere o material resfriar para análise.

Para concluir

1 **O que ocorre quando o palito de fósforo aceso é aproximado da saída do tubo de vidro (ponto A da figura)?**

2 **O que você observou no tubo de ensaio pequeno durante o aquecimento? O que restou nesse mesmo tubo após a destilação seca da madeira?**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 **Compare os produtos obtidos na destilação seca da madeira com os produtos que seriam esperados em sua combustão completa.**
Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **O propano é uma das substâncias presentes na fração gasosa da destilação da madeira e um dos constituintes do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo ou gás de cozinha). Equacione sua combustão completa.**

4. $C_3H_8(g) + 5\,O_2(g) \rightarrow 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(\ell)$

4. b) (I): octano; (II): 2,2,4-trimetilpentano. **c)** (I): C_8H_{18}; (II): C_8H_{18}. **d)** e **e)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 Analise o hidrocarboneto a seguir e dê seu nome de acordo com as regras Iupac.



Resolução

6-etil-3-metil-5-propilnon-3-eno ou 6-etil-3-metil-5-propil-3-noneno

A nomenclatura oficial deve considerar a cadeia carbônica principal como a que contém a insaturação e a maior quantidade de átomos de carbono possível. A numeração deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Ao nomear, as ramificações devem ser apresentadas em ordem alfabética. Finalizar a nomenclatura com o nome da cadeia carbônica principal.



5. a) Etileno.
Fórmula estrutural: $H_2C = CH_2$
Fórmula molecular: C_2H_4
Fórmula geral: C_nH_{2n}
1-metilciclopropeno
Fórmula estrutural:



Fórmula molecular: C_4H_6
Fórmula geral: C_nH_{2n-2}

2 Considere o hidrocarboneto apresentado abaixo.



a) Dê o nome dos grupos substituintes (ramificações) ligados à cadeia principal. Metil, etil e fenil.

b) Dê o nome oficial do composto. 5-etil-3-fenil-6-metiloct-3-eno.

3 Assinale a opção que associa corretamente nome e fórmula molecular dos hidrocarbonetos. Alternativa **e**.

a) 3,3-dimetilhexano – C_8H_{16}

b) etilciclohexano – C_8H_{18}

c) 1,2-dimetilbenzeno – C_8H_{16}

d) meta-dimetilbenzeno – C_8H_{12}

e) 2,2,4-trimetilpentano – C_8H_{18}

4 Considere as representações tridimensionais das moléculas de duas substâncias presentes na gasolina.



Reinaldo Vignati/ID/BR

Representação sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.

a) Construa, em bastão, as fórmulas estruturais das duas substâncias.

4. a)

b) Dê o nome oficial de ambas.

c) Determine suas fórmulas moleculares.

d) Compare as fórmulas moleculares das duas substâncias. Qual é a relação entre elas?

e) Qual delas deve apresentar a maior temperatura de ebulição? Justifique. **5. b)** O etileno não possui isômeros, pois não é possível montar outra estrutura com apenas 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio.

5 O etileno é o primeiro da série dos alcenos. É conhecido como o "hormônio do amadurecimento", responsável por muitos processos fisiológicos durante o crescimento, amadurecimento e senescência de tecidos vegetais. Também influi na vida pós-colheita de frutos e hortaliças, afetando a qualidade desses produtos. Para retardar a ação do etileno no amadurecimento das frutas e hortaliças e estender a vida nas prateleiras, pode-se aplicar o 1-metilciclopropeno, um inibidor do etileno, que demonstrou ser eficiente no controle do amadurecimento e na manutenção da qualidade pós-colheita.

Sobre os hidrocarbonetos citados no enunciado:

a) Construa a fórmula estrutural, a fórmula molecular e a fórmula geral de ambos.

b) O etileno possui isômeros? Justifique.

c) Construa a fórmula estrutural e dê o nome de um isômero plano de cadeia do 1-metilciclopropeno, indicando a série homóloga a que pertence.

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6 Em 2019, vários alertas foram emitidos por entidades que monitoravam uma mancha de óleo que se espalhou pelo litoral de vários estados brasileiros, para que a população não se expusesse ao óleo bruto ou a áreas contaminadas, como a areia da praia. Na época, o Conselho Federal de Química (CFQ) informou, em nota, que os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) presentes no petróleo bruto e seus derivados pertencem a um grupo de compostos orgânicos semivoláteis que estão entre os compostos mais tóxicos do óleo e podem causar problemas sérios de saúde, como câncer.

A seguir, estão representadas duas estruturas de HPAs: o benzopireno e o fenantreno.

6. a) Fenantreno: $C_{14}H_{10}$; benzopireno: $C_{20}H_{12}$. **b)** Os dois são compostos cíclicos aromáticos polinucleares com anéis condensados. **c)** Os HPAs são lipossolúveis, já que são apolares.

Não escreva no livro.

7. a) Os combustíveis fósseis foram formados e se depositaram em rochas sedimentares ao longo de milhões de anos. Trata-se de fontes não renováveis pela impossibilidade de se recriar as condições e o tempo com que foi formado.



Benzo[*a*]pireno

Fenantreno

Sobre o fenantreno e o benzopireno:

a) Dê a fórmula molecular dos dois HPAs.

b) Classifique suas cadeias carbônicas.

c) Os HPAs são hidrossolúveis ou lipossolúveis? Justifique sua resposta.

7 **A matriz energética brasileira é o conjunto de todas as fontes de energia utilizadas no país. O gráfico a seguir indica que 50,8% de toda energia consumida no Brasil deriva de combustíveis fósseis, fontes de energia não renováveis.**

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (2022)



Reinaldo Vignati/ID/BR

Fonte de pesquisa: Matriz Energética Brasileira. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica. Acesso em: 18 out. 2024.

a) Por que os combustíveis fósseis são fontes de energia não renováveis?

b) Ao utilizarmos intensamente a energia proveniente da queima de combustíveis fósseis, provocamos alterações climáticas, inclusive eventos extremos. Qual é a relação entre o uso intensivo de combustíveis fósseis e as mudanças climáticas?

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

8 **Solventes orgânicos são utilizados em tintas, vernizes, adesivos, colas, produtos de limpeza e na produção de diversos produtos como tintas, plásticos, fibras, tintas de impressão, etc. Há muitos tipos de solvente, incluindo alguns hidrocarbonetos, como o hexano, o metilbenzeno (tolueno), o etilbenzeno e o para-dimetilbenzeno (p-xileno). A exposição no local de trabalho aos solventes orgânicos pode causar vários efeitos nocivos à saúde dos trabalhadores.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Construa a fórmula estrutural das substâncias citadas no enunciado.

b) Entre as substâncias citadas, qual(is) é(são) alifática(s)? A única substância alifática é o hexano. Os demais hidrocarbonetos citados no enunciado são aromáticos, porque apresentam o anel benzênico.

9 **O farneseno é um hidrocarboneto obtido do melaço da cana, sintetizado pela levedura *Saccharomyces cerevisiae*, que passou por uma modificação genética. O farneseno é utilizado em diversos processos, como na produção de lubrificantes, combustível e plástico, e poderia substituir os derivados fósseis com grandes vantagens ambientais. Sua fórmula estrutural encontra-se representada a seguir.**



a) Classifique a cadeia carbônica do farneseno por meio de 3 critérios diferentes. Cadeia aberta (ou acíclica ou alifática), insaturada e ramificada.

b) Determine a fórmula molecular do farneseno. $C_{15}H_{24}$

c) Dê o nome oficial do farneseno. 3,7,11-trimetildodeca-1,3,6,10-tetraeno

10 **O refino do petróleo permite separar esse combustível fóssil em diversas frações com importantes aplicações.**

a) Como se chama o processo de separação das frações do petróleo? Destilação fracionada.

b) Em que propriedade física se baseia esse método de separação? A destilação fracionada baseia-se na diferença da temperatura de ebulição dos componentes da mistura.

11 **Construa a fórmula estrutural e dê o nome de todos os isômeros planos de fórmula molecular C_6H_{14}.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

12 **Construa a fórmula estrutural e dê o nome dos hidrocarbonetos aromáticos de fórmula molecular C_8H_{10}.**

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

13 **Os óleos essenciais têm reconhecida aplicação na indústria de cosméticos, mas também são usados na indústria alimentícia por contribuir na melhora da qualidade sensorial dos alimentos. Andiroba, copaíba, cupuaçu, pau-rosa e cajá são exemplos da diversidade florística brasileira de onde são extraídos os óleos essenciais, geralmente constituídos de terpenos e seus derivados. A seguir estão representadas as fórmulas estruturais de dois terpenos. Sobre elas, responda aos itens:**

13. e) Apenas o mirceno apresenta duplas conjugadas (2 ligações duplas separadas por uma ligação simples). O limoneno apresenta duplas isoladas, pois há mais de uma ligação simples entre as ligações duplas.



limoneno



mirceno

13. c) São isômeros planos de cadeia, porque apresentam a mesma fórmula molecular e diferença na classificação de suas cadeias carbônicas (o limoneno tem cadeia mista e o mirceno apresenta cadeia acíclica).

a) Qual é a fórmula molecular do limoneno? $C_{10}H_{16}$

b) Qual é a fórmula molecular do mirceno? $C_{10}H_{16}$

c) Analisando a fórmula molecular dos dois compostos, qual é a relação entre eles?

d) Qual é a fórmula geral e a classificação da série homóloga do mirceno? Fórmula geral: C_nH_{2n-4}. O mirceno pertence à série homóloga dos alcatrienos.

e) Os dois compostos apresentam duplas conjugadas?

Não escreva no livro.

CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4

1. Funções orgânicas são grupos de substâncias orgânicas identificadas pela presença de um átomo ou de um grupo de átomos, chamado grupo funcional.

FUNÇÕES ORGÂNICAS

PARA COMEÇAR

1. O que são funções orgânicas?
2. Cite os usos do etanol.
3. Qual é o problema ambiental provocado pelos clorofluorcarbonetos (CFCs)?

2. O etanol é usado como antisséptico, na indústria de tintas e vernizes e na de cosméticos, por exemplo.

3. A destruição da camada de ozônio.

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES ORGÂNICAS

Como visto ao longo desta unidade, os compostos orgânicos são muito numerosos, portanto, é conveniente organizá-los em grupos que apresentem algumas similaridades. O princípio organizacional utilizado para isso é o do grupo funcional, um átomo ou grupo de átomos que tem propriedades químicas similares e que são responsáveis pelas propriedades físicas e químicas de um grupo de compostos orgânicos.

Um exemplo de grupo funcional relevante é o —OH, que caracteriza o grupo funcional dos álcoois. O etanol, um dos álcoois mais simples, é um exemplo de composto de grande importância econômica, obtido da fermentação do caldo da cana-de-açúcar, onde se encontra a sacarose. Após o processo de destilação, pode-se obter o etanol, que serve como combustível utilizado em automóveis.

Uma reação semelhante está presente na produção de vinhos, que envolve a fermentação alcoólica do suco de uvas. Esse processo é realizado por leveduras, microrganismos que metabolizam os açúcares naturais presentes nas uvas – principalmente glicose e frutose – transformando-os em etanol e gás carbônico.

Neste capítulo, você vai conhecer melhor os compostos orgânicos e os grupos funcionais, sua nomenclatura e suas características. Esse conhecimento é importante para os processos produtivos e para o desenvolvimento de novos materiais, medicamentos e tecnologias, pois contribui para a criação de substâncias com propriedades específicas, facilitando avanços na ciência e na indústria química.

Moagem da cana na fazenda Caxeira, em Campinas. Óleo sobre tela de Benedito Calixto, [18--]. No Brasil Colônia, a cana-de-açúcar já era muito explorada, só que nesse período apenas para a obtenção do açúcar.

Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Fotografia: ID/BR

Não escreva no livro.

FUNÇÕES NITROGENADAS

A **ureia**, produto final do metabolismo de proteínas em alguns animais, é eliminada pela urina e apresenta fórmula molecular $CO(NH_2)_2$. Também é utilizada para a produção de fertilizantes.

Nos mamíferos, a ureia é o produto de excreção pela qual o nitrogênio é eliminado na urina. Ela apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Assim, o nitrogênio retorna ao ambiente sob a forma de ureia.

A ureia é um composto orgânico nitrogenado, pertencente à função amida. Entre as principais funções nitrogenadas estão, além das amidas, as aminas, as nitrilas, as isonitrilas e os nitrocompostos.

Amidas

As amidas são substâncias utilizadas na fabricação de medicamentos, de plásticos, de suplemento alimentar para gado e de outros produtos.

Grupo funcional



Nomenclatura de amidas

As amidas são nomeadas de acordo com o esquema a seguir, em que o prefixo é dado de acordo com o número de átomos de carbono acrescido do intermediário **an**:



Veja alguns exemplos:


metanamida


etanamida (acetamida)


propanamida


butanamida

Amidas aromáticas

As amidas aromáticas apresentam ao menos um anel aromático em sua estrutura molecular. A amida aromática mais simples é a benzamida, que tem a seguinte fórmula estrutural:


benzamida

Derivados da benzamida são utilizados como fármacos para o tratamento de hipertensão e de angina de peito.

Uma amida aromática de grande importância biológica é a niacinamida, molécula conhecida como **vitamina B_3**.


niacinamida

A poluição causada pelos fertilizantes

O nitrogênio é um dos elementos químicos que formam as proteínas e, portanto, é indispensável para o crescimento das plantas. O nitrogênio é muito utilizado na produção de fertilizantes sintéticos, como a amônia e a ureia. Apesar de o uso de fertilizantes nitrogenados estar relacionado com o aumento da produtividade dos alimentos, ele tem efeitos negativos no ambiente.

A partir do final da década de 1940, o uso de fertilizantes sintéticos aumentou massivamente o nitrogênio disponível para os seres vivos na forma de nitratos. Como os nitratos são facilmente lixiviados do solo, isto é, arrastados por meio de sua dissolução na água da chuva ou de irrigação, eles se acumulam nos corpos d'água, causando a poluição por nitrogênio nas águas subterrâneas de lagos, rios e córregos.

1. a) e **b)** Veja a resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

2. Resposta variável. Incentive os estudantes a fazer a relação com o conteúdo abordado no capítulo 1 desta unidade, no estudo do ciclo do nitrogênio.

3. A ureia é o produto final do metabolismo de proteínas. Assim, quanto maior a quantidade de proteína ingerida, maior a quantidade de ureia excretada.

ROTEIRO

1. Escreva a fórmula estrutural dos seguintes compostos:

a) 2-metilpropanamida.

b) 3-metilbutanamida.

2. Pesquise na internet, em livros e em revistas quais são as consequências da poluição por nitrogênio sobre a vida nos ambientes aquáticos.

3. Em sua opinião, uma pessoa excreta mais ureia quando come mais gordura, proteína ou açúcar? Justifique sua resposta.

Esse composto auxilia nas reações de oxidação dos alimentos, possibilitando a geração de energia química necessária ao organismo. A vitamina B_3 é encontrada, principalmente, em carnes vermelhas e de aves, no fígado de boi, nos peixes e no amendoim. Uma dieta pobre nessa vitamina pode ocasionar uma doença chamada pelagra, cujos sintomas são inflamações na pele que dão a ela um aspecto quebradiço, úlceras nas mucosas, diarreia e alterações mentais.

1. Segundo os estudos mais recentes, a quantidade máxima diária recomendada é de 4 xícaras de café (equivalente a 400 mg de cafeína).

CIÊNCIA SE DISCUTE

Cafeína

A cafeína é uma substância estimulante que apresenta a amida como um dos grupos funcionais. Ela pode ser encontrada no café, em alguns tipos de chá, no chocolate, em refrigerantes do tipo cola e em medicamentos para resfriados e dores, entre outros produtos.

Existem pesquisas científicas que relatam efeitos positivos da cafeína, como o estímulo do raciocínio e do desempenho esportivo. Outras alertam para efeitos como agitação, dores de cabeça, insônia, irritabilidade nervosa e da mucosa gástrica. O efeito da cafeína no padrão de construção da teia da aranha-de-jardim (*Araneus diadematus*) foi verificado e comparado com o de outras drogas.

1. O café é uma bebida consumida em todo o mundo. Pesquise qual é a quantidade máxima de café ingerida por dia que, de acordo com os cientistas, traz efeitos benéficos ao organismo.



NASA/SPL/Fotoarena

Teias feitas por aranhas-de-jardim sob efeito de maconha (**A**), benzedrina (análogo da anfetamina) (**B**), cafeína (**C**) e hidrato cloral (sedativo) (**D**).

Fonte de pesquisa: Noever, R. *et al.* Using spider-web patterns to determine toxicity. *Nasa Tech Briefs*, v. 19, n. 4, p. 82, abr. 1995.

Ratthanan/Stock/Getty Images

Substâncias voláteis provenientes da decomposição de proteínas, como a trimetilamina, são responsáveis pelo cheiro desagradável exalado pela carne do peixe.

Aminas

Uma das substâncias responsáveis pelo odor característico dos peixes é uma amina – a trimetilamina. As aminas podem ser consideradas derivados orgânicos da **amônia** (**NH_3**), em que um, dois ou três átomos de hidrogênio foram substituídos por grupos orgânicos (**R**), originando, respectivamente, amina primária, amina secundária e amina terciária.



R = grupos orgânicos (podem ser iguais entre si ou diferentes)

grupo funcional

O átomo de nitrogênio das aminas apresenta um par de elétrons não compartilhados em sua última camada, representado pelos dois pontos acima do átomo de nitrogênio (N).



Esse par de elétrons livres pode ligar-se a um próton (H^+) por uma ligação covalente, por isso as aminas são básicas. Observe a representação a seguir.



Não escreva no livro.

Exemplo

$$H_3C - NH_3(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3C - NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

solução básica (pH > 7)

Nomenclatura de aminas

Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac, na sigla em inglês), para dar nome às aminas escrevem-se os nomes dos grupos ligados ao átomo de nitrogênio, seguidos do sufixo **amina**. Caso haja dois ou mais grupos diferentes, eles devem ser escritos em ordem alfabética.

Exemplos

$CH_3 - NH_2$
metilamina

$H_3C - CH_2 - CH_2 - NH_2$
propilamina

$H_3C - N(CH_3) - CH_2CH_2CH_3$
dimetilpropilamina

$H_3C - N(CH_2CH_3) - CH_2CH_2CH_3$
etilmetilpropilamina

Anfetaminas

Anfetaminas são substâncias pertencentes à função **amina** e que aumentam a atividade do sistema nervoso, diminuindo a sensação de fadiga, reduzindo o apetite e aumentando o ânimo. Por apresentar essas propriedades farmacológicas, as anfetaminas são usadas como estimulantes. Porém, esses efeitos são acompanhados de aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos e arritmia, e, em alguns casos, seu uso pode causar diarreias, gastrite, tremor nas mãos, boca seca e irritabilidade intensa.



fórmula estrutural da anfetamina

Alcaloides

O uso de extratos vegetais como medicamentos ou venenos é conhecido há muito tempo. Por exemplo, o filósofo grego Sócrates, na Grécia Antiga, foi condenado à morte com a ingestão de chá de cicuta. Essa ação biológica dos extratos muitas vezes se deve à existência de um conjunto de substâncias conhecidas como **alcaloides**, nome derivado do termo "álcalis" devido ao caráter básico dessas substâncias.

Os alcaloides são compostos orgânicos cíclicos contendo nitrogênio e são encontrados principalmente nas angiospermas. A nicotina é um exemplo de alcaloide. Ela é formada nas raízes do tabaco (*Nicotiana tabacum*) e, posteriormente, translocada para as folhas nas quais é armazenada em vacúolos. Nas plantas, sua função é de defesa contra predadores. Por essa razão, também é utilizada na agricultura como um inseticida natural.



fórmula estrutural da nicotina

Alguns compostos orgânicos nitrogenados de origem vegetal biologicamente ativos apresentam características semelhantes a álcalis (de caráter básico) e, portanto, foram chamados alcaloides.

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ROTEIRO

4. Represente a fórmula estrutural dos compostos:

a) dietilamina;

b) metilpropilamina;

c) fenildimetilamina.

5. Desenhe as estruturas da fenilamina e da dietilamina e classifique-as em amina primária, secundária ou terciária.

Nitrilas

As **nitrilas** resultam da substituição do átomo de hidrogênio do cianeto de hidrogênio ($HC \equiv N$) por um grupo orgânico (**R**) e apresentam o grupo funcional $C \equiv N$ em sua estrutura. Sua nomenclatura segue o esquema abaixo.

////////////////////// + nitrila
nome do hidrocarboneto

Exemplos

$H_3C - C \equiv N$
etanonitrila

$H_2C = CH - C \equiv N$
propenonitrila

A propenonitrila (também conhecida como cianeto de vinila) é uma substância líquida nas condições ambientes, menos densa do que a água, de cor clara e cheiro irritante. É importante matéria-prima para a fabricação de fibras têxteis.

HCN: formador de nitrilas

Em solução aquosa, o cianeto de hidrogênio (HCN) comporta-se como um ácido fraco (ácido cianídrico) ionizando-se parcialmente em H^+ e CN^-. O íon cianeto (CN^-) é tóxico e causa a morte, se inalado, mesmo em pequenas quantidades.

O polidésmido, animal encontrado na Costa Rica, é um decompositor que se alimenta de restos de plantas e de animais. Completamente cego, ele produz ácido cianídrico para afastar o inimigo, quando se encontra em situação de perigo.

William Ervin/SPL/Fotoarena

O polidésmido usa o ácido cianídrico (substância extremamente tóxica) para afugentar seus inimigos. Reserva Florestal Monteverde, Costa Rica.

Isonitrilas

Isonitrilas são substâncias formadas por moléculas orgânicas resultantes de reações do isocianeto de hidrogênio ($H - NC$), cujo hidrogênio foi substituído por grupos orgânicos (**R**). A nomenclatura desses compostos é feita pela adição do termo **isocianeto de** ao nome do grupo orgânico ligado ao $-NC$.

isocianeto de ////////////////////// + a
nome do grupo orgânico

Exemplos

$H_3C - NC$
isocianeto de metila



isocianeto de fenila

Nitrocompostos

Os **nitrocompostos** são substâncias formadas por moléculas orgânicas que contêm o grupo $-NO_2$. Sua nomenclatura é dada pela adição do prefixo **nitro** ao nome do hidrocarboneto ligado ao $-NO_2$.

nitro + //////////////////////
nome do hidrocarboneto

Exemplos

$H_3C - NO_2$
nitrometano

$H_3C - CH_2 - NO_2$
nitroetano

$H_3C - CH_2 - CH_2 - NO_2$
1-nitropropano

Um dos nitrocompostos mais importantes é o nitrobenzeno (fórmula estrutural a seguir). Trata-se de um líquido amarelado e tóxico, utilizado principalmente na produção de anilina, mas também na produção de fármacos, como o paracetamol, e como solvente em tintas.



anilina — nitrobenzeno — paracetamol

6. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7. a) Isonitrila.
b) Nitrocomposto.
c) Nitrila.

ROTEIRO

6. A substituição do átomo de hidrogênio da molécula de HCN (cianeto de hidrogênio) por grupo orgânico produz nitrila, segundo esta reação:

$H - C \equiv N \xrightarrow[+R]{-H} R - C \equiv N$

Utilizando essas informações, mostre, mediante um esquema análogo, a obtenção de $H_3C - H_2C - CN$.

7. Identifique a que função orgânica pertencem os compostos a seguir.

a) $H_3C - NC$
b) $H_3C - NO_2$
c) $H_3C - CH_2 - CN$

Não escreva no livro.

Comparação das temperaturas de fusão e ebulição de aminas e amidas

Observe na tabela a seguir que, para os compostos de mesma massa molecular, quanto maior a possibilidade de realizar ligações de hidrogênio, maiores serão as temperaturas de fusão e ebulição. Além disso, com o aumento da cadeia carbônica, cresce a possibilidade de interações do tipo dipolo induzido-dipolo induzido, o que leva a um aumento das temperaturas de fusão e ebulição.

Função orgânica	Nome do composto	Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)	Massa molar (g/mol)
Amina	etanamina	C_2H_7N	$H_2N-CH_2-CH_3$	−81	17	45
	dimetilamina	C_2H_7N	$H_3C-N(H)-CH_3$	−92	7	45
	trimetilamina	C_3H_9N	$H_3C-N(CH_3)-CH_3$	−117	3	59
Amida	metanamida	CH_3NO	$H-C(=O)-NH_2$	3	210	45
	etanamida	C_2H_5NO	$H_3C-C(=O)-NH_2$	80	222	59

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

FUNÇÕES HALOGENADAS

Haletos orgânicos são compostos derivados de um hidrocarboneto pela troca de um ou mais átomos de hidrogênio pelo mesmo número de átomos de halogênio.

Os haletos orgânicos são representados pela fórmula geral R—X, em que R é um grupo orgânico.

Poucos haletos orgânicos são encontrados na natureza; todavia, eles podem ser facilmente preparados em laboratório por reações, em condições apropriadas, de hidrocarbonetos com halogênios.

CFC

CFC é a sigla para **clorofluorocarboneto**, uma classe de haletos orgânicos que contêm cloro e flúor em sua estrutura química.

As duas composições mais comuns desses haletos são os freons triclorofluorometano e o diclorodifluorometano (freon-12).



triclorofluorometano



diclorodifluorometano

Esses compostos foram utilizados por muitos anos como propelentes de aerossóis, como líquidos refrigerantes em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado e na fabricação de espumas. Muitos deles tiveram o uso restringido porque são um dos principais causadores do buraco na camada de ozônio.

O Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio é um acordo internacional que foi assinado em 1987. Os países participantes do acordo se comprometeram a substituir, gradativamente, as substâncias que eram responsáveis pela destruição do ozônio, como os CFCs.

A boa notícia é que a redução da produção dos CFCs está dando resultado: o buraco na camada de ozônio diminuiu após a conscientização internacional para reduzir o uso desses compostos.

Nomenclatura dos haletos orgânicos

Os compostos halogenados podem ser designados por anteposição dos prefixos **fluoro**, **cloro**, **bromo** ou **iodo** ao nome do hidrocarboneto que teve um ou mais átomos de hidrogênio substituídos por átomo(s) de halogênio.

nome do halogênio + nome do hidrocarboneto

Exemplos

$CH_3 — Br$
bromometano

$H_3C — CH_2 — C\ell$
cloroetano

Quando um átomo de halogênio está ligado a um átomo de carbono de um anel aromático, têm-se os **haletos de arila**.

Exemplos


clorobenzeno


fluorobenzeno

Nos casos em que houver mais de uma possibilidade para a posição do halogênio, deve-se numerar a cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima do halogênio.

Exemplo

$$H_3\overset{5}{C} — H_2\overset{4}{C} — H_2\overset{3}{C} — \overset{2}{C}H(F) — \overset{1}{C}H_3$$

2-fluoropentano

Outra maneira de designar os haletos orgânicos é pelos nomes fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto, em uma palavra separada, mais a preposição **de** e o prefixo do grupo orgânico acrescido da terminação **ila**. Observe a seguir.

Exemplos

$CH_3 — Br$
brometo de metila

$H_3C — CH_2 — C\ell$
cloreto de etila

Os **haletos de acila** ou haletos ácidos são compostos derivados de ácidos carboxílicos, pela substituição do grupo OH por um halogênio. São pouco solúveis em água e solúveis em etanol. Eles são usados, em laboratório, como intermediários para a obtenção de ácidos carboxílicos, ésteres e anidridos orgânicos.

A nomenclatura desses compostos é feita conforme o esquema a seguir.

nome do haleto + nome do ácido carboxílico de origem -ico + ila

Exemplos



ácido etanoico → brometo de etanoíla ou brometo de acetila

Os haletos de acila de baixa massa molecular são voláteis. O cloreto de etanoíla, por exemplo, tem temperatura de ebulição de 51 °C ao nível do mar.

ROTEIRO

8. Dê o nome dos haletos orgânicos.

a) $H_2C(C\ell) — CH_2 — CH_2 — CH_2 — CH_3$

b) $H_2C(C\ell) — CH(C\ell) — CH_2 — CH_3$

c) 

8. a) 1-cloro-pentano.
b) 1,2-diclorobutano.
c) 1,4-dibromobenzeno.

Não escreva no livro.

FUNÇÕES OXIGENADAS

O etanol combustível é uma mistura em que a substância predominante é o etanol – álcool que, no Brasil, é obtido principalmente da cana-de-açúcar. Trata-se de uma substância inflamável cujos manuseio e comercialização requerem procedimentos de segurança. Os álcoois formam uma das classes de compostos orgânicos que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio em sua composição.

Álcoois e enóis

Além do etanol, outros álcoois estão presentes em certos produtos do cotidiano, como a glicerina, usada como umectante em bolos e panetones industrializados. No corpo humano, um tipo de álcool é o colesterol.

Características de álcoois

Os álcoois são substâncias cujas estruturas derivam de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais de seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturados substituídos por um ou mais radicais **hidroxila** (—OH).

Quando a molécula do álcool apresenta apenas uma hidroxila, ela é classificada como **monoálcool** ou **monol**; quando tiver duas hidroxilas, trata-se de **diálcool**, **diol** ou **glicol**; no caso de ter três hidroxilas, a molécula é denominada **triol**; e assim sucessivamente. Os álcoois com três ou mais hidroxilas costumam ser chamados **poliálcoois** ou **polióis**.

O átomo de carbono ao qual a hidroxila aparece ligada também pode ser usado para classificar os álcoois em primário, secundário e terciário. Observe o quadro a seguir.

Nome	Fórmula	Tipo de átomo de carbono ligado à hidroxila	Classificação
etanol	H_3C-CH_2-OH	primário	álcool primário
ciclopentanol		secundário	álcool secundário
2-metilpropan-2-ol (*terc*-butanol)		terciário	álcool terciário

Há álcoois sólidos e líquidos em condições ambientes. Comparando-se os álcoois com tipos de cadeias semelhantes, nota-se que a temperatura de ebulição aumenta com o aumento do número de átomos de carbono. A tabela a seguir dá alguns exemplos, considerando-se álcoois primários.

Função orgânica	Nome do composto	Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Álcool	metanol	CH_4O	H_3C-OH	−97,50	64,60
	etanol	C_2H_6O	H_3C-CH_2-OH	−114,1	78,30
	propan-1-ol	C_3H_8O	$H_3C-CH_2-CH_2-OH$	−89,50	82,00
	butan-1-ol	$C_4H_{10}O$	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	−90,00	116,00
	pentan-1-ol	$C_5H_{12}O$	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	−78,00	136,00

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Colesterol – um álcool

Dá-se o nome **colesterol** à estrutura formada por um esteroide (grupo de 17 átomos de carbono dispostos em quatro anéis) e um grupo OH ligado a um dos anéis (veja a fórmula estrutural abaixo).



estrutura do colesterol

O colesterol é essencial para as membranas celulares de todo o corpo. É o precursor de hormônios como o estradiol e a testosterona, bem como da vitamina D. É também fundamental na produção da bílis, necessária à digestão das gorduras alimentares.

O colesterol é conduzido pelo sangue – no qual é insolúvel – preso a proteínas solúveis em gorduras, as **lipoproteínas**. A lipoproteína de alta densidade (HDL) transporta o colesterol do sangue para o fígado, onde é reciclado ou eliminado. A lipoproteína de baixa densidade (LDL) transporta o colesterol até as células periféricas, para as quais ele é fundamental. Em excesso, o LDL pode causar problemas cardiovasculares.

Essa variação nas temperaturas de ebulição ocorre porque, com o aumento da cadeia, aumenta a superfície de interação entre as moléculas, ampliando o número de ligações intermoleculares.

Principais álcoois

Dois álcoois de grande importância econômica são o metanol e o etanol.

Metanol ou álcool metílico

O metanol é conhecido como o "álcool da madeira", pois pode ser produzido pela destilação da madeira. Sua obtenção também se dá por meio da reação do monóxido de carbono com o gás hidrogênio na presença de catalisador, sob temperatura e pressão adequadas, como indicado nesta equação:

$$CO(g) + 2\,H_2(g) \underset{250\ °C,\ 50\text{-}100\ atm}{\overset{Cu,\ ZnO,\ Cr_2O_7}{\rightleftharpoons}} CH_3OH(g)$$

Esse álcool costuma ser usado como solvente em processos de obtenção de produtos de origem animal ou vegetal, na produção de biodiesel, no preparo de medicamentos e na fabricação do formaldeído (matéria-prima para a produção do formol, que é uma solução aquosa de formaldeído).

O metanol é um produto inflamável e tóxico; por isso, deve ser mantido longe do fogo e manuseado com cuidado, para não ser inalado nem entrar em contato com a pele.

Etanol ou álcool etílico

O etanol é obtido principalmente pela fermentação de açúcares ou pela reação de adição de água ao eteno catalisado por ácido. É usado como solvente, como combustível e em soluções desinfetantes.

No Brasil, a matéria-prima para a produção do etanol é a cana-de-açúcar.

Características e nomenclatura de enóis

Os **enóis** são compostos de cadeia aberta caracterizados pela presença do grupo hidroxila ligado a átomo de carbono insaturado. A nomenclatura da Iupac para os enóis obedece ao seguinte esquema:

prefixo + infixo + ol

Exemplos


etenol


prop-1-en-1-ol


propen-2-ol

Observe que, entre as fórmulas representadas, o prop-1-en-1-ol é o único que apresenta isomeria geométrica (*cis-trans*). Veja, a seguir, o nome dos dois isômeros.


cis-prop-1-en-1-ol


trans-prop-1-en-1-ol

Glicerol (glicerina)

[...] os três átomos de oxigênio ativam seus átomos de hidrogênio para a formação de ligações de hidrogênio, e as moléculas de glicerol aderem umas às outras formando um líquido viscoso como um xarope. Além do mais, as moléculas de glicerol não apenas se interligam fortemente, mas formam também fortes ligações com a água, nas vizinhanças. [...]



A capacidade da molécula de glicerol de se ligar a moléculas de água explica seu amplo uso em cosméticos, preparações farmacêuticas e alimentos. Ele é usado como **emoliente** (amaciante) em cosméticos [...]. É adicionado aos doces para evitar a sua cristalização. O glicerol também é adicionado às colas, para evitar que elas sequem rápido demais e incorporado nos plásticos – notadamente o celofane – como um **plastificante**.

Atkins, P. W. *Moléculas*. Tradução: Paulo Sérgio Santos e Fernando Galembeck. São Paulo: Edusp, 2000. p. 50.

ROTEIRO

9. Uma das substâncias responsáveis pelo aroma de rosas é o 2-feniletanol, cuja fórmula ($C_8H_{10}O$) apresenta um anel aromático. Dê a fórmula estrutural do 2-feniletanol.

10. Apresente a fórmula estrutural e dê o nome do:

a) menor álcool primário;

b) menor álcool secundário;

c) menor álcool terciário.

11. O propino reage com água, produzindo o propen-2-ol (um enol). Represente a reação de transformação do propino em propen-2-ol.

9, 10 e **11.** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Não escreva no livro.

Fenóis

Os fenóis começaram a ser usados no final do século XIX para a assepsia em hospitais. A introdução dessa prática propiciou uma queda significativa no número de mortes causadas por infecção hospitalar.

Características e nomenclatura



fenol

Os fenóis são substâncias orgânicas que apresentam cadeia aromática e um ou mais grupos hidroxila ligados diretamente ao anel benzênico. Alguns deles têm propriedades bactericidas e fungicidas.

A nomenclatura oficial da Iupac para fenóis ramificados com apenas um grupo hidroxila obedece ao seguinte esquema:

nome do grupo substituinte + fenol

Exemplos



2-metilfenol



3-metilfenol



4-metilfenol

Observe, nos exemplos anteriores, que a numeração da cadeia se inicia a partir do átomo de carbono ligado à hidroxila. Assim como nos álcoois de cadeia cíclica, a numeração da cadeia nos fenóis deve considerar o sentido em que a localização da ramificação é a menor.

A mistura formada pelos isômeros 2-metilfenol, 3-metilfenol e 4-metilfenol é conhecida como **creolina** e é usada, ainda hoje, para desinfecção, por exemplo, do recinto em que se faz a ordenha de vacas.

Para fenóis com dois ou mais grupos hidroxila, a nomenclatura da Iupac obedece ao seguinte esquema:

nome do hidrocarboneto aromático + prefixo de quantidade + ol

Exemplos



benzeno-1,3-diol



benzeno-1,4-diol



benzeno-1,2,3-triol

Éteres

Resinas de modelagem do tipo epóxi, solventes e aditivos para gasolina são algumas das aplicações dos éteres.

Características e nomenclatura

Éteres são substâncias orgânicas que apresentam um ou mais átomos de oxigênio ligados a dois grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos (R e R').

Fenóis naturais

Muitos fenóis diferentes ocorrem na natureza. As moléculas picantes – capsaicina das pimentas e zingerona do gengibre – podem ser classificadas como fenóis, e algumas moléculas extremamente fragrantes presentes nas especiarias – o eugenol no cravo-da-índia e o isoeugenol na noz-moscada – são da família dos fenóis.

A vanilina, o ingrediente ativo de um de nossos compostos flavorizantes mais amplamente usados, a baunilha, também é um fenol, tendo uma estrutura muito semelhante às do eugenol e do isoeugenol.

Le Couteur, P.; Burreson, J. *Os botões de Napoleão*: as 17 moléculas que mudaram a história. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p. 119.

Não escreva no livro.

DE OLHO NO CONCEITO

Isomeria de compensação ou metameria

Esse tipo de isomeria ocorre em compostos da mesma função e que apresentam a mesma cadeia principal heterogênea, mas se diferenciam quanto à posição de um heteroátomo. A metameria também pode ser identificada em cadeias heterogêneas que possuem diferença na cadeia principal (maior cadeia que se liga ao oxigênio). Observe um exemplo desse tipo de isomeria entre dois éteres:

$H_3C — CH_2 — CH_2 — O — CH_3$

metoxipropano

$H_3C — CH_2 — O2 — CH_2 — CH_3$

etoxietano

Outras funções que apresentam esse tipo de isomeria são as aminas, as amidas e os ésteres.

Uma forma geral de representar a função éter pode ser R — O — R', em que R e R' podem ser iguais (éter simétrico) ou diferentes (éter assimétrico). A nomenclatura da Iupac para os éteres é dada da seguinte forma:

prefixo do R menor + oxi + nome do hidrocarboneto do R maior

Exemplos

etoxietano



metoxibenzeno

Quando o átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de carbono formando uma cadeia cíclica, usa-se a seguinte regra de nomenclatura:

epoxi + nome do hidrocarboneto

Exemplos



epoxietano



1,2-epoxi-2-metilbutano

Note que, nesses exemplos, a numeração da cadeia começa no átomo de carbono da extremidade mais próxima à função.

Os éteres, assim como ocorre com os álcoois, apresentam aumento da temperatura de ebulição com o aumento da cadeia carbônica. Observe:

Função orgânica	Nome do composto	Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Éter	metoxietano	C_3H_8O	$CH_3 — O — CH_2 — CH_3$	−141,5	−24,0
	etoxietano	$C_4H_{10}O$	$CH_3 — CH_2 — O — CH_2 — CH_3$	−116,0	35,0
	metoxibutano	$C_5H_{12}O$	$CH_3 — O — CH_2 — CH_2 — CH_2 — CH_3$	−116,0	70,0

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

ROTEIRO

12. MTBE é a sigla geralmente usada para designar o éter terc-butílico e metílico. Trata-se de uma substância usada, em alguns locais, como aditivo para gasolina. Forneça sua fórmula estrutural.

12.



Aldeídos e cetonas

O **metanal**, que é muito utilizado para conservar peças anatômicas em laboratório, e o **cinamaldeído**, que confere odor e sabor característicos da canela, são exemplos de aldeídos. A **acetona**, usada para remover esmaltes, e a **testosterona**, um hormônio masculino, são exemplos de cetonas.

Características e nomenclatura de aldeídos

Aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonila ($>C=O$) em uma extremidade da cadeia carbônica.



representações da carbonila em aldeídos

Não escreva no livro.

A nomenclatura oficial da Iupac para aldeídos de cadeia aberta e que contêm um ou dois grupos CHO é dada da seguinte forma:

prefixo + infixo + al

Exemplos



metanal — etanal — 2,2-dimetilbutanal — etanodial

Note que, havendo dois grupos carbonila na cadeia, utiliza-se o prefixo de quantidade (**di**) antes do sufixo **al**, além do acréscimo da vogal **o** após o infixo.

Características e nomenclatura de cetonas

As cetonas apresentam em sua estrutura o grupo carbonila entre átomos de carbono.



carbonila

Nomenclatura de cetonas

A nomenclatura oficial da Iupac para cetonas obedece à seguinte estrutura:

prefixo + infixo + ona

Exemplos



propanona — 3-metilpentan-2-ona — ciclopentanona — ciclo-hexano-1,3-diona

Observe, nos exemplos acima, que não é necessário indicar a posição da carbonila nas cetonas em que não há outra localização possível, como ocorre com a propanona e a ciclopentanona. Nas cetonas com mais de uma carbonila, é necessário utilizar o prefixo de quantidade antes do sufixo **ona**, e quando o prefixo de quantidade iniciar com consoante, deve-se inserir a vogal **o** após o infixo.

Principais aldeídos e cetonas

Metanal

O metanal ou formaldeído é um aldeído muito usado na produção de resinas, medicamentos e tecidos, bem como em desinfetantes e em conservantes para produtos de limpeza e cosméticos. Em solução com concentração de 37%, é comercializado com o nome de **formol**, usado como antisséptico e bactericida.

Propanona

A cetona de maior uso comercial é a propanona, também denominada acetona. Ela é utilizada como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e fibra de vidro, na extração de óleos, na produção de medicamentos e em reação com o fenol para a fabricação de bisfenol-A, um dos compostos das resinas epóxi.

A acetona pode agredir a mucosa bucal e nasal e provocar irritações na pele.

Ao comparar cadeias semelhantes de cetonas e aldeídos, nota-se o aumento da temperatura de ebulição com o aumento da cadeia carbônica. Observe os exemplos na tabela a seguir.

DE OLHO NO CONCEITO

Tautomeria

Em algumas situações, a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio se desloca para o átomo de carbono vizinho. Nesse caso, o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila, para manter a estabilidade dos átomos. Nessa migração, é formada uma substância que pertence a outra função orgânica. As substâncias envolvidas estabelecem um equilíbrio dinâmico. Como a fórmula molecular continua a mesma, essas substâncias são isômeras, e esse fenômeno é chamado de tautomeria. Observe o exemplo:



Nesse exemplo, um dos átomos de hidrogênio ligados ao carbono vizinho da carbonila se liga ao átomo de oxigênio desse grupo e é fundamental para que a reação ocorra. Caso esse hidrogênio não esteja presente, o equilíbrio não acontece. Os casos mais comuns de tautomeria ocorrem entre enóis e aldeídos (equilíbrio aldo-enólico) ou enóis e cetonas (equilíbrio ceto-enólico).

Função orgânica	Nome do composto	Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Aldeído	metanal	CH_2O	$H-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-H$	–117	–19
	propanal	C_3H_6O	$H_3C-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-H$	–81	49
	butanal	C_4H_8O	$H_3C-CH_2-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-H$	–97	75
Cetona	propanona	C_3H_6O	$H_3C-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$	–94	56
	butanona	C_4H_8O	$H_3C-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$	–87	80
	pentan-2-ona	$C_5H_{10}O$	$H_3C-CH_2-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$	–78	101

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Ácidos carboxílicos

O vinagre, usado como tempero, constitui uma solução de ácido acético. O veneno da picada de formigas contém ácido fórmico. Já a manteiga rançosa apresenta o odor desagradável do ácido butírico. Essas substâncias são exemplos de **ácidos carboxílicos**, e todas elas apresentam odores característicos.

Características e nomenclatura

Ácidos carboxílicos ou carboxilácidos são substâncias que apresentam em sua composição o grupo carboxila, que pode ser assim representado:

representações possíveis para o grupo carboxila

A nomenclatura oficial da Iupac para ácidos carboxílicos de cadeia aberta e que contêm um ou dois grupos COOH é dada da seguinte forma:

ácido prefixo + infixo + oico



ácido metanoico



ácido etanoico



ácido etanodioico

Havendo dois grupos COOH na cadeia, deve-se utilizar o prefixo de quantidade (**di**) antes do sufixo **oico** com o acréscimo da vogal **o** após o infixo, porque o prefixo de quantidade se inicia com uma consoante.

O ácido carboxílico formado pela substituição de um átomo de hidrogênio no benzeno por um grupo carboxila é chamado ácido benzoico, substância utilizada como conservante e precursora da síntese de outros compostos.



ácido benzoico

Note na tabela a seguir que, assim como ocorre nas outras funções oxigenadas, com o aumento da cadeia carbônica, há o aumento da temperatura de ebulição dos ácidos carboxílicos não ramificados.

Não escreva no livro.

Função orgânica	Nome do composto	Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Ácido carboxílico	ácido metanoico	CH_2O_2	$H-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-OH$	8	101
	ácido etanoico	$C_2H_4O_2$	$H_3C-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-OH$	17	119
	ácido propanoico	$C_3H_6O_2$	$H_3C-CH_2-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-OH$	–21	141
	ácido butanoico	$C_4H_8O_2$	$H_3C-CH_2-CH_2-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-OH$	–8	163

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Principais ácidos carboxílicos

Alguns ácidos carboxílicos se destacam por sua importância. Entre eles estão o ácido metanoico e o ácido etanoico.

Ácido metanoico ou ácido fórmico

O ácido metanoico é usado como mordente (fixador) de corantes, no processo de curtimento do couro e na coagulação do látex, para produção da borracha. É também utilizado em medicamentos para reumatismo e no combate a ácaros.

Fabio Colombini/Acervo do fotógrafo

Ao desferir uma picada, a formiga secreta ácido metanoico. Na foto, formiga-tocandira, encontrada no Pantanal mato-grossense.

Ácido etanoico ou ácido acético

A obtenção do ácido acético natural, presente no vinagre, ocorre mediante a ação de bactérias. Na fermentação, o processo ocorre por ação do fungo *Mycoderma aceti*, com o auxílio da enzima **álcool oxidase**.

$$CH_3-CH_2-OH + O_2 \xrightarrow{\text{enzima}} CH_3-\overset{\overset{\large O}{//}}{C}\underset{\underset{\large OH}{\diagdown}}{} + H_2O$$

O ácido acético é usado como solvente e tempero, em tinturaria, perfumaria, na produção de corantes, em tintas, na seda sintética e em medicamentos.

Ésteres

Os ésteres constituem grande parte das essências aromatizantes de frutos e flores utilizadas na indústria alimentícia, como o etanoato de pentila (aroma de banana) e o butanoato de etila (aroma de abacaxi).

Características e nomenclatura

Os ésteres podem ser produzidos por meio de reações catalisadas por íons H^+ ou OH^- entre ácidos carboxílicos ou álcoois, em uma reação denominada **esterificação**, conforme o esquema a seguir.

$$R-\overset{\overset{\large O}{//}}{C}\underset{\underset{\large OH}{\diagdown}}{} + HO-R' \underset{}{\overset{H^+ \text{ ou } OH^-}{\rightleftharpoons}} R-\overset{\overset{\large O}{//}}{C}\underset{\underset{\large O-R'}{\diagdown}}{} + H_2O$$

ácido carboxílico + álcool ⇌ éster + água

Nessa reação, o grupo OH da carboxila é retirado para que o álcool se ligue à molécula.

Os ésteres também podem reagir com água por meio de uma reação catalisada com ácido ou base e formar o ácido carboxílico e o álcool ou fenol de origem.

$$\text{éster} + \text{água} \overset{H^+ \text{ ou } OH^-}{\rightleftharpoons} \text{ácido carboxílico} + \text{álcool ou fenol}$$

13. O butanoato de fenila provém da reação entre o ácido butanoico e o fenol.

14. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ROTEIRO

13. Quais reagentes seriam necessários para a produção de butanoato de fenila?

14. Há diferença entre o etanoato de metila e o metanoato de etila, ou ambos são a mesma substância? Apresente as fórmulas estruturais das substâncias para justificar sua resposta.

A nomenclatura oficial da Iupac é similar à nomenclatura do sal orgânico e obedece à seguinte estrutura:

$$\underbrace{\text{prefixo} + \text{infixo} + \textbf{o} + \text{ato}}_{\text{(do ácido carboxílico de origem)}} \ \textbf{de} \ \underbrace{\text{grupo} + \text{a}}_{\text{(do álcool ou do fenol de origem)}}$$

Exemplos



etanoato de etila



3-metilbutanoato de etila



propanoato de fenila

Temperatura de ebulição de ésteres

Assim como ocorre com as outras funções oxigenadas, o aumento da quantidade de átomos de carbono em um éster aumenta sua temperatura de ebulição.

Quando se comparam os ésteres com a mesma fórmula molecular (isômeros de posição ou metameria, dependendo do éster), não se observa uma tendência bem definida para a temperatura de ebulição. Veja a seguir.

Função orgânica	Nome do composto	Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Éster	metanoato de etila	$C_3H_6O_2$	$H-C(=O)-O-CH_2-CH_3$	–80	54
	etanoato de metila	$C_3H_6O_2$	$H_3C-C(=O)-O-CH_3$	–98	57
	metanoato de propila	$C_4H_8O_2$	$H-C(=O)-O-CH_2-CH_2-CH_3$	–93	81
	etanoato de etila	$C_4H_8O_2$	$H_3C-C(=O)-O-CH_2-CH_3$	–84	77

Fonte de pesquisa: Haynes, W. M. (ed.). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

ISOMERIA ÓPTICA

A talidomida é um medicamento que foi utilizado no final da década de 1950 por mulheres durante a gravidez. A princípio, esse medicamento apresentava-se como ótimo sedativo. Era indicado contra insônia e ansiedade. Além disso, aliviava os tão conhecidos enjoos de gravidez.

No entanto, seu uso por gestantes foi associado a um dos maiores acidentes médicos registrados na história. Alguns dos bebês nascidos de mulheres que ingeriram esse medicamento durante o período gestacional apresentaram deformações físicas.

A relação entre o nascimento de bebês com deformações e o uso da talidomida foi estabelecida de maneira independente por dois cientistas, um australiano (W. G. McBride) e um alemão (W. Lenz), em 1961. Eles associaram o acidente médico a uma característica muito importante de alguns compostos orgânicos: a **isomeria óptica**.

Para saber se uma molécula apresenta isomeria óptica, utiliza-se como recurso a comparação de sua estrutura com a estrutura determinada por sua imagem diante de um espelho. Se as estruturas da molécula e da sua imagem não se sobrepõem, a substância apresenta isomeria óptica.

Não escreva no livro.

Dois isômeros ópticos são denominados **enantiômeros** se suas moléculas guardam entre si uma relação objeto-imagem especular de modo que não possam ser sobrepostas. Se as imagens puderem ser sobrepostas sem alteração, trata-se do mesmo composto.

Isomeria óptica



A molécula **I** é diferente da molécula **II**, que é sua imagem especular. Em quaisquer posições que forem colocadas, é impossível que coincidam. Assim, diz-se que **I** e **II** são um par de enantiômeros.

No entanto, a disposição dos átomos em **III** e **IV** permite que eles se sobreponham, bastando um giro adequado. Nesse caso, **III** e **IV** não são enantiômeros, e sim moléculas de uma mesma substância.

Voltemos agora ao problema da talidomida. Esse medicamento, assim como muitos compostos orgânicos, apresenta isomeria óptica. E cada um dos enantiômeros pode reagir de maneira completamente diferente quando está em um organismo vivo.

Enquanto um dos isômeros funciona como excelente sedativo e também contra enjoos, o outro é teratogênico, ou seja, capaz de promover anomalias congênitas. A talidomida foi comercializada como uma mistura dos dois isômeros. Eis o motivo pelo qual a talidomida tornou-se tão nociva.

A origem da palavra "quiral"

A palavra **quiral** origina-se de *khéir*, que em grego significa "mão".

Observe nossas mãos: a mão esquerda corresponde à imagem no espelho da mão direita.

Representação especular de um objeto



Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Sobreposição do objeto e imagem

À esquerda, a imagem especular da mão esquerda se parece com a mão direita. À direita, mão esquerda e direita sobrepostas. Cores-fantasia.

No entanto, quando tentamos fazer a sobreposição, ou seja, colocar a palma da mão esquerda sobre as costas da mão direita, é fácil concluir que elas não coincidem.

Reconhecimento da isomeria óptica

Os isômeros planos e geométricos possuem propriedades físicas (temperaturas de fusão, temperaturas de ebulição, densidade, etc.) diferentes. A temperatura de ebulição do etanol ($H_3C - CH_2 - OH$), por exemplo, é diferente da temperatura de ebulição do éter dimetílico ($H_3C - O - CH_3$).

Em relação aos isômeros ópticos, não é observada essa diferença nas propriedades físicas. Os enantiômeros podem ser diferenciados pela propriedade de desviar o plano da luz polarizada.



luz não polarizada: vibração em diversos planos



luz polarizada: vibração em apenas um plano

A polarização da luz

A luz branca é o resultado da emissão de radiação de todos os comprimentos de onda do espectro visível. De maneira geral, quando uma luz branca é emitida, seus raios se propagam em todos os planos.

A luz polarizada pode ser obtida por meio de um aparelho chamado polarímetro; nele, a luz passa por uma lente (polarizador) que direciona os feixes de luz em um plano.

Dessa maneira, pode-se definir a luz polarizada como aquela que se propaga em um único plano.

A luz polarizada e a isomeria óptica

A atividade óptica de um composto pode ser determinada quando este é colocado em um aparelho chamado polarímetro. Quando o teste é feito, há três resultados possíveis. No primeiro deles, não se observa o desvio do plano de propagação da luz. Nos outros dois, o plano de propagação da luz pode ser desviado para a direita ou para a esquerda. Assim, podemos classificar os compostos de acordo com a forma como desviam a luz polarizada. Essa classificação é chamada de **configuração relativa**.

- **Levógiras:** São as substâncias que desviam o plano da luz polarizada para a esquerda. São representadas pela letra ℓ ou pelo sinal (−) na frente do nome.
- **Dextrógiras:** São assim chamadas as substâncias que desviam para a direita o plano da luz polarizada. Esses enantiômeros são indicados pela letra *d* ou pelo sinal (+) na frente do nome.

Se nenhuma alteração na direção da luz é observada, é possível que o composto seja opticamente inativo ou que haja uma mistura com quantidades idênticas dos isômeros *d* e ℓ.

Quando os isômeros *d* e ℓ estão presentes na mesma quantidade, temos uma mistura chamada **racêmica**, ou **racemato**. Nessa mistura, o isômero *d* desvia a luz polarizada em um certo ângulo para a direita e o isômero ℓ desvia a luz polarizada no mesmo ângulo para a esquerda. Como ambos estão presentes na mesma concentração, o somatório dos desvios é nulo e a luz polarizada acaba não sendo desviada.



Representação de três possíveis resultados observados para testar a atividade óptica de uma amostra. Em **A**, a substância analisada é dextrógira, em **B** é levógira e em **C** a substância não possui atividade óptica ou é uma mistura racêmica. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Bruice, P. Y. Organic Chemistry. 8. ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2015.

Não escreva no livro.

Assimetria molecular e isomeria óptica

Como já foi dito, para que um composto seja opticamente ativo, é necessário que suas moléculas sejam assimétricas.

Para entender a assimetria molecular, é preciso avaliar mais detalhadamente sua estrutura.



fórmula molecular da talidomida

Na talidomida, por exemplo, representada pela fórmula ao lado, o ponto localizado com asterisco (*) na figura corresponde ao átomo de carbono assimétrico, ou seja, é o átomo de carbono cujas quatro ligações covalentes são feitas com diferentes átomos ou grupos de átomos.

Ao representar em três dimensões uma molécula que contém um átomo de carbono assimétrico, ou quiral, e colocar em frente do espelho, obtém-se uma imagem que não poderá ser sobreposta à molécula original.

Observe a figura a seguir (cores-fantasia). Quando se tenta sobrepor a imagem formada no espelho (imagem especular) ao objeto, não se consegue obter exatamente a mesma estrutura.

AMj Studio/ID/BR



Voltando para o caso da talidomida, verifica-se que a presença de átomo de carbono assimétrico faz com que a molécula tenha uma imagem não sobreponível, o que corresponde a outra substância.



espelho

Assim, temos os dois isômeros da talidomida.

Na época em que os acidentes genéticos começaram a ser relatados, esse medicamento era administrado como uma mistura equimolar dos dois enantiômeros, ou seja, não havia a preocupação de separar os isômeros e fornecer como medicamento apenas o isômero que apresentava propriedades sedativas. Se tivesse havido esse cuidado, provavelmente os problemas decorrentes do uso da talidomida não teriam acontecido.

ROTEIRO

15. Considere o composto representado a seguir e responda ao que se pede.

$$H_3CCH_2CH{=}CH\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}HCH_3$$

a) Há algum carbono assimétrico? Se positivo, qual seria a imagem especular dele?

b) Qual outro tipo de isomeria pode ser encontrado? Se positivo, escreva as formas possíveis.

c) Suponha que a dupla-ligação seja quebrada e um número adequado de hidrogênios seja adicionado para completar as 4 ligações dos carbonos. As moléculas resultantes terão isomeria óptica?

15. a) Sim, há um carbono assimétrico.



b) Apresenta isomeria *cis-trans*.



c) Sim, pois ainda existe um carbono quiral.

Produzindo álcool em gel

Manter as mãos limpas é essencial para combater doenças e o acúmulo de bactérias no organismo. Além de água e sabão, o álcool em gel pode ser um aliado no combate a microrganismos patogênicos, como certas bactérias e vírus. Por que o álcool é um antisséptico eficiente? Neste experimento, você e os colegas formarão grupos para produzir álcool em gel e compará-lo com o álcool líquido, analisando as potencialidades de sua ação antisséptica.

Material

- 100 mL de álcool 70%
- 50 mL de álcool 96%
- 3 mL de glicerina
- 1 mL de carbopol 940
- hidróxido de sódio
- colher
- batedor de ovos
- peneira
- copo plástico pequeno
- vasilhame plástico com capacidade para 500 mL
- cronômetro
- fita-crepe

Como fazer

Parte I

ATENÇÃO!
O álcool é inflamável. Tenham cuidado na hora do preparo e mantenham o produto longe do alcance de fonte de calor.

1. Coloquem a peneira sobre o copo e peneirem o carbopol para desfazer os grumos. Usem a colher para pulverizá-lo por completo.
2. No recipiente grande, coloquem o álcool 70% e, enquanto um integrante agita fortemente com o batedor de ovos, outro despeja o carbopol 940 sob o álcool 70%.
3. Quando o álcool 70% e o carbopol 940 estiverem bem misturados, acrescentem a glicerina lentamente, misturando-a suavemente.
4. Quando tudo estiver bem misturado, acrescentem o hidróxido de sódio. Não há uma quantidade específica; ele deve ser adicionado aos poucos até que se obtenha a consistência desejada do gel.

Parte II

A atividade antisséptica dos álcoois está condicionada à sua concentração em peso ou em volume em relação à água e ao tempo de permanência na superfície. O objetivo esperado para o álcool desinfetante de superfícies é que ele desidrate a parede celular do microrganismo e, desse modo, penetre em seu interior para desnaturar as proteínas. Pensando nisso, observem a ação do álcool nas concentrações disponíveis.

1. Para o teste, delimitem duas áreas de 10 cm^2 da bancada com fita-crepe.
2. Iniciem o cronômetro e distribuam uniformemente uma colher de álcool em gel 70% na área delimitada. Anotem o tempo necessário para que todo o álcool evapore.
3. Repitam o passo 2, utilizando o álcool 96%.

1. Como o álcool em gel é um importante antisséptico, pode ser interessante tê-lo em diferentes apresentações. A forma em gel permite que uma boa quantidade seja carregada em bolsas e mochilas, por exemplo, para que seja utilizado em ocasiões em que a água e o sabão não estejam disponíveis para a higiene das mãos e/ou superfícies. Além disso, o álcool em gel é menos inflamável.

Para concluir

1 **Quais são as vantagens do uso do álcool em gel em comparação ao álcool líquido?**

2 **Pensando na ação antisséptica do álcool em gel, esse composto também é capaz de remover a barreira de gordura da pele humana? Se sim, quais são os efeitos dessa remoção?**
O álcool em gel é capaz de romper a barreira de lipídios da pele e, ao fazê-lo, provoca ressecamento e desidratação.

3 **Qual é a importância do hidróxido de sódio para a formulação do álcool em gel? O que aconteceria se ao álcool fosse adicionada uma grande quantidade de hidróxido de sódio?**

4 **Como o tempo de evaporação do álcool nas duas concentrações, 70% e 96%, está relacionado com a capacidade antisséptica de cada um deles?**

3. O hidróxido de sódio é adicionado para deixar a reação neutra, ou seja, atua como base, aumentando a viscosidade do meio. Caso se adicione hidróxido de sódio em grande quantidade, a solução ficará mais líquida, perdendo a consistência de gel.

4. Se o álcool evaporar muito rápido (álcool 96%), ele não desidratará a parede celular e não conseguirá desnaturar a proteína. Se o álcool evaporar mais lentamente (álcool 70%), terá o tempo suficiente para agir sobre o microrganismo.

Não escreva no livro.

ATIVIDADES

1. a), **b)** e **c)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1 **A riboflavina, também conhecida como vitamina B_2, tem esta fórmula estrutural:**



Essa substância pode ser encontrada em alimentos como brócolis, agrião, aveia e arroz integral. Sua carência pode provocar sangramento das gengivas, ressecamento da pele e estomatite, entre outros problemas de saúde.

a) Determine a fórmula molecular da vitamina B_2.

b) Copie a fórmula estrutural da vitamina B_2 no caderno e circule o grupo amida.

c) Identifique as outras funções orgânicas presentes na vitamina B_2.

2 **Dê o nome das aminas a seguir.**

a) $CH_3 — NH_2$

b) $CH_3 — NH — CH_2 — CH_2 — CH_3$

c) $H_3C — CH_2 — N(CH_2CH_3) — CH_2 — CH_3$

2. a) Metilamina ou metanamina.
b) Metilpropilamina ou N-metilpropan-1-amina.
c) Trietilamina ou N,N-dietiletanamina.

3. d) Resposta variável. Oriente os estudantes a buscar as informações em fontes confiáveis, como periódicos ou artigos sobre saúde.

3 **Observe a fórmula estrutural da benzedrina, apresentada a seguir.**



A benzedrina é uma substância orgânica muito utilizada em moderadores de apetite – compostos que reduzem consideravelmente o desejo de comer e que, por isso, são muito usados no tratamento de obesidade.

a) Escreva a fórmula molecular da substância orgânica benzedrina. $C_9H_{13}N$

b) Pela análise de sua estrutura, é possível afirmar que a benzedrina é uma amina primária, secundária ou terciária? É uma amina primária.

c) Dê o nome da benzedrina de acordo com a nomenclatura oficial da Iupac. 1-fenilpropan-2-amina.

d) Faça uma pesquisa na internet, em livros ou em revistas sobre os efeitos colaterais dos moderadores de apetite, e se eles são atribuídos à benzedrina.

4 **Um importante hormônio sintetizado pelo organismo humano é a adrenalina, também conhecida como**



4. a) $C_9H_{13}NO_3$
b) Fenol e álcool.

epinefrina. A fórmula estrutural da adrenalina é:

a) Qual é a fórmula molecular da adrenalina?

b) Indique outro(s) grupo(s) funcional(is) presente(s) na estrutura da adrenalina.

5 **Alguns ésteres, como os citados a seguir, são usados como flavorizantes pela indústria de alimentos.**

- acetato de pentila: sabor de banana
- acetato de etila: sabor de maçã
- acetato de octila: sabor de laranja
- acetato de propila: sabor de pera

5. a), **b)**, **c)**, **d)** e **e)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Escreva a fórmula estrutural do acetato de propila.

b) Equacione a reação entre ácido carboxílico e álcool que tem como produto o éster usado como essência de maçã.

c) Dê os nomes dos produtos da reação do item anterior.

d) Quais são o ácido carboxílico e o álcool que reagem formando o acetato de octila?

e) Na reação de síntese da essência de laranja, o técnico químico responsável trocou, inadvertidamente, o octan-1-ol pelo octan-2-ol. Qual é o nome do produto formado na reação do ácido etanoico com o octan-2-ol?

6 **Dois compostos isolados, ao serem analisados, deslocam a luz polarizada em direções diferentes: um para a esquerda, o outro para a direita. Quando misturados em quantidades iguais, o desvio da luz polarizada não é observado. Explique esse fenômeno utilizando os termos técnicos estudados neste capítulo.**

7 **Considere um alcano com quatro átomos de carbono. Existe alguma maneira de organizar os átomos a fim de que um dos carbonos tenha atividade óptica?** Nenhum butano pode ter atividade óptica, uma vez que não será obtido um carbono assimétrico em nenhuma das formas de organização possíveis.

8 **O ácido propenoico é usado para a obtenção de resinas acrílicas. Ele tem por características apresentar cheiro irritante e ser solúvel em água e em solventes orgânicos. Comercialmente, é conhecido como ácido acrílico ou ácido acroleico. Dê sua fórmula estrutural.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6. A isomeria óptica é uma propriedade característica de alguns compostos formados por moléculas que não apresentam plano de simetria. Um composto apresenta isomeria óptica quando a sua estrutura e a imagem especular dessa estrutura não são sobreponíveis.

Não escreva no livro.

ESTUDO DE CASO

O DILEMA DO USO DO DDT

O DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) é uma substância sintetizada em laboratório cujas propriedades inseticidas foram descobertas em 1939. Por sinal, o verbo "dedetizar" é derivado dessa sigla. O DDT foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para combater insetos transmissores da malária e do tifo, doenças que atingiam os soldados e a população em geral. Depois da guerra, sua aplicação também foi estendida para a agricultura. Por sua alta eficácia, prolongado efeito residual e baixo custo, foi utilizado em larga escala no mundo todo e se tornou responsável pelo controle mundial da malária entre as décadas de 1940 e 1970. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 15 milhões de vidas foram salvas da morte por malária pelo uso do DDT até os anos 1970 e que mais de 2 bilhões de casos de malária foram evitados.

Paulo Whitaker/Folhapress

Funcionários da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) em serviço de pulverização do DDT na década de 1980, no município de Jaru (RO).

No entanto, os primeiros alertas sobre os riscos associados ao DDT começaram a ser divulgados no início da década de 1960, a exemplo do livro *Primavera silenciosa*, de Rachel Carson, que reportou uma série de efeitos tóxicos do inseticida à saúde humana e animal. Estudos mostram que o DDT está relacionado com um risco aumentado de câncer, alterações no sistema nervoso central e endócrino, redução da fertilidade, malformações congênitas, etc. Seus efeitos à saúde seriam dependentes da dosagem e do tempo de exposição. Além disso, por ter uma meia-vida muito alta e ser lipossolúvel, ele se acumula progressivamente na cadeia alimentar e também pode ser passado de mãe para filhos durante a gestação e a amamentação.

Por esses motivos, seu uso foi banido totalmente na década de 1970 em vários países, mas no Brasil isso só ocorreu em 2009. Em nosso país, seu uso foi proibido na agricultura em 1985, e em campanhas de saúde pública em 1998. Em 2001, um tratado internacional assinado na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes proibiu a produção e o uso de 12 poluentes, entre eles o DDT, pelos países signatários. Mas, por recomendação da OMS, a pulverização de DDT dentro de residências continua permitida para o controle da malária, enquanto não existirem alternativas mais baratas e efetivas.

Reúna-se com os colegas para realizar as atividades a seguir.

1 **O DDT está associado a um fenômeno chamado magnificação trófica, que corresponde ao aumento progressivo da concentração de certas substâncias nos organismos ao longo dos níveis tróficos da cadeia alimentar. Vejam o gráfico a seguir.** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ID/BR



Exemplo de magnificação trófica em uma cadeia alimentar.

Fonte de pesquisa: Miller G. T. *Living in the environment*. Pacific Grove (EUA): Brooks/Cole, 2004. p. 231.

- De acordo com o texto, quais fatores contribuem para a magnificação trófica do DDT e por que isso ocorre? Por que essa característica do DDT representa um risco para a saúde dos seres humanos?

Não escreva no livro.

2. O fato de os insetos se tornarem resistentes ao DDT ao longo das gerações, por si só, já leva a uma diminuição da eficácia do DDT no controle de doenças como a malária, a dengue e a febre amarela, que são transmitidas por esses vetores. Quando isso é combinado com o fato de o DDT causar a morte de predadores naturais de insetos, o impacto é ainda mais grave, pois, além de os insetos criarem resistência ao inseticida, não podem ser controlados por seus predadores. Isso gera um aumento populacional de insetos e, consequentemente, uma incidência maior das doenças transmitidas por eles. Por essas razões, seu uso deve ser controlado.

2 **A magnificação trófica do DDT também pode causar uma grande mortalidade de predadores naturais de insetos. Além disso, insetos mais resistentes a inseticidas tendem a ser selecionados ao longo das gerações por seleção natural. Qual deve ser o efeito desses fatores combinados sobre o uso do DDT a longo prazo e em larga escala como estratégia de controle de doenças transmitidas por insetos vetores, como a malária, a dengue e a febre amarela?**

3 **Observem o gráfico e, em seguida, respondam às questões.**



Fontes de pesquisa: Boletim Epidemiológico. Brasília, DF: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, v. 55, n. 1, 18 jan. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-01; Wada, M. Y. *Situação epidemiológica da malária no Brasil*. Brasília, DF: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/cit/pautas-de-reunioes-e-resumos/2019/novembro/3-a-situacao-epidemiologica-da-malaria_brasil_cit_28-11-2018.pdf. Acessos em: 17 out. 2024.

a) Considerando que o DDT foi usado amplamente no Brasil no controle da malária entre os anos de 1945 e 1997, é possível afirmar que a proibição do DDT levou ao aumento de casos de malária no país? Justifiquem a resposta.

b) Investiguem as possíveis causas do aumento progressivo do número de casos de malária no Brasil a partir da segunda metade da década de 1970 até a década de 1990 e também as possíveis causas de seu declínio a partir de meados dos anos 2000. Criem hipóteses levando em conta os fatores ambientais, sociais e de saúde pública. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

A posição da OMS de aceitar o uso do DDT no controle da malária em países que não dispõem de alternativas mais efetivas e baratas, apesar dos riscos inerentes a ele, baseia-se na análise do balanço entre os riscos e os benefícios do uso do DDT para essa finalidade. Ou seja, a OMS considera que, nessas condições, os benefícios do uso do DDT superam os riscos, uma vez que centenas de milhões de pessoas contraem malária por ano em países pobres, principalmente na África, que concentra cerca de 90% do total de casos da doença no mundo.

Há também que se considerar que a malária é uma doença negligenciada. Doenças negligenciadas atingem populações pobres, principalmente da África, Ásia e América Latina, e recebem poucos investimentos em pesquisa, controle e produção de medicamentos. Enfermidades que acometem populações de baixa renda, por exemplo, não costumam dar retorno financeiro às indústrias farmacêuticas. Apesar de as doenças negligenciadas representarem 11,4% das enfermidades totais, somente 1,3% dos novos medicamentos registrados entre 1975 e 2004 foi desenvolvido para elas.

3. a) Não é possível fazer essa afirmação. Note que, no período de 1997 a 1999, houve um aumento do número de casos de malária no país, fato que já vinha ocorrendo progressivamente desde a segunda metade dos anos 1970, mesmo com o uso do DDT nesse período. Observe também que o número de casos de malária atinge o pico em 1999 e decresce ao longo dos anos seguintes, período em que o uso do DDT já era proibido.

4 **Considerando a posição da OMS sobre a liberação do uso do DDT no controle da malária e os dados apresentados no gráfico, vocês julgam que o uso do DDT no controle dessa doença é apropriado em nosso país? Expliquem por quê.**

4. O uso do DDT para o controle da malária no Brasil não tem se mostrado apropriado, pois mesmo com a proibição de seu uso para o controle da malária em 1998, observamos uma diminuição do número de casos dessa doença nos anos subsequentes. Ou seja, as medidas alternativas ao DDT foram tomadas e se mostraram efetivas, já que o número de casos diminuiu. Mesmo que os números ainda sejam elevados, os dados mostram que existem alternativas ao uso do DDT e que é possível investir mais nelas.

5 **Qual é a opinião de vocês a respeito da liberação do uso do DDT na pulverização de residências em países cuja incidência de malária é muito elevada? Vocês concordam que, nesse caso, os riscos do DDT à saúde dessas populações e ao meio ambiente sejam aceitáveis? Apresentem argumentos para embasar a opinião de vocês levando em conta também o fato de a malária ser uma doença negligenciada.**

5. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

QUESTÕES GLOBAIS

1 **(Enem)**

O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N_2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são microrganismos fixadores de N_2 que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas.

ADUAN, R. E. *et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta.* Planaltina: Embrapa, 2004. (Adaptado.)

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela Alternativa **d**.

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.
e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio.

2 **(UFSC) O esquema abaixo mostra de maneira simplificada o ciclo do nitrogênio na natureza. As letras A, B, C, D e E indicam processos metabólicos que ocorrem neste ciclo.**
Sobre este ciclo, é **correto** afirmar que**

**A resposta corresponde à soma das alternativas corretas. Soma das alternativas corretas: (04) + (64) = 68.



01. o processo mostrado em A é realizado somente por bactérias simbiontes que vivem no interior das raízes de leguminosas.
02. as mesmas bactérias que realizam o processo A realizam os processos D e E.
04. o esquema mostra que produtos nitrogenados originados de animais ou vegetais podem ser reaproveitados no ciclo.
08. o processo mostrado em D constitui uma etapa fundamental no ciclo, chamada de fixação do nitrogênio.
16. as plantas podem se utilizar diretamente da amônia e não dependem do processo que ocorre em C para obter os produtos nitrogenados.
32. o processo mostrado em E indica que os animais excretam a amônia.
64. o nitrogênio é importante para os seres vivos, pois entra na composição molecular dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos.

3 **(UFPA) No composto:**



UFPA. Fac-símile: ID/BR

as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente, iguais a: Alternativa **b**.

a) 5, 2 e 2.
b) 5, 1 e 3.
c) 4, 3 e 2.
d) 3, 3 e 3.
e) 2, 1 e 4.

4 **(Fuvest-SP)**



Na vitamina K3 (fórmula acima), reconhece-se o grupo funcional Alternativa **e**.

a) ácido carboxílico.
b) aldeído.
c) éter.
d) fenol.
e) cetona.

5 **(Cesgranrio-RJ) A substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural de canela.** Alternativa **e**.



Não escreva no livro.

A função orgânica a que pertence essa substância é

a) hidrocarboneto.
b) fenol.
c) éter.
d) cetona.
e) aldeído.

6 (**Uerj**) Os cães conhecem seus donos pelo cheiro. Isso se deve ao fato de os seres humanos apresentarem, junto à pele, glândulas que produzem e liberam ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de pessoa para pessoa, o que permite a animais de faro bem desenvolvido conseguir discriminá-la. Com o objetivo de testar tal discriminação, um pesquisador elaborou uma mistura de substâncias semelhantes à produzida pelo dono do cão.
Para isso, ele usou substâncias genericamente representadas por Alternativa **b**.

a) RCHO.
b) RCOOH.
c) RCH_2OH.
d) $RCOOCH_3$.
e) $RCONH_2$.

7 (**Enem**) Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de para-dodecil-benzenossulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente porque Alternativa **d**.

a) promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente.
b) a hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto.
c) a mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na natureza.
d) a solução de para-dodecil-benzenossulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto.
e) o reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do ambiente.

8 (**UFMG**) Considere as seguintes fórmulas estruturais.
Alternativa **b**.



A alternativa que apresenta, respectivamente, os nomes das funções correspondentes a essas fórmulas é

a) álcool, amina, aldeído, éster.
b) álcool, amina, cetona, ácido carboxílico.
c) aldeído, amida, cetona, éster.
d) éter, amida, aldeído, ácido carboxílico.

9 (**Enem**) O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. Alternativa **b**.

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é

a) CH_3-$(CH)_2$-CH(OH)-CO-NH-CH_3
b) CH_3-$(CH)_2$-CH(CH_3)-CO-NH-CH_3
c) CH_3-$(CH)_2$-CH(CH_3)-CO-NH_2
d) CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CO-NH-CH_3
e) C_6H_5-CH_2-CO-NH-CH_3

10 (**Fuvest-SP**) Dentre as estruturas abaixo, duas representam moléculas de substâncias, pertencentes à mesma função orgânica, responsáveis pelo aroma de certas frutas. Alternativa **d**.



Fuvest-SP. Fac-símile: ID/BR

Essas estruturas são

a) A e B.
b) B e C.
c) B e D.
d) A e C.
e) A e D.

11. As características apresentadas no texto são do ácido antranílico:



11. O ácido antranílico, ao sofrer esterificação com metanol, forma o antranilato de metila e água. Logo, o composto tem a função éster:



11 (**Uerj**) O aromatizante artificial antranilato de metila é utilizado por alguns fabricantes de gelatina de uva. Essa substância deriva do ácido antranílico, que possui as seguintes características:

- é um ácido carboxílico aromático;
- apresenta um grupo amino na posição orto;
- possui fórmula molecular $C_7H_7NO_2$.

Represente a fórmula estrutural plana desse aromatizante e cite a função química a que ele pertence.

12 Considere um ácido carboxílico composto de três átomos de carbono. Suponha que, em uma síntese, você tenha a possibilidade de adicionar ao carbono central outros grupos orgânicos substituintes.

a) Desenhe o isômero óptico mais simples desse ácido que poderia ser sintetizado.
b) Desenhe a estrutura tridimensional e sua imagem especular.
c) Qual seria a nomenclatura do novo composto?

12. a) e **b)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor. **c)** Ácido 2-metilbutanoico.

QUÍMICA, SISTEMA PRODUTIVO E AMBIENTE

Sabões biodegradáveis são um exemplo de como a Química contribui para a preservação ambiental. Esse tipo de sabão se decompõe rapidamente após o uso, minimizando os impactos ambientais.

No Brasil, a produção de sabões utilizando óleo de babaçu, feita por indígenas, é um exemplo de produção sustentável. O babaçu é uma palmeira nativa do Meio-Norte do Brasil e cujas sementes são ricas em óleo, que é utilizado na fabricação do sabão. A produção valoriza o conhecimento tradicional e gera renda para as populações indígenas. Assim, a integração de práticas tradicionais com tecnologias modernas pode servir como modelo para a indústria implementar soluções mais sustentáveis.

OBJETIVOS

- Reconhecer alguns tipos de reações químicas e suas aplicações na produção de diversos produtos industriais.
- Identificar polímeros sintéticos, seus monômeros e aplicações.
- Discutir o impacto do ser humano no meio ambiente.
- Discutir soluções para minimizar o impacto do ser humano no ambiente.

QUESTÕES PARA REFLETIR

1. Por que o uso do sabão de babaçu para realizar atividades nos rios, como tomar banho e lavar roupas, não polui a água?
2. Qual é o impacto ambiental dos sabões convencionais?
3. Cite alternativas ecológicas para substituir embalagens plásticas descartáveis.

1. Porque o sabão de babaçu é biodegradável.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Criança brincando com bolha de sabão no lago Ipa, em Querência (MT). Foto de 2009. ▸

UNIDADE 8

1 Reações químicas na natureza e no sistema produtivo

2 Polímeros sintéticos

3 Gestão de resíduos: práticas e desafios

Renato Soares/Pulsar Imagens

CAPÍTULO 1

REAÇÕES QUÍMICAS NA NATUREZA E NO SISTEMA PRODUTIVO

PARA COMEÇAR

1. De que forma as reações químicas estão presentes em seu dia a dia?
2. É possível obter benefícios a partir das reações químicas e ao mesmo tempo preservar o ambiente?

1. Respostas pessoais. Peça aos estudantes que indiquem situações cotidianas em que eles acreditam que ocorrem reações químicas.

2. Resposta variável. As reações químicas que têm como produtos poluentes, por exemplo, causam danos ao meio ambiente. Espera-se que os estudantes entendam que o ambiente deve ser preservado, e que é preciso adequar as necessidades humanas à preservação.

REAÇÕES QUÍMICAS E A OBTENÇÃO DE PRODUTOS

O alisamento de cabelos é um dos serviços prestados por salões de beleza. Você saberia identificar em que condições esse procedimento seria seguro? Por que, apesar de envolver riscos à saúde, muitas pessoas procuram esse serviço?

O formol é uma solução aquosa com cerca de 45% de metanal (formaldeído). Essa solução costumava ser usada em produtos para alisar os cabelos de modo definitivo. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restringiu a comercialização de formol no Brasil e proibiu seu uso como alisante capilar, visando à proteção da saúde de profissionais e clientes.

Apesar da comercialização restrita, o formol continua sendo vendido de maneira ilegal para ser usado como alisante, pondo em risco a saúde de quem o manipula e a de quem se submete ao alisamento de cabelos.

O metanal é um produto químico de baixo custo. É obtido principalmente do metanol e é usado nas indústrias têxtil, de madeiras, de papel e celulose, bem como em abrasivos, plásticos, resinas e esmaltes sintéticos, tintas e vernizes, adesivos, isolantes elétricos, entre outros.

Além do metanal, diversas substâncias são importantes para o sistema produtivo no Brasil. Uma delas é o etanol (álcool etílico), usado principalmente como combustível. Esse composto é obtido da cana-de-açúcar e, portanto, consiste em uma fonte de energia renovável.

Outro grupo de material amplamente utilizado é o dos metais. O ferro, principalmente na forma de aço, e o alumínio são dois exemplos de metais presentes em nosso dia a dia.

Neste capítulo, você vai estudar algumas reações químicas que permitem a obtenção de produtos importantes.

Em muitos casos, o alisamento de cabelos envolve o uso de produtos que expõem clientes e cabeleireiros a riscos de saúde. Por isso, é muito importante ficar de olho na composição dos produtos utilizados.

Pridannikov/iStock/Getty Images

Não escreva no livro.

PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE ALGUNS METAIS

Os **minerais** são materiais sólidos nas condições ambientes, formados naturalmente por meio de processos físicos, químicos e geológicos. Eles são constituídos de substâncias inorgânicas e apresentam composição química definida.

Os minerais que podem ser explorados economicamente são chamados **minérios**.

A **metalurgia** é a ciência e a tecnologia da extração e da transformação de metais, a partir de seus minérios, e de sua preparação para o uso prático.

Depois da extração, é necessário separar da rocha apenas o minério em que o metal está presente. Geralmente, o minério é triturado e moído. Esse processo reduz o volume de material que será transportado e facilita a extração do metal. A tabela a seguir mostra as fontes minerais do ferro, do alumínio e do cobre. O composto principal de um mineral é aquele que tem o metal de interesse em sua composição. A quantidade do composto principal em um minério varia entre as jazidas.

Andre Dib/Pulsar Imagens

Jazida de ferro localizada em Ouro Preto (MG), em foto de 2024. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de ferro.

PRINCIPAIS FONTES MINERAIS DE ALGUNS METAIS

Metal	Mineral	Composto principal
Ferro	Hematita	Fe_2O_3
Alumínio	Bauxita	$A\ell_2O_3$
Cobre	Calcocita	Cu_2S

Fontes de pesquisa: Museu de Minerais, Minérios e Rochas Heinz Ebert. Disponível em: https://museuhe.com.br/banco-de-dados/; Associação Brasileira de Alumínio. *Bauxita no Brasil*: mineração responsável e competitividade. Disponível em: http://www.abal.org.br/downloads/ABAL_Relatorio_Bauxita_2017_1.pdf. Acessos em: 2 out. 2024.

O minério triturado é submetido aos processos metalúrgicos, nos quais ocorrem as reações químicas para a produção do metal. Esses processos incluem a purificação do minério por meio da retirada das impurezas. Na obtenção de ferro proveniente da hematita (um óxido de ferro), por exemplo, as impurezas, chamadas escória, são separadas do ferro líquido. Por conter silicatos e outros compostos de cálcio, a escória é utilizada posteriormente para a produção de cimento, por exemplo.

A reação de obtenção do ferro metálico a partir do Fe_2O_3 é dada por:

$$Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \rightarrow 2\ Fe(s) + 3\ CO_2(g)$$

Bjphotographs/Shutterstock.com/ID/BR

Amostra de hematita.

www.sandatlas.org/Shutterstock.com/ID/BR

Amostra de bauxita.

O ferro é produzido nos alto-fornos das indústrias siderúrgicas, representado na figura abaixo. A siderurgia é o ramo da metalurgia que lida com a produção do ferro e do aço.



Reinaldo Vignati/ID/BR

O minério de ferro (Fe_2O_3) é adicionado ao alto-forno com o coque (carvão) e o calcário ($CaCO_3$). O carvão sofre combustão incompleta dentro do forno, formando o CO, que reage com o Fe_2O_3. O ferro fundido sai pelo fundo do alto-forno. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Gauto, M.; Rosa, G. *Processos e operações unitárias da indústria química*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. p. 223.

1. A lâmpada de Davy tem uma tela colocada ao redor da chama. O ar e os outros gases formados nas minas podem passar livremente pela malha e chegar à chama, mas os orifícios da tela são muito pequenos para permitir que a chama se propague para o exterior.

Magnésio e sódio

O magnésio pode ser obtido a partir da redução a 2 000 °C do óxido de magnésio com carvão. Como se trata de um equilíbrio, o processo é reversível, sendo necessário o rápido resfriamento do magnésio, o qual diminui a rapidez da reação inversa.

$$MgO + C \rightleftharpoons Mg + CO$$

Atualmente, o método mais utilizado é a reação entre o Mg^{2+} da água do mar e o $Ca(OH)_2$, produzindo o hidróxido de magnésio, $Mg(OH)_2$. Este, por reação com cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), se transforma em cloreto de magnésio ($MgC\ell_2$). Por último, o cloreto de magnésio é submetido a uma eletrólise ígnea, formando magnésio metálico e gás cloro. Veja as equações.

$$Ca(OH)_2(s) + Mg^{2+} \longrightarrow Mg(OH)_2(s) + Ca^{2+}(aq)$$
$$Mg(OH)_2(s) + 2\,HC\ell(g) \longrightarrow MgC\ell_2(s) + 2\,H_2O(\ell)$$
$$MgC\ell_2(\ell) \longrightarrow Mg(\ell) + C\ell_2(g)$$

O sódio metálico, por sua vez, é obtido por meio da eletrólise de uma mistura de 40% de $NaC\ell$ e 60% de $CaC\ell_2$. Essa mistura apresenta temperatura de fusão de 600 °C, menor que a do $NaC\ell$ puro, que é de 801 °C. Além da economia de energia devido à menor temperatura do processo, a pequena quantidade de cálcio formada no cátodo é insolúvel no sódio líquido formado, sendo fácil a obtenção do metal sódio puro.

A célula eletrolítica utilizada no processo industrial é conhecida por célula de Downs. Esse aparato apresenta ânodo de grafita e cátodo de aço e mantém os produtos Na e $C\ell_2$ isolados, evitando a reação explosiva entre eles.

Os processos que ocorrem nos eletrodos podem ser representados por:

Ânodo (+): $2\,C\ell^-(\ell) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2\,e^-$ (semirreação de oxidação)

Cátodo (−): $Na^+(\ell) + e^- \longrightarrow Na(\ell)$ (semirreação de redução)

Cromo e potássio

Atualmente, o metal potássio não é mais obtido industrialmente por eletrólise, dando-se preferência à redução do $KC\ell$ utilizando-se o metal sódio. A reação ocorre a 850 °C entre o sal fundido e o vapor de sódio. A purificação do potássio ocorre em uma torre de fracionamento.

$$KC\ell(\ell) + Na(g) \longrightarrow NaC\ell(\ell) + K(g)$$

O metal cromo de alta pureza é produzido por meio da reação da termita, em que o alumínio em pó é oxidado pelo óxido de outro metal. Nesse caso, o óxido de crômio reage com o pó de alumínio. Esse processo, também conhecido por aluminotermia, libera grande quantidade de energia.

$$Cr_2O_3(s) + 2\,A\ell(s) \longrightarrow A\ell_2O_3(s) + 2\,Cr(s)$$

QUÍMICA E HISTÓRIA

Humphry Davy e a pilha de Volta

Até o final do século XVIII não havia distinção entre o potássio e o sódio. Os químicos acreditavam que o álcali vegetal (K_2CO_3) e o álcali animal (Na_2CO_3) eram o mesmo composto.

Logo no início do século XIX, porém, estimulado pela divulgação dos resultados experimentais sobre a pilha de Volta, o cientista britânico Humphry Davy (1778-1829), professor da Instituição Real de Londres, utilizou pilhas dispostas em série para efetuar a eletrólise de diversos materiais. Em 1807, ele isolou o sódio e o potássio por meio da decomposição da soda cáustica e da potassa cáustica fundidas. No ano seguinte, Davy também conseguiu isolar o magnésio, o cálcio, o estrôncio e o bário.

Em 1812, Davy apresentou à comunidade seus experimentos sobre a produção de um arco voltaico, usando eletrodos de carvão ligados a uma bateria. O arco voltaico, também designado **arco de Davy**, resultou no desenvolvimento das lâmpadas de arco voltaico, utilizadas por muitos anos na iluminação pública, e nas **lâmpadas de Davy** – lâmpadas de segurança utilizadas até hoje por mineiros.

1. Pesquise por que a lâmpada de Davy pode ser usada com segurança pelos mineiros.

Representação sem proporção de tamanho.



AMj Studio/ID/BR

Célula de Downs. Cores-fantasia.

Não escreva no livro.

GALVANOPLASTIA

Muitas peças de metal são revestidas com um metal mais nobre. Esse revestimento, além de mantê-las polidas e brilhantes, protege-as da corrosão. Nos carros antigos, muitos detalhes da carroceria tinham metal cromado, como para-choques e grades dianteiras.

ABBPhoto/iStock/Getty Images

Roda de carro galvanizada (recoberta com camada de zinco metálico).

Atualmente, as medalhas utilizadas para premiação de atletas em diferentes eventos esportivos geralmente são confeccionadas com uma liga metálica mais barata e recebem uma camada do metal apropriado para o acabamento.

O processo utilizado para revestir uma peça metálica com uma camada de outro metal por meio da eletrólise em uma solução aquosa é denominado **galvanoplastia**.

A galvanoplastia é feita com soluções de cátions metálicos que descarregam no cátodo. Nesse caso, a peça a ser recoberta é o próprio cátodo. Essa peça fica imersa em uma solução que contém o cátion metálico apropriado.

Na galvanização do aço, a camada de zinco que recobre o aço galvanizado pode ser feita por eletrodeposição. O zinco atua como protetor catódico, inibindo a corrosão do aço.

A redução dos cátions metálicos presentes em solução sobre a peça metálica é garantida com a aplicação de uma corrente elétrica controlada. O ânodo pode ser um eletrodo inerte ou um eletrodo do metal a ser depositado.

Submetendo-se, por exemplo, uma solução contendo íons $Au^{3+}(aq)$ à eletrólise com eletrodos desse mesmo metal, ocorre simultaneamente a deposição de Au(s) sobre o cátodo e a passagem do ouro metálico do ânodo para a solução sob a forma de íons $Au^{3+}(aq)$, mantendo a concentração da solução constante.

Cátodo (−), redução: $Au^{3+}(aq) + 3\,e^- \longrightarrow Au(s)$

Ânodo (+), oxidação: $Au(s) \longrightarrow Au^{3+}(aq) + 3\,e^-$



AMj Studio/ID/BR

Galvanoplastia do ouro. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Burdge, J. R. *Química*: a ciência central. 9. ed. Pearson Prentice Hall: São Paulo, 2005.

AÇÃO E CIDADANIA

Mineração de pequena escala, impacto ambiental de grande escala

No Brasil, alguns dos maiores problemas ambientais atuais são os relacionados com os impactos da mineração. Os rompimentos das barragens de rejeitos [de mineração] [...], em Brumadinho e em Mariana, foram os que ocuparam o noticiário pelo ineditismo e [...] [pelas] vidas humanas perdidas nos acidentes.

Porém, outro problema menos noticiado, mas não menos grave, é a atividade de mineração realizada de maneira informal e pulverizada na Amazônia, em especial de minerais garimpáveis, como o ouro, a cassiterita, além do diamante e outras pedras preciosas. Tais atividades, realizadas em sua maioria sem licenciamento ambiental ou algum tipo de planejamento prévio que vise mitigar os danos ambientais, acabam por produzir um impacto muitas vezes maior que as atividades realizadas por grandes empresas de mineração.

Geiser, G. C. Mineração de pequena escala, impacto ambiental de grande escala. *Perícia Federal*, Brasília, DF, ano XV, n. 44, p. 18-23, dez. 2019. Disponível em: https://apcf.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Revista_APCF44.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

1. **O texto menciona os rompimentos nas barragens de rejeitos de Brumadinho e Mariana, dois crimes ambientais sem precedentes na história do Brasil. Faça uma pesquisa sobre as ações tomadas após esses eventos e discuta-as com os colegas. Como as mineradoras e o governo estão se articulando para que desastres como esses não ocorram mais? Como o ambiente pode ser recuperado?**
2. **As pessoas que vivem no entorno das minas, como os indígenas, estão sujeitas aos danos das atividades de mineração. Discuta, em grupo, a importância de assegurar aos indígenas o direito de demarcação de suas terras e o que isso representa para a preservação da região amazônica contra as atividades de garimpo.**

1. Resposta variável. É importante estimular a visão crítica dos estudantes. Peça a eles que avaliem, por exemplo, se, na visão deles, as medidas tomadas pelas empresas e pelos poderes públicos foram ou têm sido satisfatórias.

2. Resposta variável. É possível que, durante a discussão, surjam ideias conflitantes. Alguns estudantes podem entender que as áreas demarcadas deveriam ser maiores, enquanto outros podem defender que essas áreas não deveriam existir. Acompanhe os grupos para que os debates ocorram sem conflitos e que todos tenham oportunidade de falar e de refletir sobre a opinião dos colegas.

REAÇÕES QUE ENVOLVEM FUNÇÕES OXIGENADAS

A seguir, serão abordadas algumas reações de funções oxigenadas, seus produtos e em que eles são utilizados.

Obtenção de álcoois

No estudo das reações de compostos orgânicos, procura-se prever qual será o produto principal dessas reações, tomando-se como base a estrutura dos reagentes. Muitas vezes, parte-se também do caminho contrário: conhecendo o produto desejado, os pesquisadores buscam descobrir qual é ou quais são o(s) reagente(s) para produzi-lo.

A química dos álcoois é bastante rica e presente tanto na natureza quanto nos processos industriais. Diversos feromônios (substâncias que permitem que seres vivos se reconheçam e interajam) apresentam o grupo funcional característico dos álcoois (—OH ligado a carbono saturado) em sua estrutura.

Adriano Kirihara/Pulsar Imagens

Usina de açúcar e etanol em Florestópolis (PR). Foto de 2024.

Não escreva no livro.

Métodos de obtenção de álcoois

Álcoois podem ser produzidos de diversas formas, cada uma por meio de determinada classe de reagentes. Na produção de etanol, o processo mais utilizado é a fermentação. Na maioria das vezes, os produtos coletados nos processos de produção de álcoois precisam ser submetidos a um processo de separação, como a destilação, para que o álcool obtido tenha elevado teor de pureza.

Fermentação

Hoje, o etanol é produzido industrialmente em larga escala pelo processo de **fermentação**. Nesse processo, ocorre a transformação do açúcar em etanol. Essa transformação se dá pela ação de microrganismos (sobretudo leveduras do gênero *Saccharomyces*).

A reação da produção do etanol é:

$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow 2\,CO_2 + 2\,\underset{\text{etanol}}{CH_3CH_2OH}$$

Nesse processo, as condições do meio – principalmente o pH, a temperatura e as concentrações de oxigênio, açúcar e nutrientes – devem ser bem controladas de tal modo que o etanol produzido não seja oxidado, o açúcar não seja consumido na reprodução das leveduras e não ocorra proliferação de bactérias nocivas aos microrganismos fermentadores.

Em escala industrial, essas reações são realizadas em gigantescos tanques chamados **fermentadores**. A fermentação do açúcar produz uma mistura que contém aproximadamente 10% de massa de etanol. Após essa etapa, a mistura é pré-separada por filtração, com o objetivo de remover os restos de microrganismos da mistura obtida. Esse filtrado segue para os destiladores e, após sua destilação, obtém-se o álcool hidratado com 96 °GL, ou seja, com 96% de etanol em volume. Nessa concentração, a água e o álcool formam uma mistura chamada **azeotrópica**, impossível de separar por destilação convencional.

Pat Corkery/NREL/US DEPARTMENT OF ENERGY/SPL/Fotoarena

O processo de fermentação que ocorre em tanques fermentadores, como os da fotografia, transforma o açúcar da cana em etanol.

Para obter valores superiores de teor alcoólico – como o álcool anidro combustível (99,6 °GL) adicionado à gasolina – acrescenta-se cicloexano à mistura de álcool e água. Quando o sistema é aquecido, a mistura entra em ebulição a 63 °C, evaporando a água e o cicloexano. O etanol, que entra em ebulição a 78,4 °C, é condensado e retirado pela parte inferior da coluna de fracionamento com um grau de pureza de 99,6%. Esse processo é chamado **destilação azeotrópica**.

Hidratação de alcenos

Além da fermentação, outro método para a produção de álcoois é a reação entre alceno e água em meio ácido, formando álcool, como no seguinte exemplo.

$$\underset{\text{eteno}}{H_2C = CH_2} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{etanol}}{CH_3CH_2OH}$$

Reações de álcoois

Oxidação

O vinho pode ser convertido em vinagre quando entra em contato com o gás oxigênio presente no ar. Essa reação ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o etanol reage com o oxigênio na presença de microrganismos e é convertido em aldeído. Na segunda etapa, esse aldeído reage rapidamente com o oxigênio, dando origem ao ácido etanoico. Veja a seguir.



Em cada etapa, um átomo de hidrogênio é removido do átomo de carbono inicialmente ligado à hidroxila. Na primeira etapa, isso acontece pela formação de uma ligação dupla C=O. Na segunda etapa, isso ocorre pela formação de uma ligação C – O. A oxidação de propan-2-ol, por exemplo, origina propanona e água. Veja a seguir.



Essas reações não ocorrem apenas com oxigênio, mas também com agentes oxidantes, como o dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) e o peróxido de hidrogênio (H_2O_2). Acompanhe o exemplo a seguir.



Acompanhe, na tabela a seguir, o resumo das reações de oxidação de álcoois (R, R_1, R_2 e R_3 representam qualquer cadeia carbônica). A combustão é também uma reação de oxidação de álcoois.

RESUMO DAS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO DE ÁLCOOIS			
Álcool	**Primeira oxidação**	**Segunda oxidação**	**Oxidação total (combustão)**
Primário: $R-CH_2-OH$	Aldeído: $R-C(=O)H$	Ácido carboxílico: $R-C(=O)OH$	$CO_2 + H_2O$
Secundário: $R_1-CH(OH)-R_2$	Cetona: $R_1-C(=O)-R_3$	Não reage	$CO_2 + H_2O$
Terciário: $R_1-C(R_2)(R_3)-OH$	Não reage	Não reage	$CO_2 + H_2O$

Fonte de pesquisa: Bruice, P. Y. *Organic chemistry*. 8. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2015. p. 474-476.

Não escreva no livro.

Desidratação

A desidratação é uma reação que resulta em formação de água. No caso dos álcoois, essas reações podem ser **intramoleculares**, quando há modificação estrutural na molécula e a liberação de uma molécula de água para cada molécula de reagente, ou **intermoleculares**, quando a reação acontece entre moléculas da mesma substância ou de substâncias diferentes, ocorrendo a formação de uma molécula de água para cada duas moléculas de reagentes.

De maneira geral, essas reações ocorrem na presença de ácido sulfúrico concentrado (que é desidratante) e em temperaturas superiores a 100 °C. A desidratação intramolecular produz um alceno com o mesmo número de átomos de carbono do álcool, e a desidratação intermolecular produz um éter.

Por exemplo, a desidratação intermolecular do etanol com ácido sulfúrico a 140 °C leva à formação de etoxietano (éter dietílico).



No caso dos álcoois formados por moléculas com mais de uma hidroxila, a desidratação intramolecular pode resultar no fechamento da cadeia, formando um anel. Por exemplo, o produto desse tipo de reação para o butano-1,4-diol é um éter cíclico muito utilizado como solvente na indústria farmacêutica, o THF (tetra-hidrofurano).



A desidratação intramolecular do etanol na presença de H_2SO_4 concentrado e sob temperaturas acima de 170 °C produz o eteno.



Para cada molécula de álcool, nesse caso, forma-se uma molécula de alceno. O ácido sulfúrico concentrado atua como catalisador e desidratante (remove água do meio reacional).

ATIVIDADE RESOLVIDA

Isopropanol e álcool isopropílico são nomes triviais utilizados para o composto cuja nomenclatura oficial da IUPAC é propan-2-ol. É amplamente utilizado na indústria química, podendo ser empregado em seus mais diversos segmentos, como em tintas, vernizes e lacas, cosméticos, indústrias extrativas de essências e óleos, solvente para limpeza de equipamentos eletrônicos, entre outros. Utilizando-se catalisadores adequados, sob determinadas condições experimentais, é possível obter o álcool isopropílico a partir da reação entre acetona (ou propanona, conforme nomenclatura oficial IUPAC) e hidrogênio, em um processo denominado hidrogenação catalítica.

a) Escreva, utilizando as fórmulas bastões dos compostos orgânicos, a reação que representa o processo de hidrogenação catalítica da acetona.

b) A hidrogenação catalítica da acetona pode ser classificada como uma reação de oxirredução. Indique as variações de Nox dos átomos envolvidos no processo de oxidação e de redução.

Resolução

Observe que o Nox do carbono do grupo funcional carbonila é +2 na acetona e passa a zero no álcool isopropílico. Dizemos, portanto, que ocorreu a redução da acetona. Os dois átomos que constituem o gás hidrogênio passam de Nox zero a +1 no álcool isopropílico. Esses dois átomos de hidrogênio encontram-se representados em vermelho na fórmula estrutural do produto.

a)



b)



Investigando a fermentação

A fermentação é um conjunto de reações químicas que ocorre em organismos vivos. Nesse processo, células de fungos, de bactérias e de animais, como os seres humanos, aproveitam a energia das reações para manter seu funcionamento. Como as condições do ambiente podem influenciar o processo de fermentação?

3. Espera-se que os estudantes percebam que a temperatura da água influencia a taxa de fermentação, assim como a presença ou não do substrato. No entanto, a afirmação é falsa. Quando se compara os frascos 2 e 3, observa-se que um leve aumento na temperatura faz com que a fermentação ocorra mais rápido, mas essa tendência não pode ser generalizada: no frasco 4, onde a água estava a cerca de 100 °C, a reação não ocorreu, mesmo na presença das leveduras e do açúcar. Nesse frasco, a adição da água fervente matou as leveduras e, portanto, não ocorreu a fermentação.

Material

- fermento biológico seco (leveduras)
- açúcar refinado
- adoçante aspartame em pó
- água destilada
- 5 erlenmeyers ou frascos de 50 mL
- balão de festa
- colher de chá
- fonte de calor, que deverá ser manipulada apenas pelo(a) professor(a)
- caneta permanente

Como fazer

1. Organizem-se em cinco grupos. Cada grupo ficará responsável por uma parte do experimento, conforme descrito na tabela a seguir.
2. Adicionem em um erlenmeyer os componentes indicados no quadro abaixo, de acordo com a organização em grupos. Anotem com caneta permanente o número de seu grupo no respectivo erlenmeyer.

Grupo	Água destilada	Fermento biológico seco	Açúcar	Adoçante
1	50 mL em temperatura ambiente	2 colheres de chá	//////////////////////	//////////////////////
2	50 mL em temperatura ambiente	2 colheres de chá	2 colheres de chá	//////////////////////
3	50 mL a 40 °C, morna	2 colheres de chá	2 colheres de chá	//////////////////////
4	50 mL a 100 °C, fervendo	2 colheres de chá	2 colheres de chá	//////////////////////
5	50 mL em temperatura ambiente	2 colheres de chá	//////////////////////	2 colheres de chá

3. Agitem cuidadosamente o conteúdo do erlenmeyer ou do frasco do grupo de vocês e o vedem, utilizando o balão de festa, da maneira como é mostrada na imagem ao lado.
4. Posicionem os erlenmeyers ou frascos sobre uma mesa, de modo que todos do grupo possam monitorar os experimentos ao longo de 20 minutos. No caderno, registrem a aparência de cada frasco a cada cinco minutos.

Mar de Palha/ID/BR

Exemplos de erlenmeyers vedados, contendo a mistura de cada grupo.

5. Enquanto aguardam, elaborem hipóteses sobre o que vai acontecer em cada um dos erlenmeyers ou frascos, sabendo que a levedura realiza fermentação alcoólica.
6. Após 20 minutos, notem a aparência final de cada um dos erlenmeyers ou frascos.

Para concluir

2. O substrato da fermentação é a glicose, presente no açúcar, mas não no adoçante. Isso explica a ausência de fermentação nos frascos 1 e 5, que não contêm glicose.

1 **Qual evidência indica que a fermentação foi realizada pelas leveduras? Justifique.**

Nos frascos onde o balão inflou, ocorreu fermentação, pois um dos produtos da fermentação alcoólica é o gás carbônico.

2 **O que se pode concluir ao comparar os resultados dos frascos 1, 2 e 5?**

3 **É possível afirmar que, na presença do substrato, quanto maior a temperatura da água, mais rápida é a fermentação feita pelas leveduras? Justifique explicando o que pode ter ocorrido no frasco 4.**

Não escreva no livro.

Obtenção e reações de ácidos carboxílicos

Os ácidos nos alimentos

O vinagre, o chucrute, o iogurte e a coalhada são exemplos de alimentos ácidos consumidos há muitos séculos em diversas sociedades.

A origem da palavra vinagre (vinho azedo) esclarece seu processo de obtenção. Quando reage com o oxigênio atmosférico, o vinho azeda devido à oxidação do álcool etílico, gerando ácido acético. Os vinagres comerciais apresentam, geralmente, teor de acidez entre 4% e 6%.



Essa reação ocorre por ação de microrganismos, as bactérias dos gêneros *Acetobacter* e *Gluconobacter*. Essas bactérias necessitam de gás oxigênio para a realização da fermentação acética, por isso proliferam-se na superfície dos vinhos, formando uma camada gelatinosa conhecida como "mãe do vinagre". Para evitar o azedamento dos vinhos, os produtores dessa bebida desenvolveram métodos para a completa vedação das garrafas; um deles é a utilização da rolha, um dos métodos mais eficientes ainda nos dias de hoje.

Os iogurtes (imagem **A**) e as coalhadas são obtidos pelo processo de fermentação do leite, em que o carboidrato nele presente – a lactose – gera, entre outras substâncias, a glicose. Esta, por sua vez, sofre um processo de fermentação no qual microrganismos anaeróbicos obtêm energia por meio de sua transformação em ácido láctico. O microrganismo responsável pela fermentação da glicose é a bactéria *Streptococcus lactis*.



O chucrute é um prato típico alemão servido como acompanhamento de salsichas e carnes de porco. Trata-se do repolho fermentado cortado em tiras (imagem **B**). O repolho é imerso em água com sal para ser fermentado. Os microrganismos presentes nessa mistura produzem, principalmente, os ácidos acético e láctico, além de pequenas quantidades de cetonas, que dão o aroma e o sabor característicos desse prato.

Lilechka75/iStock/Getty Images

Peter Hermes Furian/ Shutterstock.com/ID/BR

Iogurte (**A**) e chucrute (**B**) são alimentos obtidos após o azedamento do leite e do repolho, respectivamente.



AMj Studio/ID/BR

Representação tridimensional da estrutura do ácido láctico (ácido-2--hidroxipropanoico). Cores-fantasia.

Aditivos alimentares

Há séculos, o ser humano faz uso de aditivos alimentares: sal para preservar carnes; ervas e temperos para melhorar o sabor; vinagre para conservar vegetais, como o pepino.

Um aditivo alimentar é qualquer substância adicionada a um alimento visando melhorar suas características. Atualmente, existe uma vasta gama de aditivos alimentares sintéticos. Há regulamentações federais que controlam a quantidade de aditivos usada por produto. Entre os aditivos, podemos citar os ácidos carboxílicos, que são amplamente utilizados como agentes processantes (agentes adicionados durante o processo de fabricação) e como conservantes.

Como agentes processantes, os ácidos carboxílicos são utilizados para controlar a alcalinidade do meio, atuando tanto como tampões quanto como agentes neutralizantes.

Como conservantes, esses ácidos podem atuar como agentes quelantes, antimicrobiais ou antioxidantes.

Os agentes quelantes (ou sequestradores) protegem os produtos de reações enzimáticas, que são responsáveis pela deterioração do alimento. Essas substâncias se ligam a íons como Ca^{2+} e Mg^{2+} (sequestram tais íons), requeridos como cofatores para a atividade enzimática. Um dos compostos mais utilizados para esse fim é o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Agentes antioxidantes, como o ácido cítrico, previnem a oxidação dos alimentos. Já os antimicrobiais, como os ácidos acético e benzoico, impedem o crescimento de microrganismos, como bactérias e fungos.

Métodos de obtenção de ácidos carboxílicos

As principais formas de obtenção dos ácidos carboxílicos são a oxidação com permanganato ou com dicromato em meio ácido e a hidrólise de ésteres.

Oxidação com permanganato ou com dicromato em meio ácido

Um método bastante empregado para a obtenção de ácidos carboxílicos é a oxidação de álcoois, aldeídos, alcenos, alcinos e outros compostos com permanganato de potássio ($KMnO_4$) ou com dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) em meio de ácido sulfúrico (H_2SO_4). Acompanhe alguns exemplos.



2-metilbutan-1-ol → ácido-2-metilbutanoico



4-metilpent-1-eno → CO_2 + ácido-3-metilbutanoico



2-metilpent-2-eno → propanona + ácido propanoico

No caso da oxidação de alquilbenzenos, ocorre a formação do respectivo ácido benzoico. Observe a equação a seguir, que representa a reação de oxidação do metilbenzeno com dicromato de potássio em meio de ácido sulfúrico e sob aquecimento.



metilbenzeno → ácido benzoico

Hidrólise de ésteres

Outro método empregado para obter ácidos carboxílicos é a hidrólise de ésteres. Nessa transformação, que em geral é catalisada por ácidos, ocorre a formação de ácido carboxílico e álcool ou fenol.



éster + água ⇌ ácido carboxílico + álcool ou fenol

Lembre-se de que essa reação é reversível, ou seja, as quatro espécies envolvidas (éster, água, ácido carboxílico e álcool ou fenol) estabelecem um equilíbrio químico.

Não escreva no livro.

Ácidos graxos

Ácidos carboxílicos de cadeia longa, em geral com 12 ou mais átomos de carbono, são chamados **ácidos graxos**. Os ácidos graxos são pouco solúveis em água devido à sua longa cadeia hidrofóbica, formada apenas por átomos de carbono e de hidrogênio.

Os ácidos graxos desempenham uma série de papéis importantes no metabolismo dos seres vivos. Eles provêm de óleos vegetais e de gorduras de origem animal. Os triacilgliceróis sofrem hidrólise em meio ácido, sendo essa a principal fonte de ácidos graxos. Observe um exemplo.



Cada molécula de triacilglicerol pode, por hidrólise, produzir até três ácidos graxos distintos. Nos seres vivos, esses ácidos sempre apresentam número par de átomos de carbono e suas cadeias podem ser saturadas ou insaturadas.

Os ácidos graxos são classificados em saturados, monoinsaturados (apenas uma insaturação na cadeia carbônica) e poli-insaturados (duas ou mais insaturações na cadeia carbônica). Nos seres vivos, as cadeias insaturadas predominantes apresentam conformação *cis*, sendo pouco comum a presença de ácidos graxos de conformação *trans*.


ácido saturado


ácido insaturado *cis*


ácido insaturado *trans*

1. Em geral, os óleos apresentam ácidos graxos não-saturados em sua composição, enquanto as gorduras apresentam ácidos graxos saturados.

2. O consumo em excesso de gordura saturada está relacionado a um aumento da taxa de LDL (lipoproteína de baixa densidade) ou o "colesterol ruim" no sangue. O LDL está relacionado a um aumento de chance de formação de placas em artérias e veias, bloqueando a passagem sanguínea, o que pode levar ao aumento de incidência de infartos e derrames. A recomendação é que a gordura saturada não ultrapasse 10% do conteúdo calórico diário nem 40% do total de gordura consumida.

Teor de ácidos graxos nos alimentos

É bastante comum encontrar nas embalagens de óleos e gorduras o teor (*m*/*V*) de ácidos graxos. Assim, no rótulo de certa marca de óleo de oliva, por exemplo, lê-se: 10% de ácido palmítico ($C_{15}H_{31}CO_2H$), 85% de ácido oleico ($C_{17}H_{33}CO_2H$) e 5% de ácido linoleico ($C_{17}H_{31}CO_2H$).

Considere um azeite que apresenta densidade 0,9 g/mL, em que 100 mL equivalem a 90 g de azeite. A informação do rótulo pode sugerir que, ao comer uma salada temperada com 100 mL de óleo de oliva, por exemplo, o indivíduo esteja ingerindo 90 g desses ácidos na proporção citada. Na verdade, nada disso ocorre. Se assim fosse, o óleo de oliva teria acidez consideravelmente alta, o que é desmentido pelas informações nutricionais desse alimento.

O óleo de oliva contém ésteres de ácidos graxos com glicerol (propano-1,2,3-triol). Ao hidrolisar o óleo de oliva, os ésteres presentes formam os ácidos citados na proporção (*m*/*V*) que o rótulo indica: 10% de ácido palmítico, 85% de ácido oleico e 5% de ácido linoleico.

ROTEIRO

1. Os alimentos são classificados em óleos ou gorduras de acordo com seu estado físico à temperatura ambiente. Como essa classificação se relaciona com a classificação da cadeia carbônica dos ácidos graxos?
2. A recomendação de médicos e nutricionistas é de evitar o consumo de gordura saturada e favorecer o consumo de gordura insaturada. Pesquise qual é a relação entre o consumo elevado de gordura saturada e a taxa de colesterol no sangue. Qual pode ser a consequência desse consumo exagerado?

Nitrub/Stock/Getty Images

Os aromas das frutas são formados por uma mistura de substâncias químicas, como ésteres, ácidos carboxílicos, cetonas, aldeídos, álcoois e hidrocarbonetos (terpenos) em quantidades mínimas, que não alteram significativamente o valor nutricional do alimento.

Obtenção e reações de ésteres

Os aromas de flores e frutas resultam da percepção de um conjunto de substâncias voláteis que atingem nosso sistema olfatório. Elas interagem com as células olfatórias, as quais enviam impulsos que são traduzidos pelo cérebro. Dessa maneira, identificamos os odores que nos cercam.

Os ésteres com cadeia de até dez átomos de carbono, aproximadamente, são voláteis e conferem aroma a muitas frutas. O aroma da maçã madura, por exemplo, é resultado da ação de 130 substâncias já identificadas, entre elas os ácidos carboxílicos, os álcoois e os ésteres, como o acetato de isoamila e o 2-metilbutanoato de etila.



acetato de isoamila



2-metilbutanoato de etila

A indústria de alimentos não consegue obter em laboratório a mesma mistura de substâncias que caracteriza o aroma de maçã. O processo exige investimentos em pesquisas e é economicamente inviável. Para aromatizar gomas de mascar, balas e iogurtes, utiliza-se um éster que imita o aroma de maçã, o acetato de etila, identificado nos rótulos como aromatizante artificial. Claro que isso não convence todos os paladares.

Obtenção de ésteres

O principal método de obtenção de ésteres é pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool, com eliminação de água. Esse processo, chamado **esterificação**, é catalisado pelo ácido sulfúrico.

Na esterificação, o oxigênio que forma a água provém do ácido carboxílico. Essa observação possibilitou o entendimento do mecanismo da reação e do seu comportamento cinético.



A formação do éster encontra-se em equilíbrio com o processo de hidrólise. A variação da temperatura pouco influencia o aumento do rendimento da reação. A esterificação é um processo levemente exotérmico, ou seja, libera energia. Em geral, para o favorecimento da formação do éster, a indústria utiliza um dos reagentes como solvente da reação (grande excesso) e retira a água formada. A escolha do solvente depende do preço e da disponibilidade dos reagentes.

Entre os flavorizantes artificiais obtidos em escala industrial por meio do processo de esterificação, estão o acetato de pentila (aroma de banana), o acetato de isobutila (aroma de morango) e o acetato de octila (aroma de laranja). Vale destacar que todos eles derivam do ácido acético, de odor pungente e irritante, como o do vinagre.

Éster facilmente obtido em laboratório, o acetato de benzila é o principal componente do óleo essencial de jasmim. Por causa de sua síntese, que é barata e acessível, esse odor é bastante utilizado em produtos de limpeza.



ácido acético álcool benzílico acetato de benzila

Não escreva no livro.

Transesterificação

A **transesterificação** é o processo de obtenção de um éster a partir de outro éster. Por esse método, obtém-se um novo éster em apenas uma etapa, sem a necessidade de isolar o ácido carboxílico produzido por meio de uma hidrólise. Em seguida, faz-se a esterificação, utilizando o álcool adequado.

A reação é catalisada por ácidos ou bases fortes. Como também se trata de um equilíbrio, o álcool é empregado como solvente, o que favorece a formação do novo éster.



A transesterificação é o principal método de transformação de óleos e gorduras (triacilgliceróis) em um combustível compatível com o *diesel*, o biodiesel.

Os triacilgliceróis são os principais componentes das gorduras. Consistem em triésteres obtidos da condensação de três ácidos graxos com uma molécula de glicerina.

Em condições apropriadas, é possível obter de óleos vegetais ésteres de ácidos graxos com características físico-químicas semelhantes às do *diesel,* que é derivado do petróleo, com a vantagem de serem biodegradáveis, não corrosivos e menos poluentes (em razão de serem isentos de enxofre) do que o combustível usual. Atualmente, no Brasil e em muitos outros países, o *diesel* comercializado contém um pequeno teor de biodiesel. Em abril de 2023, a mistura de biodiesel no *diesel* foi ampliada de 10% para 12%, de acordo com a Resolução CNPE nº 3/2023, segundo a qual, em abril de 2024, o percentual estava previsto para subir para 13%; em 2025, 14%; e, em 2026, 15%.

Em outros países, a transesterificação de gorduras é realizada com metanol. Entretanto, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel propõe o etanol, derivado da cana-de-açúcar, como o álcool a ser empregado na produção do combustível. O biodiesel obtido da reação de óleos vegetais com etanol já é viável economicamente e tem sido produzido no Brasil.



Além do biodiesel, a transesterificação produz glicerina, produto de alto valor agregado que, depois de isolado e purificado, é vendido para as indústrias de cosméticos e de produtos de limpeza.

Existem no Brasil diversas usinas de processamento do biodiesel (usam-se, para tanto, os óleos de soja, de dendê e de palma) que também reaproveitam resíduos domésticos e industriais de óleo utilizado em fritura.

O biodiesel também pode ser obtido da esterificação de ácidos graxos. A vantagem desse método é o aproveitamento de resíduos resultantes do refino de óleos vegetais.

Rodolfo Buhrer/La Imagem/Fotoarena

Ônibus híbrido, movido a biodiesel e eletricidade, em Curitiba (PR). Foto de 2021.

CIÊNCIA SE DISCUTE

Desenvolvimento e utilização do biodiesel

As crises de petróleo incentivaram o desenvolvimento de processos de transformação de óleos e gorduras em derivados com propriedades físico-químicas mais próximas às dos combustíveis fósseis, visando à substituição total ou parcial destes. De fato, o desabastecimento de petróleo [...] durante a Segunda Guerra Mundial fez com que pesquisadores de diversos países procurassem por alternativas, surgindo, na Bélgica, a ideia de transesterificar óleos vegetais com etanol para produzir um biocombustível, conhecido hoje como biodiesel [...]. Hoje, em países como Brasil, França, Alemanha, Áustria e Estados Unidos, a produção e o uso comercial do biodiesel são uma realidade. [...]

Oliveira, F. C. C.; Suarez, P. A. Z.; Santos, W. L. P. dos. Biodiesel: possibilidades e desafios. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 28, p. 3-8, maio 2008. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc28/02-QS-1707.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

1. Discuta, com dois colegas, vantagens e desvantagens da substituição gradual do *diesel* pelo biodiesel. Compartilhe o resultado da discussão com a turma.

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Propriedades e aplicações de ésteres naturais: gorduras e óleos

AMj Studio/ID/BR

Representação da estrutura tridimensional do triacilglicerol. Cores-fantasia.

Macronutrientes essenciais, os lipídios devem compor de 15% a 30% da nossa dieta, respeitadas as especificidades do metabolismo e o nível de atividade física de cada indivíduo.

As gorduras são misturas de triacilgliceróis, ésteres formados da condensação entre uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos.

Atualmente, os alimentos apresentam rótulos em que o consumidor encontra informações referentes à quantidade de gordura saturada, de gordura monoinsaturada, de gordura poli-insaturada e de gordura *trans* contida em sua composição. O que cada uma dessas classificações significa? As gorduras resultam da mistura de diversas substâncias e são classificadas de acordo com a composição dos ácidos graxos resultantes de sua análise.

Gorduras ricas em cadeias saturadas de ácidos graxos tendem a se solidificar em temperaturas mais altas devido a seu arranjo espacial próximo ao linear. A manteiga, o sebo de porco, a capa de gordura da picanha, a gordura do coco e a manteiga de cacau são exemplos de alimentos com alto teor de gordura saturada e sólidos à temperatura ambiente.

Gorduras ricas em cadeias de ácidos graxos insaturados e poli-insaturados são líquidas à temperatura ambiente. Uma vez que a conformação *cis* predomina na insaturação dos ácidos graxos naturais, a disposição espacial dos respectivos triacilglicerídios dificulta a cristalização da mistura. As gorduras líquidas são denominadas óleos, como os óleos vegetais de soja, milho, oliva (azeite), girassol e os extraídos de peixes como a sardinha.

A tabela a seguir mostra a composição média de algumas gorduras de origem animal ou de origem vegetal.

COMPOSIÇÃO MÉDIA DE ALGUMAS GORDURAS

Exemplos de lipídios	Gordura saturada (%)	Gordura monoinsaturada (%)	Gordura poli-insaturada (%)
Gordura bovina	47	50	3
Manteiga de cacau	59	38	2
Óleo de sardinha	38	12	50
Gordura de coco	92	8	—
Óleo de milho	14	52	34
Azeite de oliva	9	85	6

Fonte de pesquisa: *Tabela brasileira de composição de alimentos*. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: Nepa/Unicamp. Disponível em: https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

Hidrogenação catalítica e gordura *trans*

A consistência do alimento é um fator muito importante para a percepção de sabor durante a mastigação. Um dos segredos do chocolate de boa qualidade, por exemplo, reside no fato de ele derreter na boca; já o segredo do bom sorvete está em sua cremosidade. A presença da gordura e a proporção adequada entre gordura saturada e gordura insaturada são determinantes para a definição da consistência de um alimento industrializado.

Outro fator a ser considerado pela indústria alimentícia é o prazo de validade do produto: como as gorduras insaturadas são mais facilmente oxidadas, os alimentos compostos delas podem ter seu aroma e sabor alterados no vencimento do prazo de validade.

Com a industrialização dos alimentos, surgiu a necessidade de desenvolver um método eficiente de adicionar gordura na preparação das receitas. Essa gordura deveria ser barata e de fácil obtenção, além de apresentar as características físico-químicas adequadas.

DE OLHO NO CONCEITO

Ácidos graxos e gorduras

Os ácidos graxos não ocorrem de forma livre nas células ou nos tecidos. Eles estão ligados covalentemente a diferentes classes de lipídios.

Os lipídios são substâncias oleosas ou gordurosas e, juntamente com proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos, são considerados constituintes essenciais das estruturas biológicas. Os lipídios não são caracterizados por um grupo funcional específico, mas pela baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos.

Os lipídios mais simples e abundantes que, por hidrólise, originam ácidos graxos são os óleos e as gorduras, conhecidos como triacilgliceróis.

Por isso, muitos textos que se referem a gorduras utilizam indistintamente o termo ácidos graxos, sem explicitar a diferença entre eles.

As estruturas provenientes de ácidos graxos presentes nas moléculas de gordura podem apresentar diferentes graus de insaturação, ou seja, podem ser saturadas ou insaturadas, bem como uma delas pode ser insaturada e as demais podem ser saturadas, e vice-versa.

Não escreva no livro.

A solução encontrada foi a hidrogenação de óleos vegetais, como o óleo de milho e o de soja, o que resultou na conhecida gordura vegetal hidrogenada. A reação com o hidrogênio gasoso (H_2) acontece na presença de catalisador de níquel ou de platina em temperaturas próximas a 100 °C. Nessas condições, ocorre a adição do hidrogênio à dupla-ligação.

Hidrogenação do ácido oleico



ácido oleico – insaturado

ácido esteárico – saturado



AMj Studio/ID/BR

Cores-fantasia.



ácido graxo *cis*

ácido graxo *trans*

Entretanto, uma gordura formada apenas por cadeias provenientes de ácidos graxos saturados apresentaria temperatura de fusão muito elevada e, por isso, seria inapropriada para dar a consistência adequada a sorvetes, recheios de bolachas, massa de bolos e biscoitos, entre outros produtos. Assim, o mais comum é optar-se pela hidrogenação parcial, com a adição de hidrogênio em quantidade insuficiente para hidrogenar todas as insaturações existentes.

A ação do catalisador metálico na hidrogenação consiste em promover a interação entre as moléculas do gás hidrogênio e do triacilglicerol, enfraquecendo a ligação H — H e a ligação π (C = C). Com a hidrogenação parcial, observa-se a formação de isômeros *trans*, das cadeias insaturadas, substância incomum na natureza. A gordura vegetal hidrogenada obtida por esse método resulta em uma mistura de gordura saturada, insaturada *cis* e *trans*.

O aumento no consumo de alimentos industrializados é resultado da menor disponibilidade de tempo para o preparo das refeições. Como consequência, a população vem consumindo mais gordura, o que está relacionado ao aumento de casos de obesidade e à maior incidência de doenças cardiovasculares.

Pesquisas científicas verificaram maior incidência de infartos do miocárdio e derrames em populações que ingerem maiores quantidades de gordura saturada e de gordura *trans*. As organizações de saúde e de nutrição têm se esforçado para alertar a população sobre o malefício do consumo desse tipo de gordura. Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma resolução que determinava a eliminação da gordura *trans* dos alimentos industrializados no Brasil até 2023. A resolução limitava a utilização de gordura *trans* na indústria alimentícia para até 2% do total de gorduras do alimento. Em julho de 2021, essa regra passou a valer para todos os produtos alimentícios no Brasil. Desde 1º de janeiro de 2023, foi proibida a produção, a importação, o uso e a oferta de óleos e gorduras *trans* no Brasil. Produtos alimentícios que contenham esses ingredientes em sua composição não podem mais ser comercializados.

SABÕES

Pannonia/iStock/Getty Images

O sabão é um agente eficaz no combate a doenças, pois, ao lavarmos as mãos com ele, microrganismos e sujeira são eliminados.

A fabricação artesanal de sabão é feita por meio do aquecimento do sebo (gordura animal) com cinzas de fogueira. As cinzas contêm alto teor de carbonato de sódio e de potássio, que são substâncias alcalinas. Nesse processo de fabricação, ocorre a hidrólise alcalina dos triacilgliceróis, reação que resulta em uma substância eficiente para remover tecidos mortos e materiais gordurosos, podendo ser igualmente utilizada como agente de limpeza.

Na fabricação em escala industrial, o sabão é obtido por meio da hidrólise alcalina de uma gordura (de origem vegetal ou animal) com hidróxido de sódio ou de potássio.



Nesse processo, obtêm-se glicerina e sais de ácidos graxos, carboxilatos responsáveis pela ação de limpeza do sabão. Essa reação também é conhecida como saponificação. O outro produto obtido – a glicerina (ou glicerol) – é amplamente utilizado na fabricação de produtos cosméticos, em razão de sua viscosidade e grande interação com a água. Muitos sabonetes contêm glicerina, que contribui não só para melhorar sua textura como também para manter a umidade da pele.

Após a reação, a pasta obtida é neutralizada, e o sabão, depois de isolado, é prensado com aromatizantes, conservantes e corantes.

Os sais de ácidos graxos apresentam uma característica bastante interessante, pois têm longa cadeia apolar (ou hidrofóbica), formada apenas por átomos de carbono e de hidrogênio, e uma pequena região hidrofílica (de grande interação com a água). As substâncias com essas características (região hidrofóbica e hidrofílica) são denominadas **anfifílicas**.



O estearato de sódio ($C_{17}H_{35}COO^-Na^+$) é uma substância anfifílica. O ânion estearato tem uma parte hidrofóbica, formada apenas por átomos de C e H, chamada cauda, que interage mais facilmente com solventes apolares; já a região hidrofílica, denominada cabeça, tem mais afinidade com solventes polares (como a água). Uma espécie química anfifílica típica apresenta uma cabeça polar e uma cauda apolar.

A ação de limpeza do sabão depende da interação dele com a água, ao formar uma mistura capaz de remover gorduras e outras substâncias insolúveis nesse meio.

Ação tensoativa de sabões e detergentes

Ao interagir com a água, os sais de ácidos graxos se dissociam, formando ânions que são hidratados pelas moléculas do solvente. A longa cadeia, porém, apresenta fraca interação com a água, e o material não é solúvel em meio aquoso. Por causa desse comportamento duplo diante da interação com o solvente, as moléculas **anfifílicas** organizam-se em meio aquoso de modo peculiar.

Não escreva no livro.

Muitas espécies químicas localizam-se na superfície, com a parte hidrofílica interagindo com a água, e a cauda hidrofóbica em contato com o ar, fora da solução. Essa disposição das partículas explica por que os sabões são **tensoativos** (ou **surfactantes**), ou seja, os sabões são capazes de modificar (reduzir) a tensão superficial da água. A água com sabão tende a penetrar melhor nos tecidos e formar gotas menores.

Outras partículas se organizam no interior da água em estruturas conhecidas como **micelas**, espécies anfifílicas com formato esférico e constituídas de partes hidrofóbicas e cabeças hidrofílicas. As partes hidrofóbicas das micelas ficam no interior delas, sem interagir com o solvente, enquanto as cabeças hidrofílicas se mantêm na superfície, interagindo com a água. As micelas são estruturas dinâmicas e, mesmo em situação de equilíbrio, formam-se e desorganizam-se continuamente.

Ilustrações: AMj Studio/ID/BR



Representação do comportamento de moléculas anfifílicas em meio aquoso. Cores-fantasia.

3. Uma molécula de sabão apresenta uma extremidade hidrofílica (polar), que se dissolve em água, e uma extremidade hidrofóbica (apolar), que se dissolve em óleos e gorduras. Essa característica permite que as moléculas de sabão envolvam partículas de óleo e gordura, formando micelas, em que as extremidades hidrofóbicas se agrupam em torno da gordura, enquanto as extremidades hidrofílicas interagem com a água.

Substâncias formadas por partículas hidrofóbicas, como as gorduras depositadas nos tecidos ou na pele humana, podem ser solubilizadas no interior das micelas, que formam emulsões coloidais com a água, mantendo a gordura dispersa. Assim, basta esfregar o objeto a ser limpo com água e sabão para facilitar a interação do tensoativo com a gordura.

Durante o século XX, os detergentes foram desenvolvidos para substituir a gordura como matéria-prima dos tensoativos. Esses produtos também se caracterizam por terem uma longa cadeia hidrofóbica e uma pequena região hidrofílica. Os detergentes apresentam o mesmo comportamento em água que os sabões, mas sem o ânion carboxilato. São classificados em aniônicos, catiônicos, não iônicos e anfóteros. Observe a tabela abaixo com os diferentes tipos de tensoativos.

ROTEIRO

3. Descreva como a estrutura das moléculas de sabão pode explicar sua capacidade de atuar como agente de limpeza.

Tipo de tensoativo	Usos	Exemplo
Aniônico	xampus, detergentes líquidos	
Catiônico	condicionadores, amaciantes de roupas	
Não iônico	detergentes em pó	
Anfótero	xampus infantis, que não ardem ao entrarem em contato com os olhos	$CH_3(CH_2)_{11}N(CH_3)_2^{+}CH_2COO^{-}$

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

CIÊNCIA DOS AROMAS: OS SEGREDOS POR TRÁS DO GOSTO DA SUA COMIDA

Annick Vanderschelden Photography/Moment/Getty Images

A função do aromista é tornar o aroma sintético o mais próximo possível do natural. Esses aromas são formados por uma mistura de substâncias químicas, em quantidades mínimas, que não alteram significativamente o valor nutricional do alimento.

Na virada do século 20, quando o estudo da química por trás dos alimentos começou a ganhar corpo, surgiram os primeiros aromas sintéticos: tentativas de imitar, em laboratório, os voláteis mais marcantes no sabor e no odor dos alimentos.

[...]

O aumento no consumo de alimentos processados, que precisavam manter o mesmo gosto e frescor após longos períodos de transporte e estoque, ajudou a indústria de aromas a se estabelecer. Mas um dos pontos-chave para a profissão foi a invenção, na década de 1950, das primeiras máquinas comerciais de cromatografia gasosa. [...]

Um aroma artificial já não precisava imitar a natureza por meio de tentativa e erro: o aromista podia separar seus "ingredientes", provar combinações e decidir quais misturas reproduziam de forma mais agradável o sabor que ele pretendia dar à comida.

Encontrar o aroma mais equilibrado, adequado e economicamente viável em meio a mais de 3 mil ingredientes e fórmulas químicas exige bastante pesquisa [...].

Linha de montagem

[...] Eles são, tradicionalmente, divididos em dois grupos: os aromas naturais e os sintéticos. Os [aromas] naturais não precisam vir totalmente prontos da natureza. Vale fermentar, destilar, concentrar óleo. Só não pode transformar o ingrediente com reações químicas em laboratório.

O extrato de baunilha, por exemplo, é obtido a partir da fava seca da flor de uma orquídea. Mas só 2% de uma fava natural pode ser convertida em extrato. Acontece que uma única molécula é a principal responsável pelo aroma característico da baunilha: a vanilina.

E ela é facilmente produzida em laboratório. A partir do cravo-da-índia, isola-se uma substância chamada eugenol. Oxidado, ele se torna vanilina, a baunilha sintética. Sintética. Mas não exatamente "artificial". Essa classificação vale só para a produção de moléculas impossíveis de encontrar na natureza.

É o caso da etilvanilina, uma criação 100% humana. Ela dá gosto de baunilha por um terço do preço da vanilina [...]. Mas não basta um único ingrediente para fazer o trabalho. Um composto isolado sempre traz uma experiência sensorial mais linear e menos complexa do que um extrato totalmente natural.

O aromista, então, precisa criar camadas com a sua matéria-prima. "Um bom aroma de melancia não pode ser feito só de matérias-primas presentes na polpa. A fruta cresce fechadinha, e seus aromas concentram aspectos de cada um dos seus elementos: polpa, sementes, casca. Um aroma autêntico precisa ter tudo isso."

LEONARDI, A. C. Ciência dos aromas: os segredos por trás do gosto da sua comida. *Superinteressante*, São Paulo, 26 jan. 2019. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-dos-aromas-os-segredos-por-tras-do-gosto-da-sua-comida/. Acesso em: 2 out. 2024.

Para discutir **1.** Com o aumento no consumo de alimentos processados, também foi necessária a manutenção do mesmo gosto e frescor após longos períodos de transporte e estoque desses produtos.

1 **Quais necessidades levaram ao desenvolvimento das pesquisas voltadas à produção de aromas? Justifique consultando o texto.**

2 **Segundo o texto, qual é a diferença entre os aromas sintéticos e os aromas artificiais? Qual é o papel do aromista no desenvolvimento desses aromas?**

2. Aromas sintéticos são produzidos em laboratório, mas são moléculas idênticas às naturais. Aromas artificiais, por sua vez, são moléculas inexistentes na natureza.

3 **Em sua opinião, o consumo excessivo de alimentos processados pode prejudicar a saúde? Como? Reúna-se com os colegas para discutir essa questão.**

3. Respostas pessoais. Se julgar oportuno, promova uma discussão com os estudantes sobre o papel do marketing das indústrias alimentícias na produção de aromas e sabores que contribuem para o consumo excessivo de processados, especialmente durante a infância.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 Os ésteres são compostos orgânicos conhecidos por seus aromas agradáveis, que lembram flores e frutas. Essa característica torna essa classe de substâncias muito interessante para aplicação industrial, como na produção de alimentos e de perfumes. Uma importante reação dos ésteres é a hidrólise alcalina. Nessa reação, o éster reage com uma base forte, como o hidróxido de sódio (NaOH), produzindo um álcool e um sal de ácido carboxílico (sabão).

a) Escreva a equação química para a hidrólise alcalina do acetato de etila, identificando o nome das substâncias formadas.

b) O sal orgânico formado como produto apresenta propriedades que permitem caracterizá-lo como sabão? Explique.

Resolução

a) As substâncias formadas são o etanoato de sódio e o etanol.



b) Não. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeias longas (ácidos graxos). A pequena cadeia carbônica não permite a formação de estruturas micelares capazes de emulsificar a gordura.

2 Muitos dos compostos orgânicos utilizados na indústria química para conferir sabor e aroma a alimentos e bebidas são resultado da síntese de compostos orgânicos. Uma das sínteses mais conhecidas nesse meio ocorre a partir da reação entre ácidos carboxílicos e álcoois, conforme ilustrado no esquema a seguir:



a) Reação de esterificação.

a) Qual é o nome desse tipo de reação química?

b) Considere que um químico precise sintetizar a substância 2-metilbutanoato de benzila a partir do processo descrito no enunciado. Dê o nome dos reagentes orgânicos que ele precisa utilizar nesse processo. Álcool benzílico e ácido 2-metilbutanoico.

3 As garrafas de vinho costumam ser guardadas na posição horizontal. Esse procedimento faz com que os poros da rolha de cortiça sejam ocupados pelo líquido, o que impede a entrada de ar e mantém o álcool da bebida livre da ação oxidativa do oxigênio. Qual é o composto orgânico resultante da oxidação total do etanol? 3. O etanol é um álcool primário e, portanto, sua oxidação completa leva à formação do ácido etanoico, também conhecido como ácido acético.

4 O cheiro doce de diversos perfumes provém de substâncias que contêm o grupo funcional álcool em sua composição. Explique por qual motivo o cheiro desses perfumes, caso o frasco não seja devidamente fechado, pode mudar ao longo dos anos.

4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 Apresente as fórmulas estruturais dos reagentes que podem ser utilizados para obter, pelo método de oxidação, os ácidos carboxílicos cujas fórmulas estão representadas a seguir.

a)



b)



c)



d)

5. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6 A região das axilas no corpo humano é quente e úmida, o que favorece a proliferação de microrganismos que liberam, como produtos do metabolismo, substâncias de odores desagradáveis, entre elas os ácidos carboxílicos. Uma das substâncias responsáveis pelo odor desagradável do suor é o ácido 3-metil-hex-2-enoico, representado a seguir.



- Algumas formulações de talcos e desodorantes utilizam em sua composição bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) para combater odores da transpiração. Sabendo que os sais de sódio de ácidos carboxílicos são praticamente inodoros e são menos voláteis que os respectivos ácidos, explique a utilização dessa substância na composição de talcos e desodorantes.

7 O ácido cítrico é um dos principais ácidos orgânicos utilizados na indústria alimentícia e na farmacêutica, entre outras. Isso se deve às propriedades do ácido cítrico, como atoxicidade, palatabilidade (ser

6. Por se tratar de um sal com propriedades básicas, o bicarbonato de sódio neutraliza os ácidos formados na transpiração, formando sais de sódio (inodoros), gás carbônico e água.

agradável ao paladar) e tamponamento. Os compostos derivados desse ácido também são amplamente utilizados. O citrato trissódico e o citrato tripotássico, por exemplo, são empregados na medicina para evitar a coagulação do sangue; já o citrato de cálcio é utilizado como conservante de alimentos. O citrato de trietila é um agente plastificante atóxico usado em embalagens plásticas de alimentos. A partir do ácido cítrico, representado abaixo, proponha reações que produzam os derivados desse ácido, citados nesta atividade.



7. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

8 **O biodiesel é constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos obtidos da reação de transesterificação de óleos vegetais, também denominados triacilgliceróis. Considere o triacilglicerol representado a seguir.**



8. a) e **b)** Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

a) Represente as fórmulas estruturais dos ésteres metílicos obtidos na reação desse triacilglicerol com o metanol.

b) Que outro produto é obtido nessa reação? Represente sua fórmula estrutural.

9 **Leia o texto a seguir.**

[...] O cálcio é o quinto elemento mais abundante da Terra. [...] O cálcio metálico é usado para eliminar gases residuais em tubos de vácuo e como agente redutor na preparação de metais como tório, urânio, zircônio etc. É usado também como desoxigenador, dessulfurizador e descarbonizador de várias ligas metálicas; encontra usos como componente de ligas de alumínio, de berílio, de cobre, de chumbo, de magnésio, e outras.

Os compostos de cálcio são usados na fabricação de uma enorme variedade de produtos que vai de tintas a fertilizantes. Muitos processos industriais envolvem o uso de óxido de cálcio; por exemplo, a curtição de couros, o refinamento de petróleo etc. Esse composto é preparado pela simples decomposição térmica do carbonato de cálcio, $CaCO_3$. Uma vez hidratado, o CaO forma a cal hidratada, cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta branca de baixo custo para pintar paredes e meio-fio de ruas. [...]

Peixoto, E. M. A. Cálcio. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 20, nov. 2004. Seção Elemento químico. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc20/v20a12.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

- Escreva as equações balanceadas da decomposição térmica do carbonato de cálcio e da hidratação do óxido de cálcio.

9. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

10 **Leia o texto a seguir.**

Um detergente é qualquer composto que pode ser utilizado como agente de limpeza. Embora o sabão seja um detergente, esse termo geralmente é usado para designar os substitutos sintéticos do sabão. O nome genérico para essa classe de compostos é "agentes tensoativos". Assim, agente tensoativo é qualquer composto que reduz a tensão superficial da água, permitindo que óleos e gorduras possam ser emulsionados.

Barbosa, A. B.; Silva, R. R. Xampus. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 2, p. 3, nov. 1995. Seção Química e sociedade. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/quimsoc.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

- Indique, entre as fórmulas representadas a seguir, aquelas cujas características estruturais permitem que elas atuem como agentes tensoativos. Justifique.

a) 

b) 

10. As estruturas **b**, **c** e **e** são tensoativos. A estrutura **a** é um álcool, e a estrutura **d** é uma cetona.

c) 

d) 

e) 

11. **Para identificar três diferentes compostos orgânicos, que contêm apenas o grupo funcional álcool, utilizou-se um forte agente oxidante (permanganato de potássio, $KMnO_4$) em três frascos separados, cada um contendo um dos compostos a ser identificado. No primeiro frasco, observou-se redução no valor do pH. No segundo frasco, observou-se que ocorreu reação; porém, não houve redução significativa no valor do pH; já no terceiro não se observou reação. O que pode ser concluído sobre cada um desses três compostos?**

11. No primeiro frasco, havia um álcool primário, pois a oxidação total gerou um composto com características ácidas, ou seja, um ácido carboxílico; no segundo, um álcool secundário, pois houve reação, mas sem a produção de ácidos carboxílicos. No terceiro frasco, havia um álcool terciário, visto que não ocorreu oxidação.

Não escreva no livro.

POLÍMEROS SINTÉTICOS

2. Resposta pessoal. Os estudantes podem citar, por exemplo, as garrafas PET e os copos plásticos.

PLÁSTICOS

3. Como a maioria dos plásticos demora centenas de anos para se decompor, seu descarte inadequado causa a poluição do solo e das águas.

Os seres humanos convivem com polímeros desde sempre, uma vez que as proteínas, o DNA e os polissacarídeos presentes em nosso organismo são exemplos de polímeros naturais (biopolímeros). Já os plásticos, borrachas, tintas e vernizes, que fazem parte de nosso dia a dia, são exemplos de polímeros sintéticos.

O surgimento do plástico no século XX mudou a maneira como o ser humano se relaciona com a forma de embalar. Por muitos séculos, a madeira foi usada como principal material de embalagem, seguida pelo papel no início do século XX. No entanto, a popularização do plástico, devido à maior oferta de petróleo, fez com que se passasse a utilizar cada vez mais esse material em sacolas, embalagens de bebidas, na conservação de alimentos, entre outros. Sua versatilidade de usos não foi o único fator de sua popularização, mas também seu baixo custo aliado à sua leveza e alta durabilidade.

O termo "plástico" indica qualquer substância que pode ser moldada no formato que melhor nos convém. Quando nos referimos aos polímeros plásticos, estamos falando de compostos que, em nível molecular, são formados por longas cadeias repetitivas de moléculas obtidas do petróleo, capazes de resistir a condições adversas, como altas pressões e/ou temperaturas.

Industrialmente, esses polímeros podem ser classificados em duas categorias: termoplásticos, quando permitem ser deformados, fundidos e remodelados inúmeras vezes sem que sua qualidade se perca (como o PET, polietileno tereftalato); e termofixos, quando não podem ser aquecidos e remodelados sem que sejam degradados (como o EVA, polietilenoacetato de vinila).

PARA COMEÇAR

1. Qual é a principal diferença entre os polímeros naturais e os polímeros sintéticos?
2. Cite exemplos de polímeros sintéticos presentes em sua comunidade escolar que podem ser reciclados.
3. Quais são os problemas causados ao meio ambiente pelos plásticos?

1. Polímeros naturais são produzidos por organismos vivos, enquanto polímeros sintéticos são produzidos em laboratório, artificialmente.

A utilização de polímeros plásticos trouxe versatilidade, leveza e menor custo para a produção de embalagens.

Não escreva no livro.

MONÔMEROS E POLÍMEROS

Quando as cadeias de átomos de carbono em compostos orgânicos adquirem grandes comprimentos, elas formam macromoléculas que podem conter de centenas a milhares de átomos. Um **polímero** (do grego, *poli*, "muitas", e *meros*, "partes") é uma macromolécula formada por cadeias (ou redes) de pequenas unidades menores, chamadas de **monômeros**, que se repetem ao longo de sua estrutura.



O cloreto de polivinila (PVC), bastante utilizado na construção civil, é um dos polímeros sintéticos mais produzidos no mundo.

Bowonpat Sakaew/iStock/Getty Images

OSABEE/Shutterstock.com/ID/BR

Estúdios de gravação utilizam espumas de poliuretano para isolamento acústico do ambiente.





AMj Studio/ID/BR

Representação da estrutura simplificada de um polímero, em que *n* indica que o monômero se repete várias vezes na cadeia. Cores-fantasia.

A união de muitas unidades de monômeros para formar uma molécula maior chama-se **polimerização**. No cloreto de polivinila (PVC), por exemplo, o monômero é o cloreto de vinila $\left(-CH_2-\underset{C\ell}{\underset{|}{CH}}-\right)$, que se repete ao longo da estrutura.

Dependendo da estrutura química do monômero, de sua quantidade por cadeia e do tipo de ligação covalente formada, podemos classificar os polímeros sintéticos em: termoplásticos, termofixos, elastômeros (borrachas) e fibras.

AÇÃO E CIDADANIA

Riscos da queima de poliuretano

[...] o especialista em química forense e orgânica Miguel Dabdoub [...] garante que o envenenamento químico que matou os frequentadores da boate [Kiss, em Santa Maria (RS), em 27/1/2013] foi devido à ação de várias substâncias tóxicas formadas em decorrência da degradação térmica do poliuretano [...], que é a espuma utilizada no isolamento acústico da boate. [...]

[O especialista] alerta que essas substâncias são muito mais letais que o próprio monóxido de carbono, e a inalação, em determinadas concentrações, pode matar em [...] minutos.

[...] Para ele, nessa situação, os gases oferecem mais perigo que o próprio fogo. [...]

Stella, R. Professor da FFCLRP alerta para riscos da queima de poliuretano. USP, 1º fev. 2013. Disponível em: http://www5.usp.br/22161/professor-da-ffclrp-alerta-para-riscos-da-queima-de-poliuretano/. Acesso em: 16 out. 2024.

A espuma de PU [poliuretano] pode queimar se exposta a uma chama aberta formando CO_2 e óxidos de nitrogênio. Em um ambiente fechado, quando o teor de oxigênio no ar diminui, é favorecida a formação [de] CO e traços de cianeto de hidrogênio (HCN), também conhecido como ácido cianídrico ou gás cianídrico.

A ação tóxica do HCN deve-se à sua capacidade de [se ligar ao íon férrico e] inibir a enzima citocromo oxidase, fundamental para as células consumirem o gás oxigênio transportado pelo sangue. O íon cianeto provoca, então, a parada da respiração celular. [...]

Vilar, W. Gases gerados na queima da espuma flexível de poliuretano, 2014. Disponível em: https://vibrasom.ind.br/wp-content/uploads/2023/04/gases.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

1. Pesquise e discuta com os colegas quais medidas poderiam ter evitado o incêndio em questão e as suas consequências.

1. Resposta pessoal. Pode-se citar: fiscalização e cumprimento das normas do corpo de bombeiros; uso de proteção antichama nas espumas acústicas; sinalização adequada e liberação das saídas de emergência; equipamentos de combate ao fogo funcionais e em quantidade adequada; treinamento de funcionários para esse tipo de situação; etc.

Não escreva no livro.

TIPOS DE POLÍMEROS

Homopolímeros e copolímeros

Além da classificação em natural ou sintético, outro critério de classificação dos polímeros baseia-se nos tipos de monômero envolvidos em sua formação. Assim, são denominados **homopolímeros** aqueles obtidos de um único tipo de monômero, e **copolímeros** os obtidos de dois ou mais tipos de monômero.

Nos copolímeros, os monômeros podem se ligar formando padrões regulares ou irregulares. Por exemplo, de acordo com as condições em que a reação for realizada, dois monômeros diferentes podem se alternar regularmente ou se dispor ao acaso (figura **A**). Blocos de um monômero também podem ser introduzidos em intervalos, em uma cadeia de outro monômero, ou ser inseridos como cadeias laterais.

A forma como os monômeros se organizam e as interações formadas entre eles conferem as propriedades e aplicações do polímero produzido. Por exemplo, quanto maior for a força das interações intermoleculares entre as cadeias de um polímero, menor será sua flexibilidade e maior será sua temperatura de fusão. Da mesma forma, quanto maior o número de ramificações, maior será a irregularidade da estrutura do material e menor será a temperatura de fusão.



AMj Studio/ID/BR

Representação de exemplos de homopolímeros e copolímeros. Cores-fantasia.

1. São homopolímeros, pois são obtidos a partir de um único monômero.
2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ROTEIRO

1. O cloreto de polivinila (PVC) e o polietileno (PE) são exemplos de homopolímeros ou de copolímeros? Explique.

2. O polipropileno (PP), utilizado na fabricação de canudos para bebidas, é um polímero de adição cujo monômero apresenta fórmula molecular C_3H_6. Equacione a reação de polimerização do PP.

Polímeros de adição

Polímeros de adição são macromoléculas obtidas por reações sequenciais de adição de monômeros, sem que haja perda de pequenas moléculas no processo. Nesse tipo de reação, geralmente o monômero apresenta insaturações, como os alcenos, ou seja, moléculas com átomos de carbono ligados por duplas-ligações, que, ao serem quebradas, permitem a união sucessiva das moléculas do monômero, gerando um único produto.



monômero: eteno

polímero: polietileno

A formação do polietileno a partir do gás etileno (um dos produtos do refino do petróleo) é um exemplo de polimerização por adição. O polímero obtido é utilizado na fabricação de brinquedos, garrafas e sacolas plásticas. Outros exemplos de polímeros de adição bastante conhecidos são o politetrafluoroeteno (figura **B**), usado como recobrimento antiaderente, e o poliestireno expandido (figura **C**), muito utilizado em embalagens de comida como isolante térmico e proteção anti-impacto.

Dmitry Galaganov/Shutterstock.com/ID/BR



O recobrimento antiaderente usado em utensílios de cozinha é produzido a partir do tetrafluoroeteno.

Kitch Bain/Shutterstock.com/ID/BR



O poliestireno expandido e os talheres descartáveis são produzidos a partir do estireno.

Borracha

Ricardo Azoury/Pulsar Imagens

Extração de látex em Xapuri (AC). Foto de 2022.

A borracha natural consiste em um hidrocarboneto elástico obtido das árvores da seringueira (*Hevea brasiliensis*). Cada árvore produz diariamente cerca de 30 gramas de uma seiva chamada **látex**, que pode ser coletada por meio de ranhuras em seu caule.

Esse polímero natural apresenta características que dificultam seu uso mais amplo. Em temperaturas baixas, nos dias frios, ele é quebradiço e, em temperaturas altas, nos dias quentes, torna-se mole e pegajoso. No entanto, em 1839, Charles Goodyear (1800-1860) desenvolveu o processo de **vulcanização**, que consiste no tratamento da borracha com enxofre em alta temperatura e na presença de catalisador. Durante esse processo, os átomos de enxofre formam ligações entre as moléculas da borracha. Essa nova estrutura, além de mais resistente, não sofre modificações sob diferentes temperaturas.

A resistência adicional da borracha vulcanizada permitiu seu uso em pneus de veículos de transporte, por exemplo.



Ilustrações: AM Produções Gráficas/ID/BR

Os fios pretos representam polímeros de borracha natural não vulcanizada. As cadeias de polímeros desse tipo de borracha podem deslizar umas sobre as outras.

Os fios pretos ligados por átomos de enxofre (S) representam a borracha natural vulcanizada. O endurecimento da borracha ocorre devido às ligações que se formam entre os átomos de enxofre e as cadeias carbônicas do polímero.

A necessidade de produzir materiais mais adaptados às exigências da sociedade moderna culminou na síntese de polímeros artificiais ou sintéticos.

Um tipo de borracha que vem sendo cada vez mais usado é a borracha artificial, conhecida como SBR (do inglês *Styrene Butadiene Rubber*, isto é, "borracha de butadieno estireno"). Atualmente, os pneus dos automóveis são constituídos por porções iguais de borracha natural e sintética.

Em 1931, cientistas produziram uma borracha sintética mais resistente que a natural. Chamada de **neopreno**, ela é obtida por reação de polimerização do cloropreno ($C_4H_5C\ell$).

$$n\ H_2C{=}\underset{\underset{C\ell}{|}}{C}{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow{\text{polimerização}} \left[CH_2{-}\underset{\underset{C\ell}{|}}{C}{=}CH{-}CH_2\right]_n$$

cloropreno (2-clorobuta-1,3-dieno) — neopreno

Wavebreakmedia/Shutterstock.com/ID/BR

Óleos e graxas causam deformações na borracha natural e podem destruí-la. Já o neopreno é resistente à gasolina e, por isso, utilizado em mangueiras de combustível. Outro emprego bem comum é na confecção de trajes térmicos de surfe, mergulho e outros esportes aquáticos.

A roupa de neopreno, um excelente isolante térmico, protege praticantes de surfe da água fria.

Charles Goodyear e a vulcanização da borracha

O jovem Goodyear ficou fascinado com a possibilidade de tornar a borracha imune às mudanças de temperatura [...]. Essa fascinação [...] devorou a saúde de Goodyear e as poucas riquezas que ele e sua família possuíam, entre 1830 e 1839. Durante esse período, Goodyear foi para a prisão de devedores por mais de uma vez; ficou na dependência de familiares para comida e abrigo [...]. Um de seus desastres foi vender ao governo uma grande remessa de malas de correio que haviam sido impregnadas com borracha para torná-las impermeáveis, mas elas se tornaram grudentas e disformes por causa da temperatura antes mesmo de sair da fábrica.

Depois de muitas tentativas [...] ele acidentalmente deixou que uma mistura de borracha e enxofre tocasse um fogão quente. Para sua surpresa, a borracha não derreteu, mas apenas queimou um pouco, como faria um pedaço de couro. Goodyear percebeu imediatamente a importância desse acidente. [...] Goodyear determinou a temperatura ideal e o tempo de aquecimento para estabilizar a borracha. Deu entrada ao patenteamento, [...] processo que ele denominou vulcanização [...].

Goodyear não viveu de maneira feliz mesmo depois de sua descoberta do processo de vulcanização. Ficou envolvido na defesa de sua patente e nunca se recuperou dos grandes débitos que contraíra antes de morrer em 1860.

Roberts, R. M. *Descobertas acidentais em ciências*. 2. ed. Tradução: André O. Mattos. Campinas: Papirus, 2000.

Não escreva no livro.

Polímeros de condensação

Um **polímero de condensação** é formado quando os monômeros, ao reagirem, dividem-se ou liberam uma molécula pequena (comumente H_2O ou um álcool), ou quando o polímero formado contém na cadeia principal outras ligações que as do tipo C — C. Os polímeros de condensação podem ser constituídos de um único tipo de monômero (resultando em um homopolímero) ou de dois tipos diferentes (resultando em um copolímero).

Um exemplo de polímero de condensação é o náilon, um copolímero sintético obtido pela polimerização do ácido hexanodioico (ácido adípico) e do hexano-1,6-diamina (hexametilenodiamina).

O grupo carboxila (—COOH) da extremidade da molécula de ácido adípico pode reagir com o grupo amino (—NH_2) da extremidade da molécula de hexano-1,6-diamina, liberando uma molécula de água.



Uma das extremidades da molécula formada possui um grupo amino (—NH_2), capaz de reagir com outra molécula de ácido adípico. A outra extremidade apresenta o grupo carboxila (—COOH), que pode se unir a outra molécula de hexametilenodiamina. Assim, por meio de reações sucessivas se forma o polímero.



fórmula do náilon 66

Charles D. Winters/Science Source/Fotoarena

Reação do ácido adípico com a hexano-1,6-diamina formando o polímero náilon 66, o qual pode ser removido ao se girar lentamente um bastão de vidro na mistura.

A criação do náilon teve grande repercussão por esse polímero possuir propriedades semelhantes às da seda e poder ser utilizado na fabricação de roupas, cordas, velcro e fios para sutura. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, sua fabricação se voltou para aplicações militares, como a confecção de paraquedas.

Outros exemplos de polímeros de condensação são o silicone, presente em cosméticos, impermeabilizantes e próteses médicas, e o polietileno tereftalato (PET), principal componente da maioria das garrafas plásticas de bebidas.



Aleksandr Ugorenkov/Dreamstime.com/ID/BR

O silicone, usado em próteses médicas, é produzido a partir do dimetilsilanodiol.

Africa Studio/Shutterstock.com/ID/BR

O PET, muito usado na fabricação de recipientes plásticos, especialmente garrafas, é produzido a partir do ácido tereftálico e do etilenoglicol.

Cadeias poliméricas

Joloei/Shutterstock.com/ID/BR

Cada lacre de lata de alumínio vai representar um monômero e será unido a outro por um clipe.

Os polímeros produzidos por organismos vivos são classificados como naturais. Já os produzidos em laboratório, geralmente com compostos derivados de petróleo, são chamados de sintéticos. Independentemente do tipo, como você imagina que a estrutura molecular de um polímero influencia suas propriedades?

Nesta atividade, você e os colegas vão montar diversas cadeias poliméricas com lacres de latas de alumínio e clipes de papel e relacionar as propriedades de diferentes polímeros com o tipo de cadeia.

Material

- clipes de papel
- lacres de latas de alumínio

Como fazer

1. Para montar um polímero com lacres de latas de alumínio e clipes de papel, considere que cada lacre de alumínio é um monômero e o clipe é a ligação entre os monômeros. Em pequenos grupos, montem uma cadeia polimérica linear, ou seja, sem ramificações. Para ligar dois monômeros, enganchem os lacres um no outro utilizando os clipes.
2. Apresentem aos demais grupos a cadeia polimérica que seu grupo construiu, dizendo qual é o tamanho da cadeia, ou seja, quantos monômeros foram conectados. Se a força de atração entre longas cadeias do mesmo tipo é diretamente relacionada com o comprimento delas, discutam quais propriedades físicas essa característica pode afetar.
3. Construam mais uma cadeia linear, semelhante à que já está montada. Utilizando alguns lacres e clipes, conectem as duas cadeias de alguma forma, exceto pelas extremidades. Comparem essa montagem com a dos demais grupos. Todos fizeram da mesma forma? Todos os grupos utilizaram o mesmo número de lacres e de clipes e fizeram o mesmo número de conexões?
4. Analisem os graus de movimentação possíveis entre as cadeias poliméricas. De que maneira as conexões feitas entre as cadeias afetam propriedades físicas como a elasticidade do material? Esse polímero seria mais semelhante à borracha de um elástico de amarrar dinheiro ou à de um pneu?

Para concluir

1 **A união dos lacres com clipes formando uma corrente é análoga à ligação entre os monômeros para formar o polímero. Que tipo de ligação é essa?**

2 **Como você poderia representar um polímero formado por dois tipos de monômero diferentes? Como são chamados esses polímeros?**

3 **Plástico e polímero são sinônimos? Explique.**

4 **Pesquise a estrutura química do bioplástico (produzido a partir do amido) e das garrafas PET (polietileno tereftalato obtido a partir do petróleo). Com base na análise da estrutura química e da solubilidade desses dois polímeros na água, explique por que as garrafas PET são tão resistentes à degradação e acabam permanecendo no meio ambiente por um tempo muito maior que os bioplásticos.**

1. Ligação química covalente.

2. Resposta variável. Polímeros compostos de dois monômeros ou mais são chamados copolímeros.

3. Plástico e polímero não são sinônimos. Todos os plásticos são polímeros, mas nem todos os polímeros são plásticos. A seda, uma fibra natural, e o amido são exemplos de polímeros naturais, que não são classificados como plásticos.

4. Os bioplásticos são materiais degradáveis, pois são polímeros altamente hidrofílicos constituídos de amido (formados por monômeros de glicose), o que favorece a ação de microrganismos como fungos e bactérias. Já os polímeros de polietileno, presentes nas garrafas plásticas, são altamente hidrofóbicos, o que dificulta a ação dos microrganismos na superfície do polímero.

Não escreva no livro.

CIÊNCIA TEM HISTÓRIA

POLÍMEROS MAIS RESISTENTES, BARATOS E VERSÁTEIS

A produção de polímeros sintéticos, até a década de 1950, despertava o interesse industrial, mas apresentava muitas dificuldades, como a necessidade de altas pressões e temperaturas para produzi-los. Mesmo em tais condições, os polímeros demoravam horas para se formar e eram quebradiços e caros. Diante dessas dificuldades, o químico alemão Karl Ziegler (1898-1973) e o químico italiano Giulio Natta (1903-1979) desenvolveram, independentemente, estudos relacionados à obtenção de polímeros em diferentes condições de temperatura e pressão, testando a ação de diferentes catalisadores para aumentar a rapidez das reações.

A síntese do polietileno de alta densidade

Em 1953, Ziegler conseguiu produzir polietileno à pressão ambiente em um período de tempo reduzido. Ao comparar o produto obtido com o polietileno produzido à alta pressão, ele constatou que o novo polímero apresentava maior resistência quando submetido a altas temperaturas, e também maior densidade e rigidez. O produto obtido por Ziegler foi rapidamente aceito na indústria devido ao baixo custo de produção e às suas propriedades, o que deu base para a síntese de novos polímeros.

O papel da estrutura molecular

Na mesma época em que Ziegler desenvolvia suas investigações, Natta dedicava-se a compreender a formação de diversos polímeros produzidos a partir de alfa-olefinas, que são moléculas obtidas principalmente de derivados de petróleo e que possuem uma ligação dupla no carbono alfa. Esses polímeros eram obtidos por processos análogos ao do polietileno de Ziegler. A motivação de Natta era otimizar a produção de polímeros na Itália, tendo em vista que esse país ainda atravessava um período de reconstrução socioeconômica decorrente do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Nesse contexto, Natta dedicou sua atenção em entender a relação entre a estrutura dos polímeros e suas propriedades, pois alguns possuíam estrutura amorfa, enquanto outros apresentavam estrutura cristalina definida. Muitos deles, por exemplo, eram formados pela mesma matéria-prima, mas possuíam propriedades diferentes.

Em seus estudos, Natta separou fisicamente os diferentes polímeros e analisou suas estruturas por meio da análise de raios X, verificando que esses polímeros, mesmo quando derivados de uma mesma matéria-prima, possuíam isômeros, o que justificaria as diferentes propriedades. Indo além, ele notou que os polímeros formados por meio do uso do catalisador eram isômeros específicos e com estruturas mais organizadas.

Ziegler também se preocupou em justificar as diferentes propriedades notadas entre as duas variedades de polietileno conhecidas, que foram atribuídas à diferença estrutural observada entre elas. A variedade produzida em baixa pressão realizava suas ligações de forma linear, facilitando a interação entre as moléculas de sua estrutura, enquanto a produzida a altas pressões apresentava muitas ramificações, dificultando a interação entre as moléculas, o que justificaria sua baixa resistência e sensibilidade ao aumento da temperatura.

O papel do catalisador

Durante suas pesquisas, Ziegler e Natta notaram a importância de investigar os diferentes processos de catálise que permitissem aumentar a rapidez da polimerização nas condições estudadas. Esses estudos os levaram à identificação dos melhores resultados em torno dos catalisadores organometálicos, em especial a mistura de trietil alumínio ou dietil alumínio com cloreto de titânio, conhecido hoje como catalisador Ziegler-Natta.

Natta ainda investigou o mecanismo dessas reações de polimerização, verificando que o catalisador empregado alterava o caminho da reação, tornando-a estereoespecífica, de modo a favorecer a formação dos polímeros com estruturas cristalinas altamente organizadas, o que os tornava mais rígidos, resistentes e densos.

Assim, as investigações de Ziegler e Natta permitiram que a produção de polímeros fosse realizada em um período de tempo reduzido, à pressão e temperatura ambiente, possibilitando uma maior produção com menor custo. Além disso, o conhecimento dos mecanismos de reação e as relações entre a estrutura de um polímero e suas propriedades levaram a um maior controle na qualidade e nas propriedades dos polímeros obtidos, sendo, por isso, uma importante contribuição para a produção industrial de polímeros. Graças a essas contribuições, Ziegler e Natta compartilharam o Prêmio Nobel de 1963.

Fonte de pesquisa: Nobel Prize Outreach AB. The Nobel Prize in Chemistry 1963. NobelPrize.org. Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1963/summary/. Acesso em: 17 out. 2024.

Para discutir

1. Ao desenvolver um método mais barato e rápido para a produção de polímeros, foi possível baratear o custo de produção e produzir mais, além de proporcionar, no caso estudado, a produção de polímeros de melhor qualidade.

1 **Qual foi a importância de se desenvolver um método de produção de polímeros mais rápido e barato?**

2 **Como a investigação sobre um mesmo tema realizada de forma independente por diferentes pesquisadores pode contribuir para o desenvolvimento científico?**

2. Ao pesquisar um mesmo tema, diferentes pesquisadores podem ter motivações e objetivos distintos de pesquisa. Isso, por sua vez, os leva a investigar diferentes aspectos do tema em questão, proporcionando observações e resultados experimentais complementares entre si, o que, consequentemente, promove uma visão mais ampla sobre o tema estudado.

Não escreva no livro.

RECICLAGEM DE MATERIAIS PLÁSTICOS

A ampla utilização dos plásticos se deve, principalmente, à sua estabilidade e resistência à corrosão e ao ataque de bactérias e substâncias químicas. Entretanto, essas características também podem ser consideradas problemáticas, se pensarmos que sua degradação natural pode levar de décadas até centenas de anos, de modo que os resíduos plásticos tendem a se acumular no meio ambiente.

O descarte inadequado desse material pode resultar em poluição dos oceanos, rios e solos, e sua queima pode liberar gases tóxicos na atmosfera. Por isso, a destinação adequada dos resíduos para a reciclagem e o uso de produtos retornáveis e reutilizáveis é tão importante.

Representação sem proporção de tamanho.

Tartila/Shutterstock.com/ID/BR

Fonte de pesquisa: Coltro, L.; Gasparino, B. F.; Queiroz, G. C. Reciclagem de materiais plásticos: a importância da identificação correta. Revista *Polímeros: Ciência e Tecnologia*, v. 18, n. 2, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/po/a/NdHp5H75XM75JqgV6pqccPr/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 out. 2024.

Microplásticos

Atualmente existe uma enorme variedade de plásticos, e cada tipo possui uma temperatura de fusão diferente. Por essa razão, uma das etapas da reciclagem consiste em separar os plásticos segundo a categoria a que pertencem. Para facilitar essa separação e tornar o material mais homogêneo para o processo de reciclagem, a Sociedade da Indústria de Plásticos (SPI, sigla em inglês) estabeleceu, em 1988, uma nomenclatura de código para os plásticos identificando o material utilizado em sua fabricação.

A maioria dos materiais plásticos pode ser reutilizada e/ou reciclada. Por outro lado, produtos como absorventes íntimos e fraldas infantis são quase impossíveis de reciclar. Por esse motivo, é crucial que a sociedade repense sua forma de consumo e passe a dar preferência a materiais biossustentáveis.

A degradação dos materiais plásticos não significa que eles desapareçam completamente na natureza. Muitos se fragmentam em pedaços menores, formando os **microplásticos**, que podem se acumular e persistir no meio ambiente por longos períodos, impactando negativamente os ecossistemas.

O aumento da conscientização sobre o uso responsável do plástico levou alguns fabricantes a buscar materiais biodegradáveis, impulsionando a produção de polímeros à base de amido vegetal, celulose, outros polissacarídeos e até lignina. Os chamados **bioplásticos** decompõem-se muito mais rapidamente do que os plásticos comuns e podem ser facilmente degradados em usinas de compostagem, por ação de microrganismos sob condições controladas. Porém, vale lembrar que, da mesma forma que o plástico comum, é essencial que seu descarte seja feito corretamente para que o bioplástico também não se acumule na natureza em condições que impeçam sua rápida degradação.

PARA EXPLORAR

Leia

Microplásticos: o longo legado deixado pela poluição plástica

Reportagem da Organização das Nações Unidas (ONU), publicada em abril de 2023, sobre os impactos causados pela poluição por microplásticos.

Disponível em: https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/microplasticos-o-longo-legado-deixado-pela-poluicao-plastica. Acesso em: 17 out. 2024.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **Considere as estruturas do polietileno e da fibra sintética de aramida, polímero utilizado na fabricação de coletes à prova de balas. Qual desses polímeros você espera que tenha maior temperatura de fusão? Justifique.**



polietileno



aramida

Resolução

A temperatura de fusão depende, dentre outros fatores, das interações moleculares, as quais, por sua vez, dependem da estrutura da substância. A fibra sintética de aramida contém em sua estrutura química átomos de oxigênio e nitrogênio que são capazes de formar ligações de hidrogênio. Já no caso do polietileno, as interações que predominam são mais fracas (forças de London), geralmente associadas a temperaturas de fusão mais baixas. A fibra sintética de aramida, portanto, deve ter maior temperatura de fusão quando comparada à do polietileno.

2. O produto dessa reação é um copolímero de adição obtido pela reação de diferentes monômeros.

2 **Em determinadas condições, o eteno ($CH_2=CH_2$) e o propileno ($CH_2=CH-CH_3$) reagem formando o seguinte polímero.**



Classifique o produto dessa reação.

3 **A poliacrilonitrila, obtida pela reação de polimerização da acrilonitrila (propenonitrila), é um polímero muito utilizado na indústria têxtil como fibra sintética. Complete a reação de polimerização a seguir, indicando o produto pela sua fórmula estrutural, com pelo menos três monômeros unidos. Em seguida, responda: Que tipo de polímero foi formado?**

acrilonitrila



4. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4 **Nos dias mais frios, a borracha natural fica quebradiça e, nos dias mais quentes, mostra-se mais pegajosa. Para resolver esse problema, Charles Goodyear desenvolveu a vulcanização da borracha. Nesse processo, a massa viscosa obtida do látex é aquecida com enxofre, originando a borracha vulcanizada, que, além de suportar melhor as mudanças de temperatura, é bastante elástica e resistente a atritos.**

As propriedades da borracha vulcanizada decorrem das ligações de enxofre entre duas ou mais cadeias poliméricas.

Dada a estrutura de uma cadeia polimérica vulcanizada, desenhe duas dessas cadeias unidas pelas ligações entre os átomos de enxofre.



3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

5 **Algumas colas do tipo "cola-tudo" são polímeros sintetizados a partir do monômero cianoacrilato de metila. Escreva no caderno a reação de polimerização a seguir, indicando o produto pela sua fórmula estrutural, com pelo menos três monômeros unidos.**



cianoacrilato de metila

5. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

6 **O látex obtido da seringueira, depois de escoado, origina a borracha natural, uma substância viscosa cuja fórmula estrutural é:**



Indique a fórmula estrutural do monômero da borracha natural.

6. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7 **O polimetilmetacrilato é um polímero de adição utilizado para fabricar materiais moldados, janelas e globos para lâmpadas. Sua fórmula estrutural é:**



polimetilmetacrilato

Qual é a fórmula estrutural do monômero a partir do qual o polimetilmetacrilato é formado?

7. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

1. Espera-se que os estudantes reconheçam que melhorar a infraestrutura de reciclagem local e regulamentar a importação de e-lixo são medidas essenciais para mitigar seus impactos negativos, mas a solução duradoura requer, sobretudo, um regramento rigoroso do comportamento dos países exportadores.

GESTÃO DE RESÍDUOS: PRÁTICAS E DESAFIOS

2. Os estudantes devem explorar como o descarte inadequado de lixo eletrônico pode levar à poluição do solo e da água, devido à liberação de metais pesados e outras substâncias tóxicas.

PARA COMEÇAR

1. Como a melhoria da infraestrutura de reciclagem e a regulamentação da importação poderiam ajudar a resolver problemas como o comércio ilegal de lixo eletrônico (e-lixo)?
2. De que maneira o descarte inadequado de dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, pode afetar o meio ambiente e a saúde das pessoas no Brasil?
3. Qual é o impacto da substituição frequente de dispositivos eletrônicos no volume de e-lixo? O que poderia ser feito para minimizar os efeitos negativos dessa prática?

Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

DESCARTE ADEQUADO DE RESÍDUOS PERIGOSOS: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL

Agbogbloshie é o nome de uma comunidade localizada em Acra, capital de Gana. Grande parte de sua população vive em condições de pobreza e sem saneamento básico.

A comunidade é conhecida como um dos maiores depósitos de lixo eletrônico (e-lixo) do mundo. Rotulados como "doações" ou "para reciclagem", milhares de toneladas de dispositivos eletrônicos obsoletos, como computadores e celulares, e eletrodomésticos, são enviados anualmente para a região. A chegada constante de e-lixo faz parte de um fluxo maior de resíduos globais que se movem de países ricos para países emergentes, onde a regulamentação é menos rigorosa e os custos de descarte são menores.

Em Agbogbloshie, o e-lixo é desmontado de forma informal e perigosa por catadores de materiais recicláveis, adultos e crianças, que trabalham em condições precárias. Para extrair metais valiosos como o cobre, eles queimam componentes eletrônicos, o que provoca a contaminação do ar, do solo e da água, além de causar riscos severos para a saúde dos trabalhadores e dos moradores locais.

A situação em Agbogbloshie ilustra um grave problema ambiental e de saúde pública, consequência da má gestão do lixo eletrônico no planeta.

Celulares obsoletos separados para desmontagem em Agbogbloshie, Gana. Foto de 2016.

Thomas Imo/Photothek/Getty Images

Não escreva no livro.

O QUE ACONTECE COM O LIXO DESCARTADO?

No Brasil são gerados aproximadamente 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Desse total, cerca de 25% seguem para lixões ou aterros controlados, que não recebem impermeabilização do solo, o que revela uma gestão ineficiente de resíduos sólidos. Cerca de 90% de todo o lixo produzido no Brasil recebe um desses três destinos: o lixão, o aterro controlado ou o aterro sanitário.

O restante do lixo (cerca de 10%) é reciclado, compostado, incinerado ou descartado de forma irregular. Levantamentos estimam que, no Brasil, até 2050, a produção de resíduos (orgânicos, plásticos, papéis, vidros e metais) poderá bater a marca de 120 milhões de toneladas por ano.

O desafio da gestão desses materiais é ainda maior nas grandes cidades, onde a densidade populacional e o nível de consumo geram um volume mais elevado de resíduos.

A falta de uma cultura sustentável intensifica o problema, colocando em risco a viabilidade dos aterros e a qualidade do ambiente urbano.

Representações sem proporção de tamanho e em cores-fantasia.



Ilustrações: Reinaldo Vignati/ID/BR

Os **lixões** são depósitos sem cobertura, onde são despejados os resíduos sólidos, sem nenhum tratamento. Por estar descoberto, o lixo exala mau cheiro e causa a proliferação de insetos e outros animais em busca de alimento. Nesses locais, a penetração do chorume provoca poluição do solo e dos lençóis freáticos, e a liberação de gás metano causa poluição do ar.



O **aterro controlado** é um tipo de depósito que causa menos danos que o lixão. Porém, também não recebe impermeabilização do solo, coleta e tratamento do chorume gerado, nem possui sistema de coleta de gases. A vantagem em relação ao lixão é que o lixo é coberto com terra e grama, reduzindo o mau cheiro e a proliferação de insetos e outros animais.



No **aterro sanitário**, os resíduos são depositados no solo impermeabilizado. Na base desse aterro, o solo é nivelado, selado com argila, e recebe mantas plásticas que impedem a passagem de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos para o solo. Esses locais possuem um sistema de drenagem de chorume, que é levado para uma estação de tratamento. Também é feita a captação dos gases liberados, como o metano, que pode ser usado na produção de energia.
Os aterros sanitários são cobertos com terra e têm o solo compactado, dificultando o acesso de animais e diminuindo a proliferação de bactérias pela redução da disponibilidade de gás oxigênio.

Desafios e soluções para o descarte do lixo

Existem alternativas ao uso de aterros sanitários para o descarte do lixo:

- **Incineração:** processo de queima controlada de resíduos sólidos para a redução do volume de lixo. Suas vantagens são a eliminação de substâncias com alto grau de toxicidade, o controle rigoroso das emissões atmosféricas e o reaproveitamento energético (transformação da energia térmica liberada durante a queima em energia elétrica). Para evitar a liberação de gases e substâncias tóxicas para o meio ambiente, o processo requer instalações com sistemas rigorosamente controlados de filtragem e tratamento de rejeitos.
- **Compostagem:** processo que envolve a decomposição controlada de resíduos orgânicos, como restos de alimentos e resíduos vegetais, para obtenção de compostos ricos em nutrientes, que podem ser utilizados como fertilizante. O grande desafio é a implementação de um projeto adequado de coleta seletiva e separação do lixo orgânico.
- **Reciclagem:** processo de reintrodução de materiais descartados no ciclo produtivo de criação de novos produtos. Envolve a transformação de resíduos como papel, plástico, vidro e metal em matérias-primas secundárias, reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais e o volume de lixo produzido.

A reciclagem é fundamental para minimizar o impacto ambiental da geração de resíduos. Ela faz parte da prática dos 5Rs – **reduzir**, **reutilizar**, **reciclar**, **recusar** e **repensar** –, que consiste em reduzir o consumo e a geração de resíduos como ação principal; reutilizar produtos e materiais como segunda medida mais importante; reciclar o que não puder ser reutilizado; recusar produtos que causem danos ao ambiente e/ou à saúde; e repensar a real necessidade de consumo.

Essa abordagem promove a conservação de recursos naturais, reduz a poluição e a emissão de gases de efeito estufa e contribui para a economia circular, na qual os resíduos são continuamente reintegrados no ciclo produtivo.

A **coleta seletiva** é crucial no enfrentamento dos problemas associados à geração de lixo. O sistema envolve a separação dos resíduos em diferentes categorias (orgânicos, recicláveis e rejeitos), o que facilita o tratamento e a transformação posterior dos materiais. Sem a coleta seletiva, a eficácia de processos como o da reciclagem e da compostagem, por exemplo, fica comprometida.

AÇÃO E CIDADANIA

Sobrevivência e condições dignas de trabalho

No Brasil, os lixões constituem a única alternativa de renda para milhares de famílias em situação de extrema pobreza que lá buscam por materiais recicláveis. A prática representa risco à saúde e exige um compromisso conjunto entre o poder público e a sociedade. É fundamental investir em aterros sanitários, ampliar a cobertura da coleta seletiva e promover a reciclagem formal, garantindo condições de trabalho dignas e seguras a essas pessoas.

Os catadores de materiais recicláveis desempenham um papel fundamental para a sociedade e para o meio ambiente: fazem a coleta, separação, recuperação e reciclagem de resíduos sólidos, contribuindo para a redução do volume de material em lixões. Sua atividade promove a economia circular, ao vender o material às indústrias recicladoras, preservando recursos naturais.

A formação de associações e cooperativas de catadores, por exemplo, representa uma alternativa às condições de trabalho insalubres e desumanas.

1. **Como a formação de cooperativas para reciclagem de materiais pode, ao mesmo tempo, combater os problemas sociais e ambientais provocados pelo descarte inadequado de resíduos?**

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

ROTEIRO

1. **Por que o descarte inadequado de produtos como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos é especialmente perigoso, comparado a outros produtos?**

1. Todos esses produtos apresentam materiais altamente tóxicos em sua composição, que podem se dispersar facilmente no solo, na água e no ar.

Biogás de aterros sanitários: transformando lixo em energia

O **biogás** é um subproduto da decomposição anaeróbia dos resíduos orgânicos em aterros sanitários. Formado principalmente por metano (CH_4) e dióxido de carbono (CO_2), o biogás é uma fonte de energia renovável. Sua captura e utilização têm vantagens ambientais e econômicas.

Quando liberado diretamente para a atmosfera, o metano contribui de forma significativa para o aquecimento global, e seu potencial estufa é cerca de 25 vezes superior ao do CO_2. Entretanto, sua captura e seu uso para geração de energia convertem esse problema em uma solução sustentável, já que a combustão completa do CH_4 libera grande quantidade de calor:

$$CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(v) \qquad \Delta H^0 = -891\ \text{kJ/mol}$$

Dessa forma, mesmo que a combustão do CH_4 capturado resulte em gases de efeito estufa, o impacto é **muito menor** se comparado à sua liberação sem controle.

Resíduos perigosos: o que são e como descartá-los

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é regida pela Lei n. 12 305/10, que incentiva a adoção de métodos sustentáveis para a gestão de resíduos e busca promover a educação ambiental e erradicar práticas inadequadas de descarte como os lixões, substituindo-os por soluções ambientalmente responsáveis.

A PNRS classifica como **resíduo sólido** todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. Esse tipo de resíduo é dividido em duas categorias: **resíduos perigosos** e **resíduos não perigosos**.

Os resíduos presentes no cotidiano das pessoas, como vidro, papel, plásticos, etc., são classificados como não perigosos. Já os resíduos perigosos são os que apresentam potenciais riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido a uma ou mais das características listadas a seguir.

- **Inflamabilidade**: podem pegar fogo em condições normais de manuseio ou sob a ação de calor.
- **Corrosividade**: podem corroer materiais ou tecidos vivos, com pH $\leqslant 2$ ou $\geqslant 12{,}5$.
- **Reatividade**: podem reagir violentamente com a água ou outros materiais.
- **Toxicidade**: podem causar danos à saúde quando ingeridos, inalados ou em contato com a pele.
- **Patogenicidade**: contêm micro-organismos que podem causar doenças.
- **Ecotoxicidade**: podem causar danos ao meio ambiente e à vida aquática.

Tais resíduos não podem ser descartados no lixo comum. A solução encontrada pela PNRS foi a implementação da **logística reversa**, que responsabiliza o fabricante pela destinação final de seu produto, em um sistema que organiza o retorno de produtos após o consumo para posterior reciclagem, reúso ou disposição final segura. Esse processo envolve a colaboração entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, que compartilham a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, desde sua fabricação até a destinação final.

Produtos como baterias, pilhas, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos devem ser transportados para instalações especializadas, onde passam por processos de tratamento que visam neutralizar seus componentes perigosos, reciclar materiais recuperáveis ou garantir sua disposição final de maneira segura e ambientalmente adequada.

Esse sistema contribui significativamente para a mitigação dos impactos ambientais associados ao descarte inadequado de resíduos perigosos, promovendo um ciclo de vida mais sustentável para os produtos.

Não escreva no livro.

QUÍMICA E GEOGRAFIA

COMO O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESTÁ TRANSFORMANDO ALGUNS PAÍSES NOS LIXÕES DO MUNDO

Celulares: de onde vêm, para onde vão

O lixo eletrônico, ou e-lixo (do inglês *e-waste*), é composto de uma enorme variedade de equipamentos eletrônicos (como o próprio nome sugere) e eletrodomésticos descartados por não serem mais úteis ou estarem obsoletos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), foram produzidos 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos em 2022 no mundo, e apenas cerca de 20% dessa quantidade foi reciclada formalmente. O cenário do futuro próximo é mais alarmante, pois a estimativa é a de que a massa de lixo eletrônico produzida anualmente aumente para 82 milhões de toneladas. Nesse caso, se a economia circular não for fortalecida, a expectativa é que a reciclagem dos equipamentos descartados se mantenha em 20%.

Os grandes desafios para o fortalecimento da economia circular são a coleta e o reaproveitamento do material descartado. Esses processos dependem do setor privado para a elaboração dessa logística; dos consumidores, que devem descartar adequadamente os equipamentos para que retornem ao ciclo produtivo; e do poder público, que deve fiscalizar todo esse processo, além de tornar a legislação mais rigorosa, quando necessário.

Com a fraca economia circular e a falta de empenho dos governos dos países desenvolvidos em implementar tal processo, o grande e ilegal destino do lixo eletrônico são os países menos desenvolvidos. Muitos países africanos e do Sudeste Asiático, por exemplo, devido à carência de produtos eletrônicos e à falta de fiscalização da qualidade dos equipamentos recebidos, acabam absorvendo grandes quantidades de produtos de segunda mão ou não funcionais de países como os Estados Unidos. Essas ações, associadas à baixa capacidade de reciclagem, acarretam o surgimento de enormes "montanhas" de lixo eletrônico.

petovarga/Shutterstock.com/ID/BR

Representação simplificada das etapas da economia circular.

Categorias de E-LIXO

1 **Equipamentos de refrigeração e climatização**
Refrigeradores, congeladores, ares-condicionados, aquecedores.

2 **Equipamentos grandes**
Máquinas de lavar e secar roupas, fornos elétricos, painéis fotovoltaicos, máquinas copiadoras.

3 **Telas e monitores**
Televisores, monitores de computador, *tablets*, *notebooks*.

4 **Lâmpadas**
Lâmpadas fluorescentes, LEDs.



5 **Equipamentos pequenos**
Cigarros eletrônicos, fornos micro-ondas, calculadoras, rádios, câmeras, barbeadores elétricos.

6 **Equipamentos de telecomunicação**
Celulares, aparelhos de GPS, impressoras, roteadores.

Reinaldo Vignati/ID/BR

Não escreva no livro.



STR/AFP/Getty Images

Lixo eletrônico ilegal encontrado em contêiner na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia. Foto de 2024.

Os efeitos negativos dos lixões de eletrônicos nos países em desenvolvimento são muitos, mas os principais estão relacionados a impactos ambientais e à saúde da população local. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem se observado um aumento na contaminação por substâncias tóxicas, principalmente em crianças e mulheres grávidas. Nesses locais, o processamento do lixo eletrônico é feito de maneira informal e sem a tecnologia dos países desenvolvidos. Uma grande parte do e-lixo é queimada, gerando material particulado com compostos orgânicos tóxicos derivados do plástico, que são inalados por adultos e crianças. Além disso, equipamentos elétricos têm quantidades relativamente grandes de metais, incluindo metais altamente tóxicos como chumbo, mercúrio e cádmio. Esses metais sofrem lixiviação durante o processamento, contaminando o solo e a água. Consequentemente, os cultivos próximos apresentam metais tóxicos. Como esses elementos entram nas teias tróficas, também há contaminação de outros alimentos, como ovos, leite e peixe. A ingestão ou inalação dessas toxinas aumenta os riscos de desenvolvimento de doenças neurológicas, renais e cardiovasculares, por exemplo.

Fontes de pesquisa: World Health Organization. *Children and digital dumpsites*: e-waste exposure and child health. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341718/9789240023901-eng.pdf; Baldé, C. P. *et al. The Global E-waste Monitor 2024*. Geneva/Bonn: International Telecommunication Union (ITU) and United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), 2024. Disponível em: https://api.globalewaste.org/publications/file/297/Global-E-waste-Monitor-2024.pdf; Oliveira, L. Má gestão de resíduos sólidos transforma países em lixões do mundo. *Jornal da USP*, 2 fev. 2023. Disponível em: https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/atualidades-paises-sao-transformados-em-lixoes-do-mundo-gracas-a-ma-gestao-de-residuos/. Acessos em: 17 out. 2024.

Conecte as ideias

1 **Em grupos, conversem sobre quais seriam as causas da geração de tamanha quantidade de lixo eletrônico. Em seguida, compartilhem suas ideias com os demais grupos e, para cada causa levantada, proponham, em conjunto, a solução do problema.**

2 **Faça uma pesquisa sobre economia circular e elabore um esquema que apresente a implementação da logística reversa para o aumento da reciclagem do lixo eletrônico.**

3 **Nas Olimpíadas Rio 2016, cerca de 30% das medalhas foram feitas com material reciclado. Quatro anos depois, o Japão tomou iniciativas para tornar as Olimpíadas de Tóquio 2020 as mais sustentáveis de todos os tempos.**

[...]

Pela primeira vez na história as medalhas olímpicas foram feitas com metal retirado do lixo eletrônico. Seis milhões de telefones celulares usados e mais de 78 toneladas de computadores, *tablets*, monitores e outros aparelhos antigos ou quebrados recolhidos no Japão forneceram 28,4 kg de ouro, 3,5 toneladas de prata e 2,7 toneladas de bronze. [...]

Ferri, M. Olimpíadas de Tóquio devem ser as mais sustentáveis da história. *G1 Campinas e região*, 4 ago. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2021/08/04/olimpiadas-de-toquio-devem-ser-as-mais-sustentaveis-da-historia.ghtml. Acesso em: 17 out. 2024.

- É possível obter 0,012 mol de ouro com a reciclagem de 100 *smartphones*. Se uma medalha de ouro contém cerca de 6,7 g de ouro metálico, calcule quantos *smartphones* seriam necessários para produzir todas as 340 medalhas de ouro entregues nas Olimpíadas de Tóquio. Dado: massa molar do ouro = 197 g/mol.

1. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes associem a grande quantidade de lixo eletrônico produzido ao consumismo e à obsolescência programada. Como possíveis soluções, podem ser citadas a conscientização das pessoas para o uso dos equipamentos por mais tempo e a pressão sobre as indústrias para que produzam itens com vida útil maior.

2. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3. 96 526 *smartphones*.

PARA EXPLORAR

Leia

Dia Mundial da Reciclagem: por que é importante reciclar o lixo eletrônico?

O texto, publicado em maio de 2022, na *National Geographic Brasil*, traz informações sobre os benefícios ambientais e econômicos de reciclar o lixo eletrônico.

Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/05/dia-mundial-da-reciclagem-por-que-e-importante-reciclar-o-lixo-eletronico. Acesso em: 17 out. 2024.

Não escreva no livro.

OS PERIGOS DO MERCÚRIO: DE MINAMATA AO TAPAJÓS

O mercúrio é considerado um metal que ocorre naturalmente na crosta terrestre em três estados de oxidação.

O **mercúrio metálico (Hg)**, também chamado mercúrio elementar, que apresenta número de oxidação (Nox) igual a zero, é uma substância simples prateada, líquida à temperatura ambiente. É utilizado em barômetros, na mineração do ouro e em determinados processos industriais.

As **formas oxidadas do mercúrio** correspondem a íons Hg_2^{2+} e Hg^{2+}. O cátion Hg^{2+} é encontrado na natureza no cinábrio, minério rico em sulfeto de mercúrio(II) (HgS). Já o cátion Hg_2^{2+} é menos comum, mas pode formar sais como o $Hg_2C\ell_2$ (cloreto de mercúrio(I)).

O descarte inadequado de lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, além do uso intensivo no garimpo, provoca alterações no ciclo do mercúrio, aumentando os riscos de exposição humana e contaminações.



Reinaldo Vignati/D/BR

Fonte do esquema: Souza, J. R. de; Barbosa, A. C. Contaminação por mercúrio e o caso da Amazônia. *Química Nova na Escola*, n. 12, nov. 2000. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc12/v12a01.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

Ciclo do mercúrio na natureza.

As emissões de mercúrio para a atmosfera podem ser de origem natural (emissões vulcânicas) ou antropogênicas (atividades industriais, mineração, garimpo). O mercúrio elementar volatiliza-se facilmente e pode ser transportado por longas distâncias na atmosfera. Na atmosfera, o mercúrio metálico pode ser oxidado a mercúrio(II) (Hg^{2+}), mais solúvel em água. Este, por sua vez, pode se combinar a grupos orgânicos, transformando-se em compostos orgânicos de mercúrio.

Além disso, o mercúrio pode precipitar-se com as chuvas, depositando-se nos solos e corpos d'água. Parte do mercúrio depositado pode ser reemitida para a atmosfera por processos como a evaporação. O mercúrio pode recircular entre diferentes compartimentos ambientais (ar, água, solo).

O mercúrio pode atingir os seres humanos de duas maneiras: a ocupacional e a ambiental. A exposição ocupacional ocorre em ambientes de trabalho, como na mineração – nos garimpos de ouro, por exemplo – e em indústrias que fabricam produtos como cloro-soda ou lâmpadas fluorescentes. Nesse caso, a contaminação se dá principalmente por meio das vias respiratórias, afetando os pulmões e o sistema respiratório.

A contaminação ambiental, por sua vez, está associada à dieta alimentar, em geral ao consumo de peixes contaminados por metilmercúrio, que é uma das formas mais tóxicas de mercúrio, devido à sua capacidade de bioacumulação e biomagnificação na cadeia alimentar.

DE OLHO NO CONCEITO

Bioacumulação e **biomagnificação** são processos interligados que explicam como contaminantes se concentram nos organismos através das cadeias alimentares. A bioacumulação ocorre quando a taxa de absorção de um composto tóxico é superior à de eliminação em organismos aquáticos, levando à elevação de sua concentração nos tecidos ao longo do tempo. Biomagnificação refere-se ao aumento progressivo das concentrações de metilmercúrio à medida que se avança na cadeia alimentar. Pequenos peixes contaminados são consumidos por peixes maiores, aves ou mamíferos aquáticos, resultando em níveis ainda mais altos de metilmercúrio nesses predadores de nível superior.

2. Como a taxa de absorção do mercúrio é superior à de eliminação, mesmo quando um ecossistema deixa de receber novas quantidades de mercúrio, o material presente circula pela cadeia alimentar, e quando os organismos mortos se decompõem, o mercúrio volta para o solo e para a água, realimentando o ciclo.

ROTEIRO

2. Qual é a relação entre o efeito bioacumulativo do mercúrio e os efeitos duradouros de sua contaminação?

QUÍMICA E LITERATURA

O Chapeleiro Maluco

No livro *Alice no país das maravilhas*, de Lewis Carroll, o excêntrico Chapeleiro Maluco é uma personagem famosa por seu comportamento caótico e imprevisível. Embora Carroll não tenha explicitamente ligado o Chapeleiro à intoxicação por mercúrio, a expressão faz referência a uma condição real que afligia a indústria de chapéus no século XIX, como consequência do uso de **nitrato de mercúrio** no processo de fabricação dos chapéus.

Os sintomas típicos incluíam tremores (conhecidos como "tremores de chapeleiro"), irritabilidade, depressão e dificuldades cognitivas, características do comportamento do Chapeleiro Maluco no romance. A intoxicação ocupacional por mercúrio era a causa subjacente dessas manifestações, resultando em envenenamento crônico devido a condições inseguras de trabalho e à falta de conhecimento sobre os perigos associados ao mercúrio à época. A expressão "intoxicação ocupacional" refere-se à exposição a substâncias tóxicas no local de trabalho.

No caso dos chapeleiros, a falta de conhecimento e de regulamentos sobre o uso de mercúrio culminou em uma epidemia de problemas neurológicos entre esses trabalhadores.

1. **Problemas de saúde causados por condições inadequadas de trabalho, como o caso dos chapeleiros, ainda acontecem nos dias atuais, como foi mostrado no início do capítulo. O que o poder público e a sociedade devem fazer para garantir condições dignas e seguras de trabalho para as pessoas?**

1. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

A doença de Minamata

Um evento marcante envolvendo mercúrio, conhecido como a doença de Minamata, é amplamente documentado na literatura. Seu nome deriva da cidade japonesa de Minamata, local onde a doença foi identificada pela primeira vez na década de 1950.

Os primeiros sinais de um problema sério vieram dos gatos da região, que começaram a exibir comportamentos estranhos, como movimentos espasmódicos, seguidos de paralisia, estado de coma e morte. Inicialmente, essa condição peculiar nos gatos foi subestimada. Contudo, o cenário mudou quando moradores locais começaram a apresentar sintomas semelhantes aos observados nos gatos, tendo sido relatados casos de problemas neurológicos, incluindo perda de coordenação, dificuldades na fala e até mesmo insanidade e danos irreversíveis ao sistema nervoso central. Também foram relatados casos de malformações congênitas e graves retardos mentais em recém-nascidos.

A origem do problema foi investigada, concluindo-se que se tratava de intoxicação aguda por mercúrio.

Uma fábrica da região estava descartando resíduos contaminados com mercúrio em um rio local, que deságua na baía de Minamata. O mercúrio descartado se transformava em metilmercúrio no ambiente aquático e se acumulava nos sedimentos da baía. Esse metilmercúrio era então ingerido por organismos aquáticos menores e bioacumulado através da cadeia alimentar, atingindo peixes, gatos e, eventualmente, humanos que dependiam dos recursos pesqueiros da baía. As investigações revelaram uma tragédia ambiental com cerca de 50 mortes e consequências físicas e neurológicas para outros tantos moradores afetados da região.

Caso semelhante ocorreu – e ainda ocorre – no Brasil. Na década de 1980, relatos de envenenamento por mercúrio começaram a surgir entre comunidades ribeirinhas e indígenas da bacia do rio Tapajós, no estado do Pará. A fonte do problema foi rastreada até a mineração de ouro, uma atividade intensa na região que utiliza mercúrio para amalgamar o ouro.

A denúncia dos impactos da contaminação por mercúrio no Tapajós ganhou força na década de 1990, quando estudos científicos começaram a chamar a atenção para os altos níveis de mercúrio em peixes e na população local. Os esforços de ambientalistas e organizações não governamentais também foram cruciais para destacar os riscos da contaminação, levando a uma crescente pressão para a regulamentação das práticas de mineração e maior proteção das comunidades afetadas. Apesar das medidas tomadas, os efeitos da contaminação continuam a ser uma realidade preocupante para as comunidades do Tapajós, refletindo a complexidade e persistência dos problemas ambientais e de saúde pública associados ao uso indiscriminado de mercúrio na mineração.

Perigos do mercúrio na mineração do ouro

No leito dos rios, o ouro é encontrado misturado com areia, cascalho e outros minerais, sob a forma de pequenos pedaços, denominados pepitas.

O garimpeiro introduz sua bateia (recipiente de madeira ou metal, de fundo cônico) nas cascalheiras do leito dos rios, coletando a mistura que pode conter pepitas de ouro.

Fazendo movimentos circulares, o garimpeiro acelera a decantação do ouro; areia e cascalho são levados pela correnteza, restando em sua bateia uma mistura de ouro e lama. A essa mistura adiciona-se o mercúrio líquido. O metal é capaz de formar com o ouro uma mistura homogênea, denominada amálgama, que se separa da lama. Como a amálgama é mais densa que a lama, é separada por decantação.

Para separar o ouro da amálgama, o garimpeiro, muitas vezes, aquece a mistura ao ar livre. Como a temperatura de ebulição do mercúrio, de 357 °C, é inferior à temperatura de ebulição do ouro, que é de 1 337 °C, o mercúrio evapora e é liberado para o ambiente na forma de vapor. O mercúrio residual é lançado nas margens e no leito dos rios.

O método mais adequado para recuperação do ouro é utilizando sistema fechado de destilação simples; além disso, os resíduos devem ser armazenados e enviados para entidades especializadas.

Não escreva no livro.

Impactos do descarte ilegal

A gestão inadequada de resíduos perigosos representa um grande risco ambiental e de saúde pública. Em áreas urbanas e rurais, o descarte incorreto pode levar a contaminações graves. Como podemos identificar e mitigar os impactos do descarte inadequado de resíduos perigosos em nossa comunidade?

A partir da análise de uma situação-problema real, nesta atividade você deverá investigar causas e consequências e propor possíveis soluções para o descarte ilegal de resíduos sólidos perigosos.

Material

- computador para pesquisas na internet

Como fazer

Leia o texto a seguir.

Terreno de antiga fábrica de baterias vira garimpo de chumbo no interior de SP

O terreno de uma antiga fábrica de baterias automotivas em Sorocaba (SP) se tornou um garimpo de chumbo a céu aberto. Em busca de dinheiro "fácil", moradores da região se arriscam e cavam na terra contaminada por produtos químicos para vender os metais para ferros-velhos da cidade.

[...]

Sem saber que estava sendo filmado, um homem, que teve a identidade preservada, explicou como funciona o esquema de extração no terreno.

"Você bate o martelo e se ela [pedra] não quebrar, é pura. É R$ 4 o quilo. Você só não pode chegar perto de lá, porque tem uma fumaça saindo ali embaixo da terra. Tem lugar que você vai e arde o olho", diz.

[...]

A reportagem recolheu algumas pedras que foram submetidas a análise laboratorial. [...]

TV TEM/Imagens Conteúdo Globo

Terreno onde se localizava a fábrica de baterias citada na reportagem, em Sorocaba (SP). Foto de 2018.

"As amostras apresentaram valores extremamente elevados de chumbo. Um milhão de vezes superiores àquelas que nós esperaríamos. Além do chumbo, foram encontrados alumínio, cádmio, cromo e arsênio."

[...]

[...] O chumbo é um dos principais componentes da fabricação [de baterias industriais e de automóveis]. Quando uma bateria acaba, ela volta para a indústria para ser reciclada. No entanto, o que deveria ser um processo de reciclagem, se transformou em um grave crime ambiental.

Um ex-funcionário, que não terá a identidade revelada, contou como era o esquema:

"A bateria chegava, eles despejavam no pátio e lá abriam no machado para escorrer todo o ácido que tem na bateria. O ácido ia para o chão mesmo. Depois, catavam as placas da bateria e jogavam em uma caçamba e despejavam no forno."

Em seguida, o material era derretido e o chumbo separado. A sobra, que é chamada de "escória", era enterrada atrás do barracão. "A máquina aterrava, depois cobria e abria outro buraco de novo. Dia e noite", afirma o ex-funcionário.

A engenheira química Fabíola Ribeiro afirma que este tipo de descarte é totalmente irregular.

"Eles precisam ser encaminhados para o que a gente chama de uma disposição final adequada, a exemplo de um aterro de resíduos perigosos, e nunca diretamente no solo sem nenhum tipo de prevenção e controle da poluição", explica.

[...]

Dias, C.; Gonçalves Jr., W.; Golfieri, D. Terreno de antiga fábrica de baterias vira garimpo de chumbo no interior de SP. *G1 Sorocaba e Jundiaí*, 19 ago. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/08/19/terreno-de-antiga-fabrica-de-baterias-vira-garimpo-de-chumbo-no-interior-de-sp.ghtml. Acesso em: 17 out. 2024.

Agora, imagine que você seja um(a) estudante prestes a concluir o curso de Química e foi procurado(a) por uma moradora local, aflita com a situação instaurada na comunidade em que vive.

Dona Maria é uma líder comunitária de 65 anos. Há algum tempo, ela já estava intrigada com boatos de uma nova forma de "ganhar dinheiro fácil" que vinha atraindo vários moradores do bairro em que mora. Com toda sua experiência, ao ler a notícia no jornal, imediatamente ligou os pontos.

Assídua frequentadora das reuniões de vereadores do município de Sorocaba, Dona Maria quer expor o caso a eles para que sejam tomadas providências. No entanto, ela sabe que precisa de um plano de ação para mostrar quais medidas devem ser tomadas.

Após uma conversa com dona Maria, você se oferece para organizar um grupo de pesquisadores para ajudá-la na elaboração do plano de ação. Essa ajuda envolve pesquisar sobre o tema e preparar uma apresentação para a Câmara de Vereadores de Sorocaba.

Reúnam-se em grupos de 4 ou 5 integrantes e sigam as etapas para elaborar o trabalho.

ETAPA 1: Pesquisa

Análise de dados: busquem artigos sobre o ocorrido, começando pelos problemas descritos no texto acima.

Busca por referências teóricas: pesquisem e leiam artigos que possam ampliar conhecimentos sobre o assunto para além da notícia, para proporem ações efetivas. Como resultado da pesquisa, elaborem uma síntese sobre os seguintes temas:

a) Princípio de funcionamento das baterias chumbo-ácido, usadas nos automóveis.

b) Problemas associados ao descarte inadequado de baterias chumbo-ácido. Considerem os componentes presentes nessas baterias e os riscos que representam à saúde e ao meio ambiente.

c) O chumbo é um metal tóxico. Expliquem o que são metais tóxicos, destacando os efeitos causados pelo chumbo à saúde e ao meio ambiente.

ETAPA 2: Preparação de um seminário

A apresentação deve contemplar os seguintes tópicos:

a) Breve apresentação do problema ocorrido em Sorocaba.

b) Apresentação dos perigos causados pelo descarte inadequado de baterias de chumbo-ácido e possíveis formas de remediação da área contaminada.

c) Solicitações à Câmara de Vereadores:

- Identificar e notificar os donos do terreno sobre responsabilidades e consequências sobre o descarte irresponsável.
- Exigir ações efetivas por parte do poder público para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em relação a práticas como as realizadas pela empresa em questão; instalação de canais de denúncia sobre práticas inadequadas relacionadas à geração e descarte de resíduos sólidos.
- Criar um programa de educação ambiental para a população, começando pela divulgação dos princípios da PNRS. O programa deve buscar a participação ativa da sociedade em ações que envolvam, por exemplo, a instalação de pontos de coleta no município para descarte de resíduos perigosos como as baterias chumbo-ácido; análise de casos de intoxicação para que a população possa identificar sinais de intoxicação causada por agentes ambientais; etc. Em sua apresentação, faça o detalhamento dos assuntos a serem abordados nesse programa.

ETAPA 3: Apresentação do seminário

A apresentação do seminário simulará uma apresentação feita para os vereadores. Cada grupo fará uma apresentação e assumirá o papel dos vereadores na apresentação de outro grupo, debatendo as propostas apresentadas.

Para concluir

1 **Você tem conhecimento de algum caso semelhante de descarte inadequado de resíduos perigosos, como o que aconteceu em Sorocaba, na cidade onde mora ou em alguma cidade vizinha? Em caso afirmativo, quais foram os problemas causados pelo material descartado?**

Resposta pessoal.

2 **Pesquise quais são os canais de comunicação que a prefeitura do município onde você mora disponibiliza para a população denunciar irregularidades e solicitar providências. Você ou seus familiares já usaram esses canais? Qual foi o resultado?**

Resposta pessoal. Se julgar pertinente, peça aos estudantes que façam uma pesquisa estendendo o público consultado, a fim de verificar se os canais oficias de comunicação estão atendendo às demandas da população.

Não escreva no livro.

ATIVIDADE RESOLVIDA

1 **Foram feitas denúncias sobre a contaminação por mercúrio em uma marca de sardinha comercializada em latas de 200 g. Para investigar o problema, a vigilância sanitária solicitou o recolhimento do produto das prateleiras dos supermercados e enviou amostras a órgãos especializados em análise. Resultados da análise indicaram concentrações de mercúrio variando entre 1,25 ppm e 1,50 ppm (partes por milhão) de mercúrio. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o teor máximo permitido de mercúrio em peixes para consumo humano é de 0,50 miligramas por quilo do produto (0,50 mg/kg). Com base nas informações fornecidas:**

a) Explique o significado do termo ppm (partes por milhão). Como é possível expressar a concentração de mercúrio permitido pela Anvisa em ppm?

b) Qual é a faixa de massa, em miligramas, de mercúrio presente nas latas de sardinha (200 g) analisadas?

c) Avalie se a concentração de mercúrio encontrada está dentro dos limites permitidos por lei.

Resolução:

a) **Partes por milhão (ppm)** é uma medida de concentração utilizada para concentrações muito baixas, que indica quantas partes de uma substância (o soluto) estão presentes em um milhão de partes do total (solução). Uma concentração de Hg de 1,25 ppm na sardinha significa que há 1,25 partes de mercúrio em 1 000 000 partes de sardinha, o que poderia ser expresso como 1,25 mg de mercúrio em 1,0 kg de sardinha. Observe que 1,0 kg corresponde a 1 000 000 mg.

Assim, a concentração limite estabelecida pela Anvisa de 0,50 mg/kg corresponde a 0,50 ppm.

b) $1{,}25\ \text{ppm} = \dfrac{1{,}25\ \text{mg}}{1\ \text{kg}} = \dfrac{0{,}25\ \text{mg}}{0{,}200\ \text{kg}}$

$1{,}50\ \text{ppm} = \dfrac{1{,}50\ \text{mg}}{1\ \text{kg}} = \dfrac{0{,}30\ \text{mg}}{0{,}200\ \text{kg}}$

Nas latas de sardinha de 200 g há entre 0,25 mg e 0,30 mg de mercúrio.

c) As concentrações de mercúrio encontram-se entre 1,25 e 1,50 mg/kg de atum. Portanto, estão acima do limite permitido por lei. O produto deve ser recolhido e não deve ser liberado para consumo.

2 **Análises de amostras de água subterrânea em uma área próxima a um antigo lixão, recentemente transformado em aterro controlado, revelaram a presença de níveis elevados de metais e compostos orgânicos tóxicos, sugerindo possível contaminação pelo chorume.**

A tabela mostra os resultados dessas análises comparados aos limites máximos permitidos pela legislação.

Substância	Concentração encontrada (mg/L)	Limite máximo permitido (mg/L)
chumbo	0,050	0,010
mercúrio	0,0020	0,0010
benzeno	0,10	0,0050
arsênio	0,015	0,010

Fonte de pesquisa: Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente. *Resolução n. 420*. Brasília, DF: Conama, 2009. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/veicular/wp-content/uploads/sites/13/2013/11/CONAMA-420-09.pdf. Acesso em: 22 out. 2024.

a) Explique o que é o chorume e como ele é gerado em aterros e lixões.

b) Todos os materiais listados na tabela apresentam concentrações acima do limite máximo permitido pela legislação brasileira. Apresente uma possível explicação para a contaminação observada.

3 Observe a *charge* a seguir.

3. Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

Arionauro/Acervo do cartunista

Arionauro. *Obsolescência programada*. [*S. l.*], 2023. Disponível em: http://www.arionaurocartuns.com.br/2023/11/charge-celular-obsolescencia-programada.html. Acesso em: 17 out. 2024.

Há uma crítica à estratégia adotada por algumas empresas para incentivar o consumo. Que nome é dado a ela? Explique como funciona essa estratégia e como se relaciona ao conceito de sustentabilidade.

4 **A análise de contaminação por mercúrio (Hg) em peixes do rio Tapajós, na Amazônia, é crucial para a avaliação da contaminação ambiental e da segurança alimentar das populações ribeirinhas. O teor máximo de Hg permitido pelo órgão regulador em peixes destinados ao consumo humano é de 0,5 mg/kg para peixes não carnívoros e 1,0 mg/kg para peixes carnívoros.**

Foram coletadas e analisadas amostras de 50 g de cinco espécies de peixes para determinação dos teores de Hg total. Os dados obtidos são listados na tabela.

Peixe	Massa de Hg em 50 g de peixe	Categoria
tucunaré	0,060 mg	carnívoro
piranha	0,035 mg	carnívoro
tambaqui	0,020 mg	não carnívoro
dourado	0,055 mg	carnívoro

Tabela elaborada para fins didáticos.

Dê a concentração de mercúrio nos peixes em gramas de Hg por kg de peixe e indique quais espécies estavam contaminadas.

2. a) e **b)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

4. Tucunaré: 1,2 mg/kg (contaminada); piranha: 0,70 mg/kg (não contaminada); tambaqui: 0,40 mg/kg (não contaminada); dourado: 1,1 mg/kg (contaminada).

PENSANDO CIÊNCIAS

COMO CORRIGIR O SOLO ÁCIDO NA AGRICULTURA?

Nednapa/Shutterstock.com/ID/BR

O desenvolvimento das batatas é prejudicado se a acidez do solo estiver alta.

A acidez do solo é um fator crucial para o plantio e para se obterem bons resultados na colheita. Contudo, nem todos os solos se apresentam na faixa de pH ideal para determinados plantios. Vamos considerar o caso da batata: a maioria dos solos brasileiros destinados à plantação de batata é ácida, ou seja, apresenta pH abaixo da faixa ideal de cultivo, entre 5,5 e 6,0.

Com base nessa informação, reúnam-se em grupos e imaginem a seguinte situação: um agricultor quer plantar batatas, mas o solo apresenta-se demasiadamente ácido para essa espécie de planta. Como vocês fariam para corrigir a acidez do solo, deixando-o propício à utilização pelo agricultor?

Decompondo o problema

Detectado o problema complexo (corrigir o solo ácido para o plantio de batatas), é hora de decompô-lo em problemas mais simples, atentando aos detalhes. A solução desse problema passa por fatores como amostragem do solo, materiais que serão utilizados para corrigir seu pH, quantidade de material, entre outros. Procurem levantar questões como:

- Qual é o pH ideal para o plantio de batatas?
- Como medir o pH do solo para plantio?
- Que materiais poderiam ser utilizados para corrigir essa acidez?
- Qual é a quantidade de material a ser utilizada para essa correção?
- Que equipamentos são necessários para realizar essas etapas?

Reconhecendo padrões

Nesta etapa, vocês devem identificar as características comuns entre os diferentes problemas e soluções. Vamos considerar uma das questões levantadas na etapa anterior: Que materiais poderiam ser utilizados para corrigir a acidez do solo? Vejamos alguns exemplos.

Quando se está com acidez estomacal ou com ardor no estômago, é comum que um médico prescreva o uso de substâncias conhecidas como antiácidos, como o bicarbonato de sódio e o hidróxido de magnésio (popularmente conhecido como leite de magnésia), para solucionar esse problema. Tanto o bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) quanto o leite de magnésia ($Mg(OH)_2$) reagem com os ácidos, em uma **reação de neutralização**. Nessa reação, os íons H^+ da solução ácida reagem com os íons OH^- da solução básica, formando água. Nesse exemplo, o valor do pH deve subir, diminuindo a acidez.

Discutam com os colegas de grupo se esse princípio seria aplicável ao problema em questão e por quê. Levantem exemplos de outras aplicações – como as industriais. Realizem essa etapa para os demais problemas levantados anteriormente.

Não escreva no livro.

Abstraindo o problema

A ideia aqui é separar os pontos relevantes daqueles que não importam para a solução do problema. Tendo reconhecido os padrões, retornem à questão: Que materiais poderiam ser utilizados para corrigir a acidez? Por quê?

Um método bastante comum no campo é a **calagem**, a aplicação de hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$), uma base popularmente conhecida como cal hidratada. Analise com seu grupo se essa seria uma boa opção e procure identificar aspectos que realmente importam para a solução do problema. Por exemplo: A marca do produto a ser utilizada é relevante? Neste momento, não. Importa quem vai aplicar este produto? Não. Mas outras questões são extremamente importantes, por exemplo: Este material é propício a ser utilizado em solos agriculturáveis? Ele tem um custo acessível? Ele é fácil de ser encontrado? Seu manuseio é seguro? Montem um quadro como o do modelo a seguir para cada material levantado. Se preciso, realizem pesquisas na literatura especializada para obter as informações.

Material	É propício para o uso na agricultura?	Custo	Facilidade de obtenção	Segurança
Hidróxido de cálcio	Sim	//////////	//////////////////////////////	///////////////
//////////////////////	//	//////////	//////////////////////////////	///////////////
//////////////////////	//	//////////	//////////////////////////////	///////////////

Essas questões devem ser feitas para os demais problemas. É essencial saber a quantidade do produto a ser utilizada, pois um solo básico também pode ser um problema para o plantio. Também é importante ter um método consistente de medição do pH, ferramentas adequadas para realizar as aplicações, entre outros itens. Faça pesquisas sempre que for necessário.

2. Respostas variáveis. As questões **1** e **2** servem como momento de troca e de reflexão sobre quais melhorias poderiam ser aplicadas aos algoritmos produzidos. É amplamente possível que exista mais de um algoritmo como solução para o problema; portanto, reforce esse ponto para os estudantes.

Buscando soluções

Este é o momento em que se elabora uma possível solução para o problema principal, deixando claro o material a ser utilizado, a quantidade, como fazer essa aplicação, entre outros aspectos. Compartilhem suas ideias com o(a) professor(a).

Elaborando o algoritmo

O algoritmo refere-se ao passo a passo necessário para instruir alguém ou alguma máquina a fazer determinada coisa. Neste momento, deve-se focar no que é essencial para a correta execução do que está sendo instruído. Um bom exemplo de algoritmo é o passo a passo para a confecção de um barco de papel. É essencial que nele estejam as principais informações do que precisa ser feito e em que ordem.

Com a solução definida e com as informações que pesquisaram e discutiram, troquem ideias e elaborem um algoritmo para a correção do solo ácido para o plantio de batatas.

Maximilian100/Shutterstock.com/ID/BR

O algoritmo para a elaboração de um barco de papel deve informar o que deve ser feito e em que ordem, por exemplo: 1. Obtenha uma folha de sulfite A4; 2. Dobre a folha exatamente ao meio, no sentido do maior lado; 3. Mantenha a folha dobrada e dobre-a novamente, mais uma vez no sentido do maior lado; e assim por diante.

Para discutir

1. Respostas variáveis. Espera-se que haja diferenças entre os algoritmos produzidos pelos estudantes. Oriente-os a anotar as diferenças encontradas, discutindo-as.

1 **Reúnam-se com os demais grupos e compartilhem o algoritmo que seu grupo produziu. Comparem-no aos demais. Há diferenças? Se sim, quais?**

2 **Essas diferenças poderiam ser utilizadas para melhorar o algoritmo que seu grupo produziu? Ou podem ajudar o algoritmo de outros grupos? Elaborem argumentos que justifiquem como isso pode ser feito.**

3 **Vocês sentiram dificuldade em alguma parte dessa atividade? Qual? Como vocês a resolveram?**

3. Respostas pessoais. Aproveite para questionar os estudantes sobre o trabalho em grupo, perguntando de que forma ele foi importante para a resolução dos problemas e para o bom andamento da atividade.

Não escreva no livro.

QUESTÕES GLOBAIS

1 **(Enem)** No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de "bola" e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente, em I e II do esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno.



Enem. Fac-símile: ID/BR

Um professor de Química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: "A bola de massa torna-se menos densa do que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação:

$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} \rightarrow \underset{\text{álcool}}{2\ C_2H_5OH} + \underset{\text{gás comum}}{2\ CO_2} + \text{energia}$$

Considere as afirmações abaixo.

I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo.

II. Durante a fermentação ocorre produção de gás carbônico, que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir.

III. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe.

Dentre as afirmativas, apenas: Alternativa **b**.

a) I está correta.
b) II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) II e III estão corretas.
e) III está correta.

3. b) $H_3C-O-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-C_9H_{19}$

2 A partir do ácido acético, por esterificação, foram obtidos 19,6 g de acetato de metila.

a) Determine a massa de ácido que reagiu.

b) Que álcool foi empregado na reação de esterificação?

c) Determine a quantidade de matéria, em mol, de álcool utilizado no processo.

2. a), **b)** e **c)** Veja respostas em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

3 O biodiesel é muito pesquisado atualmente como alternativa para reduzir o consumo de combustíveis de origem fóssil. Sua produção ocorre mediante uma reação de transesterificação de óleos vegetais, ricos em triglicerídeos, formando como subproduto um composto muito utilizado como hidratante em formulações comerciais.

3. a) O nome é propano-1,2,3-triol, também conhecido como glicerina ou glicerol. Nessa molécula estão presentes hidroxilas ligadas a carbonos saturados, o que caracteriza a função álcool.

5. b) Teremos:



Reações de transesterificação são muito semelhantes a reações de esterificação, porém convertem um éster em outro éster. A reação de transesterificação para produção de biodiesel pode ser resumida como:



Fac-símile: ID/BR

Nessa reação, R_1, R_2 e R_3 são cadeias carbônicas do óleo vegetal, e R é a cadeia carbônica do álcool, geralmente CH_3- ou CH_3CH_2-.

a) Qual é o nome do subproduto formado? Qual grupo funcional está presente na molécula desse subproduto?

b) Para determinado óleo vegetal, R_1, R_2 e R_3 são compostas, cada uma, de uma cadeia não ramificada e saturada de dez átomos de carbono, e o álcool utilizado é o metanol. Escreva a estrutura da molécula de biodiesel formada.

4 **(UFSM-RS)** As borrachas sintéticas são classificadas como polímeros de adição. Também são polímeros de adição industrializados: Alternativa **c**.

a) náilon e PVC.
b) PVC e poliéster.
c) teflon e isopor.
d) náilon e isopor.
e) poliéster e teflon.

5 **(Unifesp-SP)** O volume de glicerina (propanotriol, fórmula molecular $C_3H_8O_3$) produzido como resíduo na obtenção de biodiesel excede em muito a necessidade atual do mercado brasileiro. Por isso, o destino atual da maior parte da glicerina excedente ainda é a queima em fornalhas, utilizada como fonte de energia. Uma possibilidade mais nobre de uso da glicerina envolve sua transformação em propeno e eteno, através de processos ainda em fase de pesquisa. O propeno e o eteno são insumos básicos na indústria de polímeros, atualmente provenientes do petróleo e essenciais na obtenção de produtos como o polietileno e o polipropileno.

a) Escreva a equação química balanceada da combustão completa de um mol de glicerina.

b) Sabendo que o polietileno é produzido pela reação de adição de um número *n* de moléculas de eteno, escreva a equação genérica de formação do polímero polietileno a partir de eteno, utilizando fórmulas estruturais de reagente e produto.

5. a) $1\ C_3H_8O_3(\ell) + \frac{7}{2}\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(\ell)$

Não escreva no livro.

6 (**Fuvest-SP**) Para aumentar a vida útil de alimentos que se deterioram em contato com o oxigênio do ar, foram criadas embalagens compostas de várias camadas de materiais poliméricos, um dos quais é pouco resistente à umidade, mas não permite a passagem de gases. Esse material é um copolímero (fórmula na Figura 1) e é produzido por meio de um processo de quatro etapas, esquematizado na Figura 2.

Fuvest-SP. Fac-simile: ID/BR

Figura 1



6. a) O monômero X é o acetato de vinila.



Figura 2

(acetato de vinila)



Figura 3



a) Dentre os compostos – vinilbenzeno (estireno), acetato de vinila, propeno, propenoato de metila –, qual pode ser o monômero X? Dê sua fórmula estrutural (ver Figura 3).

b) Escreva a equação química que representa a transformação que ocorre na etapa Y do processo.

6. b) Veja resposta em *Respostas e comentários* no Manual do Professor.

7 (**UFSM-RS**) A química e a física constituem a base para determinar os processos de preservação e restauro mais convenientes para esculturas e monumentos históricos. Produtos químicos sintéticos são utilizados para restaurar, preservar e proteger tanto as esculturas de Miguel Ângelo e as dos guerreiros chineses de terracota de Qin Shi Huangdi quanto a Estátua da Liberdade. Nesses casos, os revestimentos com adesivos à base de solventes e resinas poliméricas são muito utilizados, pois proporcionam uma camada protetora, que é impermeável, resistente à luz solar e autolimpante. Dentre as resinas poliméricas aplicadas na proteção de monumentos, estão os poliacrilatos, que são ésteres vinílicos polimerizados.



acetato de vinila



metacrilato de metila



cianoacrilato de metila

UFSM-RS. Fac-símile: ID/BR

Considerando os monômeros de poliacrilatos apresentados acima, é **correto** afirmar que: Alternativa **b**.

a) possuem isômeros geométricos.

b) sofrem polimerização por adição.

c) somente o acetato de vinila sofre polimerização por adição.

d) o cianoacrilato de metila sofre polimerização por condensação.

e) são todos ésteres derivados do ácido acético.

8 (**UPF-RS**) Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente: Alternativa **c**.

a) hidrocarbonetos; peptídios.

b) macromoléculas; ácidos graxos.

c) polímeros; monômeros.

d) polímeros; proteínas.

e) proteínas; aminoácidos.

9 (**Enem**) O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume (líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.

Revista *Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde*, ano 1, n. 4, dez. 2000. Adaptado.

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas abordadas no texto? Alternativa **c**.

a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.

b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e, sobre ele, colocada cal virgem.

c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume, canalizado para ser tratado e neutralizado.

d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume.

e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos.

10 (**Enem**) Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é Alternativa **b**.

a) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica.

b) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar.

c) aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo.

d) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado.

e) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica.

SÉRIE DE VÍDEOS

IDENTIFICANDO *FAKE NEWS* SOBRE TEMAS CIENTÍFICOS

O que será feito

Hoje, é muito comum receber ou encontrar alguma notícia que, à primeira vista, parece séria e confiável, mas depois se revela sem fundamento. Mais do que uma maneira pouco ética de atrair a atenção das pessoas e de movimentar as redes sociais, as chamadas *fake news* podem ir muito além da "trolagem" (palavra derivada de *troll*, termo em inglês para designar pessoas que usam as redes sociais para causar discórdia em uma discussão, propagando falácias e ofendendo as pessoas envolvidas). As notícias falsas ou tendenciosas também são usadas para manipular a opinião pública e, assim, podem gerar sérias consequências para a vida de milhares de pessoas.

Christoph Schmidt/Picture Alliance/Getty Images

A disseminação de informações falsas ou incorretas pela mídia ou pelas redes sociais é um dos principais responsáveis pela persistência de movimentos antivacina, marcados pelo medo e pela insegurança.

É provável que você conheça pessoas que, influenciadas por *fake news*, duvidam ou em algum momento já duvidaram de fatos e argumentos científicos, como a eficácia das vacinas ou os efeitos antrópicos no atual cenário de mudanças climáticas globais. Embora haja ampla divulgação de textos embasados em dados e informações científicas confiáveis em jornais, revistas e *sites* sobre essas e outras questões, muitas pessoas acabam se "informando" e baseando seus julgamentos pelas *fake news*, principalmente por aquelas veiculadas em redes sociais. Sendo assim, o que pode ser feito para combater a desinformação sobre temas científicos gerada pelas *fake news*?

Neste projeto, você e os colegas vão refletir sobre as características e os problemas gerados por *fake news* em assuntos ligados às ciências. O resultado dos questionamentos e das pesquisas que vocês farão vai embasar a elaboração de vídeos para contestar determinadas *fake news* à luz do conhecimento científico. Esses vídeos serão apresentados às comunidades escolar e local.

Objetivos

- Pesquisar e selecionar *fake news* relacionadas a temas científicos.
- Identificar e estabelecer critérios que caracterizem as *fake news*.
- Roteirizar, produzir e divulgar uma pequena série de vídeos apresentando *fake news*, discutindo seus impactos negativos na sociedade e refutando-as com base no conhecimento científico.

Não escreva no livro.

Preparação

Analisando textos e identificando *fake news*

Nem sempre é fácil reconhecer uma notícia ou uma informação falsa. O movimento antivacinas, por exemplo, ganhou força, principalmente, após a publicação de um artigo científico no qual um médico inglês associou o aumento do número de crianças autistas à vacina tríplice viral. Anos depois, verificou-se que os dados eram falsos e que o médico era beneficiado em processos por compensação de danos vacinais. Outro exemplo acontece quando, difunde-se uma argumentação equivocada, como nesta frase sobre mudanças climáticas: "O aquecimento global não existe, pois hoje está mais frio do que ontem".

Observe a tirinha abaixo. Você já se deparou com argumentos enganosos sobre temas científicos?

Armandinho, de Alexandre Beck/Acervo do cartunista

A tira apresenta, de forma bem-humorada, como questões científicas podem ser desacreditadas.

Beck, A. *Armandinho*. [*S. l.*], 28 mar. 2016. Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/141866731629/tirinha-original. Acesso em: 19 set. 2024.

Nesta primeira parte do projeto, você e os colegas devem se reunir para desenvolver as etapas a seguir.

1. Organizados em grupos, pesquisem e selecionem uma notícia, um artigo ou uma reportagem que contenha informação relacionada a aspectos científicos (como mudanças climáticas, eficácia e segurança de vacinas, evolução humana, vida fora da Terra, entre outros) e que essa informação seja considerada falsa ou equivocada.
2. Ao analisar os textos, procurem identificar elementos que possam conferir credibilidade a eles ou ser usados para distinguir uma notícia falsa de uma notícia confiável, tais como:
   - fonte da notícia (são mencionadas instituições acadêmicas reconhecidas pelo meio científico ou a fonte – quando há – é genérica?);
   - qualidade dos dados apresentados (são confiáveis e precisos, com métodos de análise bem descritos, ou os dados são incoerentes e/ou insuficientes?);
   - qualidade dos argumentos apresentados (são bem fundamentados no conhecimento científico ou são generalizações indevidas e/ou inconsistentes?);
   - *layouts* utilizados (são muito similares aos de *sites* oficiais de notícias?); etc.

   Além desses critérios, vocês podem acessar alguns *sites*, como os sugeridos no boxe *Para explorar*, que trazem um serviço de checagem de notícias falsas. Se necessário, acesse os *links* para a verificação das notícias escolhidas.
3. Anotem os argumentos falaciosos e justifiquem por que eles são equivocados.
4. Descrevam os critérios adotados por vocês para classificar esse conteúdo como *fake news*.
5. Compartilhem com a turma o conteúdo selecionado; apresentem e discutam os principais aspectos considerados para defini-lo como *fake news*.

PARA EXPLORAR

Acesse

Serviço de checagem de notícias

Os *sites* a seguir são especializados na averiguação da veracidade de notícias.

Agência Lupa. Disponível em: https://lupa.uol.com.br/

G1 Fato ou Fake. Disponível em: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Pública – Agência de jornalismo investigativo. Disponível em: https://apublica.org/

E-farsas. Disponível em: https://www.e-farsas.com/

Acessos em: 9 out. 2024.

Planejando os próximos passos

Agora que vocês já investigaram e discutiram o tema do projeto, é hora de organizar as próximas etapas.

O planejamento é essencial para que o desenvolvimento do projeto e, consequentemente, seu produto final (a série de vídeos) sejam bem-sucedidos. Os grupos e o(a) professor(a) devem, juntos, definir:

- **A organização dos estudantes –** Sugere-se que haja duas equipes divididas em subgrupos de trabalho. Com o(a) professor(a), avaliem a melhor organização.
- **As tarefas a serem realizadas –** A distribuição de tarefas deve ser equilibrada.
- **O cronograma de trabalho –** É importante estabelecer as datas de entrega de materiais, das reuniões, da publicação dos vídeos, etc.; ter um cronograma e cumpri-lo é essencial ao bom andamento de qualquer projeto.

Desenvolvimento

Propomos a organização da turma em duas equipes responsáveis pela realização das tarefas. O projeto, porém, permite que vocês, em conjunto e com o(a) professor(a), decidam o melhor caminho para a etapa de desenvolvimento.

Equipe 1 – Construção dos roteiros para os vídeos

- **Definição dos temas –** Com base nas apresentações realizadas durante a fase de preparação, definam, com o(a) professor(a), as *fake news* a serem tratadas nos vídeos. Se possível, priorizem assuntos diversificados das áreas de Ciências da Natureza, como os da Química, da Física e da Biologia.
- **Pesquisa sobre os temas –** Organizem a equipe em grupos; cada grupo deve pesquisar um dos temas escolhidos.

Para orientar a construção dos roteiros, respondam às perguntas a seguir.

1. Os dados e as informações que fundamentam essa argumentação são inverídicos, estão distorcidos ou foram mal interpretados?
2. A divulgação dessa informação errônea tem algum impacto socioambiental negativo? Em caso afirmativo, qual (ou quais)?
3. Essa *fake news* pode favorecer algum setor específico da sociedade? Em caso afirmativo, qual (ou quais)?
4. Como vocês fizeram para identificar que se tratava de uma informação falsa ou enganosa – ou seja, que critérios foram usados para caracterizar a *fake news*?
5. Quais dados, informações e fontes confiáveis vocês usaram para refutar os argumentos falsos?

Ao responder às perguntas das atividades de 1 a 5, os estudantes da equipe 1 devem ter clareza não apenas dos elementos usados para tentar sensibilizar as pessoas para a falta de credibilidade das notícias falsas, mas devem buscar conhecer também os argumentos que embasam a versão considerada correta, de cunho científico. Além disso, todos devem debater sobre os prováveis interesses que estão por trás de tais notícias, assim como as consequências que elas podem acarretar, seja para indivíduos e grupos específicos, seja para a sociedade como um todo. Sempre que possível, estimule os estudantes a ter uma visão que não fique centrada apenas no ser humano, mas que tenha abrangência socioambiental.

- **Elaboração de textos –** Com base nas respostas a essas perguntas, escrevam um roteiro para a gravação do vídeo. Acrescentem outras informações que julgarem pertinentes. Cada grupo escreverá o roteiro para um vídeo (como sugestão, indica-se que ele tenha, no máximo, cinco minutos).
- **Validação dos roteiros –** Antes do início das gravações, é essencial verificar se os roteiros não apresentam erros conceituais. Para isso, sugere-se que sejam consultados especialistas nos temas selecionados para a produção dos vídeos. Podem ser pesquisadores, professores especialistas, entre outros. Pesquisem quem poderia ajudá-los e solicitem a opinião do(a) professor(a), sempre. Essa consulta pode ser feita por *e-mail* ou por outro recurso de comunicação a distância. Na mensagem, expliquem o objetivo do projeto e peçam-lhe que, por gentileza e se possível, analise o texto produzido.

Não escreva no livro.

Equipe 2 – Produção dos vídeos

A equipe 2 será responsável por elaborar, gravar e divulgar os vídeos, especialmente nas redes sociais.

- Antes de ligar a câmera e começar a gravar, é importante selecionar imagens e outros materiais audiovisuais que julgarem ser úteis para a produção do vídeo.
- Definam quem serão os narradores ou apresentadores e lembrem-se de preparar o cenário onde o vídeo será gravado. Verifiquem a disponibilidade de iluminação (natural ou artificial) do local. Após a gravação, utilizem *softwares* ou aplicativos específicos para edição de vídeo.
- Deem um nome apropriado à série de vídeos. Isso pode ser feito coletivamente. Elaborem uma vinheta para a série e cuidem para que o *design* gráfico dos vídeos tenha certo padrão. Caso julguem conveniente, um membro de cada equipe de preparação do roteiro pode se reunir em uma equipe paralela para trabalhar nesses detalhes.
- A divulgação é uma etapa crucial para o projeto, pois será o momento de fazer a conexão com as comunidades escolar e local. Reúnam-se para definir as estratégias de divulgação dos vídeos, principalmente nas redes sociais.

Maria Symchych/Shutterstock.com/ID/BR

O *smartphone* pode ser usado como equipamento de filmagem e para a edição dos vídeos produzidos no projeto.

Refinando os vídeos

Antes da divulgação dos vídeos, realizem uma apresentação coletiva deles para toda a turma. Após todas as equipes terem mostrado suas produções, compartilhem sugestões e críticas construtivas. Caso seja necessário, aprimorem os vídeos de acordo com as sugestões e críticas recebidas.

Conclusão

Lançamento e divulgação da série de vídeos

Com o auxílio do(a) professor(a), criem um evento para divulgar a série para as comunidades escolar e local. Estabeleçam um dia para a realização desse evento e reservem um local apropriado da escola para a apresentação. Se possível, façam uma projeção em um telão e/ou divulguem o *link* para o acesso aos vídeos por celular e computador, por exemplo.

Os vídeos podem ser publicados em mídias como plataformas *on-line* de vídeos, o *website* da escola ou outros *websites* adequados ao projeto. Divulguem também a série usando meios físicos (cartazes, pôsteres, panfletos, entre outros) e as redes sociais.

Avaliação

1 **Como você acha que a série de vídeos vai auxiliar as pessoas a identificar *fake news* sobre temas científicos? Além disso, os vídeos devem trazer conhecimentos novos para as comunidades escolar e local? Quais? De que modo esses conhecimentos poderão beneficiar os indivíduos e a sociedade?**

2 **A execução desse projeto foi interessante para você? Por quê?**

3 **Com base na experiência adquirida nesse projeto, você acredita que a série de vídeos poderia ter continuidade? Se sim, por quê? O que precisaria ser feito para dar continuidade à série?**

1. Respostas variáveis. Espera-se que o projeto tenha colaborado para a identificação de elementos que caracterizam as *fake news* e que, ao serem veiculados nos vídeos, tenham contribuído também para alertar e auxiliar as pessoas a serem mais cuidadosas com as notícias que recebem e compartilham.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que sim. Eles podem mencionar que um maior entendimento de temas relacionados às *fake news* podem ter mudado a forma de eles lerem e veicularem notícias.

3. Resposta pessoal. Oriente os estudantes a identificar as oportunidades de crescimento que vivenciaram ao longo do projeto e o interesse em continuar o projeto. Como as notícias fazem parte do cotidiano de todos, uma ideia é criar uma comissão que tenha como incumbência checar as informações de interesse da comunidade, ao longo do ano letivo, e pensar em ações para promover a divulgação dos argumentos científicos que ajudam a embasá-las.

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES DE CÁLCULO

UNIDADE 1

Atividades (páginas 40 e 41)

2. **a)** 54 kg **b)** Duas viagens.

6. 1,63 L

UNIDADE 2

Roteiro (páginas 85 e 87)

1. **b)** 121,855 u

2.

2A + B → C + 3D				Excesso
2 L	1 L	1 L	3 L	—
5L	2 L	2 L	6 L	1 L de A
10 L	5 L	5 L	15 L	—
56 L	30 L	28 L	84 L	2 L de B

Práticas de Ciências (página 89)

4. 3 333 grãos

Atividades (página 90)

2. $^{203}T\ell = 30\%$ e $^{205}T\ell = 70\%$

3. **a)** 3 : 1 **b)** 12 g **c)** 12 vezes

Roteiro (páginas 93 e 98)

1. **a)** 32 g **b)** 32 g

2. $C_{13}H_{18}O_2$ e massa molar 206 g/mol.

Atividades (páginas 100 e 101)

2. **a)** 3 mol de O_2. **b)** 144 g de O_3.
c) Frasco **A**: $3{,}6 \cdot 10^{24}$ átomos de O; Frasco **B**: $5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de O.
d) 144 g de O_2; $5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de O; $2{,}7 \cdot 10^{23}$ moléculas de O_2.

6. $C_{20}H_{24}N_2O_2$; massa molar: 324 g/mol.

7. 510 vezes mais.

8. **a)** $3{,}9 \cdot 10^{-3}$ mol de Na^+; $6{,}4 \cdot 10^{-4}$ mol de K^+; $2{,}4 \cdot 10^{-3}$ mol de $C\ell^-$.
b) $1{,}95 \cdot 10^{-2}$ mol de Na^+; $3{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol de K^+; $1{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol de $C\ell^-$.

10. **a)** 308 g/mol

11. **a)** $MnO_2 = 87$ g/mol; $A\ell = 27$ g/mol; $A\ell_2O_3 = 102$ g/mol; Mn = 55 g/mol.
b) $2{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de Aℓ; $3{,}6 \cdot 10^{24}$ átomos de O.
c) 63,2%

12. **a)** 0,18 g **b)** 180 g/mol
c) 0,001 mol
d) $6{,}0 \cdot 10^{20}$ moléculas.

13. **a)** 8,0 g **b)** 0,6 mol

Roteiro (páginas 109 e 122)

4. $C_{42,11\%}H_{6,43\%}O_{51,46\%}$ **6.** 2 550 g

Química e Matemática (página 123)

1. $k = \frac{1}{3}$

2. 4 000 mol de N_2 e 12 000 mol de H_2.

Atividades (páginas 126 e 127)

7. C_3H_8O **8.** $C_6H_{10}O_5$

9. $m = 1480$ g ou 1,48 kg

10. **b)** 112,5 g
c) 86,25 g de NH_3 em excesso.

11. 795 g **12.** 138 t **13.** $n = 2$

14. $C_{57,14\%}H_{6,12\%}N_{9,52\%}O_{27,21\%}$

Estudo de caso (páginas 128 e 129)

2. Massa molecular = 176 u; massa molar = 176 g/mol.

3. Aproximadamente 0,1 mol por dia.

Questões globais (páginas 130 e 131)

1. **b)** 12,011 u

2. Alternativa **c**. **3.** Alternativa **a**.

4. **a)** 52,2% de C, 13% de H e 34,8% de O
c) 48 kg **d)** 49 200 L

5. Alternativa **b**. **6.** Alternativa **b**.

7. Alternativa **a**. **8.** Alternativa **a**.

10. 76% **12.** Alternativa **d**.

13. **1**: SO_2; **2**: SO_3; **3**: SO_2 **14.** $PC\ell_5$

UNIDADE 3

Atividades (página 143)

5. $P_{Vênus} = 9{,}1 \cdot 10^6$ Pa **7.** 440 K

Roteiro (página 166)

1. $C = 0{,}4$ mol/L

Atividades (páginas 174 e 175)

2. 0,4 mol/L **3.** 0,15 mg/mL

4. 502,5 mg de Ca; $C = 1{,}675$ g/L

5. 96 mol **6.** 56 g

9. **a)** 3,04 kPa **b)** 342 g

Questões globais (páginas 178 e 179)

2. Alternativa **d**. **4.** Alternativa **b**.

5. Alternativa **d**. **6.** Alternativa **d**.

7. Alternativa **b**.

UNIDADE 4

Roteiro (páginas 184 e 189)

1. 3,74 kcal **2.** 14,2 °C

3. $\Delta H_{subl} = 46{,}5$ kJ/mol

Química e Matemática (páginas 193 e 194)

1. **a)** $\Delta H = 44$ kJ **b)** $\Delta H = 51$ kJ

2. **b)** $H(NO_2) = 16{,}5$ kJ; $H(N_2O_4) = -24$ kJ.

3. $\Delta H_f(CO_2(g)) \approx -383$ kJ/mol

Atividades (páginas 196 e 197)

2. $\Delta H^0 = 1090$ kJ/mol

4. $\Delta H = -820$ kJ

5. $\Delta H = -40$ kJ/mol de C_2H_4

6. $\Delta H = -202{,}3$ kJ/mol de CH_4

8. **c)** 24,5 kJ

9. $\Delta H^0 = -48$ kJ/mol

10. $\Delta H^0_r = -24{,}8$ kJ

11. **a)** $K(s) \rightarrow K(g)$ $\Delta H = 89$ kJ/mol
b) $C\ell_2(g) \rightarrow 2\,C\ell(g)$ $\Delta H = 244$ kJ/mol
c) $\Delta H = -437$ kJ

12. $\Delta H^0_f = 33$ kJ/mol

Atividades (página 207)

3. **a)** $T = -120$ °C: 6 mg/dia
$T = -180$ °C: 2,5 mg/dia

Pensando Ciências (páginas 208 e 209)

1. 547,2 kcal

Questões globais (páginas 210 e 211)

5. Alternativa **a**. **6.** Alternativa **c**.

UNIDADE 5

Atividades (páginas 235 e 236)

6. 6 pilhas **10.** **b)** 1,23 V

12. **d)** 2,00 V

UNIDADE 6

Roteiro (páginas 281 e 285)

3. $5 \cdot 10^{-5}$ L ou 0,05 mL

4. pH = 7,3

Atividades (páginas 290 e 291)

4. $[H_3O^+] = [OH^-] = 2 \cdot 10^{-7}$ mol/L

5. **a)** deterg. líquido: $[OH^-] = 10^{-6}$ mol/L
limpador multiuso: $[OH^-] = 10^{-3}$ mol/L
limpador de forno: $[OH^-] = 10^{-1}$ mol/L

7. **a)** $1{,}12 \cdot 10^{-3}$ mol/L
b) $3 \cdot 10^{-4}$ mol/L **c)** pH = 3,5

9. **b)** $2 \cdot 10^{-8}$ mol/L

Atividades (páginas 300 e 301)

3. 10^{-12} mol/L **4.** Alternativa **a**.

5. $1{,}6 \cdot 10^{-2}$ mol/L

8. Alternativa **c**. **9.** **b)** 10^{-6} mol/L

UNIDADE 8

Química e Geografia (páginas 405 e 406)

3. 96 526 *smartphones*.

Atividades (página 411)

4. Tucunaré: 1,2 mg/kg (contaminada); piranha: 0,70 mg/kg; tambaqui: 0,40 mg/kg; dourado: 1,1 mg/kg (contaminada).

Não escreva no livro.

TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS

As transcrições aqui apresentadas não foram corrigidas de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, resguardando a autenticidade dos textos e preservando aspectos característicos das variações linguísticas e do registro oral das pessoas gravadas.

UNIDADE 2

Página 93

PODCAST – Mol, a "dúzia" química

Vinício Francisco: Eu sou o Vinício, químico, e o mol está para a Química, assim como a dúzia está para a feirinha ou para o mercado. Bom, hoje eu vou falar sobre o mol, uma das sete unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. Um tema bem simples, mas com alguns detalhes bem interessantes, algumas observações e uma atualização da definição, que ocorreu há poucos anos atrás e que a gente tem mostrado, então, com isso, que a ciência está sempre em constante movimento, em busca de melhorias e de esclarecimentos, certo? Então não sai daí.

Eu brinquei na abertura com o mol ser uma "dúzia química", né? Que é uma analogia bastante comum em diversos livros didáticos, de livros de Ensino Médio, e tudo... E é muito comum no cotidiano a gente ter termos que representam números, né? Os numerais coletivos, assim como a gente tem a dúzia, temos dezena, temos semana para sete dias, século para cem anos, milheiro para quantidade de mil tijolos, arroba – quantidade de peso geralmente associada a gado – e resma. "Résma" ou "rêsma", produção? [som de grilo] Também não sabe me informar. É que a palavra parece muito com "lesma". Então, por que que a gente mudaria para um "é" aberto, para resma? Não sei. Enfim... Assim como a dúzia, no caso, a gente tem um mol, uma entidade adimensional. Claro, ele é uma unidade. Ele existe por si só. Um número, ele precisa de ter uma unidade para ter um significado, então a unidade também precisa de uma medida para também ter um significado. Então, uma coisa depende da outra. Se eu tenho uma dúzia de ovos ou bananas, eu tenho, na verdade, 12 ovos ou 12 bananas, tá? Se eu tenho um mol de partículas, eu tenho, na verdade $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas, ou, melhor dizendo, 602 sextilhões de partículas. É muita partícula. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como surgiu esse número e algumas curiosidades da escala de grandeza, do quão grande esse número é.

Bom, mas inicialmente, para que que eu uso o mol? Químicos basicamente usam muito o mol. Essencialmente a gente utiliza o mol para quantidades de substâncias, quantidades de entidades elementares: átomos, moléculas, íons, elétrons e tantas outras. Bom, é possível que esse termo "mol", que é um nome até estranho e engraçado, seja do latim *mole*, que significa "monte", "amontoado" ou "quantidade". O curioso é que a palavra "molécula" surge como uma derivação da palavra "mole", é mole? Uma das primeiras palavras que vêm na cabeça quando a gente fala de Química é "molécula". E essa palavra é uma palavra derivada. Enfim, né, o sufixo "cula", de molécula, dá uma ideia de pequeno, diminuto. Então, molécula seria uma pequena quantidade de alguma coisa, uma partícula extremamente pequena. Isso, segundo o *Online Etymology Dictionary*, certo? O primeiro uso do mole no sentido científico mais moderno, que seria a menor parte de uma substância, que pode ser dividida sem destruir o seu caráter químico, foi dada por Amedeo Avogadro, em 1811. Alguns anos depois, em 1896, o alemão Wilhelm Ostwald introduz na química a palavra "mol", traduzindo para o alemão a palavra "mole".

Eu comentei da equivalência entre 1 mol e $6{,}022 \cdot 10^{23}$ entidades, partículas, o que seja. Bom, esse número, ele é chamado de Constante de Avogadro, em homenagem a Amedeo Avogadro, cientista químico italiano, que lançou as ideias básicas que permitiram com que fosse determinada essa constante, no início do século XX, utilizando técnicas modernas na época, que permitiram determinar o seu valor numérico. Hoje em dia a gente pode determinar a constante de Avogadro com razoável precisão, por meio de técnicas e métodos bastante presentes no nosso cotidiano, como eletrólise, emissões radioativas, raio X, onde a gente pode ser capaz de medir a distância entre átomos presentes numa rede cristalina, e tantos outros por aí. É bom que se diga que de todos os métodos e técnicas utilizadas, elas dão resultados concordantes. Então, indica uma grande robustez desse resultado.

Recentemente tivemos uma atualização do conceito de mol. Anteriormente, um mol era a quantidade de uma substância contida em um equivalente a 12 gramas de carbono-12, isótopo de carbono-12. Era um pouco confuso de entender, eu confesso. Nunca entendi muito bem na escola e ainda bem que essa definição mudou, porque aí a outra definição é bem mais tranquila. Em novembro de 2018, a gente teve outras reuniões; Iupac, pessoas responsáveis por essas definições, por esses regulamentos, se reuniram, certo? Na verdade, já tinha algum desejo dessa mudança antes e reuniões elaboradas, mas, em 2018, foi batido o martelo e isso entrou em vigor a partir de 20 de maio de 2019, né, entrou em vigor a nova definição do mol, que diz o seguinte: "mol, de símbolo mol, é a unidade do Sistema Internacional da quantidade de substância. Um mol contém exatamente 6,02214076 vezes dez a 23 entidades elementares. Este número é o valor numérico fixado para a constante de Avogadro, N_A, quando expresso em mol a menos 1, e é chamado de número de Avogadro". Ah, importante: o símbolo da unidade mol é mol, tá? Assim como o metro é m e candela é cd. Mas no Brasil, o nome da unidade também é mol, como já ficou nítido, né? Então, o que que acontece, para escrever por extenso, o mol vai para o plural. Se você escreve dois mols por extenso – d, o, i, s mols – de uma substância, nós temos que escrever o "s" no final, "dois mols". Mas se a gente escreve um numeral no final de uma questão, por exemplo, não devemos usar o plural, fica apenas "2 mol", o "2" e o "mol", tá? É esquisito, mas pensa: a gente escreve por extenso, "dois metros", direitinho, no plural, mas, quando usamos os números, fica "2 m", e não "2 ms", certo? Então, é um detalhe para deixar claro. É uma confusão que eu lembro até hoje, o professor falando que mol não tinha plural, mas aí apareceu em alguns momentos o mol como o plural... Então o símbolo mol, quando você expressa junto com o número, não vai ao plural. Quando você for escrever quantos mols, por exemplo, tem em tantos gramas, tantos mols, porque você tá utilizando ali a unidade de medida e não o símbolo. O símbolo é quando você expressa o valor junto com ele, tá bom? Então é uma confusão que às vezes acontece e não vai dar mole por aí nas provas, tá bom?

Locutor: *Podcast Quimicast*. Episódio "Mol, a 'dúzia' química". Crédito: QuimiCast 48 – Mol, a dúzia química. Locução de: Vinício Francisco. [*S. l.*]: Produção independente, 5 de março de 2021. Locução: Jader Cardoso/ID/BR.

QuimiCast 48: Mol, a dúzia química. Locução de: Vinício Francisco. [*S. l.*]: Produção independente, 5 mar. 2021. *Podcast*. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/6HAhTqoFFU0zUVwK8P6xK7?si=5597de51880440ff&nd=1&dlsi=33a1d5cba89b4100. Acesso em: 2 out. 2024.

UNIDADE 7

Página 309

PODCAST – Cidades-esponjas

Locutor: Inspiradas em processos naturais do ciclo da água, as cidades-esponjas apresentam sistemas que absorvem e armazenam a água da chuva, como uma esponja. Esses sistemas previnem inundações, protegendo a cidade das consequências de eventos climáticos extremos.

Fabrício Marques: Nós vamos conversar agora com o arquiteto paisagista e urbanista Paulo Pellegrino. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele também é um estudioso da interação das águas com a paisagem urbana. Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse como essas soluções das cidades-esponja podem ser úteis para aumentar a resiliência urbana aos alagamentos.

Paulo Pellegrino: Esse termo, "cidade-esponja", foi criado na China. O arquiteto paisagista chinês Kongjian Yu começou a utilizar esse termo há uns 15 anos atrás, e ele justamente queria se referir ao conceito de você cuidar das águas numa cidade. Como você pode mudar a perspectiva das águas como uma ameaça, como um elemento que venha a trazer algum risco para as cidades, num elemento de fruição, um elemento benéfico, numa coisa que melhora a qualidade de vida da cidade e cria toda uma resiliência ambiental.

Fabrício: Professor, mas essa ideia não é exatamente nova, né? Tem sistemas parecidos usados em outros países há mais tempo, às vezes há bem mais tempo. Não é isso?

Paulo: Não, exatamente. Esse é o termo que vem sendo... Na verdade, se nós voltarmos para o Egito Antigo, o Nilo era usado como praticamente área esponjosa para a civilização de lá, de milhares de anos atrás. E se nós formos para México, onde era a antiga Cidade do México... Onde é a atual Cidade do México, onde era a antiga capital dos astecas, era também uma grande cidade-esponja. Nós temos todos exemplos nas civilizações de como as pessoas aproveitavam essa variação do ciclo hidrológico para criar paisagens e assentamentos muito resilientes, muito ricos e capazes de assegurar uma riqueza para a população.

Fabrício: Essas cidades-esponja contam com as chamadas "soluções baseadas na natureza". Quais são os elementos da natureza que inspiraram essas soluções?

Paulo: Então, diante dessa vertente que a China tá trabalhando, você vê que é uma recuperação de conceitos muito antigos, que eles trabalham há milênios também lá na China, no tratamento das águas, especialmente os camponeses, as pessoas do campo e nas cidades mesmo de lá... Havia todo um conceito de você aproveitar as águas, através do quê? Através de espraiamento das águas da chuva, através da construção de pequenos espaços de tratamento da vegetação com a água, de uso de áreas para culturas agrícolas, de terraceamentos, de uma série de movimentos de solo, de vegetação e de condução das águas, que favorecia o conjunto de processos que faziam aproveitamento melhor das condições hídricas para as culturas, para abastecimento das cidades, para esse tipo de uso. E isso era o que se diz hoje em dia como soluções baseadas na natureza; nada mais é do que a observância desses aspectos que os processos cíclicos naturais sempre tiveram no ciclo hidrológico. Quer dizer, quando você tem a água circulando numa bacia hidrográfica, você observa que ela cai lá nos pontos mais altos ou mesmo nos pontos intermediários ou no final da bacia, e acaba sendo processada através de uma série de relações com o solo, com a vegetação, com a topografia. E isso é uma observação do que acontece numa paisagem natural, e você transporta isso para o uso numa paisagem construída, numa área urbana, etc. Então, nada mais é do que os próprios processos de ciclos da natureza trazidos para dentro da cidade.

Fabrício: Professor, como o urbanismo do Brasil lida hoje com as águas? É possível aplicar soluções de cidades-esponja aqui?

Paulo: Não, o que acontece é que nós sempre aplicamos, nós sempre fomos. São Paulo era uma cidade-esponja. Até 100 anos atrás, São Paulo era uma cidade-esponja, só que a gente não chamava por esse nome. Mas até a origem da cidade, o nome Piratininga, vem do quê? Peixe seco. Significa que os nossos antigos moradores eram muito inteligentes, eles escolheram ficar em cima de colinas, observando a imensa várzea que tinha dos nossos rios e esperavam essas águas subirem. Quando desciam, eles iam lá pescar os peixes nas lagoas formadas pelo recesso das águas. Toda a colonização de São Paulo, a trazida dos bandeirantes, que subiam pela serra através de pirogas e chegavam pelos rios, canais, até o centro da cidade... São Paulo era uma cidade-esponja. O que aconteceu é que há 100 anos e pouco mais disso, um tempo atrás, nós entramos numa outra ideologia. Nós compramos uma versão de que a retificação, a canalização, a impermeabilização, a condução e concentração rápida das águas era a solução para a cidade. Então, São Paulo perdeu essa capacidade esponjosa que ela tinha quando adotou o modelo atual de engenharia dura para tratamento das águas.

Fabrício: Professor, elementos de uma cidade-esponja podem ser introduzidos em cidades altamente impermeabilizadas, como muitas aqui do Brasil?

Paulo: Então, acontece que quando nós perdemos o pé do nosso acordo com as águas, quando adotamos esse modelo de engenharia hidráulica que está presente até hoje aqui nas cidades brasileiras como um todo, nós perdemos a capacidade de resistir ao avanço das águas, nós perdemos a capacidade de regenerar as águas, nós perdemos a capacidade de viver em conforto com as águas, em paz com as águas. E isso apresentou o quê? Que nós quando lidamos com o solo, quando nós criamos toda uma interrupção desse ciclo hidrológico, nós perdemos essa capacidade, fechando e impermeabilizando a superfície da cidade, retificando e acelerando os cursos d'água. Acontece que hoje, nós podemos refazer isso. Então todos os nossos espaços abertos ou espaços livres das cidades podem ser recondicionados a serem espaços que recebam e retenham as águas e tratem as águas para que elas possam voltar a ter essa função de áreas de recreação, de áreas de conforto paisagístico, de áreas de contemplação e de áreas de produção. Então nós temos hoje na cidade uma série de espaços que não precisam voltar a ter aquela... desenho, ou aquela cara das antigas várzeas, mas eles podem funcionar como aquelas várzeas funcionavam, como as matas funcionavam. Você pode trabalhar isso no desenho da cidade hoje. Então, é só uma questão de reconfigurar os espaços abertos, mesmo, as áreas edificadas, as próprias coberturas das edificações, as paredes, enfim, tem todo um conjunto de estratégias que pode se adaptar, serem adaptados e aplicados nas áreas urbanas, como elas estão hoje, e podem criar uma certa... evidentemente, eles vão complementar esta infraestrutura implantada nos últimos cem anos. Evidentemente que nós já estamos com a cidade construída nesse modelo atual, mas nós não devemos perder a oportunidade de criar mais uma camada de segurança para esse modelo existente. E isso pode ser feito com as intervenções na cidade como ela está hoje. Nós temos uma série de exemplos que a gente podia aplicar, vendo a cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil.

Fabrício: Algum deles está sendo aplicado hoje, professor?

Paulo: Sim, nós já aplicamos até. Mesmo São Paulo, depois que ela mudou de paradigma no tratamento das águas, nós ainda tivemos, há um tempo atrás, a ideia de "vamos preservar o resto da várzea da cidade". Então, nós criamos o Parque Ecológico do Tietê, ali acima da Penha, em direção a Guarulhos, que foi muito interessante. Foi uma... Era um parque alagável, e isso é um exemplo de um modelo que pode ser aplicado.

Fabrício: Nós conversamos com o arquiteto, paisagista e urbanista Paulo Pellegrino, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, um estudioso da interação das águas com a paisagem urbana. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.

Paulo: Ah, imagina, o prazer foi meu.

Locutor: *Podcast Pesquisa Brasil*. Episódio "Cidades-esponja em construção". Crédito: *Podcast* Pesquisa Brasil; Revista Pesquisa Fapesp. Locução: Jader Cardoso/ID/BR.

Podcast Pesquisa Brasil: Cidades-esponja em construção. Revista *Pesquisa Fapesp*, São Paulo, 12 jul. 2024. *Podcast*. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/cidades-esponja-em-construcao/. Acesso em: 2 out. 2024.

UNIDADE 8

Página 400

***PODCAST* – Microplásticos**

Fabrício Marques: Os microplásticos estão em toda parte e a ciência ainda não sabe ao certo o tamanho do prejuízo que esse tipo de poluição pode causar aos ecossistemas e à saúde humana. Fragmentos e esferas de plástico ou pedacinhos de filmes ou de fibras com até cinco milímetros estão presentes no ar que respiramos, nos oceanos, nos rios, na água de torneira ou em peixes consumidos pelo homem. Em seres humanos, já foram detectados microplásticos nos pulmões, na corrente sanguínea e até na placenta de mulheres grávidas. Estudos feitos por grupos de pesquisa do país procuram avaliar como a costa brasileira está acumulando microplásticos. Uma pesquisa recente analisou amostras de ostras e mexilhões no estuário

Não escreva no livro.

de Santos, no litoral paulista, e comparou os resultados com dados coletados em localidades de 40 países. A conclusão foi que o estuário de Santos é um dos lugares mais contaminados por microplásticos do mundo. O artigo foi publicado em maio [de 2023] na revista científica *Science of the Total Environment*. E nós vamos conversar agora com o coordenador desse trabalho, o biólogo marinho Ítalo Braga de Castro, do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, antes de perguntar sobre os resultados do estudo, eu queria que o senhor falasse sobre a origem desses microplásticos encontrados na costa brasileira. De onde eles vêm?

Ítalo Braga de Castro: Bom, existem duas origens gerais para os microplásticos: aqueles primários, que são lançados no ambiente já em tamanho muito pequeno, e existem os secundários, que são produto da degradação de utensílios ou itens maiores. No caso do que a gente vem encontrando no litoral brasileiro, especialmente no litoral de Santos, nós temos visto microfibras, né, o que sugere que a origem muito provavelmente é da indústria têxtil. Quando eu me refiro à indústria, pode ser também lavagem de roupa doméstica, né, porque os sistemas de tratamento de esgoto não são capazes de remover isso durante o tratamento.

Fabrício: Quer dizer, o esgoto lançado diretamente no mar carrega os microplásticos que contaminam o estuário de Santos, é esse é o diagnóstico?

Ítalo: Exatamente. Então, as pessoas lavam roupa em casa. O efluente da lavagem de roupa, seja da máquina de lavar, seja do tanquinho, é colhido pela rede de esgotos, isso passa por estação de tratamento, mas não há lá na estação de tratamento nenhuma tecnologia capaz de remover. Isso acaba sendo lançado no mar, e aí as marés, as correntes costeiras tratam de espalhar. É só importante enfatizar que não é o sistema de tratamento de Santos que não tem tecnologia. O mundo inteiro hoje se debate com esse problema.

Fabrício: Professor, mas você sabe por que em Santos isso aparece de uma forma mais aguda do que em outras localidades?

Ítalo: Provavelmente o problema é tão grave em Santos porque nós temos aí uma zona costeira densamente urbanizada, né? Então, a região da Baixada Santista, não só Santos, tá entre as regiões mais densamente urbanizadas do litoral brasileiro. Então esse aglomerado grande de pessoas, a grande quantidade de atividades industriais, atividade portuária, tudo isso contribui para os impactos mais agudos aqui no litoral paulista.

Fabrício: Qual foi a concentração de microplásticos encontrada no estuário de Santos?

Ítalo: Em alguns organismos de Santos, nós chegamos a encontrar cerca de 300 partículas em um único indivíduo. A concentração média dos pontos mais contaminados se aproxima de 20 partículas por grama de tecido. E quando nós comparamos isso com mais de cem estudos feitos em 40 países, Santos apresentou-se, para as duas espécies que nós testamos, entre os cinco locais mais contaminados, com base nos estudos que já haviam sido feitos com essas espécies.

Fabrício: Vocês já estudaram outros pontos da costa brasileira? Há lugares com problemas equivalentes?

Ítalo: O estudo de Santos foi, na verdade, um projeto-piloto. Nós testamos a viabilidade de uso de duas espécies que são abundantes no litoral brasileiro para posteriormente iniciar um monitoramento nacional. O projeto que hoje eu tenho vigente junto à Fapesp corresponde exatamente a esse monitoramento nacional. Então, no ano que vem [2024], nós estaremos levando o projeto para seis regiões costeiras do litoral brasileiro, que vão desde Fortaleza até o extremo sul do Rio Grande do Sul, aonde nós vamos avaliar, usando as ferramentas que nós aperfeiçoamos no primeiro trabalho, ao longo de todo o litoral, esse problema. Mas, já temos alguns dados preliminares que dão conta que existem níveis muito altos também em outros locais da costa brasileira.

Fabrício: Professor, qual é o impacto dos microplásticos na vida marinha?

Ítalo: A população, ela tá muito acostumada a entender o impacto dos utensílios plásticos grandes. É comum ver animais emalhados em redes de pesca ou objetos sendo retirados de aberturas naturais, né, tem um vídeo de uma tartaruga que ficou muito famoso extraindo o canudo da narina, mas os microplásticos causam problemas muito semelhantes, mas para uma fauna, vamos dizer, menos comovente para a população, a fauna de invertebrados: pras algas, pro fitoplâncton, pro zooplâncton. Então, na medida em que esses organismos são impactados pelos efeitos da exposição aos microplásticos, você tem aí danos potenciais aos serviços ecossistêmicos que eles prestam para os seres humanos. E aí, entre os impactos específicos, você tem, por exemplo, desde a obstrução de tratos gastrointestinais, você tem dificuldades respiratórias, você tem estresse oxidativo, você tem a veiculação de substâncias químicas perigosas adsorvidas aos microplásticos pra esses organismos. Então a literatura já documenta fartamente os impactos que esses resíduos podem produzir no caso dos microplásticos, principalmente, mas não exclusivamente, nos invertebrados marinhos.

Fabrício: E esses invertebrados estão na cadeia alimentar de outros animais marinhos, não é? E como os microplásticos se disseminam pelas cadeias alimentares?

Ítalo: Perfeitamente. Então, na medida em que um organismo acumula microplásticos, e ele é presa de uma outra espécie, você tem aí uma potencial biomagnificação desse contaminante nos níveis tróficos superiores. Então, tentando ser mais objetivo: na medida em que um determinado peixe, por exemplo, consome um molusco, se esse molusco tiver acumulado microplásticos, esses microplásticos passarão ao peixe. Óbvio, uma parte disso pode ser excretada, pode ser metabolizada, mas uma parte também acumula. Isso certamente vai transitando na cadeia alimentar para os níveis tróficos mais altos, incluindo o ser humano. Não é por acaso que já há dados reportando a ocorrência de microplásticos no sangue humano, no coração humano, no pulmão humano, entre outros órgãos.

Fabrício: Professor, que medidas poderiam ser tomadas para conter a disseminação de microplásticos na costa brasileira?

Ítalo: Perfeitamente, Fabrício. Eu acho que primeiro a gente tem que investir mais em monitoramento. A gente revelou um problema no litoral paulista, tem vários colegas trabalhando em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, aqui também em São Paulo. Então, a gente tem que investir claramente para entender a dimensão e a magnitude, né? Que outras áreas estão contaminadas? Por exemplo, as áreas marinhas protegidas do Brasil, do estado de São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Arquipélago de Alcatrazes, Laje de Santos estão sob ameaça dos microplásticos? Então, a gente precisa responder essas perguntas. Eu acho que é o primeiro passo, e aí traçar um diagnóstico preciso do problema. A partir daí, com base em dados que já temos e que geraremos, eu acho que a gente tem que começar a pensar em política pública, né? E eu acho que a principal política pública nesse momento seria uma revisão da política nacional, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que, embora tenha sido um avanço para o país, ele nem sequer menciona os microplásticos. Então, eu acho que é importante que se implante políticas públicas e também políticas de contenção, redução, reciclagem... Já tá muito claro para a comunidade científica internacional que o problema do plástico, ele não vai ser resolvido com uma bala de prata. Ele precisa de uma ação múltipla em diferentes perspectivas: programas de redução, substituição... Temos talvez que sobretaxar o plástico, diminuir a carga tributária sobre produtos alternativos. Tudo isso para estimular a população a utilizar cada vez mais itens de uso longo e não de uso único, né? E, na medida do possível, também substituir por materiais que sejam menos lesivos, que sejam degradáveis, entre outras coisas.

Locutor: *Podcast Pesquisa Brasil*. Episódio "A presença dos Microplásticos". Crédito: *Podcast* Pesquisa Brasil; Revista Pesquisa Fapesp. Locução: Jader Cardoso/ID/BR.

Podcast Pesquisa Brasil: a presença dos microplásticos. Revista *Pesquisa Fapesp*, São Paulo, 7 out. 2024. *Podcast*. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/a-presenca-dos-microplasticos/. Acesso em: 2 out. 2024.

BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Atkins, P.; Jones, L. *Princípios de Química*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

O livro apresenta uma introdução abrangente aos principais conceitos e áreas da Química, abordando tanto aspectos teóricos quanto práticos do campo de estudo.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Base Nacional Comum Curricular*: educação é a base. Brasília, DF: MEC/SEB, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 22 out. 2024.

A BNCC é um documento de caráter normativo, que define o conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica, incluindo o Ensino Médio.

Brown, T. L. *et al. Química*: a ciência central. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

A obra apresenta uma abordagem detalhada de princípios básicos da Química, como equilíbrio, termodinâmica e eletroquímica.

Bruice, P. Y. *Organic Chemistry*. 8. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2015.

O livro aborda os fundamentos da Química Orgânica, com foco em estruturas, reatividade, mecanismos de reação e a síntese de compostos orgânicos, além de explorar as aplicações práticas desses conceitos na biologia, medicina e indústria.

Caramori, G. F.; Oliveira, K. T. Aromaticidade: evolução histórica do conceito e critérios quantitativos. *Química Nova*, v. 32, n. 7, p. 1871-1884, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/Q5msxtL66xLr5jPN8Qjs53S/. Acesso em: 22 out. 2024.

O artigo discute a evolução histórica do conceito de aromaticidade na Química, revisando os critérios qualitativos e quantitativos utilizados para definir e identificar compostos aromáticos ao longo do tempo.

Chassot, A. *A ciência através dos tempos*. São Paulo: Moderna, 2003.

A obra aborda o conhecimento humano ao longo da história, os saberes e as relações entre ciência e tecnologia.

Kotz, J. C. *et al. Chemistry and chemical reactivity*. 11. ed. Boston: Cengage Learning Inc., 2023.

O livro trata, entre outros assuntos, dos princípios e das aplicações da Química, bem como da reatividade de elementos químicos e seus compostos.

Haynes, W. M. (ed.). *CRC. Handbook of Chemistry and Physics*. 97. ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

Manual de referência que contém dados científicos e técnicos.

Matriz Energética e Elétrica. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica. Acesso em: 4 out. 2024.

O documento oferece uma visão geral da composição e da evolução das fontes de energia utilizadas no Brasil, detalhando a participação de energias renováveis e não renováveis no cenário energético nacional, além de fornecer dados e análises sobre a geração, a distribuição e o consumo de energia no país.

Nelson, D. L.; Cox, M. M. *Lehninger Principles of Biochemistry*. 4. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2004.

O livro aborda os fundamentos da Bioquímica, explorando a estrutura e a função de biomoléculas, o metabolismo e os princípios moleculares da Biologia Celular.

Panico, R. *et al. Guia Iupac para a nomenclatura de compostos orgânicos*. Tradução: Ana Cristina Fernandes *et al*. Lisboa: Lidel, 2002.

O guia trata da nomenclatura, em língua portuguesa, de compostos orgânicos.

Sagan, C. *O mundo assombrado pelos demônios*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

Carl Sagan explora explicações pseudocientíficas, reforçando o poder positivo e benéfico da ciência.

Shriver, D. F.; Atkins, P. W.; Langford, C. H. *Inorganic chemistry*. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Livro com conhecimentos gerais de Química Inorgânica, elementos químicos, entre outros.

Siglas de exames e universidades

Acafe-SC – Associação Catarinense das Fundações Educacionais
Cesgranrio-RJ – Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio
Enem – Exame Nacional do Ensino Médio
Enem PPL – Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade

Famerp-SP – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
FCM-MG – Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
FCMSC-SP – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Fuvest-SP – Fundação Universitária para o Vestibular
Udesc – Universidade do Estado de Santa Catarina
UEA-AM – Universidade do Estado do Amazonas
Uece – Universidade Estadual do Ceará
UEL-PR – Universidade Estadual de Londrina
UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais
Uerj – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UERR – Universidade Estadual de Roraima
UFC-CE – Universidade Federal do Ceará
UFJF-MG – Universidade Federal de Juiz de Fora
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
UFPA – Universidade Federal do Pará
UFPR – Universidade Federal do Paraná
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRR – Universidade Federal de Roraima
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UFSCar-SP – Universidade Federal de São Carlos
UFSM-RS – Universidade Federal de Santa Maria
UFU-MG – Universidade Federal de Uberlândia
Unemat-MT – Universidade do Estado de Mato Grosso
Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Unicamp-SP – Universidade Estadual de Campinas
Unifesp – Universidade Federal de São Paulo
Unifor-CE – Universidade de Fortaleza
UPF-RS – Universidade de Passo Fundo
Urca-CE – Universidade Regional do Cariri

Não escreva no livro.

QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA

MANUAL DO PROFESSOR

APRESENTAÇÃO

CARA PROFESSORA, CARO PROFESSOR,

O principal objetivo deste Manual é oferecer subsídios e sugestões para o trabalho cotidiano na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e seus componentes curriculares (Biologia, Física e Química), apresentando suas diversas possibilidades escolares e, mais ainda, sociais.

O Novo Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõem iniciativas para alguns dos diversos desafios que enfrentamos como cidadãos brasileiros atualmente, como o de estarmos preparados para as novas formas de uso das tecnologias de comunicação e informação, visando utilizá-las de maneira ética e autônoma. Mais uma vez, a educação é o meio estratégico para que as transformações sociais possam ocorrer e para que os estudantes participem ativamente da construção de um mundo cada vez mais justo, social e ambientalmente.

Na primeira parte deste Manual, são abordados os principais aspectos teóricos e metodológicos do ensino das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, bem como de seus componentes curriculares, e as perspectivas pedagógicas que fundamentam a coleção. Também são propostas reflexões e sugestões sobre os processos de avaliação. Há, ainda, a descrição comentada da estrutura dos livros da coleção, os quadros de conteúdos de seus volumes, sugestão de cronograma para este volume e referências bibliográficas acompanhadas de sinopses.

A segunda parte do Manual oferece orientações mais específicas para o planejamento e o trabalho em sala de aula com o Livro do Estudante deste volume de Química. São disponibilizadas orientações didáticas e sugestões pedagógicas detalhadas, além de atividades complementares e respostas das atividades do Livro do Estudante. Essa parte também apresenta indicações de *sites*, livros, artigos, portais digitais e outros materiais que, de alguma maneira, podem apoiar a ação docente.

Com isso, esperamos que este material possa dar suporte à oferta de caminhos didáticos criativos e significativos às diversas comunidades escolares de nosso país, ampliando as possibilidades de futuro de nossos jovens.

Bom trabalho!

Equipe editorial

SUMÁRIO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO DA OBRA 428

Ensino Médio em contexto **428**
O Ensino Médio ao longo do tempo 428
A etapa do Ensino Médio 428
O Novo Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular 429
Temas Contemporâneos Transversais 430
As Ciências da Natureza na BNCC 431
O jovem, a escola e o Ensino Médio **431**
Juventudes, currículo e equidade 431
Escola e inclusão 432
O ensino de Ciências da Natureza **433**
Ciências da Natureza e interdisciplinaridade 433
A Biologia no contexto das Ciências da Natureza 433
A Física no contexto das Ciências da Natureza 434
A Química no contexto das Ciências da Natureza 434
Contextualização da ciência 435
O papel do professor no Ensino Médio 435
Formas de organização da turma 436
Estratégias e abordagem teórico-metodológica **436**
Desenvolvimento de competências 436
Investigação, prática e linguagem científica 438
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 439
Argumentação 439
Leitura inferencial 440
Pensamento computacional 440
Avaliação 440
O papel do estudante e as formas de avaliação 440
Avaliação e novos paradigmas educacionais 441
Preparação para exames 442
Objetivos gerais da coleção **442**
Organização da obra **442**
Organização e estrutura da obra 442
Sugestão de cronograma **444**
Quadros de conteúdos da coleção **446**
Bibliografia comentada e leituras complementares **452**

ORIENTAÇÕES E COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 453

Unidade 1 **Química e estudo dos materiais** **453**
Unidade 2 **O macro e o micro** **467**
Unidade 3 **O comportamento das substâncias** **478**
Unidade 4 **Energia e transformações da matéria** **488**
Projeto 1 **Produtos químicos em casa: manual para identificação, uso e armazenagem** **497**
Unidade 5 **Eletroquímica** **499**
Unidade 6 **Equilíbrios químicos** **509**
Unidade 7 **A química da vida** **523**
Unidade 8 **Química, sistema produtivo e ambiente** **535**
Projeto 2 **Série de vídeos: identificando *fake news* sobre temas científicos** **543**

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO DA OBRA

ENSINO MÉDIO EM CONTEXTO

O Ensino Médio ao longo do tempo

Historicamente, o acesso ao Ensino Médio no Brasil era restrito, e os avanços em busca da universalização dessa etapa do ensino são recentes. Um dos marcos no processo de redemocratização do país foi o estabelecimento da Assembleia Constituinte em 1987, durante a qual diversos setores da sociedade se manifestaram em favor da elaboração de um novo conjunto de leis para a nação. A Constituição promulgada em 1988 proporcionou avanços significativos para a Educação ao expressar como direitos fundamentais, entre outros:

- a obrigatoriedade e a gratuidade do Ensino Fundamental;
- a progressiva universalização do Ensino Médio;
- o atendimento a crianças de zero a 6 anos[1] de idade e a pessoas com deficiência física ou mental;
- a educação de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação formal na idade recomendada[2].

Ficou também expresso na lei que é dever da educação pública preparar o indivíduo para seu desenvolvimento pleno, para o exercício da cidadania e para a qualificação para o mercado de trabalho, dispondo assim sobre os objetivos e a qualidade do ensino. A legislação estabelece, portanto, que apenas uma educação de qualidade contempla adequadamente o direito social previsto pela Constituição.

Essas resoluções foram devidamente organizadas em forma de um projeto, que contou com a participação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). Após oito anos de discussões e votações, em dezembro de 1996 foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)[3], que, em momentos posteriores, ganhou novos artigos. Apesar de a nova lei não contemplar, por si, a revolução educacional, ela amparou a política educacional em nível nacional, organizando, estruturando e permitindo transformações, reformas e inovações na educação formal. Em relação à legislação anterior[4], a nova LDB introduziu avanços importantes, especialmente para o Ensino Médio. Até então, o acesso a essa etapa de ensino era restrito e tinha somente dois objetivos: preparar o educando para o Ensino Superior ou para uma formação de caráter técnico-profissional. A nova LDB incluiu o Ensino Médio como parte da Educação Básica[5], com possibilidade de articulação com o ensino profissionalizante. Em seu artigo 35, essa lei define que o Ensino Médio tem como finalidades:

> I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
> II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
> III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
> IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
>
> (Brasil, 1996)

Além disso, a LDB prevê o desenvolvimento de habilidades e conteúdos obrigatórios, de forma que o Ensino Médio, ao atender à formação geral do jovem, possa prepará-lo também para o exercício de profissões técnicas.

Nota-se que tal diretiva considera o jovem um sujeito singular, cujo projeto de vida é construído por suas múltiplas relações sociais. Nesse sentido, estabelecidos os objetivos mencionados para o Ensino Médio, o tema passou a fazer parte da agenda das políticas educacionais, na medida em que se fazia necessária a criação de mecanismos que permitissem a implementação da política em âmbito nacional. Entre esses mecanismos, incluem-se a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que, mais tarde, em 2009, passaria por significativa atualização. Somada a essas ações, destaca-se a ampliação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), também para essa etapa de ensino. É importante lembrar que foi em 1998 que o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu as bases para tais ações, ao publicar as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, em consonância com a LDB.

A etapa do Ensino Médio

O Ensino Médio tornou-se um direito universal subjetivo dos cidadãos brasileiros a partir de 2009, por meio da Emenda Constitucional n. 59/2009 (Brasil, 2009), que ampliou a obrigatoriedade escolar para a faixa dos 4 aos 17 anos de idade. Desde então, essa etapa de ensino passou a ser reconhecida como fundamental para a construção da cidadania, na medida em que

1 A Emenda Constitucional n. 53, de 19 dezembro de 2006, alterou a idade para até 5 anos. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/540656. Acesso em: 18 ago. 2024.

2 Brasil. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Art. 208. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 ago. 2024.

3 Brasil. *Lei n. 9 394, de 20 dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 18 ago. 2024.

4 Brasil. *Lei n. 5 692, de 11 agosto de 1971*. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692impressao.htm. Acesso em: 18 ago. 2024.

5 Brasil. *Lei n. 9 394, de 20 de dezembro de 1996*, arts. 21 e 22. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei%209394.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

possibilita aos nossos jovens expandir seus horizontes mediante o acesso ao conhecimento historicamente acumulado, de modo que ganhem autonomia intelectual e ferramentas para o pleno exercício da cidadania e dos demais direitos sociais.

No entanto, o Ensino Médio tem uma particularidade. Por ser a última etapa da Educação Básica, faz-se necessário reconhecê-la dentro de uma visão sistêmica, não apenas no âmbito da formação de cidadãos, mas também como transição para outras etapas da vida, como explicitado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN):

"Visão sistêmica implica, portanto, reconhecer as conexões intrínsecas entre Educação Básica e Educação Superior; entre formação humana, científica, cultural e profissionalização [...]" (Brasil, 2013, p. 147).

As expectativas para essa etapa são tantas que chegam a ser mencionadas como fundamentais para o desenvolvimento do país.

> Para alcançar o pleno desenvolvimento, o Brasil precisa investir fortemente na ampliação de sua capacidade tecnológica e na formação de profissionais de nível médio e superior. Hoje, vários setores industriais e de serviços não se expandem na intensidade e ritmos adequados ao novo papel que o Brasil desempenha no cenário mundial, por se ressentirem da falta desses profissionais. Sem uma sólida expansão do Ensino Médio com qualidade, por outro lado, não se conseguirá que nossas universidades e centros tecnológicos atinjam o grau de excelência necessário para que o País dê o grande salto para o futuro.
>
> (Brasil, 2013, p. 145)

Contudo, ainda que sua importância venha sendo defendida e amparada em leis e documentos oficiais sobre a educação no país, essa etapa de ensino apresenta problemas de acesso e altas taxas de evasão e defasagem.

Esse cenário pode ser explicado por inúmeros fatores, como os de ordem social, política, econômica, entre outros, que se combinam de forma complexa e em diferentes proporções, dependendo da realidade de cada local. Mas um aspecto tem sido frequentemente mencionado: a falta de sentido que muitos jovens veem no Ensino Médio.

Os jovens em idade de frequentar o Ensino Médio têm anseios próprios e estão preocupados não apenas com a profissão que exercerão no futuro, como também com outros aspectos de sua vida: social, afetivo, criativo, etc. Além disso, com as transformações sociais ocorridas nos séculos XX e XXI e a revolução promovida pelas tecnologias da informação e da comunicação no que se refere ao acesso ao conhecimento, os estudantes do Ensino Médio vivem de modo mais agudo a crise que a instituição escolar e o próprio papel do professor têm enfrentado.

> Conforme Oliveira (2008)[6], a escola, e aqui tratando especificamente o Ensino Médio, já não se apresenta como representante único e legítimo de uma cultura a ser transmitida. Para Abramovay e Castro (2003)[7], tal monopólio da produção de significados não é predominante frente às múltiplas formas oferecidas aos jovens para construírem percepções sobre o mundo. Os mesmos trazem à escola suas próprias linguagens e culturas, fazendo-se atores, sujeitos ativos na construção da forma de ser no espaço escolar e não apenas receptores de conteúdos com fins de memorização.
>
> Nesse contexto, a cultura escolar e o processo de ensino vivenciado no Ensino Médio perdem lugar para as diferentes culturas que o jovem experimenta, como a cultura do *skateboard*, do *hip-hop*, do *funk*, da grafitagem, antagonicamente divergente da escola na maior parte das vezes, que fica fechada em si, não oferecendo espaços de abertura à criatividade, ao nomadismo, às inúmeras idas e voltas que têm caracterizado os espaços juvenis (Pais, 2006)[8].
>
> [...]
>
> Parece ser esse um dos aspectos do Ensino Médio que denota a sua crise: as dificuldades em conformar os jovens à cultura escolar. Tais situações reforçam a ideia que permeia a reflexão acerca da juventude e de processos de escolarização, ou seja, o Ensino Médio ainda se faz palco de práticas de longa duração, as quais nem sempre atendem à diversidade de interesses de seu público e, logo, manifestam-se dificuldades no estabelecimento de relações de sentido por parte dos alunos jovens.
>
> (Tomazetti e Schlickmann, 2016, p. 334-335)

Assim, um ensino desvinculado desses anseios dificilmente terá êxito em atrair os jovens e cumprir sua função.

Por esse motivo, as DCN já apontavam: "É sabido que a questão do atendimento das demandas das 'juventudes' vai além da atividade da escola, mas entende-se que uma parte significativa desse objetivo pode ser alcançada por meio da transformação do currículo escolar e do projeto político-pedagógico" (Brasil, 2013, p. 147).

O Novo Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular

A crise apontada anteriormente pode ser tomada como incentivo para novas configurações escolares que atribuam valor a professores e estudantes.

Visando promover mudanças necessárias e propondo a construção de uma identidade própria para o Ensino Médio, foi idealizada uma reforma dessa etapa educacional, processo esse que foi oficialmente instituído em 2017 (Brasil, 2017) e posteriormente passou por amplo processo de escuta social e institucional, resultando na lei de reforma do Ensino Médio, a Lei n. 14 945, de 31 de julho 2024.

A reforma no Ensino Médio aliou-se ao estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC (Brasil, 2018) no esforço conjunto de implementar de forma efetiva uma nova proposta de ensino, com o desafio de aproximar os estudantes do mundo contemporâneo.

Nesse sentido, com o objetivo de atender às necessidades da formação geral e à diversidade de expectativas dos jovens quanto à própria formação, a BNCC destaca a importância de "recontextualizar as finalidades do Ensino Médio, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, art. 35) há mais de vinte anos, em 1996" (Brasil, 2018, p. 464).

A reforma do Ensino Médio prevê maior tempo na escola, mas não necessariamente maior ênfase na transmissão de conhecimentos conceituais. Ao contrário, ela pressupõe mais espaço e tempo para práticas diversificadas e flexíveis, maior integração entre os saberes, opções de itinerários conforme o interesse dos estudantes e um olhar para a construção de seus projetos de vida.

6 Oliveira. A. M. *Jovens e adolescentes no Ensino Médio*: sintomas de uma sistemática desvalorização das culturas juvenis. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.

7 Abramovay, M.; Castro, M. G. *Ensino Médio*: múltiplas vozes. Brasília, DF: Unesco/MEC, 2003.

8 Pais, J. M. Buscas de si: expressividades e identidades juvenis. *In*: Almeida, M. I. M.; Eugenio, F. *Culturas jovens*: novos mapas do afeto. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 7-10.

Essa nova estrutura do Ensino Médio [...] adota a **flexibilidade** como princípio de **organização curricular**, o que permite a construção de currículos e propostas pedagógicas que atendam mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes, estimulando o exercício do **protagonismo juvenil** e fortalecendo o desenvolvimento de seus projetos de vida.

(Brasil, 2018, p. 468)

Vale ressaltar a importância dos fundamentos científico-tecnológicos para as várias juventudes e seus interesses. Para que sejam de fato garantidos, de modo a relacionar teoria e prática,

[...] a **escola que acolhe as juventudes**, por meio da articulação entre diferentes áreas do conhecimento, deve possibilitar aos estudantes:

- compreender e utilizar os conceitos e teorias que compõem a base do conhecimento científico-tecnológico, bem como os procedimentos metodológicos e suas lógicas;
- conscientizar-se quanto à necessidade de continuar aprendendo e aprimorando seus conhecimentos;
- apropriar-se das linguagens científicas e utilizá-las na comunicação e na disseminação desses conhecimentos; e
- apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e tornar-se fluentes em sua utilização.

(Brasil, 2018, p. 467)

Em caráter complementar, a BNCC passa a determinar quais aprendizagens comuns e obrigatórias, conectadas às competências que preparam os jovens para a vida, devem ser trabalhadas nas escolas de todo o país. É importante ressaltar a inter-relação entre aprendizagem e competências.

Na BNCC, **competência** é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a "educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza" (Brasil, 2013[9]), mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU[10]).

(Brasil, 2018, p. 8)

A BNCC propõe, para a etapa do Ensino Médio, uma organização curricular que possibilite a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, o conhecimento dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, além de abordagens e temas mais próximos das culturas juvenis, do mundo do trabalho e de dinâmicas e questões sociais do mundo contemporâneo.

9 Brasil. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. *Educação em direitos humanos*: diretrizes nacionais. Brasília, DF: Coordenação Geral de Educação/Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 18 ago. 2024.

10 Organização das Nações Unidas (ONU). *Transformando nosso mundo*: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel. Acesso em: 18 ago. 2024.

As aprendizagens essenciais da etapa seguem orientadas pelas dez competências gerais da Educação Básica e são organizadas em quatro áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas). Cada área do conhecimento é pautada por suas competências específicas, que são articuladas às habilidades a serem desenvolvidas ao longo do Ensino Médio. As habilidades estão relacionadas a diferentes conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

Na BNCC, para cada área do conhecimento, são definidas **competências específicas**, articuladas às respectivas competências das áreas do Ensino Fundamental, com as adequações necessárias ao atendimento das especificidades de formação dos estudantes do Ensino Médio. [...]

Relacionadas a cada uma dessas competências, são descritas **habilidades** a ser desenvolvidas ao longo da etapa [...].

(Brasil, 2018, p. 470)

Em relação à complexidade e amplitude das competências, de acordo com a BNCC (p. 8), as dez competências gerais "consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento". Por sua vez, em relação às competências específicas das áreas, a BNCC informa:

Essas competências explicitam como as competências gerais da Educação Básica se expressam nas áreas. Elas estão articuladas às competências específicas de área para o Ensino Fundamental, com as adequações necessárias ao atendimento das especificidades de formação dos estudantes do Ensino Médio.

(Brasil, 2018, p. 33)

Essa concepção evidencia a proposta de um ensino com foco no desenvolvimento da capacidade de aprender, de saber lidar com a disponibilidade cada vez maior de informações, de atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, de aplicar à resolução de problemas os saberes adquiridos, de tomar decisões de maneira autônoma, de ser proativo para identificar os dados em uma situação e buscar soluções pertinentes, de conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Nesse sentido, é salutar que os professores tenham autonomia para adaptar seu planejamento didático diante do projeto político pedagógico das escolas, visando à promoção dessas competências e habilidades.

Temas Contemporâneos Transversais

A BNCC também orienta que as escolas e redes de ensino incorporem a seus respectivos currículos e a suas propostas pedagógicas o trabalho com Temas Contemporâneos Transversais (TCTs). O objetivo é contextualizar o ensino com temas que afetam a vida humana, que despertam o interesse dos estudantes e que têm relevância em sua formação como cidadãos em diversas escalas (local, regional e global).

Os TCTs possibilitam estabelecer ligações entre diferentes componentes curriculares, atendem às demandas da sociedade contemporânea e contribuem para um ensino integrador e transversal. Essa abordagem se baseia na problematização da realidade e das situações de aprendizagem, na integração das habilidades e competências curriculares à resolução de problemas e na visão do conhecimento como uma construção coletiva.

Os TCTs perpassam diferentes áreas do conhecimento e se dividem em seis grandes áreas (ou macroáreas) temáticas, ilustradas no esquema a seguir:



Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Temas contemporâneos transversais na BNCC*: proposta de práticas de implementação. Brasília, DF: MEC/SEB, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_pratico_temas_contemporaneos.pdf. Acesso em: 18 ago 2024.

As Ciências da Natureza na BNCC

De modo geral, o ensino de Ciências da Natureza proposto na BNCC está alinhado a um enfoque no letramento científico.

> [...] poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos [...]. Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação Básica – em especial, a área de Ciências da Natureza – comprometer-se com o letramento científico da população.
>
> É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além do aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por meio de um olhar articulado da Biologia, da Física e da Química – define competências e habilidades que permitem a ampliação e a sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental no que se refere: aos conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental e histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Natureza.
>
> (Brasil, 2018, p. 547)

A abordagem da área de Ciências da Natureza deve ser compreendida não somente pelos conteúdos tradicionais mobilizados nas aulas, mas também pela possibilidade de aplicar nas práticas a lógica de produção de conhecimento usado nas Ciências da Natureza, que se baseia na investigação, na pesquisa, no raciocínio lógico, no pensamento crítico, na elaboração e verificação de hipóteses, entre outras estratégias.



Além disso, a própria discussão sobre os produtos e processos das ciências pode se articular ao dia a dia na sala de aula, possibilitando àqueles dispostos a realizar novas dinâmicas implementar um Ensino Médio relevante e efetivo para a formação dos jovens do século XXI.

O JOVEM, A ESCOLA E O ENSINO MÉDIO

Juventudes, currículo e equidade

De acordo com Dayrell e Carrano (2014), observou-se, nas últimas décadas, uma mudança significativa no modo como os jovens se comportam e se comunicam e no modo como expressam a própria identidade e opiniões, por meio de linguagens culturais. No contexto urbano, o sentido de pertencimento a um grupo somado aos impulsos pessoais de expressão de subjetividade levou os jovens a ocupar espaços públicos para produzir e expressar suas culturas. Assim, tais espaços passaram a ser entendidos como locais de uso coletivo ou espaços sociais que potencializam os encontros, as trocas e a expressão cultural deles. Os jovens passaram a se reunir nesses lugares não só para compartilhar ideias com seus pares e fruir manifestações artísticas, mas também para produzir músicas, vídeos, programas de rádios comunitárias, eventos culturais, entre outras formas de expressão.

> Por meio da produção dos grupos culturais a que pertencem, muitos deles recriam as possibilidades de entrada no mundo cultural além da figura do espectador passivo, ou seja, como criadores ativos. Por meio da música ou da dança que criam, dos *shows* que fazem ou dos eventos culturais que promovem, eles colocam em pauta, no cenário social, o lugar do jovem, principalmente no caso dos mais empobrecidos.
>
> (Dayrell e Carrano, 2014, p. 116)

Assim, os jovens estabeleceram uma nova relação com o consumo de bens culturais, tornaram-se protagonistas em seus meios e criaram novos modos de atuar na sociedade. Tudo isso indica que é salutar aproximar-se das culturas juvenis, acolhendo suas diversas modalidades de expressão, em uma educação que visa ao protagonismo e à autonomia.

Uma diferença importante é que muitos jovens do século XXI estão utilizando diversas formas de interação multimidiáticas e multimodais, em aplicativos educativos ou de entretenimento, por exemplo, e especialmente atuando nas redes sociais. Nesse cenário, existe um elemento fundamental a ser considerado: a desigualdade de acesso aos recursos tecnológicos. Enquanto algumas pessoas sentem que o uso exagerado das telas acirrou o imediatismo, o individualismo e a solidão, outras se sentem isoladas exatamente pelo inverso, ou seja, por não terem acesso a essas tecnologias e à internet. A pandemia de covid-19, que se iniciou em 2020 e persistiu por alguns anos, potencializou e escancarou os sentimentos de isolamento, ansiedade e exclusão, que não se restringiram a esse período, mas se tornaram problemas reais para as famílias e para a sociedade de forma ampla.

Se já não podíamos antes dizer que existe uma juventude, no singular, e padronizar nossa entrega aos estudantes, hoje, depois da publicação da BNCC e de tantos estudos nas áreas de educação, psicologia e sociologia, é imprescindível olhar para as individualidades e procurar enxergar que um jovem de periferia de uma metrópole provavelmente não tem as mesmas necessidades de um jovem que reside em um pequeno município rural, por exemplo. Temos uma diversidade de jovens e de juventudes no Brasil e no mundo – basta pensarmos em alguns fatores que claramente impactam a forma de vivenciar o mundo e de ser jovem, como gênero, local de residência, cor de pele, cultura da comunidade em que está inserido, entre outras.

A rede pública de ensino agrupa, em suas salas de aula, estudantes com diferentes perfis econômicos, sociais, políticos, identitários e de instrução; por isso, para que os objetivos de aprendizagem façam sentido para cada grupo específico de estudantes (ou seja, de cada escola, de cada ano, de cada turma), é preciso que esses objetivos sejam definidos com base no que se conhece de cada estudante, assegurando, com isso, que não se recorra a práticas de massificação e apagamento das diferenças observadas na turma, mas, sim, que se promova a equidade na educação. Equidade, como a própria BNCC explicita, significa, na prática, reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes.

Ao fazer as escolhas curriculares, é papel de cada rede considerar a comunidade que a integra, de maneira ampla, assim como devem ficar nas mãos das escolas e dos professores fazer as escolhas necessárias para que esse currículo dialogue com a realidade de seus estudantes e os engaje no desejo de aprendizagem. Desse modo, a equidade se explicita a cada escolha feita pelos atores que compõem cada rede estadual e municipal de ensino e cada comunidade escolar, e essas decisões devem, necessariamente, dialogar com os diferentes perfis culturais e socioeconômicos que cada sala de aula acolhe. Não se trata de uma tarefa fácil. Por isso, dessa perspectiva, é preciso engajamento, colaboração e respeito mútuo, para que seja possível garantir um melhor índice nas aprendizagens e uma cultura de paz na comunidade escolar e em seu entorno.

Escola e inclusão

Compreender que a diversidade é uma característica intrínseca à sociedade e, por consequência, às salas de aula é imperioso. Cada estudante traz uma bagagem de habilidades, experiências e necessidades, e é papel da escola e dos educadores reconhecer e valorizar essa diversidade. É essencial reconhecer que cada estudante é único e apresenta demandas e capacidades muito próprias.

Para aprofundar as percepções sobre a múltipla diversidade de condições dos estudantes do Ensino Médio, é importante identificar as especificidades de possíveis deficiências e transtornos. De acordo com o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015 –, as pessoas com deficiência são aquelas que "têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

Por sua vez, de acordo com a Resolução n. 4/2009 do Conselho Nacional de Educação Básica (Brasil, 2009), os estudantes com transtornos do neurodesenvolvimento são os "que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento psicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras". Os transtornos do neurodesenvolvimento englobam uma diversidade de condições que podem variar em nível e em grau, de acordo com o contexto. Nesse sentido, é possível citar o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Deficiência Intelectual (DI), o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e os transtornos de aprendizagem, sendo os mais comuns entre estes últimos a dislexia, a discalculia e a disgrafia.

É necessário compreender os desafios enfrentados pelos jovens que têm transtornos dessa ordem. Muitos deles podem apresentar dificuldades relativas à comunicação, interação social, compreensão das emoções dos outros, aprendizado acadêmico, bem como dificuldades comportamentais, sendo necessário adotar abordagens pedagógicas específicas para atender às necessidades de cada uma delas.

As deficiências, contudo, agrupam grande diversidade de condições humanas e podem se apresentar em diferentes dimensões, como a física (no caso de pessoas surdas e/ou cegas, de usuários de cadeiras de rodas, etc.) e a intelectual (por exemplo, a síndrome de Down). Assim como ocorre com os transtornos, é importante garantir ambientes que possam receber estudantes que apresentam tais condições e preparar-se para incentivá-los de maneira específica, adaptando propostas pedagógicas e ampliando o repertório escolar concernente a esse cenário.

Resumindo, esses jovens exigem uma política de gestão da escola para recebê-los e cuidar de sua formação, de acordo com seus direitos e suas possibilidades. A arquitetura inclusiva é essencial para facilitar o acesso à escola não só aos estudantes com condições físicas específicas, mas também a outras pessoas que tenham dificuldade de locomoção. É preciso incluir a disponibilização de material didático adaptado, a implementação de estratégias de ensino diferenciadas, como currículo individualizado, o suporte emocional e comportamental (se necessário), a tutoria e o uso de recursos digitais e até mesmo visuais (como os cartões de emoções, que ajudam a identificar os próprios sentimentos e a compartilhá-los com outras pessoas).

Outra estratégia eficaz é trabalhar com os jovens habilidades de resolução de problemas e conflitos. Aqueles que apresentam tais transtornos podem se sentir desafiados em situações de conflito, o que pode ser sanado ou amenizado mediante o ensino de habilidades de negociação, escuta e empatia.

Também pode-se explorar propostas de trabalho colaborativo, em duplas ou grupos, a expressão oral ou a dramatização como recursos para entender ou explicar o pensamento. No entanto, para cada jovem não bastam as estratégias de ensino, também é preciso repensar o que ensinar em função de suas possibilidades. Algumas orientações que podem auxiliar seu planejamento para esses estudantes estão listadas a seguir.

- Organizar o trabalho, combinando com a turma a maneira de realizá-lo, de modo que todos saibam o que se espera de cada um. Comece a aula organizando o que será feito, as tarefas e, se for o caso, as expectativas diferenciadas para os estudantes com deficiência.
- Selecionar conteúdos, relacionando os conceitos das Ciências da Natureza ao contexto e às experiências dos estudantes.
- Utilizar recursos digitais e ferramentas *on-line* que os estudantes possam acessar de acordo com seu potencial, permitindo, também, retomadas ou preparação prévia de qualquer lugar. Plataformas de aprendizagem *on-line*, vídeos educativos e aplicativos interativos podem ser muito úteis.
- Planejar o ensino colaborativo por meio do trabalho em grupo e a aprendizagem colaborativa. Diferentes estudantes podem se beneficiar ao compartilhar seus conhecimentos e habilidades.

Por fim, as decisões para a real inclusão de estudantes com deficiências devem sempre evidenciar, bem como assegurar e promover, em condições de igualdade, que a pessoa com deficiência faz parte do grupo social e é aceita do modo como se apresenta. Não se trata de oferecer concessões ou favores, mas de demarcar o território escolar como um espaço de acolhimento e de cidadania. Portanto, escolas verdadeiramente inclusivas são fundamentais para a construção de uma sociedade inclusiva. Acreditamos, com isso, que a diversidade de condições físicas e neurológicas pode ser bem atendida quando há promoção de valores, como colaboração e empatia; criação de ambientes acolhedores e seguros; valorização ativa da diversidade; e envolvimento da comunidade.

O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Ciências da Natureza e interdisciplinaridade

No amplo processo de reformulação do Ensino Médio, a flexibilização curricular é um dos principais pontos, bem como a ampliação da carga horária mínima, o foco no estudante e em seu desenvolvimento integral e a incorporação de práticas escolares mais dinâmicas e interativas. Essa flexibilização visa possibilitar que os estudantes escolham parte de seu percurso educativo como forma de conectar o aprendizado a seus interesses e projeto de vida. Com isso, o currículo do Ensino Médio passou a integrar formação geral e itinerários formativos. A formação geral, comum a todos os estudantes, está organizada por áreas do conhecimento integradas por componentes curriculares, propondo o trabalho com o conhecimento aplicado e tendo como foco o desenvolvimento de competências. Em relação às ciências naturais, estas estão organizadas na área de conhecimento Ciências da Natureza, a qual é integrada por Biologia, Química e Física.

Não é de hoje que se discute a articulação entre Biologia, Física e Química. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Brasil, 2013, p. 195) já propunham, em seu artigo 8, um "tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos". Em outros documentos oficiais que organizam o currículo, essas disciplinas integram o mesmo campo do conhecimento – a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Essa proximidade justifica-se pela existência de características comuns, como o caráter investigativo, com a aplicação de estruturas lógicas hipotético-dedutivas, e, muitas vezes, a mesma linguagem de sistematização e representação do conhecimento.

Nesse sentido, esta coleção procura oferecer os conteúdos da Biologia, da Física e da Química em seus respectivos volumes únicos, mas também promover a interdisciplinaridade sempre que possível. Isso ocorre por meio de atividades, de conteúdos ou temas pontuais, em seções e boxes, como as seções e os boxes *Biologia e...*, *Física e...* ou *Química e...* (a depender do volume em questão), assim como nos projetos ou em outras seções e momentos da obra. Com isso, procura-se a interação interdisciplinar sem perder de vista os conhecimentos dos componentes curriculares. Não se trata, portanto, de tirar de cena os conteúdos da Biologia, da Física e da Química, mas de promover a interação entre eles (ou com outros componentes curriculares) quando oportuno. É possível, assim, atuar com os componentes curriculares e, ao mesmo tempo, mobilizar o conhecimento destes para o tratamento dos temas interdisciplinares.

A abordagem de temas transversais e/ou contemporâneos e a realização de projetos também ganham especial importância. Tais estratégias são válidas e permitem enormes ganhos em eficácia na aprendizagem. Em ciências, sejam elas naturais, sejam humanas, há noções e conceitos-chave que permeiam os componentes curriculares. A seleção e a eleição dessas noções ou desses conceitos centrais como foco de trabalho interdisciplinar são muito instigantes. Pense, por exemplo, nas ideias de transformação ou de ciclo, ou em conceitos como energia, espaço e tempo. Todos eles estão presentes e são significativos em muitos componentes, da Física à História, da Geologia à Geografia, passando pela Química e pela Biologia. Essas ideias e esses conceitos de caráter interdisciplinar podem, portanto, ser uma motivação especial para a abordagem das ciências naturais.

Não há dúvida de que a interdisciplinaridade traz muitos desafios, especialmente para o professor. Primeiro, porque a formação do docente foi, provavelmente, de caráter estritamente disciplinar, com poucas oportunidades formativas de trabalho interdisciplinar. Segundo, porque, de maneira geral, a escola brasileira ainda carece de práticas organizacionais de trabalho colaborativo típicas de uma proposta interdisciplinar. No que diz respeito ao primeiro desafio, uma alternativa é a busca – em nível governamental, escolar e individual – por oportunidades de formação continuada do professor. Igualmente importante é a construção de aulas em conjunto com professores dos componentes curriculares que formam as Ciências da Natureza – como também de outras áreas de conhecimento. Quanto ao segundo desafio, um passo imprescindível é considerar a interdisciplinaridade na construção do próprio projeto político-pedagógico da escola.

A Biologia no contexto das Ciências da Natureza

Há registro do uso do termo "biologia", em 1766, pelo físico e filósofo alemão Michael Christoph Hanov (1695-1773). Contudo, foi só na primeira década do século XIX que o naturalista francês Jean-Batiste Lamarck (1744-1829) deu ao termo uma formulação mais sistemática, conferindo-lhe o significado de uma ciência da vida como fenômeno unificado e não somente dos seres vivos. Até então, algumas das áreas que mais tarde se tornariam disciplinas da Biologia estavam integradas à Medicina (casos da Anatomia e da Fisiologia), à História Natural e à Botânica. De fato, alguns autores consideram que somente após o advento da teoria da evolução pela seleção natural, elaborada pelos britânicos Charles Darwin (1809-1882) e Alfred Wallace (1823-1913), a Biologia consolidou-se como ciência, pois permitiu a unificação teórica de muitos fenômenos antes compreendidos de modo relativamente independente.

Atualmente a Biologia trabalha com uma diversidade imensa de organismos e atua sob o enfoque de várias áreas de pesquisa. Trata-se de uma ciência extremamente dinâmica – é o que comprova a publicação, a cada ano, de mais de centenas de milhares de artigos científicos relacionados às diversas áreas que a compõem. Além disso, novas fronteiras de investigação vêm sendo abertas. É o caso, por exemplo, de áreas de pesquisa impulsionadas pelo aperfeiçoamento de técnicas de biologia molecular, como a genética, a engenharia genética, a sistemática, etc.

Esse crescimento – não somente da Biologia, mas também da Física e da Química – nas últimas décadas impõe alguns desafios para os professores, os quais se veem diante da necessidade de compreender os fundamentos de diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, de se manterem atualizados, para auxiliar os estudantes na aquisição e na interpretação dos novos conhecimentos divulgados cotidianamente. Parte dessa tarefa pode ser facilitada se o professor tiver em mente, de modo bem assimilado, as teorias, as noções, as ideias e os conceitos mais importantes que sustentam a Biologia, como a teoria da evolução por seleção natural. Por meio da teoria da evolução, por exemplo, explicam-se inúmeros processos biológicos, tanto os microscópicos como os mais abrangentes, no nível do organismo ou mesmo no da biosfera. Ela é, portanto, uma teoria central da Biologia, e o domínio dos conceitos ligados aos mecanismos evolutivos, como os de competição, de adaptação e de seleção natural, se bem compreendidos, conferem aos estudantes a base requerida para a assimilação de muitos fenômenos e processos relativos a outras disciplinas da Biologia, tais como a Citologia, a Embriologia, a Botânica e a Zoologia. Assim como a teoria da evolução, há também outros temas ou conceitos estruturadores do pensamento em Biologia e, por isso, fundamentais – como a origem da vida, a transmissão da vida, a ética e a manipulação genética, a diversidade da vida, entre outros. Eles podem, por essa razão, ser empregados como norteadores no processo de ensino-aprendizagem.

A Física no contexto das Ciências da Natureza

A Física pode expandir a compreensão do mundo. Para transferir esse benefício à sociedade, é preciso assegurar o acesso dos estudantes aos saberes produzidos. No entanto, não interessa apenas que os estudantes tenham acesso aos conhecimentos da Física, mas que também tenham compreensão dos instrumentos que acompanham seu aprendizado, evitando generalidades sem significado.

Contudo, mesmo diante de sua importância na aquisição de competências investigativas, o ensino da Física – e, por vezes, da Química – pode ser considerado difícil e complicado. Em parte, isso se explica pelo formalismo matemático, muitas vezes necessário, na resolução de problemas. Por outro lado, nem sempre os estudantes conseguem se apropriar adequadamente dos conhecimentos matemáticos necessários a essa fase da escolaridade. Isso contribui para que a Física se distancie da vida e da realidade deles.

Nesse sentido, é essencial a contextualização do conhecimento científico, que pode ser traduzida em ações complementares: a identificação de fenômenos naturais e de tecnologias presentes na vida diária e a explicação ampla de tais fenômenos e tecnologias que envolvem dimensões do saber diversas. Há também o papel instigante e motivador da investigação científica como elemento característico das Ciências da Natureza no contexto físico, bem como as relações que a Física estabelece com outras áreas do conhecimento. Temas como estrutura da matéria, história da ciência, clima e aquecimento global e astrobiologia, por exemplo, permitem que a Física interaja com outros componentes curriculares, como a Química, a Biologia, a História, a Geografia, entre outros. Essas ações ainda podem servir como pontos de partida ou de apoio para a discussão de assuntos distantes da realidade imediata da sala de aula. A aproximação entre o científico e o cotidiano se dá inicialmente pelo reconhecimento de que existe um conhecimento empírico acumulado pelos estudantes do Ensino Médio e que tal conhecimento é fruto de suas vivências, de sua história pessoal e de sua inserção no mundo.

Por fim, pode-se ver a Física como elemento da ciência, mas também da cultura. Essa concepção reforça o redirecionamento dos elementos históricos, éticos e estéticos – antes empregados como meros objetos de motivação ou ilustração – para um papel de maior relevância. É preciso despertar nos estudantes a capacidade de perceber que a Física – assim como a Química e a Biologia – está presente também em diferentes campos da cultura: nas artes plásticas (como em pinturas e esculturas), na arquitetura, na literatura, nas histórias em quadrinhos, nos filmes, nas séries, no teatro, na música, nos esportes. Assim, é necessário trazer para o ensino de Física diferentes objetos culturais e, ao mesmo tempo, promover a difusão científico-cultural em diversas instâncias para além do ambiente escolar.

A Química no contexto das Ciências da Natureza

A sociedade interage com o conhecimento químico em vários níveis e por diferentes meios, como pela escolaridade formal, por meio da mídia ou por saberes populares. E não são só os químicos que fazem uso dessa ciência, mas também os profissionais de áreas diversas, como Medicina, Farmácia e Artes. Além disso, ela faz parte de inúmeras interações cotidianas. Com isso em mente, é importante ressaltar que a Química e alguns conceitos a ela relacionados são objetos de representações sociais pelos estudantes; portanto, considerar as concepções elaboradas por eles no decorrer da vida em sociedade é de extrema importância para que o processo de ensino-aprendizagem seja bem-sucedido, pois, em geral, tais representações estão solidamente incorporadas ao modo de pensar dos estudantes sobre os fenômenos que os cercam. Ao ignorar essas representações, o professor corre o risco de não se fazer compreender. A interpretação da expressão "substância química", por exemplo, pode ficar comprometida caso os estudantes considerem eventual visão negativa veiculada pela mídia, ou seja, interpretando-a como algo ruim, poluidor, tóxico, artificial, etc.

Nesse sentido, é salutar não reforçar visões maniqueístas a respeito da Química, segundo as quais ela estaria ligada meramente a aspectos negativos do cotidiano. Por exemplo, ao abordar a temática ambiental, é fundamental cuidar para que a Química não seja mostrada somente pelo viés de problemas ambientais, como a poluição de rios e solos, mas também como componente essencial para a sustentabilidade, como evidenciado pela Química Verde. Do mesmo modo, é importante explorar as variadas aplicações e a articulação da Química com outros componentes curriculares. Isso inclui abordar os ciclos biogeoquímicos em conjunto com a Biologia e a Geografia, os modelos atômicos em consonância com a Física e a reciclagem como ação sustentável e forma de subsistência, relacionando-a à Biologia e à Sociologia.

Desse modo, pode-se afirmar que o ensino de Química contribui de maneira eficaz para o pleno exercício da cidadania quando consegue levar os estudantes a relacionar os conceitos científicos entre si e com suas implicações socioeconômicas, culturais, ambientais e tecnológicas. Para isso, é preciso desmistificar a ideia de que a Química é algo distante da realidade dos estudantes, aproximando-a do cotidiano deles e da sala de aula, reforçando seu protagonismo.

Contextualização da ciência

Explicações fundamentadas no senso comum costumam ter um caráter local, específico, particularizado e, com frequência, inconsistente. Por isso é importante estabelecer conexões entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico, não para transformar o empírico em científico, mas para explorar as contradições e limitações de um e de outro. Assim, ao contrapor e avaliar diferentes interpretações (prévias, empíricas ou científicas), favorecemos atitudes reflexivas, críticas e investigativas. Ao mesmo tempo, o ensino formal deve permitir aos estudantes a percepção dos limites dos modelos, inclusive dos científicos.

Para contextualizar a produção do conhecimento das Ciências da Natureza em relação a aspectos históricos e sociais, parte-se do pressuposto de que a produção científica, na tentativa de alcançar determinado saber, percorre um caminho marcado por continuidades e rupturas, ou seja, os problemas são tratados dentro da história e da ciência, bem como das implicações sociais que acarretam, explicitando suas origens, as tentativas de solução e as controvérsias. Essa dimensão procura mostrar o conhecimento científico como produto histórico da humanidade, ilustrando como a produção científica percorre uma rota acidentada, coletiva, cheia de percalços e desvios.

É com base nessa percepção ampla de contextualização que o ensino de Ciências da Natureza pode desenvolver nos estudantes a competência crítico-analítica. Com esse objetivo, esta coleção procura explorar os conhecimentos prévios dos estudantes, de maneira que possam refletir sobre a contextualização histórica e social da ciência e da tecnologia, bem como suas aplicações no cotidiano. A coleção busca, ainda, ser atraente e desenvolver nos estudantes competências cognitivas, práticas e sociais a que todo cidadão tem direito – e que se traduzem na capacidade de descrever, interpretar e agir sobre a realidade –, procurando estimular também o planejamento de ações e o pluralismo de ideias.

O papel do professor no Ensino Médio

Levando em conta o exposto anteriormente, consideramos fundamental o papel mediador do professor.

> O que distingue a atuação do professor das demais experiências mediadas presentes no cotidiano do aluno é a maneira planejada, intencional com que ele organiza a sua prática didática, considerando-se que: "os mediadores são todas as pessoas que organizam com intencionalidade sua interação e atribuem significados aos estímulos que o educando recebe" (TÉBAR, 2011, p. 114). O professor ajuda a suscitar o interesse e captar a atenção do aluno, trazendo-o para junto do objeto, a fim de que ao aprendê-lo derive benefícios desta experiência. [...]
>
> A mediação demanda domínio da prática das relações humanas, porque, o mediador é um educador que assume completamente a responsabilidade de seu trabalho educativo, envolve-se na formação integral dos educandos dentro dos limites éticos e é cônscio de que o processo formativo é holístico, pois envolve todo o ser humano. Em suma, "o professor deve ter atitudes de empatia e acolhimento, de permanente interação, de críticas positivas da cultura e vivência dos valores que pretende transmitir" (Tébar, 2011, p.115).
>
> No processo de construção dos conhecimentos do próprio aluno, o professor é o mediador que gerencia, planeja e executa a aplicação das atividades e as relações dos sujeitos com o objeto a fim de atingir os objetivos de aprendizagem dos alunos. O objetivo é a autonomia do aluno, pois ao estruturar sua ação, o professor tem em mente, "[...] que os educandos são os protagonistas de sua própria aprendizagem" (Tébar, 2011, p.125). A autonomia do aluno é construída ao longo do trabalho docente quando este oferece oportunidades ao aluno de tomar decisões (Freire, 2006, p.120).
>
> O professor medeia o processo de aprendizagem do aluno em direção à autonomia da aprendizagem, quando o aluno aprende a aprender. De acordo com os pressupostos da teoria do sócio construtivismo ou sócio-interacionismo de Vygotsky, a aprendizagem é construída no processo de interação social onde o conhecimento é mediado. A prática mediadora é ampla e se manifesta nas relações sociais. Não é somente o professor que cumpre o papel de mediador na vida do aluno, mas a família e a comunidade também o fazem, pois "[...]a mediação é uma forma de interação que engloba todos os âmbitos da vida dos educandos" (Tébar, 2011, p. 114).
>
> A atuação intencional do professor permite que o aluno transcenda e perceba novos sentidos acrescentados pelo conhecimento adquirido, e desta forma desempenha o papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. [...]
>
> [...]
>
> Maia, Miriam Bastos Reis Maia; Guerreiro, Elaine Maria Bessa Rebello. Perfil do professor mediador: proposta de identificação. *Revista Educação*. Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/34189/pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

Neste sentido, o professor se posiciona como um mediador de linguagens e oportunidades educativas, como aquele que apoia o acesso ao conhecimento e não aquele que o detém. Reuven Feuerstein (1921-2014) reforça que são essenciais algumas características para que, de fato, se efetive a mediação, como intencionalidade e reciprocidade, transcendência e mediação dos significados. Essas e outras características favorecem a autonomia e o protagonismo dos estudantes.

O papel do professor é especialmente importante pois, em geral, em uma turma há estudantes de diferentes perfis, com diferenças significativas em seus conhecimentos e experiências, o que impõe desafios à aprendizagem, principalmente se a turma for grande. Torna-se importante identificar eventuais dificuldades dos estudantes e orientá-los na análise e na descoberta de caminhos e soluções, procurando, sempre que possível, entender essa variedade na base cultural dos jovens, de suas linguagens e de seus anseios de vida. O diálogo e a escuta ativa, em consonância com abordagens como discussões, o trabalho em grupos, o trabalho com outros professores, etc., são essenciais.

De mesmo modo, estimular o debate e o posicionamento crítico dos estudantes no sentido de valorizar uma visão humanista, de respeito aos direitos humanos, à diversidade de corpos, de sexualidades, de gêneros, de culturas, de etnias, de classes sociais, de crenças religiosas, entre outros.

Ao professor também é importante não deixar de investir em seu aprendizado. Sabemos que o cotidiano da sala de aula é desafiador, mas hoje em dia há boa oferta de cursos *on-line* gratuitos que podem colaborar nesse sentido. Um exemplo é a plataforma Avamec, do Ministério da Educação, disponível em https://avamec.mec.gov.br/ (acesso em: 18 ago. 2024). A plataforma propõe um ambiente virtual de aprendizagem que possibilita realizar cursos a distância, projetos de pesquisa ou colaborativos e outras maneiras de apoio educacional a distância para o processo de ensino-aprendizagem.

Formas de organização da turma

Pensar a escola é pensar em um espaço formativo, pois é por meio das relações, reações, vivências e convivências nesses ambientes que professores e estudantes se formam juntos. Organizar de maneiras alternativas as carteiras em sala de aula tem como objetivo atender melhor às necessidades diversas dos estudantes, promover interações mais significativas e facilitar métodos de ensino mais dinâmicos e participativos.

As disposições em círculo ou em U, por exemplo, permitem que todos os estudantes se vejam e se ouçam claramente, facilitando a discussão em grupo, a colaboração e o compartilhamento de ideias. Isso não apenas enriquece a experiência de aprendizagem, mas também ajuda a desenvolver habilidades sociais e comunicativas essenciais para o sucesso dentro e fora da sala de aula. Outra possibilidade ideal para trabalhos em grupo ou projetos colaborativos com mais de quatro estudantes é organizar as carteiras em ilhas ou grupos menores para fomentar um ambiente mais cooperativo. Para atividades que exigem foco individual, como testes ou tarefas de escrita, uma disposição em filas ou em forma de L pode ser mais adequada para reduzir distrações e aumentar a concentração. Já a organização da sala em diferentes estações ou áreas, cada uma dedicada a uma atividade específica, estimula a autonomia dos estudantes, permitindo que se movimentem e escolham as atividades que desejam realizar. Observe a seguir a representação de algumas dessas disposições.

Círculo

Ideal para debates, discussões em grupo e atividades de compartilhamento.



Formato em U

Recomendado para aulas expositivas, discussões e apresentações, permitindo uma boa interação com o professor.



Grupos ou ilhas

Facilita a realização de projetos e atividades em grupo.

Organização em estações

Ideal para aprendizagem com base em centros de interesse, projetos e rotação por estações.



A flexibilidade na organização das carteiras permite que os professores adaptem o ambiente de acordo com os objetivos específicos de cada aula ou atividade. Essa adaptabilidade é crucial em um mundo educacional em constante mudança, no qual as metodologias e abordagens pedagógicas estão sempre evoluindo para melhor atender às necessidades dos estudantes. Há ainda a possibilidade de utilizar espaços externos à sala a de aula, de modo que os estudantes possam experimentar diferentes arranjos em um ambiente mais dinâmico e inclusivo.

ESTRATÉGIAS E ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

Desenvolvimento de competências

As semelhanças entre Biologia, Química e Física no contexto das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, especialmente no que se refere a procedimentos e linguagens comuns, justificam tanto o compartilhamento quanto o estímulo ao desenvolvimento das competências gerais e específicas e das habilidades que consistem nos objetivos fundamentais desses componentes curriculares.

De modo geral, deseja-se que os estudantes dessa área sejam capazes de se comunicar, obter informações, argumentar, compreender, agir, enfrentar problemas, fazer escolhas, propor soluções, entre outros exemplos de competências ou qualificações humanas amplas desejáveis.

Nesta coleção, compartilhamos o entendimento de competências e habilidades preconizado pela BNCC, apresentado anteriormente. No conjunto de seus três volumes, procurou-se desenvolver todas as competências gerais da Educação Básica e todas as competências específicas e habilidades da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Esse trabalho com competências e habilidades, além de reforçar o aspecto interdisciplinar, estimula a autonomia, o protagonismo e o pensamento crítico dos estudantes, conduzindo-os

a um papel central como sujeitos do próprio aprendizado. Também promove atitudes e valores, contribuindo para a formação de estudantes com visão ética, justa, inclusiva, sustentável e solidária, para o desenvolvimento de seus projetos de vida e para lidar com os desafios das sociedades contemporâneas.

Relacionamos, a seguir, as competências gerais da Educação Básica e as competências específicas e habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio. As siglas utilizadas para as competências que serão mencionadas mais adiante neste Manual são: competências gerais da Educação Básica (CGEB) e competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio (CECNTEM).

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

(Brasil, 2018, p. 9-10)

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

(Brasil, 2018, p. 553)

HABILIDADES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO

Competência específica 1

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.

(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.

(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.

(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.

(Brasil, 2018, p. 555)

HABILIDADES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
Competência específica 2
(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como *softwares* de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como *softwares* de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como *softwares* de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.
(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.
(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.
(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como *softwares* de simulação e de realidade virtual, entre outros).

(Brasil, 2018, p. 557)

HABILIDADES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
Competência específica 3
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.
(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.
(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.

(Brasil, 2018, p. 559-560)

Investigação, prática e linguagem científica

Nesta obra, o contato dos estudantes com um repertório estimulante de conhecimentos acadêmicos se articula com o desenvolvimento do fazer científico. Nesse contexto, a proposição de questões ou problemas deve servir aos processos característicos do pensar e do fazer científicos, que envolvem a admiração e o questionamento diante de algo, a ponto de levar os estudantes a formular hipóteses ou suposições, motivando-os, assim, a empreender uma investigação.

Tão importante quanto a problematização ou a apresentação de um conflito inicial é possibilitar meios para que os estudantes percorram o caminho investigativo que os levará à solução do problema e à aprendizagem. O que chamamos aqui de investigação envolve uma lista extensa e diversificada de atividades que inclui a realização de testes e experimentos, as demonstrações, os estudos de meio, as entrevistas e as pesquisas em livros e multimeios. Ou seja, a investigação nas

aulas de Ciências da Natureza e seus componentes curriculares não se reduz apenas à experimentação ou às "atividades de laboratório". Ela envolve todos os tipos de atividade, que são acompanhados de situações problematizadoras que promovem a busca ativa de dados ou de informações, os quais, quando analisados e discutidos, conduzem à solução de um problema ou à geração de informações que evidenciem ou contradigam uma ou mais hipóteses ou suposições formuladas anteriormente. O que de fato faz com que uma atividade seja considerada uma investigação é a forma como ela é apresentada e conduzida pelo professor e o caráter que ela assume no processo de ensino e aprendizagem.

A atividade investigativa possibilita, sobretudo, a reflexão crítica e o engajamento ativo dos estudantes. Ela exige que os estudantes mobilizem várias habilidades cognitivas e processuais, entre elas, as que são importantes no pensamento científico: a observação, a formulação de hipóteses, o planejamento e a construção de modelos, a realização de testes e experimentos, a coleta, a sistematização e a análise de dados e informações, o estabelecimento de sínteses e relações e a comunicação de conclusões. Também demanda dos estudantes o conhecimento de variados conteúdos de natureza conceitual (informações, fatos, dados, conceitos, vocabulário específico, entre outros), a tomada de decisões e a expressão de valores (colaboração, respeito, organização, criatividade, entre outros).

A investigação e suas práticas proporcionam aos estudantes oportunidades de desenvolver habilidades relacionadas à linguagem, como a construção de um discurso oral coerente para expressar uma explicação, argumentar ou relatar uma experiência. Propicia também o desenvolvimento da habilidade de escrita, como em situações de comunicação de resultados na forma de um relatório. Até mesmo o uso de outras linguagens pode e deve ser estimulado, como as linguagens próprias da Matemática e das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com a utilização de ferramentas de tratamento de dados e de produção e leitura de mapas, entre outras.

Atividades práticas no laboratório ou em campo devem ser estimuladas. Uma rápida saída a campo, para visitar um ambiente natural ou modificado, possibilita ricas experiências de aprendizagem e cumpre um importante papel pedagógico, pois desperta a curiosidade, estimula a busca pelo conhecimento e exercita certas habilidades e a prática de alguns valores e atitudes que nem sempre são facilmente exploráveis em sala de aula. Sabendo que a realidade de cada escola é muito particular, com seu entorno natural e social próprio, não ousamos apresentar no Livro do Estudante propostas definidas de saída a campo. Essa atividade vai depender muito mais do planejamento do professor e do projeto da escola. No entanto, em geral, ofereceremos algumas sugestões na parte específica deste Manual.

A escolha e o planejamento de atividades investigativas são fundamentais em uma proposta de ensino de Ciências da Natureza que vise ao desenvolvimento do pensar e do agir de maneira científica, sem, no entanto, negligenciar a aquisição de conteúdos conceituais. Além disso, se conduzidas de maneira colaborativa e solidária, as atividades investigativas podem auxiliar na consolidação de valores e atitudes importantes e servir de exemplo de como se constrói o conhecimento científico. Desse modo, possibilitam também a vivência e o debate sobre o caráter coletivo, social e cultural do conhecimento científico.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente

Na esteira de diretrizes educacionais contemporâneas, surgiu e se fortaleceu o movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), que recomenda que o ensino de Ciências tenha como focos: o estudante e suas necessidades; as demandas da comunidade; a consciência de que as respostas da ciência podem ser controversas; a estreita ligação entre ciência e sociedade. Essa visão fundamenta-se tanto em razões político-econômicas como em razões sociais e humanistas. De acordo com Pereira (2002)[11], citando a abordagem de Fourez (1994)[12], as razões econômicas e políticas implicam educar os jovens para se sentirem aptos a lidar com produtos científicos e tecnológicos com maior comodidade e para que entendam os processos produtivos fundamentados na ciência e na tecnologia, sendo então capazes de aproveitar melhor as tecnologias e inovações futuras. No âmbito social, objetiva-se permitir que os jovens compreendam as decisões que envolvem problemáticas científicas e tecnológicas e sejam capazes de participar das decisões, exercendo a cidadania. As razões humanistas agregam diversas dimensões, como:

- a dimensão histórica, para entender como a ciência e a tecnologia emergem da história da humanidade e dela fazem parte.
- a dimensão epistemológica, para adquirir noções de como se constrói a ciência e como se dá a atividade científica.
- a dimensão funcional, para apreciar como determinada teoria ou máquina se ajusta a certas situações.
- a dimensão corporal, para perceber o corpo como um lugar inteligente em relação a utensílios e máquinas.
- a dimensão de comunicação, para ter consciência de que ciência e tecnologia são formas de construir uma visão de mundo compartilhável e comunicável.

Nesse sentido amplo, a BNCC reforça que ciência e tecnologia sejam compreendidas como empreendimentos humanos e sociais. Esta obra se alinha com a orientação da BNCC ao propor discutir "o papel do conhecimento científico e tecnológico na organização social, nas questões ambientais, na saúde humana e na formação cultural, ou seja, analisar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente" (Brasil, 2018, p. 549). Além disso, ao longo deste Manual do Professor se encontram orientações, proposições e subsídios que fortalecem as relações entre as Ciências da Natureza e os componentes que as integram e com as outras áreas do conhecimento, quando pertinente.

Argumentação

A argumentação aparece explicitamente na competência geral da Educação Básica 7 da BNCC:

> Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
>
> (Brasil, 2018, p. 9)

11 Pereira, A. *Educação para a ciência*. Lisboa: Universidade Aberta, 2002.

12 Fourez, G. *Alphabétisation scientifique et technique*. Bruxelles: De Boeck-Wesmael, 1994.

Por meio desse excerto, é possível notar a importância que fatos, dados e informações confiáveis têm para a construção de uma boa argumentação. Também é possível perceber que a argumentação, como competência a ser desenvolvida na escola, deve estar vinculada a princípios éticos e cidadãos. Considerando esse viés, a obra proporciona aos estudantes oportunidades particularmente propícias para o desenvolvimento de importantes habilidades relacionadas à argumentação, como construir um discurso oral coerente, expressar uma explicação, defender uma ideia, deliberar coletivamente ou propor soluções para problemas. Isso ocorre, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto, nas atividades propostas nos capítulos, nos estudos de caso, entre outros.

Leitura inferencial

Durante a leitura de textos científicos, em suas investigações ou na execução de tarefas, os estudantes vão se deparar com diversas situações e textos (verbais ou não verbais). Para cada um deles, deverão elaborar um sentido, que vai além de localizar as informações apresentadas. Para elaborar esse sentido, os estudantes precisam fazer inferências, estabelecendo relações entre o que está explícito no texto (ou na situação vivenciada) e aquilo que eles inserem no texto com base em seu conhecimento de mundo. Nessa perspectiva, o conhecimento prévio é um fator fundamental na qualidade das inferências que uma pessoa pode fazer ao realizar uma leitura e, consequentemente, torna-se estritamente necessário para a compreensão de um texto, pois é esse conhecimento, seja linguístico, seja conceitual ou procedimental, que permite ao leitor fazer as inferências necessárias para a construção de significados de um texto (Kleiman, 2010). Segundo Guedes (1999, p. 31-32), "a inferência pode ser considerada a maior contribuição cognitiva do leitor. Sem perceber, o leitor está inferindo, isto é, adequando representações mentais".

Em sala de aula, o professor pode promover a qualidade das inferências nas leituras dos estudantes de diversas formas. É possível formular perguntas que os motivem a antecipar informações, verificar a probabilidade de que as hipóteses sejam reais, acessar seus conhecimentos prévios, explicar o que está implícito em um texto, preencher lacunas de informação com base em pistas já dadas e excluir ou confirmar hipóteses levantadas durante a leitura. Seguramente, ao se empenhar para que os estudantes realizem cada vez mais e melhor a leitura inferencial, o professor obterá maior qualidade dos resultados nas atividades que propõe. Assim, o professor contribuirá para a formação de leitores proficientes, competência tão necessária aos estudantes no enfrentamento dos desafios da vida.

Pensamento computacional

Quem imagina que o pensamento computacional diz respeito unicamente a saber navegar na internet, utilizar as redes sociais, enviar *e-mails* ou utilizar ferramentas digitais para elaborar um texto ou resolver uma equação está enganado. O pensamento computacional utiliza a linguagem e o raciocínio da computação para resolver problemas de modo individual ou colaborativo. Essa estratégia de ensino e aprendizagem está próxima do pensamento analítico, que, assim como a matemática, a engenharia e a ciência, busca, entre outras questões, aprimorar a proposição de soluções para problemas. De acordo com a BNCC, o pensamento computacional:

> [...] envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos.
>
> (Brasil, 2018, p. 474)

Ainda no âmbito da BNCC, em 2022 foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) o documento *Base Nacional Comum Curricular: Computação – Complemento à BNCC*, resultado de debates ocorridos em comissões formadas por professores e pesquisadores de diferentes áreas (como Pedagogia, Psicologia, Ciências da Computação, Matemática, Geografia, etc.) ao longo dos anos. Nesse documento, o pensamento computacional ganha destaque como um de seus três eixos – os outros dois são cultura digital e mundo digital – de uma perspectiva que considera a abstração, análise e automação[13].

Essa visão encontra consonância com os quatros eixos do pensamento computacional apresentados pelo Currículo de Referência em Tecnologia e Computação (2018)[14], publicado pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb):

- Decomposição: trata da divisão de problemas complexos em partes menores para sua solução.
- Reconhecimento de padrões: envolve a identificação de características comuns entre problemas para sua solução.
- Abstração: envolve a filtragem, formas de organização e a classificação de dados para a resolução de problemas.
- Algoritmos: refere-se à construção de orientações claras para a resolução de problemas.

Nesta obra, esses quatro eixos são trabalhados explicitamente na seção *Pensando Ciências*, mas é importante ressaltar que o pensamento computacional pode ser/estar incorporado de diversas maneiras ao se abordar e tentar solucionar um problema. Ao longo dos três volumes, isso pode ocorrer em atividades, por exemplo, que envolvem diferentes processos cognitivos, como analisar, compreender, definir, modelar e resolver. A estrutura da seção *Projeto* também reflete o desenvolvimento do pensamento computacional.

Avaliação

O papel do estudante e as formas de avaliação

Nas últimas décadas, foi se consolidando um referencial para a concepção de aprendizagem com base nas contribuições teóricas da psicologia do desenvolvimento, que se fundamentaram nas pesquisas de Lev Vygotsky (1896-1934), de Jean Piaget (1896-1980) e de Henri Wallon (1879-1962), entre outros. Uma das principais hipóteses dessas linhas de pensamento é a de que o indivíduo constrói um conjunto de conhecimentos nas mais diversas situações vivenciadas, dentro e fora da escola, e leva esse repertório para o espaço educativo. Assim, o indivíduo passa a ser visto como sujeito ativo de seu conhecimento, na busca de responder às inúmeras interrogações postas pelo mundo que o rodeia.

Tal concepção altera radicalmente o papel do estudante – de mero receptáculo de conteúdos para protagonista na construção de seu conhecimento. Essa mudança de perspectiva impõe alterações na maneira de avaliar o estudante, especialmente na compreensão de que a avaliação constitui um processo

13 Diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação para o Ensino de Computação na Educação Básica. Sociedade Brasileira de Computação. 2019. Disponível em: https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/view/60/263/505. Acesso em: 18 ago. 2024.

14 Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb). *Currículo de Referência em Tecnologia e Computação*: da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. São Paulo: Cieb, 2018. p. 19. Disponível em: https://curriculo.cieb.net.br/assets/docs/Curriculo_de_Referencia_em_Tecnologia_e_Computacao.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

permanente, instaurado ao longo de todo o período letivo, e deve contemplar as múltiplas capacidades e habilidades desenvolvidas pelo estudante no trajeto educativo.

Os novos modelos de avaliação implicam o rompimento da ideia arraigada no imaginário escolar de que avaliação é sinônimo de prova. Os instrumentos de avaliação variam de acordo com a dinâmica da sala de aula. Sem perder de vista os objetivos específicos da disciplina, o professor pode avaliar os resultados de uma vasta gama instrumental, como: produção de textos sobre a análise de modelos ou hipóteses científicas ou de situações do contexto social; debates e rodas de conversa sobre determinado tema dos conteúdos em estudo; produções artísticas resultantes da troca de ideias; registros escritos de experimentos laboratoriais; resoluções propostas para situações-problema variadas; relatos escritos sobre as dificuldades no aprendizado de certos conteúdos; entre outros.

A avaliação passa a ser também um objeto de investigação do professor, com potencial para produzir informações diagnósticas e qualitativamente indicativas sobre as transformações e os avanços na relação entre o grupo de estudantes, o professor e o sistema didático-pedagógico adotado. Hoffmann (1993, 1995) propõe três momentos distintos de avaliação: a **avaliação diagnóstica** ou **inicial**; a **avaliação contínua** ou **formativa**; e a **avaliação final** ou **somativa**.

Nas abordagens pedagógicas em que os estudantes são concebidos como indivíduos que constroem o conhecimento dentro e fora da escola, é adequado, na introdução de cada novo tópico, realizar uma avaliação diagnóstica, ou seja, um levantamento do que eles já sabem. O objetivo dessa avaliação é possibilitar-lhes tomar consciência das concepções que já têm sobre o assunto em foco e facilitar ao professor a identificação dos limites das soluções propostas para construir argumentos que conduzam à compreensão do tópico estudado. Isso pode ser feito por meio de atividades na abertura de capítulos, ou ao introduzir a unidade ou em outro momento que o professor considere oportuno.

A avaliação pode ser também um instrumento para o professor repensar seu planejamento. Nesse caso, é importante não se restringir a um momento final da etapa de aprendizado, quando já não há mais tempo de redirecionar o trabalho. É com esse objetivo que se propõe uma avaliação contínua ou formativa: momentos variados de avaliação ao longo do processo de ensino e aprendizado (por exemplo, ao longo dos capítulos de uma unidade) que possibilitem aos estudantes tomar consciência de suas dúvidas, dificuldades e avanços, e ao professor perceber se suas escolhas didáticas foram adequadas.

O término de uma sequência didática (por exemplo, ao final de uma ou mais unidades) é o momento adequado para a avaliação final ou somativa. Objetiva-se, sobretudo, perceber se os objetivos propostos inicialmente foram atingidos neste ciclo maior, se houve de fato aprendizado, se é possível dar prosseguimento ao processo de ensino ou se há necessidade de revisão e/ou de complementação.

Além desses modelos avaliativos, vale a pena destacar os seguintes:

- avaliação comparativa: utilizada para comparar o desempenho de diferentes grupos de estudantes ou de um grupo de estudantes em diferentes momentos. O objetivo da avaliação comparativa é analisar diferenças no desempenho entre grupos de estudantes (como diferentes turmas ou escolas) ou, ao longo do tempo, para entender tendências e efetividade de métodos de ensino.
- avaliação ipsativa: compara o desempenho atual de um estudante com seu desempenho anterior. Ela pode ser utilizada para manter registros das avaliações dos estudantes ou você pode pedir a eles que façam autoavaliações e estabeleçam metas de aprendizagem, revisando essas metas periodicamente para monitorar seu progresso pessoal. O objetivo principal da avaliação ipsativa é focar no progresso individual e na melhoria contínua dos estudantes, incentivando o desenvolvimento pessoal.

Outro aspecto importante para a formação do estudante é o incentivo à autoavaliação. Esse processo colabora para que o estudante se torne responsável pelo próprio processo de aprendizado, na medida em que a autoavaliação subsidia o desenvolvimento de estratégias metacognitivas. Essas estratégias são entendidas como a capacidade do ser humano de monitorar o que é percebido, julgar o que é aprendido ou o que precisa aprender e predizer as consequências das ações futuras (Metcalfe, 1996).

Neste Manual, procuramos oferecer, nas orientações específicas de cada unidade, uma série de subsídios e de estratégias que possibilitem ao professor conduzir da melhor maneira a avaliação dos estudantes.

Avaliação e novos paradigmas educacionais

Ao seguir o paradigma de uma aprendizagem centrada em conteúdos – e pressionada pela necessidade de medir, de forma objetiva, o "sucesso" ou o "fracasso" de seus estudantes –, a escola tradicional perpetuou um modelo de avaliação de caráter classificatório, seletivo e frequentemente punitivo, que deixa de lado aspectos importantes (hoje entendidos como centrais) do processo educacional, como a aquisição de competências e habilidades e a construção de valores e atitudes.

Em decorrência do entendimento atual sobre como se processa a aprendizagem, surge a necessidade de romper com essa concepção de avaliação. O "erro" deve ser encarado como parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem, visto que ele é uma evidência dos processos mentais por meio dos quais os estudantes experimentam a realidade, formulam hipóteses sobre o seu objeto de estudo, confrontam-nas com as hipóteses de seus pares, reestruturam-nas e criam concepções que devem ser aplicadas à realidade. Quando visto desse modo, o "erro" – e também o "acerto" – não é mais do que um elemento que ajuda a compor o diagnóstico do professor sobre as aprendizagens de seus estudantes, sinalizando a necessidade de repensar seu planejamento, de experimentar outras estratégias de ensino-aprendizagem e de realizar de maneira mais próxima a gestão da aprendizagem de um estudante. A avaliação, nessa perspectiva formativa, significa saber em que ponto se está e o que é preciso fazer para se chegar aonde se pretende.

Um dos instrumentos mais importantes para operacionalizar esse modo de avaliação é o estabelecimento de objetivos de aprendizagem claros e passíveis de serem aferidos. Em se tratando de habilidades e competências, é necessário cuidado especial para traduzir em notas ou conceitos a relação entre os objetivos estabelecidos para a aprendizagem e aquilo que os estudantes demonstram como conhecimento efetivamente construído. Também é preciso dar peso adequado a cada aspecto a ser avaliado. Esses objetivos devem ser traçados considerando-se o programa de ensino de Ciências da Natureza e seus componentes curriculares como um todo, mas, idealmente, devem ser subdivididos em objetivos parciais, para que seja possível transformar a avaliação em uma prática processual, realizada ao longo de todo o período letivo e não apenas ao final de etapas burocraticamente instituídas.

Para que se torne produtiva, a avaliação deve ser dialógica, valorizando em igual proporção as atividades individuais e as coletivas, as atividades de avaliação do professor, de avaliação entre pares e de autoavaliação. Deve, ainda, abrir espaço para a criatividade, a participação e o questionamento do estudante. Trocas de experiências entre professores da área podem ser muito valiosas para se pensar em caminhos alternativos, partilhar situações de ensino e aprendizagem bem-sucedidas e buscar subsídios teóricos e metodológicos para reorientar a prática, quando necessário.

Preparação para exames

Ao longo da obra, os estudantes terão contato com questões de exames de larga escala, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Manual do Professor, também são apresentadas opções de atividades que podem ser compartilhadas com os estudantes, para que conheçam e resolvam questões de diversas instituições do país. O intuito é dar aos estudantes a oportunidade de se prepararem para esses tipos de exame, que estão presentes na vida dos jovens brasileiros como parte da trajetória natural para o ingresso no Ensino Superior, colaborando, assim, para a construção de seu projeto de vida. Caso o professor considere oportuno, essas atividades podem ser organizadas em um simulado, por exemplo.

Outro aspecto importante nessa preparação é possibilitar aos estudantes conhecer como funcionam esses exames, as instituições que são de seu interesse, entre outros aspectos. Vale a pena orientá-los a acessar *sites* de universidades e de instituições aplicadoras de exames, como a página do Enem (disponível em: https://enem.inep.gov.br/; acesso em: 18 ago. 2024), em que poderão conhecer mais esse exame, acessar a cartilha do estudante, fazer o *download* de provas e gabaritos de anos anteriores, etc.

OBJETIVOS GERAIS DA COLEÇÃO

Tendo como base o que foi apresentado anteriormente, listamos, a seguir, alguns objetivos para a coleção no conjunto de seus volumes.

- Promover as competências gerais da Educação Básica e as competências específicas e habilidades da BNCC para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio.
- Valorizar os conhecimentos científicos, utilizando-os de modo que os estudantes entendam, interpretem e expliquem fenômenos e processos do mundo natural, tecnológico e do cotidiano.
- Discutir o papel do conhecimento científico e tecnológico e de questões sociais, políticas, históricas e culturais, analisando as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
- Promover a cultura de paz e de diálogo, colaborando para o desenvolvimento integral dos estudantes e preparando-os para enfrentar as demandas complexas do cotidiano.
- Promover o letramento e a investigação científica, exercitando a curiosidade intelectual dos estudantes, pondo em prática conceitos, processos, práticas, valores e atitudes.
- Estimular os estudantes a expressar ideias e compartilhar conhecimentos, informações, vivências, experiências, bem como a defender e negociar decisões, ideias e perspectivas por meio da construção de argumentos alicerçados em conhecimentos, dados, informações confiáveis, etc.
- Reconhecer e valorizar a diversidade de culturas e saberes, respeitando e valorizando os diferentes indivíduos e grupos sociais, identidades, culturas, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, convicção religiosa, entre outros.
- Colaborar para o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, estimulando-os a agir com autonomia, criticamente, pautando-se em conhecimentos, em princípios éticos e democráticos, na inclusão e na solidariedade.

ORGANIZAÇÃO DA OBRA

Organização e estrutura da obra

Esta coleção está organizada em três volumes únicos: um de Biologia, um de Física e um de Química. Cada volume apresenta dois projetos e oito unidades; as unidades são formadas por capítulos.

Páginas iniciais

As primeiras páginas de cada volume trazem uma apresentação aos estudantes, com um texto motivador para o estudo da coleção e a seção *Conheça seu livro*, que orienta os estudantes sobre como o livro está organizado. Além disso, há um sumário.

Projeto

A obra apresenta dois projetos em cada volume. Neles, os estudantes desenvolvem um produto relevante para a comunidade. A realização de um projeto é um dos principais momentos de protagonismo do estudante.

Abertura da unidade

Sempre em dupla de páginas, a abertura da unidade procura atrair o interesse dos estudantes para o estudo dos respectivos conteúdos. Ela introduz a temática da unidade por meio de uma imagem em tamanho grande e de um texto curto relacionado ao assunto. Além de introduzir o tema, a abertura apresenta os objetivos, propõe questões que podem explorar a imagem e o contexto apresentados e/ou questões reflexivas sobre a relevância do tema para a vida dos estudantes e fornece a relação dos capítulos da unidade.

Capítulo

Cada capítulo apresenta um número variável de páginas de conteúdo, com base na especificidade de cada tema. O conteúdo dos capítulos é estruturado segundo os elementos descritos a seguir.

Abertura de capítulo: além do número e do título do capítulo, a página apresenta o boxe *Para começar*, que apresenta questões que possibilitam aos estudantes levantar os conhecimentos prévios que têm sobre os conceitos e/ou práticas abordados no capítulo. A abertura também traz ao menos uma imagem para despertar o interesse deles. O texto dessa página pode apresentar uma introdução ao tema do capítulo ou ir diretamente à apresentação do conteúdo.

Texto-mestre: trata-se do texto principal do capítulo no qual são apresentados os conteúdos a serem estudados. As imagens, o glossário e outros recursos gráficos facilitam a compreensão do conteúdo focalizado pelos estudantes. Os títulos e subtítulos organizam e demarcam os conteúdos, permitindo aos estudantes estabelecer relações entre os temas em estudo e

compará-los, sintetizá-los e analisá-los, o que colabora para a integração dos conceitos.

Objetos digitais: a coleção apresenta, em sua versão digital, doze objetos digitais para cada volume, totalizando 36 objetos. Eles se apresentam nos seguintes tipos: *podcasts*, vídeos, carrosséis de imagens, mapas clicáveis e infográficos clicáveis. Esses objetos podem ser localizados por meio do sumário presente no início do Livro do Estudante ou ao longo dos capítulos, por meio deste ícone:

Boxes: os boxes aparecem em quantidades variáveis nos capítulos e visam trabalhar aspectos diversos dos conteúdos. São eles:

- **De olho no conceito:** retoma e/ou define algum conceito importante que é necessário para a compreensão do conteúdo abordado na página em que está inserido.
- **Ciência se discute:** apresenta debates, conflitos e controvérsias entre os próprios cientistas ou entre sociedade e ciência, propondo questionamento(s) e/ou atividade(s).
- **Ação e cidadania:** apresenta exemplos de aplicações do conhecimento científico que promovem melhoria na vida das pessoas e no ambiente ou que estão relacionados aos direitos e deveres dos cidadãos, a questões de atitudes e valores, etc., propondo questionamento(s) e/ou atividade(s).
- **Biologia e... / Física e... / Química e...:** aprofunda pontos de contato e a relação entre conteúdos da Biologia, da Física ou da Química (a depender do volume/componente em questão), na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, ou com componentes de outras áreas do conhecimento. No formato de boxe, a informação é apresentada de modo pontual ao longo dos capítulos. No volume de Biologia, esse boxe se chama *Biologia e...*; no volume de Física, *Física e...*; por fim, no volume de Química, *Química e...*. Em todas, o título é complementado com o nome do componente curricular com o qual se relaciona, por exemplo: Biologia e Geografia.
- **Roteiro:** aparece eventualmente ao longo do capítulo. Traz atividades de retomada, compreensão e aplicação do que foi apresentado, que podem envolver a resolução de uma questão, a produção de sínteses, a construção de analogias, o estabelecimento de relações, a produção de pequenos textos, gráficos e tabelas, etc. Tem como finalidade ajudar os estudantes na compreensão do texto apresentado.
- **Ampliação:** trata de assuntos que complementam ou aprofundam o que foi abordado no texto principal.
- **Para explorar:** apresenta indicações comentadas de vídeos, *sites*, livros, etc. Não é exclusivo do capítulo e pode aparecer em outros momentos no decorrer da obra, como em Projeto.

Seções de capítulos: as seções se diferenciam dos boxes por serem desenvolvidas em páginas inteiras ou em duplas de páginas, permitindo aprofundar determinados desdobramentos dos conteúdos e estimular a reflexão por parte dos estudantes. As que constam dos capítulos, em quantidades variáveis, são:

- **Práticas de Ciências:** apresenta atividades práticas, experimentais e investigativas. Envolve coleta e análise de dados e informações, uso de tecnologias variadas, trabalho em grupo, elaboração de conclusões coletivas e comunicação. Desenvolve as várias formas de investigação próprias das ciências como meio de conhecer e de interpretar o mundo.
- **Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente:** apresenta um assunto relacionado à temática da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e questões que estimulam a análise, a reflexão e o posicionamento sobre assuntos relacionados ao tema do capítulo.
- **Ciência tem história:** discute a história da ciência, o contexto histórico, personagens, conflitos, construção de conceitos, métodos, mudanças de paradigmas, etc. Evidencia o caráter social e histórico da ciência como empreendimento humano.
- **Biologia e... / Física e... / Química e...:** a seção é "coirmã" do boxe de mesmo nome, apresentado anteriormente. O objetivo é explorar a interdisciplinaridade entre Biologia, Física ou Química (a depender do volume/componente) com componentes da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias ou de outras áreas do conhecimento. Na forma de seção, o assunto é desenvolvido de modo mais aprofundado em páginas duplas. No volume de Biologia, essa seção se chama *Biologia e...*; no volume de Física, *Física e...*; por fim, no volume de Química, *Química e...*. Em todas elas, o título recebe o complemento do componente curricular; por exemplo: Química e Física.
- **Atividades:** organizada sempre ao final de cada capítulo, apresenta questões que permitem aos estudantes retomar conteúdos pontuais e trabalhar diferentes habilidades e competências na resolução das atividades propostas. O conjunto dessas atividades possibilita, portanto, estabelecer relações entre os tópicos tratados e avaliar o conhecimento adquirido.

Fechamento da unidade

Seções de fechamento da unidade: o final de cada unidade apresenta uma seção *Estudo de caso* ou uma seção *Pensando Ciências*. *Questões globais* está presente em todo fechamento de unidade.

- **Estudo de caso:** contém um texto narrativo que apresenta dados e uma situação-problema, para que os estudantes, em grupo, discutam e proponham uma solução/interpretação do caso. Pode envolver exemplos de diferentes atuações profissionais.
- **Pensando Ciências:** apresenta um problema/questão a ser solucionado(a) pelos estudantes por meio da aplicação do pensamento computacional.
- **Questões globais:** propõe atividades autorais mais elaboradas, que abordam o conjunto dos capítulos e/ou de exames de larga escala (vestibular e Enem). A exemplo do que ocorre nas atividades ao longo dos capítulos, nesta seção, espera-se que os estudantes mobilizem diferentes habilidades e competências na resolução das atividades propostas e que se preparem para exames de larga escala.

Fechamento do volume

Ao final do volume do Livro do Estudante, há as seções:

- **Respostas das atividades de cálculo:** são apresentadas aos estudantes as respostas das atividades do Livro do Estudante que envolvem cálculo.
- **Transcrições dos áudios**: neste Manual do Professor, as transcrições dos áudios (*podcasts*) se encontram no final da reprodução do Livro do Estudante.
- **Bibliografia comentada**: referências bibliográficas e breves comentários sobre as obras utilizadas na elaboração do volume e indicadas para o aprofundamento dos estudos na área.

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA

Apresentamos, a seguir, uma proposta de distribuição dos conteúdos deste volume em bimestres, trimestres e semestres, previstos para os três anos do Ensino Médio. Entretanto, sabemos que o dinamismo do contexto escolar exige uma prática docente flexível diante dos desafios que surgem ao longo do ano letivo. Assim, esta proposta tem o objetivo de nortear sua prática pedagógica de maneira que você possa adaptá-la à sua realidade escolar e ao projeto pedagógico desenvolvido na instituição de ensino em que leciona.

UNIDADE	CAPÍTULO	1º ANO			
		1º semestre		2º semestre	
		1º trimestre	2º trimestre		3º trimestre
		1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre
1. Química e estudo dos materiais	**1.** Química: objeto de estudo e aplicações				
	2. Propriedades da matéria				
	3. Modelos atômicos e características dos átomos				
	4. Ligações químicas				
2. O macro e o micro	**1.** Relações entre massas de átomos e moléculas				
	2. Quantidade de matéria				
	3. Contando átomos e moléculas				
3. O comportamento das substâncias	**1.** O comportamento dos gases				
	2. Funções inorgânicas				
	3. Soluções e propriedades coligativas das soluções				
4. Energia e transformações da matéria	**1.** Termoquímica				
	2. Cinética química				
Projeto 1	Produtos químicos em casa: manual para identificação, uso e armazenagem				
5. Eletroquímica	**1.** Contando elétrons				
	2. Eletrólise				
6. Equilíbrios químicos	**1.** Estado de equilíbrio				
	2. Equilíbrio ácido-base				
	3. Equilíbrios em sistemas heterogêneos				
7. A química da vida	**1.** Ciclos biogeoquímicos				
	2. Carbono e cadeias carbônicas				
	3. Hidrocarbonetos				
	4. Funções orgânicas				
8. Química, sistema produtivo e ambiente	**1.** Reações químicas na natureza e no sistema produtivo				
	2. Polímeros sintéticos				
	3. Gestão de resíduos: práticas e desafios				
Projeto 2	Série de vídeos: identificando *fake news* sobre temas científicos				

Caso considere oportuno, apresente os temas em uma ordem diferente, mas atente para os temas e os conceitos abordados em unidades precedentes e posteriores, a ligação que estabelecem com os demais conteúdos e como isso pode interferir no andamento dos projetos. Os projetos, por sua vez, podem ser executados no momento que julgar mais adequado à sua realidade escolar.

Você pode complementar essa proposta esmiuçando os temas, os boxes e as seções que compõem os capítulos e as unidades. Se considerar interessante, também é possível adaptar os momentos previstos para as avaliações, conforme sua necessidade.

2º ANO				3º ANO			
1º semestre		2º semestre		1º semestre		2º semestre	
1º trimestre	2º trimestre		3º trimestre	1º trimestre	2º trimestre		3º trimestre
1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre

QUADROS DE CONTEÚDOS DA COLEÇÃO

Volume de Biologia

Unidade	Capítulo	Conteúdos
1 Biologia: o estudo da vida	**1.** O que é Biologia?	• Características dos seres vivos • Níveis de organização • A Biologia e a investigação científica • A Biologia e sua relação com outras áreas do conhecimento
	2. As bases químicas da vida	• Composição química dos seres vivos • Moléculas orgânicas das células vivas • Água, sais minerais e vitaminas
2 Células e tecidos	**1.** As células	• Introdução à citologia • Observações ao microscópio • A célula • Composição e estrutura da membrana plasmática • Citoplasma • O núcleo celular
	2. Metabolismo celular	• Metabolismo e energia • Metabolismo • Reações de oxirredução e metabolismo energético • Respiração celular aeróbia • Processos anaeróbios de obtenção de energia • Fotossíntese • As etapas da fotossíntese • Quimiossíntese • O DNA e o metabolismo • Síntese de proteínas
	3. Ciclo celular e o estudo dos tecidos	• Células e tecidos • Ciclo celular • Mitose • Meiose • Tecidos celulares • Tecidos epiteliais • Tecido conjuntivo • Tecido muscular • Tecido nervoso
3 Genética	**1.** Hereditariedade	• Diferenças e semelhanças • Primeiras ideias sobre hereditariedade • A herança cromossômica • Genética mendeliana • Noções de probabilidade • Padrões de dominância • Interação gênica • Alelos múltiplos • Padrões de herança influenciados pelo sexo • Ligação gênica • Alterações cromossômicas • Epigenética
	2. Biotecnologia	• O uso da natureza • O que é biotecnologia? • Produção de vacinas • Produção de antibióticos • Tecnologia do DNA recombinante • Sequenciamento de DNA • Clonagem • Células-tronco • Biotecnologia e ética
4 Origem da vida e diversidade dos seres vivos	**1.** A origem da vida	• Como surgiu a vida na Terra? • Os primeiros seres vivos • Primeiras ideias sobre a geração dos seres vivos • Teorias sobre a origem da vida na Terra • A teoria da evolução molecular da vida • Evolução do metabolismo energético • A origem das células, da multicelularidade e da diversidade celular
	2. Evolução	• A evolução biológica • O pensamento evolucionista • A evolução por seleção natural • Evidências da evolução • Seleção natural e adaptação • Seleção sexual e seleção artificial • A teoria sintética da evolução • As bases genéticas da evolução
	3. Taxonomia, sistemática e diversidade da vida	• Classificação dos seres vivos • Sistemática filogenética • Os grandes grupos de seres vivos • Vírus • Bactérias • Protozoários • Algas • Fungos • Plantas • Animais • As origens da humanidade

Unidade	Capítulo	Conteúdos
5 O estudo dos seres vivos	**1.** Nutrição e excreção	• Os seres se nutrem e excretam resíduos • Nutrição • A água e os seres vivos • Osmose e pressão osmótica • Osmorregulação e excreção • Plantas e o transporte da seiva mineral
	2. Circulação e trocas gasosas	• Os gases e os seres vivos • Composição da atmosfera • Trocas gasosas em animais • Circulação nos animais • Trocas gasosas e transpiração em plantas
	3. Coordenação e percepção do ambiente	• Introdução aos sistemas sensoriais • Células nervosas e condução de estímulos • Sistema nervoso • Mecanismos e receptores sensoriais • Audição e equilíbrio humanos • Evolução da percepção visual • Hormônios
6 Ser humano e saúde	**1.** Fisiologia humana	• Uma ciência antiga • Nutrição • Sistema digestório • Sistema respiratório • Sistema circulatório • Circulação da linfa • Sistema urinário • Sistema nervoso • Sistema endócrino • O ciclo menstrual • Gestação • Parto • Aleitamento materno
	2. Saúde e tecnologia	• O que é saúde? • A evolução do conceito de saúde • A saúde pública no Brasil • O Sistema Único de Saúde • Doenças crônicas • Saúde sexual e saúde reprodutiva • Saúde mental • Tecnologia e saúde
7 Ecologia	**1.** Noções básicas de Ecologia	• Introdução à Ecologia • A biosfera • Ecossistemas • Biomas • Biodiversidade • Fatores abióticos em um ambiente • Nicho ecológico
	2. Energia e matéria nos ecossistemas	• Relações tróficas nos ecossistemas • Biomassa e produtividade • Pirâmides tróficas • Fotossíntese
	3. Relações ecológicas e dinâmica de populações	• Introdução às relações ecológicas • Relações intraespecíficas • Relações interespecíficas • Dinâmica de populações • Sucessão ecológica
8 Ambientes e conservação	**1.** As ações do ser humano no ambiente	• A ação antrópica e os ambientes • O impacto humano sobre o ar • O impacto humano sobre a água • O impacto humano sobre o solo • Saneamento básico
	2. Ecossistemas brasileiros	• Os ambientes brasileiros • Ecossistemas aquáticos • Mata Atlântica • Floresta Amazônica • Cerrado • Caatinga • Pantanal • Pampa
	3. Conservação ambiental	• O que é conservação ambiental • Desenvolvimento sustentável • Estratégias de conservação ambiental • Unidades de Conservação • Acordos internacionais sobre meio ambiente • Tecnologia aplicada à conservação ambiental

QUADROS DE CONTEÚDOS DA COLEÇÃO

Volume de Física

Unidade	Capítulo	Conteúdos
1 Física e o estudo dos movimentos	**1.** Física, ciência da natureza	• Ciências da Natureza • Ciência, tecnologia e ética • Ciência e religião na sociedade • Modelagem de fenômenos
	2. Medidas	• Medidas no dia a dia • A importância das medições • Grandezas físicas e medidas • Representações de medidas
	3. Cinemática escalar	• Estudo do movimento • Conceitos iniciais • Movimento uniforme (MU) • Movimento uniformemente variado (MUV) • Movimento circular
2 Dinâmica	**1.** Forças e leis de Newton	• Causas e alterações nos movimentos • Interações e forças • Caracterização de uma força • A inércia e a primeira lei de Newton • O princípio fundamental da dinâmica e a segunda lei de Newton • Força peso ($\vec{P}$) • O princípio da ação e reação e a terceira lei de Newton • Força normal ($\vec{N}$) • Força de tração ($\vec{T}$) ou força tensora • Força de atrito • Aplicações das leis de Newton • Movimento no plano inclinado • Forças no movimento circular
	2. Energia e trabalho	• Usos comuns de energia e trabalho • A grandeza energia • Tipos de energia • Trabalho de uma força constante • Trabalho de uma força variável • Energia cinética • Energia potencial e forças conservativas • Energia mecânica • Sistemas não conservativos e forças dissipativas • Potência e rendimento
	3. Impulso e colisões	• Quantidade de movimento • Princípio da conservação da quantidade de movimento • Outro enunciado da segunda lei de Newton • Energia em colisões
	4. Bases da Mecânica celeste	• A evolução dos modelos cosmológicos • Os primeiros modelos cosmológicos • Modelo aristotélico • Modelo ptolomaico • Modelo copernicano • Leis do movimento planetário • Lei da gravitação universal • Movimento dos satélites artificiais
3 Estática	**1.** Torque	• Relação entre equilíbrio e força em corpos extensos • Torque • Relação entre o torque e a direção da força • Centro de massa • Alavancas • Forças em uma alavanca
	2. Estudo dos fluidos	• O que são fluidos • Grandezas básicas no estudo dos fluidos • Princípios básicos no estudo dos fluidos • Alguns fenômenos que envolvem fluidos líquidos
4 Física térmica	**1.** Temperatura e calor	• Calorimetria • Temperatura • Calor • Medidas de temperatura
	2. Consequências do calor	• O calor e a variação de temperatura • Capacidade térmica • Calor específico • Calor latente • Equilíbrio térmico e mudanças de estado • Dilatação e contração térmica
	3. Leis da Termodinâmica	• Um pouco sobre a Termodinâmica • A Termodinâmica e a Revolução Industrial • A primeira lei da Termodinâmica • A segunda lei da Termodinâmica • Ciclo de Carnot • Entropia • Máquinas térmicas • Combustíveis

Unidade	Capítulo	Conteúdos	
5 Luz, som e ondas	**1.** Óptica	• Reflexão da luz • Modelos para a luz • Fontes de luz • Tipos de reflexão da luz	• Espelhos • As cores dos objetos • Refração da luz
	2. Introdução às ondas	• Pulso e onda • Classificação e características das ondas • Ondas sonoras • Qualidades fisiológicas do som	
	3. Fenômenos ondulatórios	• Estudo dos fenômenos ondulatórios • Polarização da luz • Reflexão de uma onda • Refração de uma onda	• Difração de uma onda • Ressonância • Onda estacionária • Efeito Doppler
6 Eletricidade e magnetismo	**1.** Força elétrica e campo elétrico	• Eletricidade • Introdução à força elétrica • Força elétrica	• Campo elétrico • Energia potencial elétrica • Potencial elétrico
	2. Corrente elétrica e circuitos elétricos	• Corrente elétrica e condutividade em metais • Resistência elétrica e a primeira lei de Ohm • Resistividade elétrica e a segunda lei de Ohm • Eletricidade, resistência e choques elétricos • Potência elétrica • Resistência elétrica e efeito Joule	• Cálculo de consumo de energia elétrica • Associação de resistores • Circuitos residenciais • Geradores • Força eletromotriz
	3. Produção e consumo de energia elétrica	• Transformações de energia • Energia • Usinas hidrelétricas	• O caminho da energia: das usinas às residências • O problema da escassez mundial de energia
	4. Magnetismo e indução eletromagnética	• A importância das bússolas • Campo magnético • Campo magnético de correntes elétricas em fios retilíneos • Força magnética • A descoberta da indução eletromagnética • Fluxo magnético	• Lei de Faraday • Lei de Lenz • As ondas eletromagnéticas • O espectro eletromagnético • Computadores e Tecnologia da Informação (TI)
7 Física do "muito pequeno"	**1.** Estrutura da matéria	• Modelos atômicos • O átomo contemporâneo	
	2. Física quântica	• Fenômenos atômicos • O trabalho de Planck • O efeito fotoelétrico • A dualidade onda-partícula	• O princípio da incerteza • A descoberta do *spin* • A física das partículas elementares
	3. Física nuclear	• Medicina nuclear • A descoberta da radioatividade • Decaimento radioativo	• Efeitos biológicos da radiação ionizante • Alteração do núcleo atômico
8 Física do "muito grande"	**1.** Evolução da Terra	• A origem da Terra • A Terra primitiva • Os planetas do Sistema Solar • A estrutura da Terra	
	2. Estrelas	• Céu noturno • Escala de distância cósmica • Classificação das estrelas • O destino das estrelas	
	3. Teoria da relatividade	• Espaço curvo • Contexto histórico-científico	• Teoria da relatividade especial de Einstein • Teoria da relatividade geral de Einstein
	4. Modelo cosmológico padrão	• Universo em expansão • A geometria e a estrutura do Universo • A expansão do Universo	• O Big Bang • Modelo Cosmológico Padrão – ΛCDM

QUADROS DE CONTEÚDOS DA COLEÇÃO

Volume de Química

Unidade	Capítulo	Conteúdos
1 Química e estudo dos materiais	**1.** Química: objeto de estudo e aplicações	• Onde a Química está presente • Conhecimento químico • Química Verde: uma abordagem mais sustentável para a conservação ambiental
	2. Propriedades da matéria	• Medições • Massa • Volume • Densidade • Propriedades da matéria • Sistemas • Substâncias puras e misturas • Substâncias simples e substâncias compostas • Propriedades específicas dos materiais e separação de misturas
	3. Modelos atômicos e características dos átomos	• Aplicações dos raios X • Modelos atômicos de Dalton e Thomson • O modelo de Rutherford e as partículas fundamentais do átomo • Próton, nêutron e elétron • Número atômico • Isótopos • A reelaboração do modelo atômico de Rutherford • Espectros atômicos • O modelo atômico de Rutherford-Bohr • Distribuição eletrônica em camadas ou níveis de energia • Critérios para prever a distribuição eletrônica
	4. Ligações químicas	• Introdução ao estudo das ligações químicas • Substâncias iônicas, moleculares e metálicas • Ligação iônica • Ligação covalente • Ligação metálica • Fórmulas das substâncias moleculares: as representações de Lewis • Ligações simples, duplas e triplas • A polaridade das ligações e das moléculas • Geometria molecular e polaridade de moléculas • Estado físico das substâncias e as forças intermoleculares
2 O macro e o micro	**1.** Relações entre massas de átomos e moléculas	• O Modelo-Padrão e a massa dos átomos • Massa atômica • Isótopos e massa atômica • Massas moleculares
	2. Quantidade de matéria	• Quantidades de substâncias • A unidade mol • Relação entre mol, massa molar e constante de Avogadro
	3. Contando átomos e moléculas	• Reações químicas • Equações químicas • Balanceamento de equações • Tipos de fórmula • Cálculo estequiométrico • Reagente em excesso e reagente limitante • Reagentes impuros e rendimento de uma reação
3 O comportamento das substâncias	**1.** O comportamento dos gases	• Como os gases afetam a vida na Terra • Características dos gases • Transformações gasosas
	2. Funções inorgânicas	• Introdução às funções químicas • Funções inorgânicas • Ácidos • Bases • Óxidos • Sais
	3. Soluções e propriedades coligativas das soluções	• As diferentes propriedades de uma solução de sal de cozinha • As soluções • Relações entre a quantidade de soluto e a de solvente ou a de solução • Propriedades coligativas
4 Energia e transformações da matéria	**1.** Termoquímica	• A energia dos alimentos é química • Transformações exotérmicas e endotérmicas • Energia envolvida nas transformações • Poder calorífico de um combustível e calor de combustão • Entalpia e variação de entalpia de reação • Lei de Hess • Energia de ligação • Entalpia-padrão de formação (ΔH^0_f)
	2. Cinética química	• Rapidez das reações • Como as reações ocorrem • Fatores que alteram a rapidez das transformações químicas • Catalisadores

Unidade	Capítulo	Conteúdos
5 Eletroquímica	**1.** Contando elétrons	• Reações envolvendo transferência de elétrons • Reações de oxirredução • Número de oxidação (Nox) • Transferência de elétrons • Regras para determinação do Nox • Nox e as reações de oxirredução • Balanceamento de equações de oxirredução • Reações redox e produção de corrente elétrica • Espontaneidade das reações • Pilhas comerciais • Corrosão de metais: um exemplo de pilha • Proteção contra a corrosão
	2. Eletrólise	• Eletrólise: energia elétrica gerando transformações químicas • Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa • Comparação entre a eletrólise e o funcionamento das pilhas • Principais aplicações da eletrólise
6 Equilíbrios químicos	**1.** Estado de equilíbrio	• Reconhecendo os equilíbrios químicos • Equilíbrio químico • Constantes de equilíbrio • Cálculo das constantes de equilíbrio • Princípio de Le Châtelier
	2. Equilíbrios ácido-base	• Ácidos e bases no cotidiano • Ácidos e bases segundo a teoria de Arrhenius • Ácidos e bases segundo a teoria de Brönsted-Lowry • Constantes de ionização de ácidos e de dissociação de bases • Equilíbrio iônico e produto iônico da água • Determinação do pH • Indicadores ácido-base • Cálculo de pH de soluções de ácidos e bases • Titulação ácido-base • Sistema-tampão ou solução-tampão
	3. Equilíbrios em sistemas heterogêneos	• Equilíbrios heterogêneos • Solubilidade de gases em líquidos • Perturbação de equilíbrios heterogêneos • Produto de solubilidade (K_{PS})
7 A química da vida	**1.** Ciclos biogeoquímicos	• Introdução aos ciclos biogeoquímicos • Ciclo da água • Ciclo do carbono • Ciclo do oxigênio • Ciclo do nitrogênio
	2. Carbono e cadeias carbônicas	• A versatilidade do carbono • Introdução à química orgânica • O carbono e as ligações covalentes • Carbono e cadeias carbônicas • Algumas características dos compostos orgânicos
	3. Hidrocarbonetos	• Hidrocarbonetos e mudanças climáticas • Hidrocarbonetos • Petróleo: fonte de hidrocarbonetos • A queima de combustíveis fósseis e as mudanças climáticas • Carvão mineral: fonte de hidrocarbonetos aromáticos • Isomeria
	4. Funções orgânicas	• Introdução às funções orgânicas • Funções nitrogenadas • Funções halogenadas • Funções oxigenadas • Isomeria óptica
8 Química, sistema produtivo e meio ambiente	**1.** Reações químicas na natureza e no sistema produtivo	• Reações químicas e a obtenção de produtos • Processos de obtenção de alguns metais • Galvanoplastia • Reações que envolvem funções oxigenadas • Sabões
	2. Polímeros sintéticos	• Plásticos • Monômeros e polímeros • Tipos de polímeros • Reciclagem de materiais plásticos
	3. Gestão de resíduos: práticas e desafios	• Descarte adequado de resíduos perigosos: uma questão de saúde pública e ambiental • O que acontece com o lixo descartado • Os perigos do mercúrio: de Minamata ao Tapajós • A doença de Minamata • Perigos do mercúrio na mineração do ouro

BIBLIOGRAFIA COMENTADA E LEITURAS COMPLEMENTARES

André, C. F. O pensamento computacional como estratégia de aprendizagem, autoria digital e construção da cidadania. *TECGOGS – Revista Digital de Tecnologias Cognitivas*, São Paulo, n. 18, p. 94-109, jul./dez. 2018. Disponível em: https://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2018/edicao_18/teccogs18_artigo05.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

O artigo discorre sobre o pensamento computacional como visão estratégica de aprendizagem, considerando a autoria digital e a perspectiva da cidadania, entre outros aspectos relacionados a esse tema.

Brasil. *Emenda constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009*. [...] dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos [...]. Brasília, DF: Presidência da República, [2009]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm. Acesso em: 18 ago. 2024.

A redação dos incisos prevê a obrigatoriedade do ensino para a faixa etária dos 4 aos 17 anos de idade e amplia a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da Educação Básica.

Brasil. Conselho Nacional de Educação Básica. Resolução n. 4/2009, de 2 de outubro de 2009. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, seção 1, p. 17, 5 out. 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em: 11 set. 2024.

O documento estabelece as diretrizes para a organização e a prática do ensino nas escolas de Educação Básica. Ele visa orientar a formação de um currículo que atenda às necessidades educacionais dos estudantes e os prepare para uma participação ativa e crítica na sociedade.

Brasil. *Estatuto da Pessoa com Deficiência*. 3. ed. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2019. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554329/estatuto_da_pessoa_com_deficiencia_3ed.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

O documento detalha a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13 146/2015), que estabelece uma série de direitos e garantias para pessoas com deficiência.

Brasil. *Lei n. 13 415, de 16 de fevereiro de 2017*. [...] institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, seção 1, p. 1, 17 fev. 2017.

Brasil. *Lei n. 14 945, de 31 de julho de 2024*. Brasília, DF: Presidência da República, 2024. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14945-31-julho-2024-796017-publicacaooriginal-172512-pl.html. Acesso em: 18 ago. 2024.

A lei estabelece a organização e a carga horária referentes à reforma do Ensino Médio.

Brasil. Ministério da Educação. Novo Ensino Médio. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio-descontinuado/. Acesso em: 18 ago. 2024.

O portal do Ministério da Educação sobre o Novo Ensino Médio traz diversas informações, como o marco legal e as mudanças no Ensino Médio para estudantes, professores e gestores escolares, entre outras.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Base Nacional Comum Curricular*: educação é a base. Brasília, DF: MEC/SEB, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 18 ago. 2024.

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, incluindo o Ensino Médio.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. *Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica*. Brasília, DF: MEC/SEB/Dicei, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 18 ago. 2024.

O documento oficial apresenta e justifica normas obrigatórias para a Educação Básica visando orientar o planejamento curricular das escolas e das redes de ensino no Brasil.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Conselho Nacional de Educação. *Base Nacional Comum Curricular*: Computação – complemento à BNCC. Brasília, DF: MEC/SEB, 2022. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2022-pdf/236791-anexo-ao-parecer-cneceb-n-2-2022-bncc-computacao/file. Acesso em: 18 ago. 2024.

O documento apresenta diretrizes específicas para a inclusão da área de Computação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica no Brasil.

Dayrell, J.; Carrano, P. Juventude e Ensino Médio: quem é este aluno que chega à escola. *In*: Dayrell, J.; Carrano, P.; Maia, C. L. (org.). *Juventude e Ensino Médio*: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014. p. 101-133.

O artigo trata do currículo como um caminho para equilibrar saberes relevantes e projeto de vida, sem simplificar a experiência escolar, o que possibilita uma interlocução com os universos do trabalho, das tecnologias, da cultura, das artes e das ciências.

Gentile, P.; Bencini, R. Construindo competências: entrevista com Philippe Perrenoud, Universidade de Genebra. *Nova Escola*, p. 19-31, set. 2000.

Nessa entrevista, o sociólogo suíço Philippe Perrenoud, da Universidade de Genebra, aborda as competências e a educação.

Guedes, M. B. Espaços mentais, leitura e produção de resumos. *Veredas*: revista de estudos linguísticos, Juiz de Fora, v. 3, n. 2, p. 31-48, jul./dez. 1999.

O artigo apresenta uma investigação sobre estratégias de leitura e esquemas cognitivos ativados durante a leitura, verificando a atribuição de sentido ao texto.

Hoffmann, J. *Avaliação mediadora*: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993.

Neste livro, a autora explora pressupostos metodológicos relacionados à prática avaliativa mediadora, do Ensino Infantil ao Ensino Superior.

Hoffmann, J. *Avaliação, mito e desafio*: uma perspectiva construtivista. 16. ed. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1995.

A obra aborda, por meio de exemplos reais, a ressignificação da avaliação como acompanhamento da construção do conhecimento dos estudantes.

Jiménez-Aleixandre, M. P.; Rodríguez, A. B.; Duschl, R. A. "Doing the lesson" or "doing science": argument in high school genetics ("Fazendo a lição" ou "fazendo ciência": argumento em genética do Ensino Médio). *Science Education*, Hoboken, v. 84, p. 757-792, 2000.

Neste artigo, os autores investigam a construção de argumentos em aulas de Ciências.

Kleiman, A. *Texto e leitor*: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2010.

O livro apresenta as teorias cognitivas relacionadas à interpretação de texto e explica como percepção, atenção, memória e inferência têm papel central na compreensão e na reflexão sobre o que se lê.

Metcalfe, J. Metacognitive processes. *In*: Bjork, E. L.; Bjork, R. A. (ed.). *The handbook of perception and cognition*: memory. San Diego: Academic Press, 1996. v. 10.

O capítulo discute o papel da metacognição na resolução de problemas e sua relação com o aprendizado e a memória.

Sasseron, L. H. ; Carvalho, A. M. P. de. Construindo argumentação na sala de aula: a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de Toulmin. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 17, n. 1, p. 97-114, 2011. Disponível em: http://scielo.br/pdf/ciedu/v17n1/07.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

Nesse artigo, as autoras investigam os elementos em jogo na construção de um argumento, dando destaque aos aspectos estruturais da argumentação.

Tomazetti, E. M.; Schlickmann, V. Escola, Ensino Médio e juventude: a massificação de um sistema e a busca de sentido. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 331-342, abr./jun. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v42n2/1517-9702-ep-42-2-0331.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

O artigo problematiza o Ensino Médio, refletindo sobre a falta de sentido atribuída à escola em razão de mudanças sociais, culturais e políticas.

UNIDADE 1 QUÍMICA E ESTUDO DOS MATERIAIS

INTRODUÇÃO

Esta primeira unidade é constituída de quatro capítulos. O capítulo 1 aborda os objetos de estudo da Química, o conhecimento químico e os princípios da Química Verde. No capítulo 2, são trabalhadas as unidades de medida, como as de massa, volume e densidade, estabelecendo que os estudantes compreendem as propriedades da matéria. No capítulo 3, são apresentados alguns modelos atômicos e as partículas prótons, nêutrons e elétrons, para se chegar a conceitos como número atômico, número de massa e isótopos e à reelaboração do modelo de Rutherford. Depois, são explorados os espectros atômicos para, então, ser apresentado o modelo de Rutherford-Bohr, em que se inicia a ideia de energia quantizada dos elétrons, de camadas eletrônicas e de distribuição dos elétrons nessas camadas. Por fim, no capítulo 4 os estudantes conhecem e identificam as diferentes ligações químicas, suas propriedades e características.

Os objetivos da unidade se articulam a este e a outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas competências gerais como a **CGEB1** (valorizar o conhecimento historicamente construído), a **CGEB2** (recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas) e a **CGEB5** (utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação para acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo), competências específicas como a **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida) e a **CECNTEM3** (avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico), e habilidades como a **EM13CNT104** e a **EM13CNT307**.

Sugestão de planejamento

Sugere-se que a abordagem de modelos atômicos e características dos átomos seja realizada com o(a) professor(a) de Física. A seção *Química e Sociologia* (p. 65) oferece oportunidade de interdisciplinar com a Sociologia ao explorar a reciclagem de alumínio e a importância do trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Procure disponibilizar, sempre que possível, material de consulta e de pesquisa para os estudantes e apoie-os em suas buscas por informações e na construção do aprendizado.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Avaliar as características necessárias para que um material seja utilizado em determinada finalidade. • Compreender por que o senso comum atribui à Química aspectos negativos. • Reconhecer que os conhecimentos da Química podem propiciar abordadens sustentáveis para diminuir impactos ambientais.	CGEB1 CGEB7		Educação ambiental Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
2	• Identificar processos de medição em situações do cotidiano. • Diferenciar materiais por meio da análise de suas propriedades. • Compreender os métodos para separação de misturas, avaliar qual é o método mais adequado para a separação de uma determinada mistura e reconhecer sua presença em setores como as atividades domésticas e o tratamento de água, entre outros.	CGEB2 CGEB7 CGEB9 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT301 EM13CNT307	Ciência e tecnologia Educação ambiental Saúde Vida familiar e social

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
3	• Reconhecer a necessidade de elaborar modelos microscópicos para a interpretação das propriedades e da constituição da matéria. • Conhecer os tipos de partículas elementares. • Relacionar o modelo atômico de Bohr aos resultados do teste de chama.	CGEB1 CGEB2 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT104	
4	• Compreender a natureza das ligações químicas. • Relacionar os tipos de ligação química à formação de interações intramoleculares. • Elaborar e testar hipóteses sobre o comportamento de determinados materiais com base nos modelos de ligações intermoleculares.	CGEB1 CGEB2 CECNTEM3	EM13CNT301 EM13CNT307	
Fechamento da unidade	• Investigar como é feita a determinação da composição de uma liga metálica. • Elaborar um algoritmo que permita identificar um material por meio de suas propriedades específicas.	CGEB2 CECNTEM3	EM13CNT301 EM13CNT307	

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 12 E 13)

- A imagem de abertura pode ser utilizada para iniciar a discussão sobre as diferentes formas de observar e identificar as características dos materiais. As questões propostas propiciam uma ocasião para identificar as ideias dos estudantes sobre o assunto.

CAPÍTULO 1 QUÍMICA: OBJETO DE ESTUDO E APLICAÇÕES (PÁGINA 14)

- Sugere-se que os tópicos do capítulo sejam apresentados a partir da contextualização da Química enquanto ciência e da definição de seu objeto de estudo, bem como de sua presença em nosso cotidiano.

Onde a Química está presente? (página 14)

- Para avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o que é a Química, converse com a turma sobre as respostas que eles elaboraram para as atividades do boxe *Para começar*.

Conhecimento químico (páginas 15 e 16)

- Comente o fato de que a Química passou a ser estudada de maneira formal no século XVI, mas vem sendo usada de forma empírica desde a Pré-História. O texto apresentado na seção *Ciência tem história* (p. 19), mostra as contribuições dos alquimistas para o desenvolvimento da Química.
- Para contextualizar o avanço científico e tecnológico, sugere-se que seja proposta aos estudantes a seguinte questão: "Em sua opinião, qual é a importância da Química para a sociedade?". Com base nas respostas, que podem ser registradas na lousa, discuta a importância da Química e a visão que as pessoas têm sobre ela. Após essa abordagem, observe como os estudantes reconstruíram suas ideias sobre a Química enquanto ciência e sobre as implicações de seus produtos no cotidiano das pessoas.
- O objeto digital *Química decolonial* traz exemplos de saberes africanos e indígenas em processos que envolvem o uso da Química. Assim, trabalha-se o tema contemporâneo transversal **Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras**, da área Multiculturalismo.
- Para retratar como a Química está presente em nosso cotidiano, sugere-se abordar o boxe *Para explorar* (p. 15) que indica a leitura da obra *O livro da Química*, de Maria da Anunciação Rodrigues.

Química e Geografia – La Palma: uma erupção vulcânica sob o olhar da Química e da Geografia (página 16)

- Use o texto para mostrar aos estudantes como o trabalho conjunto de profissionais gera resultados mais efetivos ao utilizar e unir conhecimentos de áreas diferentes.

Química Verde: uma abordagem mais sustentável para a conservação ambiental (páginas 17 e 18)

- Ao abordar o contexto da Química Verde com a turma, ressalte a importância de reduzir os impactos ambientais e leve os estudantes a refletir sobre a maneira como produzem e consomem. Caso julgue oportuno, proponha uma conversa em grupo sobre o reconhecimento e a importância dos 12 Princípios da Química Verde.

Ação e cidadania – Sustentabilidade: o segredo para um futuro melhor (página 18)

- O texto do boxe discute o conceito de sustentabilidade e propõe aos estudantes que implementem uma prática sustentável na escola ou na comunidade. Dessa forma, são trabalhados o tema contemporâneo transversal **Educação ambiental** e a competência geral **CGEB7**.

Ciência tem história – Da Alquimia à Química: uma jornada de transformação científica (página 19)

- Sugere-se iniciar a discussão da seção questionando os estudantes sobre o que eles entendem por Alquimia, se já ouviram o termo "alquimista", levantando suas noções prévias sobre o assunto. Caso surjam referências a jogos, filmes e/ou a animações, aproveite a oportunidade para explorar o que eles se recordam desses ambientes, a fim de atrair o interesse da turma para a análise do texto, destacando o que de fato condiz com os registros históricos e o desenvolvimento científico.
- Caso julgue oportuno, antes da leitura da seção, apresente à turma o vídeo "Da Alquimia à Química moderna" (5 m 12 s), disponível em: https://youtu.be/kuL_I8c69vU (acesso em: 10 out. 2024). Ao final da leitura e resolução das atividades, procure resgatar o que foi trazido pelos estudantes inicialmente e questione como as noções sobre o tema se aprofundaram para que eles percebam os preconceitos envolvidos, principalmente em relação ao misticismo relacionado à Alquimia.
- Procure ressaltar o contexto histórico da época, como, por exemplo, o fato de que o acesso ao conhecimento era bastante restrito a uma parcela da população; a grande repressão religiosa existente na Idade Média e seu impacto no desenvolvimento das ciências e na comunicação científica; e posteriormente o preconceito de alguns pesquisadores após a Revolução Científica, com a filosofia alquímica e a visão de mundo e métodos utilizados pelos seus antecessores. Os(As) professores(as) de História e Filosofia podem ser convidados a colaborar na construção de uma linha do tempo para uma melhor contextualização.
- É importante reforçar a ideia de que o conhecimento científico é uma construção não linear, e que vários conceitos e filosofias caminham em paralelo ou são abandonados e revistos posteriormente, fortalecendo o entendimento de que a ciência não é estática e que o surgimento de teorias e experimentos divergentes contribuem para novas interpretações de um mesmo fato, quebrando uma visão triunfalista da ciência. Além disso, incentivar a quebra de preconceitos e as visões distorcidas com saberes e entendimentos antigos é de extrema relevância para promover uma empatia histórica e o respeito com a divergência de opiniões. Assim, trabalha-se a competência geral **CGEB1**.
- Procure introduzir também o conceito de divulgação científica e a importância do surgimento de Academias e Sociedades Científicas para promoção da troca de ideias e para o avanço do conhecimento.

Práticas de Ciências – Regras de segurança e descarte de resíduos (página 20)

- A atividade prática tem como objetivo verificar os conhecimentos dos estudantes relacionados aos símbolos que alertam sobre perigos em produtos, além de discutir exemplos de regras e de procedimentos de segurança. É importante orientá-los quanto à maneira correta de descartar resíduos.

FONTES COMPLEMENTARES

- Pereira, L. S. Proposta de uso da abordagem *team-based learning* em aulas de história da Química no ensino remoto: discutindo a relação entre a Alquimia e a Química. *Revista de Estudos em Educação e Diversidade*, Itapetinga, v. 3, n. 7, p. 1-22, jan./mar. 2022. Disponível em: https://periodicos2.uesb.br/index.php/reed/article/view/10269/6743. Acesso em: 24 set. 2024.

  O artigo traz uma proposta para o uso da abordagem *team-based learning* para aulas de história da Química, discutindo a relação entre a Alquimia e a Química. Essa proposta tem como objetivo atender às necessidades do ensino remoto. A leitura do artigo contribui também para sua própria aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos de e sobre Química, bem como sobre as múltiplas formas de desenvolver as suas atividades de ensino.

- Marques, G. T. S. *História da Química*. 2. ed. Fortaleza: EdUece, 2019. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/472966/2/Livro%20Hist%C3%B3ria%20da%20Qu%C3%ADmica.pdf. Acesso em: 24 set. 2024.

  O livro aborda a história da Química e da ciência desde as civilizações antigas da América, da Ásia e da Europa, passando pelos outros períodos históricos e discutindo perspectivas para o século XXI. Em diversos pontos da obra, é feita a associação da evolução da Química ao desenvolvimento de outras áreas afins, além dos acontecimentos políticos, sociais e históricos que impactaram o desenvolvimento da Química. Esta sugestão de leitura aborda também processos e práticas de investigação que podem ser exploradas a partir da história da química.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As atividades propostas nos boxes *Roteiro* ao longo do capítulo e as atividades propostas no final do capítulo podem servir como avaliação formativa. Esse tipo de avaliação tem a capacidade de gerar, com rapidez, informações úteis sobre etapas vencidas e dificuldades encontradas, proporcionando uma verificação contínua do processo de ensino-aprendizagem.
- Outra avaliação ainda pode ser feita por meio de uma atividade em que os estudantes devem responder a questionamentos como: "Quais atividades desenvolvidas em sua casa envolvem a Química?"; "A Química esteve envolvida na construção de sua casa?"; "Em que momentos e como?"; "Seu corpo depende de processos químicos para viver?"; Onde a Química se apresenta na natureza?".

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 14)

1. Resposta pessoal. Comente com os estudantes que as imagens que pensaram, sejam elas positivas ou negativas, envolvem escolhas humanas, e não é correto atribuir caráter positivo ou negativo ao conhecimento científico.

Ação e cidadania – Sustentabilidade: o segredo para um futuro melhor (página 18)

1. Resposta pessoal. Se considerar necessário, auxilie os estudantes no planejamento das ações. Eles devem ser protagonistas na implementação das práticas propostas.

Ciência tem história – Da Alquimia à Química: uma jornada de transformação científica (página 19)

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes comentem que a transição da Alquimia para a Química não foi apenas uma evolução científica, mas também refletiu em mudanças sociais, culturais e filosóficas, como a crescente valorização da razão e da observação empírica durante a Renascença e a Revolução Científica, além do desenvolvimento de tecnologias laboratoriais que permitiram experimentos mais precisos.

Atividades (página 21)

2. Desde os primórdios da humanidade, atividades como o domínio do fogo, o reconhecimento de materiais inflamáveis, a conservação dos alimentos, a identificação de metais e de suas propriedades para confecção de ferramentas e a obtenção de metais a partir de minérios, entre outras, utilizam os conhecimentos químicos.

Comente com os estudantes que o conhecimento químico apresenta constante evolução, com o passar do tempo, por meio de estudos e contribuições de cientistas, essas e outras atividades revolucionaram a sociedade.

3. Sim, porque o conhecimento do fogo envolve o controle de materiais combustíveis. Além de proporcionar iluminação noturna, aquecimento e proteção contra os animais, o fogo permitiu o cozimento de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e de carnes.

Chame a atenção dos estudantes para a importância da descoberta e do domínio do fogo. Considerado um conhecimento químico, o fogo proporcionou calor, cozimento e fonte de luz, e foi um avanço na evolução humana.

4. Na primeira *charge*, o planeta Terra já se apresenta em estado de deterioração; na segunda *charge* a deterioração foi agravada em um curto intervalo de tempo. A ironia diz respeito à ideia central de sustentabilidade, ou seja, de garantir para as próximas gerações a disponibilidade de recursos do planeta. Pode-se inferir que a imagem do pai, sorridente e despreocupado, reflete o comportamento irresponsável da sociedade atual em relação à conservação ambiental.

6. A Química Verde tem impulsionado o desenvolvimento de processos sustentáveis como a transformação do milho em plástico biodegradável, a redução de resíduos gerados na manufatura de produtos farmacêuticos populares e a modificação de processos de extração e de branqueamento na indústria da celulose, entre outros.

Comente com os estudantes como o avanço da Química Verde na medicina tem impulsionado o desenvolvimento sustentável, reduzindo o impacto ambiental de medicamentos e a agilidade dos processos de produção.

7. O aquecimento em banho-maria é usado para aquecer substâncias ou misturas garantindo que a temperatura do conjunto não fique maior que a temperatura de ebulição da água. Usa-se, por exemplo, para preparar pudim. A destilação permite separar misturas homogêneas, cujos componentes não podem ser identificados visualmente. Faz parte do processo de preparação de algumas bebidas alcoólicas e do refino do petróleo.

CAPÍTULO 2 PROPRIEDADES DA MATÉRIA (PÁGINA 22)

Medições (página 22)

- A imagem de abertura pode ser utilizada para iniciar a discussão sobre as diferentes formas de quantificar os materiais a partir dos produtos comercializados em supermercados. Se alguns estudantes tiverem alguns desses produtos em suas embalagens originais, como água mineral ou biscoitos, peça a eles que analisem essas embalagens e as informações nelas contidas. Depois, indague sobre algumas das medidas que costumam realizar em procedimentos do dia a dia e as unidades de medida utilizadas.

Massa, volume e densidade (página 23)

- Comente que, devido à necessidade de utilizar medições, foram elaborados padrões para a unificação das unidades, o que levou ao surgimento do Sistema Internacional de Unidades (SI). Essa abordagem trabalha a habilidade **EM13CNT301**.
- A ideia de massa é sempre confundida com a de peso. Para evitar esse equívoco, é importante definir a massa e explicar aos estudantes que ela é determinada por uma balança, como se vê na foto, diferentemente do peso, que reflete uma força e é determinado por dinamômetros.
- Para facilitar a compreensão dos estudantes, pode-se trabalhar com atividades simples que permitam o entendimento prático do conceito de densidade e da relação entre massa e volume. Pode-se mostrar a tendência do comportamento dos materiais usando objetos simples, que boiam ou afundam na água.
- O boxe *Roteiro* (p. 23) apresenta uma atividade em que o estudante deve comparar as massas e os volumes de materiais com densidades diferentes. A atividade permite avaliar a compreensão dos estudantes sobre o conceito de densidade.

Propriedades da matéria (páginas 24 a 28)

- Ao explicar a diferença entre as duas transformações apontadas no texto (p. 24) – combustão e mudança de estado físico –, elas podem ser relacionadas com as propriedades químicas e físicas da matéria.
- A atividade do boxe *Roteiro* (p. 26) pede aos estudantes que classifiquem determinadas propriedades da matéria em extensivas ou intensivas. Esse é um bom avaliador para mensurar a compreensão dos estudantes acerca desse tema.
- Para sondar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema, pergunte-lhes quais dessas mudanças eles conhecem. Espera-se que citem, entre outras, o derretimento do gelo e a evaporação da água. Em seguida, eles poderão ser motivados a fazer suposições a respeito da participação da energia nesse processo. Trata-se de uma discussão importante sobre as transformações microscópicas que ocorrem em decorrência da mudança de estado físico.
- Se considerar oportuno, utilize o boxe *Ampliação* que trata do gelo-seco (p. 27) para destacar que alguns estados físicos de determinadas substâncias podem ser conhecidos por outros nomes, como a água, por exemplo, que no estado sólido é chamada gelo. O mesmo ocorre com a substância dióxido de carbono, que, no estado gasoso, é conhecida como gás carbônico e, no estado sólido, como gelo-seco. Com isso, é trabalhada a habilidade **EM13CNT307**.
- Ao trabalhar com os gráficos de mudança de estado dos materiais puros, será possível mostrar as equivalências das temperaturas, tanto de ebulição e condensação como de fusão e solidificação, relacionando os respectivos fluxos de energia. Por exemplo, na fusão do gelo, a temperatura se mantém em 0 °C com absorção de energia, enquanto na solidificação tem-se a mesma temperatura, mas com liberação de energia.
- No boxe *Roteiro* (p. 28), os estudantes precisam identificar a temperatura de condensação e a temperatura de solidificação de uma substância com base em um gráfico. Caso algum deles tenha dificuldade nessa identificação, peça-lhe que compare o gráfico do boxe com o gráfico do texto (sobre a água), na mesma página. Espera-se que o estudante perceba que existem partes do gráfico que são paralelas ao eixo horizontal e que essas partes indicam a mudança de estado físico.

Práticas de Ciências – Duas maneiras de diferenciar líquidos (página 29)

- As curvas de aquecimento dos diversos materiais são construídas mediante a utilização de dados experimentais. A fim de facilitar o entendimento dessas curvas, considere a possibilidade de realizar a atividade experimental nesse momento e trabalhar com os dados obtidos. Com os valores de temperatura colhidos durante o aquecimento da água e durante a ebulição, será possível solicitar a construção de um gráfico. Ao interpretá-lo, os estudantes terão a oportunidade de concluir que se trata da representação do que aconteceu durante o experimento. Esta atividade trabalha a competência geral **CGEB2**.
- Além do monitoramento da temperatura da água líquida e da construção do gráfico correspondente, essa atividade permite responder a perguntas bastante interessantes, como as apresentadas a seguir.
  - Por que saem algumas bolhas antes da ebulição?

    R.: *Porque existem gases dissolvidos na água.*
  - Por que saem mais bolhas em alguns locais do béquer do que em outros durante a ebulição?

    R.: *Toda a base do béquer está recebendo a mesma quantidade de calor. Como o vidro pode apresentar ranhuras, ainda que microscópicas, a água que preenche esses pequenos espaços será aquecida antes que o resto da água. Assim, ela entra em ebulição primeiro, liberando bolhas de vapor d'água. Muitos estudantes dizem que são bolhas de ar, portanto, esse esclarecimento é necessário.*
  - Por que em locais de altitude acima do nível do mar a temperatura de ebulição é diferente de 100 °C?

    R.: *Porque a altitude exerce influência sobre a temperatura de ebulição: quanto mais alto o lugar, menor é a quantidade de ar (menor pressão atmosférica) para oferecer resistência à saída efetiva do vapor e, portanto, menor a temperatura de ebulição.*
  - Por que a temperatura fica constante, após o início da ebulição, se ainda há fornecimento de energia?

    R.: *Porque, a partir do momento em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica, a energia fornecida é usada exclusivamente para a mudança de estado.*
- É importante estimular os estudantes a buscar as respostas em grupo, com base no que já aprenderam e também em novas pesquisas, se necessário.
- Verifique sempre a segurança do local em que a atividade experimental será realizada. Lembre os estudantes dos procedimentos e dos equipamentos de segurança indispensáveis para qualquer atividade realizada em laboratório.

Sistemas (páginas 30 e 31)

- A definição de "sistema" confere ao estudante a noção de que a experimentação e a pesquisa para a coleta de dados dependem do estabelecimento de parâmetros e de uma necessária delimitação, já que são muitas as informações que podem ser obtidas.
- O texto do boxe *Química e Física* (p. 30) revela como a troca de energia e/ou de matéria com o ambiente serve de parâmetro para classificar um sistema em aberto, fechado ou isolado.

Substâncias puras e misturas (páginas 31 e 32)

- Considere solicitar aos estudantes que pensem em como é possível diferenciar água destilada de água mineral e de água potável. Poderá ser elaborado um texto a respeito com a participação deles. Nesse momento, deve ficar claro que o material puro é a substância água (destilada) e que as demais (mineral e potável) são misturas de água e outras substâncias nela dissolvidas.
- As diferentes fases de uma mistura podem ser verificadas experimentalmente com a demonstração das misturas propostas na página 32, no tópico "Fases e substâncias de uma mistura". O estudante perceberá, assim, que a quantidade de materiais misturados pode ou não corresponder ao número de fases. Também é possível demonstrar que uma das fases de um sistema heterogêneo pode ser composta de uma mistura ou uma substância.
- Para contextualizar e justificar o estudo das soluções (misturas), peça aos estudantes que observem a imagem da bolsa de soro fisiológico (p. 32). Para efeito de comparação, cite o frasco de água e sal (salmoura) em que comumente se conservam produtos como azeitonas. Comente que, em caso de desidratação, normalmente são utilizadas soluções isotônicas que, além de cloreto de sódio, contêm sais de potássio, entre outros componentes. O soro fisiológico é muito usado também na higienização nasal e de ferimentos. Quanto às azeitonas, são conservadas em solução de salmoura, que contêm também ácido cítrico, que inibe o crescimento de microrganismos resistentes a altas concentrações de sal.

Substâncias simples e substâncias compostas (página 33)

- Ao realizar a comparação entre as curvas de aquecimento das misturas e das substâncias, dê relevância à temperatura constante ou não na mudança de estado e ao fenômeno que ocorre durante essas mudanças. Por exemplo, na ebulição da substância, somente ela vai do líquido ao vapor; já na mistura, somente o componente de menor temperatura de ebulição muda de estado. Com isso, altera-se a proporção entre o soluto e o solvente da mistura, o que provoca a variação da temperatura durante o processo da ebulição.

Propriedades específicas dos materiais e separação de misturas (páginas 34 a 38)

- Sugerimos que sejam destacadas as propriedades da mistura que pode ser separada para cada método apresentado.
- Ao falar sobre a filtração, é importante salientar que uma das fases da mistura é obrigatoriamente um sólido, parte que fica retida no filtro. Procure utilizar, sempre que possível, exemplos do dia a dia. No caso da filtração, considere comentar o processo de preparo de café ou o de separação do macarrão do líquido de cozimento, com o uso de um escorredor. Utilize também o boxe *Ação e cidadania* (p. 37).
- Se julgar oportuno, chame a atenção dos estudantes para o trecho da página 35 que trata da separação de algumas frações do sangue e seus principais usos. Esse conteúdo pode ser utilizado para comentar a importância de se doar sangue, trabalhando os temas contemporâneos transversais **Saúde** e **Vida familiar e social**, da área Cidadania e civismo. O *site* do Ministério da Saúde (disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/doacao-de-sangue/; acesso em: 11 out. 2024), por exemplo, traz algumas informações sobre a doação de sangue.

- Ao falar sobre a levigação, mostre as imagens de extração do ouro usando a bateia. Em seguida, faça a leitura do boxe *Química e Geografia* (p. 36), que aborda as consequências do garimpo ilegal em terras Yanomami. A discussão sobre os problemas causados pelo garimpo ilegal propicia o trabalho com os temas contemporâneos transversais **Saúde** e **Educação ambiental**, da área Meio ambiente. Aproveite o tema dessa seção para trabalhar também a habilidade **EM13CNT104**, a competência geral **CGEB9** e a competência específica **CECNTEM1**.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Jardins filtrantes (página 39)

- A seção aborda a técnica dos jardins filtrantes, em que microrganismos presentes nas raízes das plantas são capazes de filtrar parte do esgoto residencial. A água proveniente desse processo, apesar de não ser potável, pode ser utilizada para diversos fins, sem risco de contaminação. O tema dessa seção promove aspectos da habilidade **EM13CNT105**, da competência geral **CGEB7** e da competência específica **CECNTEM1**, e explora os temas contemporâneos transversais **Ciência e tecnologia** e **Educação ambiental**, da área Meio ambiente.

FONTE COMPLEMENTAR

- Rozenberg, I. M. O Sistema Internacional de Unidades – SI. 3. ed. rev. e ampliada. São Paulo: Instituto Mauá de Tecnologia, 2006. Disponível em: https://maua.br/files/arquivos/o-sistema-internacional-de-unidades-si-3.a-edicao.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.

  Nessa obra, o autor aborda o Sistema Internacional de Unidades e faz um breve histórico do desenvolvimento de padrões e de técnicas de medidas de grandezas.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Visita à estação de tratamento de água e de esgoto

Para que os estudantes aprofundem seus conhecimentos sobre o tratamento de água e de esgoto, é interessante levá-los para uma visita guiada, disponível em diversas estações de tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE) no Brasil. A seguir indicamos duas delas.

- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb): A companhia disponibiliza visitas mensais a suas ETAs e ETEs, localizadas no Distrito Federal. Orientações sobre quantidade de pessoas por visita, regras, entre outras, estão disponíveis em: https://www2.caesb.df.gov.br/educativo/espaco-ambiental/visitas-as-estacoes.html.
- Águas de São Francisco: A empresa oferece visitas guiadas a estações de tratamento de água e de esgoto em Barcarena (PA). A visita começa pela ETA Cabanos, onde ocorre a captação da água e os tratamentos para o consumo humano. A segunda parte da visita ocorre nas ETEs Cabanos I e II, em que os visitantes podem conhecer o processo de tratamento do esgoto sanitário. Mais informações estão disponíveis em: https://aguasdesaofrancisco.com.br/portas-abertas-oferece-visita-guiada-a-estacoes-de-tratamento-de-esgoto-e-agua-em-barcarena/.
  Acessos em: 14 out. 2024.

Pesquise se alguma ETA ou ETE na sua região oferece visitas guiadas. Caso haja a oportunidade de realizar uma visita, busque informações sobre a quantidade de visitantes por vez, quais locais da ETA ou ETE serão visitados e a sequência em que serão visitados. Esse processo facilita a adaptação da atividade, uma vez que você poderá ajustá-la conforme o percurso.

Sugerem-se as atividades a seguir, a serem realizadas durante a visita (pesquisa de campo para coleta de informações) e após a visita (debates e questões conceituais).

Material

- Caderno
- Lápis ou caneta
- Equipamentos de Proteção Individual, como capacetes, botas, etc. (caso sejam exigidos pela ETA/ETE)
- *Smartphone* com câmera (verifique com antecedência se é possível fotografar o local e as etapas)

Roteiro

1. **Durante a visita**
   - **a)** Os estudantes devem anotar observações sobre cada etapa do processo, focando nos aspectos químicos envolvidos.
   - **b)** Incentive os estudantes a fazerem perguntas para o guia sobre os processos realizados e desafios enfrentados em cada etapa.
   - **c)** Se for possível, solicite aos estudantes que tirem fotos, façam desenhos esquemáticos ou fluxogramas representando os processos observados.
2. **Após a visita**
   - **a)** Organize a turma em grupos. Cada grupo ficará responsável por apresentar um relatório em formato de *slides* ou cartazes físicos, apresentando:
     - as etapas observadas.
     - processos químicos envolvidos nas etapas.
     - a importância de cada etapa no tratamento geral da água ou do esgoto.
     - reflexões sobre como o tratamento contribui para o ambiente e para a saúde humana.
   - **b)** Após as apresentações, reúna a turma em uma roda de conversa e promova um debate sobre as estações visitadas, focado em possíveis melhorias nos processos, ou nas alternativas mais sustentáveis. Após a discussão, é possível aprofundar a atividade solicitando aos estudantes que pesquisem alternativas mais sustentáveis já existentes para o tratamento de água e de esgoto, mesmo que em pequena escala. Caso essa parte da atividade seja realizada, pode-se pedir aos estudantes que elaborem um resumo sobre a alternativa encontrada, com posterior debate em sala de aula sobre ela, abordando, por exemplo, quais seriam os desafios de aplicar essa alternativa em larga escala.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

Peça aos estudantes que, organizados em grupos, pesquisem a respeito do ciclo da água e produzam um cartaz com os seguintes itens:

- Reprodução do ciclo da água na natureza, com a indicação das mudanças de estado físico por meio de setas ao lado dos nomes.

- A representação dos estados físicos – sólido, líquido e gasoso – por meio do modelo de esferas em três locais do ciclo onde aparece o respectivo estado físico.
- Representação da variação da temperatura de ebulição da água com a altitude, acrescida de uma explicação sucinta sobre esse fenômeno.

Estimule os estudantes a serem criativos na confecção do cartaz. Se considerar que uma cartolina não tem espaço suficiente para que as informações fiquem claras, oriente-os a usar papel *kraft*.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 22)

1. Resposta variável. Podem ser feitas medidas para verificar, por exemplo, o tempo gasto, a distância, a temperatura, a pressão ou a umidade relativa do ar.

2. Resposta variável. O tempo pode ser medido em minutos ou horas (dependendo da distância). A distância pode ser medida em metros ou quilômetros, mas poderiam expressá-la em quarteirões. As medidas de temperatura, pressão ou umidade relativa do ar necessita de instrumentos específicos – termômetro, barômetro, higrômetro, respectivamente – geralmente expressas em °C, mmHg ou atm e g/m³, respectivamente.

Práticas de Ciências – Duas maneiras de diferenciar líquidos (página 29)

1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes consigam diferenciar os dois líquidos (água da torneira e água salgada) realizando um experimento em que se coloca a mesma quantidade dos dois líquidos em béqueres distintos, introduzindo-se uma batata (de dimensões análogas) em cada um. Comparando-se a posição das batatas nos dois béqueres, espera-se que a batata flutue no béquer com água salgada.

Atividades (páginas 40 e 41)

2. a) Para calcular a massa, primeiro calcula-se o volume de cada placa:

$V = L \cdot C \cdot A = 200 \cdot 50 \cdot 2 = 20\,000\ \text{cm}^3$

Com o valor da densidade fornecido pelo exercício, encontra-se o valor da massa:

$d = \frac{m}{V} \rightarrow m = d \cdot V = 2{,}7 \cdot 20\,000$

$m = 54\,000\ \text{g} = 54\ \text{kg}$

b) O cliente solicitou 100 placas. Como a massa de cada placa é 54 kg, a massa total do pedido é 5 400 kg, ou 5,4 toneladas. Como o caminhão suporta no máximo 3 toneladas, serão necessárias, no mínimo, duas viagens para transportar a carga até o cliente.

3. O volume do sólido é obtido a partir do enunciado ($V = 0{,}6$ mL); utilizando esse valor na equação da densidade, temos:

$d = \frac{m}{V} = \frac{2{,}1}{0{,}6} = 3{,}5\ \text{g/cm}^3$.

Comparando com os valores fornecidos pelo enunciado, chega-se à conclusão de que o sólido era formado por diamante.

5. A adição de sal à água aumenta a densidade do líquido porque a densidade do sal é maior do que a densidade da água.

6. Para calcular a variação de volume entre a água a 25 °C e congelada a 0 °C, sabemos que a massa do material se mantém a mesma e não há variação; por isso, inicialmente calculamos a massa da água com a equação da densidade:

$d = \frac{m}{V} \rightarrow m = d \cdot V = 1{,}00 \cdot 1\,500$

$m = 1\,500\ \text{g}$

Então, utilizando a densidade do gelo, encontramos o volume que o gelo terá na garrafa:

$d = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{d} = \frac{1\,500}{0{,}92} \rightarrow V = 1\,630{,}4\ \text{cm}^3 = 1{,}6304\ \text{L}$

Nesse caso, não houve danos na garrafa, mas é possível trabalhar com os estudantes o que aconteceria se a garrafa estivesse totalmente cheia de água, ou mesmo se a garrafa fosse feita de outro material, com mais massa dentro dela.

7. A identificação e a determinação do grau de pureza de um sólido devem ser feitas por meio de suas propriedades específicas. Se a amostra em estudo contiver uma substância pura, sua temperatura permanecerá constante durante a fusão.

8. A temperatura da superfície do copo se equilibra com a temperatura do líquido em seu interior. Isso interfere na temperatura ao redor do copo, condensando o ar e formando gotículas de água no copo.

9. Na temperatura e pressão consideradas, o metano será um gás, pois −145 °C é maior que sua temperatura de ebulição. Propano e eteno serão líquidos, pois −145 °C é uma temperatura maior que a temperatura de fusão e menor que a temperatura de ebulição dessas substâncias.

10. Verdadeira: III. Falsas: I, II e IV. Correção das alternativas falsas: **I.** O processo de condensação libera energia, o processo é exotérmico; **II.** A solidificação é um processo exotérmico; **IV.** A vaporização é um processo endotérmico, pois absorve energia.

11. O gráfico obtido é o seguinte:



A mudança de estado físico representada é a fusão.

CAPÍTULO 3 MODELOS ATÔMICOS E CARACTERÍSTICAS DOS ÁTOMOS (PÁGINA 42)

- Neste capítulo, é importante chamar a atenção dos estudantes para o significado de um modelo como representação de uma realidade visível ou de uma realidade que não podemos ver, como as partículas que constituem a matéria.
- Organize com os estudantes a construção de um painel coletivo que apresente todos os modelos atômicos já elaborados, trabalhando a competência geral **CGEB1**. Durante a apresentação do painel, alguns estudantes podem indicar como ocorreu a troca de um modelo por outro, destacando

as suas limitações e as características de uma investigação científica, com resultados que diferem do previsto em um experimento ou em uma construção teórica.

O modelo de Rutherford e as partículas fundamentais do átomo (páginas 43 e 44)

- No boxe *Para explorar* (p. 44), sugere-se acessar o vídeo que ilustra o experimento realizado por Rutherford.
- Se julgar oportuno, utilize a simulação sobre o experimento de Rutherford indicado na seção *Fonte complementar* deste Manual.

Próton, nêutron e elétron (página 45)

- Compare as propriedades dos prótons, nêutrons e elétrons informadas na tabela.
- Os estudantes costumam confundir as cargas formadas pelo recebimento e pela perda de elétrons por considerarem que aquele que ganha algo fica positivo e aquele que perde algo fica negativo. Explique que ocorre o inverso, pelo fato de os íons serem formados ao receber ou ceder elétrons, que possuem carga negativa.

Número atômico (páginas 46 e 47)

- Para reforçar os conceitos de número atômico e número de massa, trabalhe com os estudantes o quadro com representações de íons. Se julgar necessário, utilize a Tabela Periódica (p. 58) para exemplificar com outros elementos químicos.

Isótopos (páginas 47 e 48)

- O boxe *Roteiro* (p. 48) menciona o enriquecimento de urânio e pede aos estudantes que realizem uma pesquisa de outras aplicações de isótopos. Verifique se eles citam, em suas pesquisas, a geração de energia elétrica e o uso dos isótopos na medicina nuclear. Se julgar oportuno, realize um debate com os estudantes organizando-os em dois grupos. Um deles deverá defender o uso desse tipo de material, mesmo havendo risco de contaminação, e o outro deve ser contra o uso da energia nuclear. Esse debate trabalha a habilidade **EM13CNT104**.

A reelaboração do modelo atômico de Rutherford (páginas 48 e 49)

- O boxe *De olho no conceito* (p. 49) retoma os conceitos de comprimento de onda e frequência aplicados às radiações eletromagnéticas. Se julgar necessário, reforce a ideia de que o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais.

Espectros atômicos (página 50)

- O boxe *Roteiro* chama a atenção dos estudantes para as diferentes colorações de determinadas substâncias quando aquecidas no bico de Bunsen. Aproveite para verificar com os estudantes se eles têm algum conhecimento prévio desse tópico. Alguns exemplos que eles podem conhecer são os fogos de artifício ou algumas lâmpadas, como a lâmpada de vapor de sódio ou a de vapor de mercúrio. Essa abordagem trabalha as competências específicas **CECNTEM1** e **CECNTEM3**.

O modelo atômico de Rutherford-Bohr (página 51)

- Com o estudo do modelo atômico de Rutherford-Bohr, pode-se trabalhar a habilidade **EM13CNT101**, ao se prever o comportamento do elétron nos níveis de energia.

Distribuição eletrônica em camadas ou níveis de energia (página 52)

- Ao trabalhar o boxe *Ciência se discute*, aproveite para contextualizar o assunto sobre a pesquisa e o uso da energia nuclear. Comente com os estudantes que, após a descoberta do plutônio, foi possível realizar uma comparação entre um núcleo atômico de massa instável e uma gota de água que se rompe, dando assim fundamentos à teoria da "gota de água".

Práticas de Ciências – Teste de chama (página 54)

- Dependendo dos reagentes de laboratório, pode-se complementar a atividade experimental, comparando-se, por exemplo, o teste de chama de diferentes sais de sódio e de cálcio. Nesta atividade, é trabalhada a competência geral **CGEB2**.
- Nesse momento, faça uma síntese dos principais conceitos sobre a emissão de radiação por mudança de níveis de energia feita por elétrons. Aponte também algumas possíveis fontes de erros, como a limpeza inadequada do fio de níquel-cromo, por exemplo. Além disso, o conhecimento adquirido com o experimento pode ser aplicado no entendimento da composição de fogos de artifícios.

FONTE COMPLEMENTAR

- Espalhamento de Rutherford. PhET Simulações Interativas. Universidade do Colorado Boulder. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/rutherford-scattering. Acesso em: 1º set. 2024.
  O simulador apresenta o bombardeamento de partículas alfa sobre um conjunto de átomos. Pode-se analisar o que ocorre no átomo e, separadamente, o que ocorre com seu núcleo apenas. Também é possível variar a quantidade de partículas no núcleo e a energia das partículas alfa.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Pesquisa documental

Outra sugestão de atividade é a realização de uma pesquisa documental mais aprofundada sobre a vida e o trabalho dos cientistas citados no decorrer do capítulo, que desempenharam importante papel na evolução dos estudos sobre estrutura atômica. Além das indicações de leituras sugeridas no Livro do Estudante, proponha pesquisas em *sites* de busca da internet, como o da Sociedade Brasileira de Química, que publica a revista *Química Nova na Escola,* disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/ (acesso em: 1º set. 2024), destinada a professores do Ensino Médio. Nessa publicação, há artigos que tratam da história da Química. Alguns deles podem ser utilizados pelos estudantes.

Nos livros indicados a seguir, podem ser encontradas informações pertinentes a essa pesquisa.

Brody, D. E.; Brody, A. R. *As sete maiores descobertas científicas da história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Curie, E. *Madame Curie*. Trad. Monteiro Lobato. 16. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957.

Rival, M. *Os grandes experimentos científicos*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Solicite aos estudantes que assistam ao vídeo *Teste de chama e a química dos fogos de artifício* (Direção: Bruno Vieira. São Paulo, Instituto de Química da USP, Grupo de Pesquisa em Educação Química (Gepeq), 2014, 5 m 48 s), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VK-mzVXPYRE (acesso em: 1º set. 2024).

  Em seguida, sugira aos estudantes que trabalhem em duplas, para discutir as questões propostas.

  1. Como o fenômeno observado na explosão de fogos de artifício pode ser explicado?

  R.: *O calor liberado na explosão é absorvido pelos átomos dos metais presentes na composição do cartucho. A energia provoca a excitação eletrônica. Quando os elétrons voltam ao estado fundamental, ocorre liberação de energia na forma de radiação visível.*

  2. Comparem os fenômenos apresentados no vídeo *Teste de chama e a química dos fogos de artifício*.

  R.: *Em ambos os casos, as cores observadas são características de átomos de elementos metálicos presentes. Nos fogos de artifício, os sais se encontram no interior de um cartucho e o calor liberado na explosão provoca a excitação eletrônica. No teste da chama, os sais são borrifados, em forma de solução, sobre a chama de um solvente, no caso o etanol, em combustão. O calor liberado na combustão do etanol provoca a excitação eletrônica.*

  3. Expliquem o significado do termo "excitação eletrônica" e como ele se relaciona aos fenômenos de emissão de luz observados no vídeo.

  R.: *Uma fonte de energia faz com que os elétrons da camada de valência passem para camadas mais externas, de maior energia. Quando isso ocorre, dizemos que o átomo se encontra eletronicamente excitado.*

  4. Elaborem uma síntese para justificar por que os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford não podem ser utilizados para explicar os fenômenos observados. Na síntese, procurem registrar as características dos modelos citados.

  R.: *Dalton – não previa a existência de partículas subatômicas; Thomson – incorporou a existência de elétrons ao átomo indivisível de Dalton, contudo estes se encontravam dispersos em uma massa gelatinosa; Rutherford – propôs a existência de elétrons ao redor do núcleo, no entanto não previu as órbitas com diferentes níveis de energia.*

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Ciência se discute – Bohr e a fissão nuclear (página 52)

1. Resposta variável. Por meio de pesquisa, os estudantes podem chegar às seguintes vantagens: a energia nuclear pode gerar grandes quantidades de energia utilizando pouco combustível, não gera emissão de gás, contribui para o setor da medicina, auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças, permite o avanço dos estudos em tecnologia nuclear, etc. Entre as desvantagens estão: alto investimento e alto custo, longa duração da radioatividade gerada pelo lixo nuclear, que leva muito tempo para desaparecer, e riscos associados a acidentes, como os causados por armas nucleares ("bombas") desenvolvidas em vários países, entre outros.

Atividades (página 55)

2. As partículas alfa têm carga elétrica positiva; sendo assim, são repelidas pelo núcleo, sofrendo um desvio ao passar próximas a ele. Elas também podem colidir com o núcleo e voltar. Assim, as associações são as seguintes:

a) II **b)** III **c)** I

3. O modelo de Bohr explica adequadamente apenas o espectro de linhas do átomo de hidrogênio. Também utiliza o conceito de órbita, sendo mais adequado considerar os níveis de energia dos elétrons. Por fim, esse modelo não considera as propriedades ondulatórias dos elétrons.

6. O fato de os elétrons permanecerem ao redor do núcleo e não colidirem com ele. A figura representa a trajetória do elétron. De acordo com a Física clássica, os elétrons submetidos à força de atração eletrostática exercida pelos prótons deveriam perder energia continuamente. Com essa perda de energia, os elétrons diminuiriam sua velocidade e, em razão disso, sua atracão pelo núcleo aumentaria até se chocarem contra ele.

7. **b)** O número de isótopos identificados são 8: $^{106}_{48}Cd$, $^{108}_{48}Cd$, $^{110}_{48}Cd$, $^{111}_{48}Cd$, $^{112}_{48}Cd$, $^{113}_{48}Cd$, $^{114}_{48}Cd$ e $^{116}_{48}Cd$.

9. Devido à absorção de energia, um elétron pode ser excitado e ocupar uma camada de maior energia e, em seguida, retornar à camada de menor energia (ao estado fundamental). Nesse retorno, ele libera energia na forma de radiação eletromagnética, que é correspondente à diferença de energia entre as camadas, e as linhas do espectro são obtidas nessa emissão de radiação descontínua, que segue o padrão de energia necessário para que o elétron mude de camada.

CAPÍTULO 4 LIGAÇÕES QUÍMICAS (PÁGINA 56)

Introdução ao estudo das ligações químicas (páginas 56 a 58)

- Neste capítulo, a habilidade **EM13CNT307** é desenvolvida no âmbito da análise das propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações.
- No tópico "Modelo do octeto e estabilidade dos gases nobres" (p. 57), são apresentados o conceito do modelo do octeto e de valência. Ressalte aos estudantes a importância desses assuntos para o entendimento da formação das ligações químicas.
- Discuta as propriedades das substâncias iônicas, moleculares e metálicas usando a Tabela Periódica da página 58 e reveja com os estudantes as famílias dos elementos químicos e suas características. Ressalte aos estudantes a importância de sempre consultarem a Tabela Periódica quando quiserem informações sobre os elementos químicos.
- Para auxiliar os estudantes a compreender o conceito de valência, pode-se propor uma atividade usando massa de modelar e palitos. Organizados em grupos, os estudantes vão construir átomos usando a massa de modelar e, com os palitos, o número de ligações que cada átomo pode fazer. Com os átomos prontos, os grupos deverão unir os átomos criando as ligações estáveis. As moléculas criadas devem ser anotadas no caderno. Ao final da atividade, cada grupo compartilhará as moléculas criadas. Na lousa, em conjunto com a turma, verifique se as ligações são possíveis.

- O objeto digital *A Tabela Periódica* traz mais informações sobre os grupos, nomes e símbolos de elementos.

Substâncias iônicas, moleculares e metálicas (página 59)

- Explore a tabela com dados sobre a condutibilidade elétrica de alguns materiais. Peça aos estudantes que identifiquem as similaridades entre os elementos representados. Espera-se que eles identifiquem três grupos em relação à capacidade de conduzir corrente elétrica em estado sólido e líquido.

Ligação iônica (páginas 60 e 61)

- Os compostos iônicos são formados por cátions e ânions, razão pela qual não é conveniente usar a palavra molécula para designá-los. A representação da fórmula indica a proporção entre os íons positivos e os negativos. Por exemplo, quando se escreve a fórmula Na_2S, não se está representando uma molécula de sulfeto de sódio, mas, sim, a proporção entre os menores números de cátions e ânions no retículo cristalino, isto é, 2 cátions Na^+ para 1 ânion S^{2-}.
- Caso ainda não tenha realizado um teste de condutibilidade elétrica, um bom momento de aplicá-lo é durante o estudo do tópico "Dissolução de substâncias iônicas em água" (p. 60), para que os estudantes mobilizem aspectos da habilidade **EM13CNT301**, ou seja, empregar instrumentos de medição, representar e interpretar modelos explicativos.
- Outra opção é trabalhar com o simulador Soluções de açúcar e sal, do projeto PhET, da Universidade de Colorado Boulder, disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions (acesso em: 2 set. 2024). Nesse simulador, é possível demonstrar a condutibilidade elétrica do sal e da sacarose em solução, a dissociação iônica do cloreto de sódio na água, e a interação molecular entre a água, os íons do cloreto de sódio e a molécula de sacarose. Ao utilizar a ferramenta de simulação, é interessante construir um roteiro de navegação e questões para discussão.
- A atividade proposta no boxe *Roteiro* (p. 61) pode ser utilizada para avaliação formativa.

Ligação covalente (página 62)

- No mesmo simulador usado anteriormente, os estudantes poderão construir moléculas e visualizar sua estrutura em 3D, observando as ligações formadas entres os átomos. Para isso, eles devem acessar o conteúdo disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/build-a-molecule (acesso em: 2 set. 2024).
- As representações de Lewis são um instrumento interessante para representar as estruturas covalentes porque permitem visualizar o número de pares de elétrons compartilhados e prever o número de compartilhamentos com mais facilidade.

Ligação metálica (páginas 63 a 64)

- O modelo de ligação metálica denominado nuvem ou mar de elétrons sugere que essas cargas elétricas são os elétrons da camada de valência que não ficam restritos ao respectivo átomo e circulam por todo o material. Esse modelo tem base em várias propriedades dos elementos metálicos, como os baixos valores de potencial de ionização dos elétrons das camadas de valência dos metais. Ao ser aplicada uma tensão na estrutura, eles tendem a se movimentar de forma ordenada, produzindo a corrente elétrica.
- Essa característica explica igualmente a maleabilidade e a ductibilidade dos metais. Tendo em vista que não há ligações mais fortes nessa estrutura – pois o núcleo de um átomo atrai as eletrosferas dos átomos vizinhos –, sob tensão mecânica as camadas de átomos deslizam, modificando a forma do metal. Não há ruptura das ligações, mas uma disposição diferente dos átomos, ou seja, uma nova acomodação na estrutura metálica.
- A atividade proposta no boxe *Roteiro* (p. 63) trabalha aspectos da habilidade **EM13CNT301**, ao permitir que os estudantes utilizem métodos próprios das ciências para resolver um problema.
- O texto indicado no boxe *Para explorar* (p. 64) refere-se aos tipos de aço inoxidável. Discuta com os estudantes algumas das aplicações dessas ligas metálicas.
- O texto do boxe *Ciência se discute* (p. 64) mostra a participação de Linus Pauling na corrida pela descoberta da estrutura da molécula de DNA. Antes de iniciar a leitura do texto, pergunte aos estudantes o que sabem a respeito da descoberta da estrutura do DNA, quem foram os cientistas que fizeram essa descoberta e se eles têm conhecimento de como foi feita essa descoberta. Caso desconheçam, indague-os como imaginam que tenha ocorrido uma descoberta científica dessa magnitude. As discussões a respeito da natureza da ciência permitem aos estudantes reconhecerem a ciência como um empreendimento humano, que é construído de forma coletiva.
- Caso os estudantes demonstrem interesse em conhecer mais a fundo a história da descoberta do DNA, peça a eles que pesquisem-na em artigos, livros e documentários que abordam o tema. Desse modo, desenvolve-se a competência geral **CGEB1**, no âmbito da valorização dos conhecimentos historicamente construídos.

Química e Sociologia – A importância dos catadores de materiais recicláveis na reciclagem do alumínio (página 65)

- Antes de iniciar a seção, pergunte aos estudantes se eles sabem o que acontece com os materiais de alumínio que são descartados no lixo, principalmente as latas de bebidas, bastante comuns no cotidiano. Sugere-se abrir a discussão sobre o tema antes da leitura da seção, avaliando a visão trazida pelos estudantes em relação ao papel dos catadores de materiais recicláveis, sua invisibilidade perante a sociedade, a estigmatização de trabalhadores do "lixo", suas condições precárias de trabalho e, principalmente sobre a questão desse tipo de atividade não ocorrer por uma escolha livre da pessoa na maioria dos casos e, sim, por necessidade e circunstância de vida. O(A) professor(a) de Sociologia e/ou de História pode contribuir para enriquecer o diálogo. Essa discussão aborda temas acerca do mundo do trabalho e processos produtivos.
- Aproveite também a oportunidade para conversar com os estudantes sobre temas como a economia circular, incentivando o olhar sobre a maneira como produzimos, consumimos e descartamos os produtos no dia a dia, visando o reaproveitamento e a colaboração em nossa sociedade.
- Sugere-se a discussão das questões propostas em uma roda de conversa. Se não for possível realizá-la com toda a turma, organize os estudantes em pequenos grupos e, depois, solicite a cada grupo que compartilhe as ideias e conclusões a que chegarem.

SUGESTÃO DE AULA

- Inicialmente, convide o(a) professor(a) de Sociologia para trabalhar em conjunto nesta aula. O tema a ser trabalhado é a rotina de trabalho dos catadores de materiais recicláveis.

- Em seguida, organize a turma em grupos. Peça aos estudantes que conversem sobre o que eles sabem a respeito das condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Cada grupo deve compartilhar o que conversaram com o restante da turma.
- Por fim, solicite aos estudantes que pesquisem o que é a uberização do trabalho e façam uma relação entre esse fenômeno e o trabalho dos catadores. Em seguida, peça que eles elaborem, novamente nos grupos, uma lista de direitos que deveriam ser garantidos aos catadores de materiais recicláveis.

A polaridade das ligações e das moléculas (página 67)

- Novamente, utilize o recurso de simuladores para tornar o conceito de polaridade menos abstrato. No simulador disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-polarity/latest/molecule-polarity_pt_BR.html (acesso em: 2 set. 2024), os estudantes poderão ajustar a eletronegatividade das moléculas e observar como isso afeta a distribuição das cargas. Nele, também é possível simular a polaridade de moléculas com dois átomos e com três átomos.

Geometria molecular e polaridade de moléculas (página 68)

- Apresente aos estudantes a visão espacial das geometrias mais comuns. Para isso, pode-se utilizar modelos de bola e bastão ou massa de modelar e palitos.
- A atividade proposta no boxe *Roteiro* pode ser resolvida coletivamente. Desenhe as moléculas na lousa e peça aos estudantes que digam se a molécula é polar ou apolar, justificando suas respostas. Dessa forma, é possível fazer um levantamento das dificuldades apresentadas pela turma.

Estado físico das substâncias e as forças intermoleculares (páginas 69 a 72)

- Os estados de agregação podem ser interpretados pelas interações que ocorrem entre as partículas, que apresentam maior ou menor energia. Nesse momento, sugerimos que seja abordada a noção de forças entre as partículas, denominadas forças intermoleculares, forças de Van der Waals ou interações de Van der Waals.
- Ao caracterizá-las, assim como sua intensidade, os estudantes compreenderão, por exemplo, o fato de um material volatilizar mais rápido do que outro por apresentar forças intermoleculares mais fracas do que o outro, o que também resulta em uma temperatura de ebulição menor.
- As interações também ocorrem entre estruturas moleculares e íons, como no caso da dissolução de substâncias iônicas pela água. No boxe *Ampliação* (p. 70), o texto "As interações íon-dipolo" exemplifica esse fenômeno e mostra um modelo de distribuição das partículas na solução.
- Para motivar os estudantes, considere a possibilidade de convidá-los a levantar hipóteses que expliquem o estado líquido de um óleo ou da gasolina, bem como o estado sólido do iodo, já que, a princípio, eles devem intuir que inexistem interações entre as moléculas apolares. Ao refletirem a respeito, terão de buscar um novo modelo, diferente das fortes interações dos dipolos permanentes.
- Essas interações, chamadas forças de London, justificam-se pela probabilidade de os elétrons se movimentarem pela estrutura formando dipolos instantâneos. A interação também pode se dar mediante a formação de dipolos induzidos, verificados quando as nuvens eletrônicas das moléculas apolares sofrem interação com moléculas polares. Porém, o fator principal para que essa interação se concretize é o tamanho das moléculas que interagem. Por exemplo, moléculas O_2 sofrem a influência da polaridade da água, o que permite que se dissolvam nesse meio. Esse fenômeno é explicado no texto "O oxigênio dissolvido em ambientes aquáticos", do boxe *Ampliação* (p. 72).
- A atividade proposta no boxe *Roteiro* (p. 72) pode ser resolvida. Desenhe a fórmula estrutural do ácido acético na lousa e peça aos estudantes que respondam que tipo de interação intermolecular ocorre.

Práticas de Ciências – Moldando sólidos com um martelo (página 73)

- Esta atividade experimental tem por objetivo discutir a relação entre as propriedades das substâncias e as ligações químicas de seus constituintes, mediante a observação macroscópica após uma martelada vigorosa em uma vela, um cristal de sal grosso e uma lâmina metálica de cobre.
- Além do experimento, por si só, como elemento motivacional para a investigação, procure instigar os estudantes com a pergunta problematizadora: O que acontece se utilizarmos um martelo para moldar diferentes sólidos?
- Essa questão tem como objetivo exercitar a observação minuciosa de um evento, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses; desenvolvendo-se, assim, a competência geral **CGEB2**.
- Espera-se que os estudantes relacionem as características observadas nos materiais às características relacionadas às ligações químicas.

Material	Elementos químicos	Tipo de ligação química
sal grosso	sódio e cloro	ligação iônica
lâmina de cobre	cobre	ligação metálica
vela	carbono e hidrogênio	ligação covalente

- Os estudantes devem apreciar o trabalho dos colegas, demonstrando respeito às ideias de cada um. Estimule-os a serem críticos, mas sem expor os colegas a constrangimentos, por exemplo, sugerindo que procurem boas ideias entre as demais duplas, em vez de criticá-los negativamente.
- Se possível, deixe à disposição dos estudantes materiais de referência, como livros de Química e livros didáticos, além de indicar-lhes *sites* nos quais possam buscar informações.

FONTES COMPLEMENTARES

- Linus Pauling. *Superinteressante*, São Paulo, 31 out. 2016. Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/linus-pauling/. Acesso em: 2 set. 2024.

  Essa matéria aborda a vida e o trabalho de Linus Pauling e seu interesse por moléculas biológicas.
- Linus Pauling and the race for DNA. Special Collections & Archives Research Center. The Valley Library. Oregon State University. Disponível em: http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/dna/index.html. Acesso em: 2 set. 2024.

O *site*, em inglês, fornece uma série de informações e documentos sobre a participação de Linus Pauling na corrida pela descoberta da estrutura do DNA.

- MUKHERJEE, S. *O gene*: uma história íntima. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

  Nesse livro, o autor narra o desenvolvimento da genética, incluindo a disputa pela descoberta da estrutura do DNA.

TEXTO COMPLEMENTAR

O fragmento de texto reproduzido a seguir foi extraído do artigo "Ligações químicas: ligação iônica, covalente e metálica" e exemplifica como as propriedades periódicas ajudam a entender o comportamento dos átomos em vários sistemas.

O potencial de ionização e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem nos auxiliar a compreender a natureza da ligação química. [...]

[...] aquele elemento [de] que se tem maior dificuldade em retirar elétrons, ou que apresenta menor afinidade eletrônica, é o átomo de neônio. Em outras palavras, dentre todos os átomos da segunda linha da tabela periódica, o neônio é o que apresenta menor tendência a receber ou doar elétrons. Ele precisa de 2080 J. mol^{-1} para que um elétron seja retirado e, para receber um elétron, precisaria ainda de 29 J. mol^{-1} (valor negativo na Tabela).

Vemos que outros elementos tendem a doar seus elétrons mais facilmente e outros a receber elétrons liberando energia. O processo de receber ou doar elétrons leva à formação de ânions ou cátions, respectivamente. Espera-se, assim, que os dois íons formados interajam devido às forças de atração de cargas formando uma ligação química.

A natureza da ligação química dependerá de como acontece o rearranjo dos elétrons na molécula formada. [...]

[...] Toda interação entre dois átomos, agregados de átomos ou moléculas que leva a um estado de equilíbrio, e consequentemente estável em relação ao tempo relativamente longo, também deve ser considerada como uma ligação química. Em outras palavras, ligação química leva sempre a um abaixamento da energia do sistema, estabilizando-o. Esta interação pode ser mais fraca ou mais forte dependendo das forças envolvidas. [...]

DUARTE, H. A. Ligações químicas: ligação iônica, covalente e metálica. *Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 4, p. 14-23, maio 2001.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- A avaliação deve ser realizada de forma contínua ao longo de todo o capítulo. Preste atenção à participação dos estudantes durante as aulas.
- As atividades propostas nos boxes *Roteiro* ao longo do capítulo e as atividades propostas no final do capítulo podem ser utilizadas como avaliações formativas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 56)

3. É possível prever o tipo de ligação química entre dois átomos com base no número de elétrons que eles apresentam na camada de valência, na eletronegatividade desses átomos e na família à qual pertencem.

4. O tipo de ligação química determina a estrutura da molécula e a quantidade de energia necessária para romper essa estrutura, estabelecendo assim o estado físico das substâncias na temperatura ambiente (25 °C), a temperatura de ebulição e a temperatura de congelamento.

Química e Sociologia – A importância dos catadores de materiais recicláveis na reciclagem do alumínio (página 65)

1. A coleta seletiva do alumínio reduz a quantidade de resíduos destinados a aterros e lixões e, com a reciclagem do alumínio, reduz a necessidade de extração de bauxita, minimizando o impacto da mineração sobre os ecossistemas locais, a emissão de gases poluentes e o consumo de energia elétrica para a produção do alumínio.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes levantem questões como as condições precárias de trabalho; a informalidade da atividade na busca por uma fonte de renda; a falta de equipamentos de proteção individual, que coloca em risco a saúde dos coletores; a baixa remuneração do serviço, que obriga a longas horas de busca e separação de materiais; a exaustão gerada pela carga do material, muitas vezes embaixo de sol quente ou chuva; o estigma associado ao trabalho com algo que é considerado "lixo" por muitos, etc. As cooperativas surgem como uma alternativa para melhorar essas condições, proporcionando treinamento, acesso a benefícios e organização coletiva, o que aumenta a renda e promove melhores condições de vida e a saúde aos catadores.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que é de interesse público e social o incentivo e a valorização do trabalho dos catadores visando a otimização dos recursos do planeta e a sustentabilidade. Entre os exemplos de políticas públicas, pode-se citar: o apoio e fortalecimento das cooperativas e associações de catadores, oferecendo capacitação, assistência jurídica e financeira, facilitando o acesso a linhas de crédito para investimentos em infraestrutura e equipamentos de segurança; incentivo fiscal para empresas que utilizem materiais reciclados em seus processos produtivos, estimulando a demanda por materiais recicláveis, aumentando assim a renda dos catadores; etc.

Roteiro (página 68)

3. Como justificativa, os estudantes podem desenhar no caderno a estrutura de cada molécula e indicar os momentos de dipolo da molécula.

a) $HC\ell$ — polar. Como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, existirá um momento dipolar resultante apontando para o cloro.

b) CO_2 — apolar. Existe um momento dipolar apontando para o oxigênio para cada ligação C = O, que estão em sentidos opostos e se anulam.

c) CH_2O — polar. Como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, existirá um momento dipolar apontando para o carbono em cada ligação C — H que, somados, apresentará um momento dipolar resultante em sentido oposto e de módulo (valor) diferente do momento dipolar da ligação dupla entre carbono e oxigênio.

d) NH_3 — polar. Como o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, existirá um momento dipolar apontando para o nitrogênio em cada uma das ligações N — H; somados, eles apresentarão um momento dipolar resultante não nulo.

e) H_2O — polar. Existe um momento dipolar apontando para o oxigênio em cada ligação H — O; somados, eles apresentarão um momento dipolar resultante não nulo.

Práticas de Ciências – Moldando sólidos com um martelo (página 73)

1. Resposta variável. De forma geral, os estudantes são capazes de prever que o sal grosso pode quebrar com a martelada, que o cobre pode ser moldado, mas podem ficar em dúvida sobre o que ocorre com a vela, ou seja, se ela se esfarela, quebra ou amassa. De qualquer forma, é importante que eles consigam perceber as diferenças de comportamento dos três materiais.

Atividades (páginas 74 e 75)

6. a) $HNO_3(aq) \xrightarrow{água} H^+(aq) + NO_3^-(aq)$

   $C_2H_6O(\ell) \xrightarrow{água} C_2H_6O(aq)$

   É importante que os estudantes representem corretamente a equação do processo de dissolução. Caso tenham dificuldade, resolva coletivamente na lousa, solicitando-lhes que indiquem os elementos que formam a equação. Discuta os motivos pelos quais nem todos os compostos moleculares são capazes de gerar íons em solução.

   b) A solução **A** é a de etanol, e a solução **B** é a de ácido nítrico. Os íons formados explicam a condução de corrente elétrica. Os estudantes têm de relacionar a formação de íons no processo de dissolução e a capacidade de conduzir eletricidade da solução.

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 76 A 79)

Pensando Ciências – Como saber se é ouro mesmo? (páginas 76 e 77)

- Se for necessário orientar os estudantes para que respondam à pergunta "Como descobrir se a estátua tem ouro 18 quilates em sua composição?", indique-lhes o *site* Fiocruz Invivo, disponível em: https://www.invivo.fiocruz.br/historia/arquimedes-e-a-coroa/ (acesso em: 9 set. 2024), no qual há informações sobre a história "Arquimedes e a coroa", que podem ser bastante úteis no desenvolvimento desta atividade. O texto explica resumidamente como Arquimedes teria feito para descobrir se a coroa do rei Hierão era feita de ouro puro. Em sua investigação, que envolveu conhecimentos a respeito da densidade, do volume e da massa do ouro e da prata, ele deduziu que a coroa era feita de uma mistura de ouro e prata.
- Durante a etapa "Reconhecendo padrões", aproveite para relacionar os conteúdos abordados na unidade, com destaque para a massa, o volume e a densidade. Aproveite também para frisar as unidades de medidas usadas para expressar essas grandezas físicas e retome como é feita a conversão de algumas delas – por exemplo, de quilograma (kg) para grama (g) e de litro (L) para mililitro ou centímetro cúbico (cm^3).
- A etapa "Abstraindo o problema" trabalha a competência geral **CGEB2**. Ao elaborar uma solução para o problema, os estudantes aperfeiçoam as habilidades **EM13CNT301** e **EM13CNT307**. Durante a elaboração do algoritmo para determinar se a estátua do ourives é de ouro 18 quilates, é trabalhada a competência específica **CECNTEM3**.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões globais (páginas 78 e 79)

1. O sal de cozinha dissolvido em água forma íons de sódio. Os elétrons são excitados pela energia térmica e, então, vão para uma órbita mais energética (camada mais externa). O retorno desses elétrons ao estado fundamental (de menor energia), neste elemento, emite energia luminosa com comprimento de onda correspondente à cor amarela.
3. Os elementos $^{24}_{12}Mg$ e $^{25}_{12}Mg$ têm o mesmo número atômico, informando que são o mesmo elemento, mas, como seus números de massa são diferentes, eles são isótopos.
6. Os sais de amônio são espécies de caráter iônico, que se separam no cátion NH_4^+ e no ânion X^-. Esses íons interagem com a água, por ser polar, com interações do tipo íon-dipolo.
7. As substâncias iônicas conduzem energia quando fundidas ou em solução.
8. A corrente elétrica é formada por conta dos elétrons livres.
9. Ao manter a água coletada em um tanque de decantação, em repouso, a maior parte dos sólidos suspensos se acumula no fundo do tanque.
10. É possível separar os isótopos por meio da centrifugação porque eles apresentam densidades diferentes.
11. Como o esgoto fica em repouso por um período no tanque séptico, acontece a decantação da parte sólida.

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**Enem**) Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida.

   A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a

   a) mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.
   b) combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.
   c) diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.
   d) transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.
   e) promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos.

Alternativa **d**. Quando um átomo absorve energia de uma fonte como o bico de Bunsen, ocorre a transição de elétrons de níveis menos energéticos, mais internos, para níveis mais energéticos, mais externos, de acordo com o modelo de Bohr. Para retornar ao nível fundamental, os elétrons devem liberar a energia absorvida. A liberação pode ocorrer na forma de energia luminosa, cujo comprimento de onda é correspondente à diferença de energia entre os níveis da transição eletrônica, que, nesse caso, ocorre de um nível mais energético, mais externo, para o estado fundamental, que é um nível menos energético e, portanto, mais interno.

2. (**Enem**) Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado *Um novo sistema de filosofia química* (do original *A New System of Chemical Philosophy*), no qual continha os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir:

   1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
   2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades.

3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas.

4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.

5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos.

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico.

Oxtoby, D. W.; Gillis, H. P.; Butler, L. J. *Principles of modern chemistry*. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado **correto**?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

Alternativa **e**. O postulado 1 não é considerado correto, pois já se sabe da existência de subpartículas. O postulado 2 também não é correto, porque átomos de um mesmo elemento podem apresentar massas diferentes, com número de nêutrons diferentes no núcleo. Por causa disso, a massa de átomos de elementos diferentes pode coincidir e, portanto, o postulado 3 não é mais considerado correto. O postulado 4 não é mais aceito, já que transformações como o decaimento radioativo e a fissão nuclear podem alterar sua identidade e destruir o átomo original. O postulado 5 ainda é válido.

3. (**Fuvest-SP**) Uma amostra sólida, sem cavidades ou poros, poderia ser constituída por um dos seguintes materiais metálicos: alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. Para identificá-la, utilizou-se uma balança, um recipiente de volume constante e água. Efetuaram-se as seguintes operações:

1) pesou-se a amostra;

2) pesou-se o recipiente completamente cheio de água;

3) colocou-se a amostra no recipiente vazio, completando seu volume com água e determinou-se a massa desse conjunto.

Os resultados obtidos foram os seguintes:



Fuvest, 2019. Fac-símile/ID/BR

Dadas as densidades da água e dos metais, pode-se concluir que a amostra desconhecida é constituída de

Note e adote:

Densidades (g/cm³): água = 1,0; alumínio = 2,7; bronze = = 8,8; chumbo = 11,3; ferro = 7,9; titânio = 4,5.

a) alumínio.

b) bronze.

c) chumbo.

d) ferro.

e) titânio.

Alternativa **b**. Para calcular a densidade do material, é necessário saber sua massa e seu volume. A massa foi fornecida na imagem e é igual a 44 g. O volume pode ser calculado da seguinte maneira:

Subtrai-se a massa da amostra da massa do recipiente com água e amostra

389,0 − 44,0 = 345 g

Compara-se com a massa do recipiente cheio de água e verifica-se que o espaço ocupado pela amostra corresponde a 5 g de água;

350,0 g − 345,0 g = 5,0 g

Dado que a densidade da água é igual a 1 g/cm³, calcula-se que o volume ocupado pela amostra no recipiente com água é igual a 5 cm³.

Se a massa da amostra é igual a 44 g e seu volume é 5 cm³, sua densidade pode ser calculada por

$d = m/V$

$d = 44\ g/5\ cm^3$

$d = 8{,}8\ g/cm^3$

Portanto, a amostra é constituída de bronze.

4. (**Enem**) Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

a) 6

b) 8

c) 10

d) 12

e) 14

Alternativa **c**. O difluoreto de xenônio é uma molécula composta de dois átomos de flúor, os quais têm 7 elétrons na camada de valência ($2s^2 2p^5$), e um átomo de xenônio, que tem 8 elétrons na camada de valência ($5s^2 5p^6$). Ocorre a formação de duas ligações covalentes, conforme a figura abaixo, de modo que o átomo de xenônio fica com 10 elétrons na camada de valência.

ID/BR

2 O MACRO E O MICRO

INTRODUÇÃO

Esta segunda unidade é constituída de três capítulos. No capítulo 1, são trabalhados os conceitos de massa atômica e massa molecular. No capítulo 2, explora-se quantidade de matéria. O capítulo 3 trata das reações químicas e do cálculo de quantidades de reagentes e produtos em processos químicos. Ao longo da unidade, os estudantes são incentivados no fazer científico, como nas práticas de determinação de um padrão de massa e na criação de uma analogia para explicar o que é mol.

Os objetivos da unidade se articulam a esses e outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas competências gerais como **CGEB1** (valorizar o conhecimento historicamente construído), **CGEB2** (recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas), **CGEB4** (utilizar a linguagem matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências e ideias), **CGEB5** (utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação para acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo) e **CGEB7** (usar a argumentação com base em dados, fatos e informações confiáveis), competências específicas como **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida) e **CECNTEM3** (avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico), e habilidades como a **EM13CNT205** e a **EM13CNT301**.

Sugestão de planejamento

Sugere-se que esta unidade e principalmente a temática Cálculo estequiométrico seja realizada em parceria com o(a) professor(a) de Matemática. A seção *Química e Matemática* (p. 123) oferece a oportunidade de um trabalho interdisciplinar com a Matemática, ao trabalhar os conceitos de razão e proporção. A seção *Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente* (p. 124 e 125) é uma boa oportunidade de trabalho interdisciplinar com o(a) professor(a) de Geografia, pois trata da medição da quantidade de CO_2 na atmosfera durante o século XX e sua relação com o aquecimento global.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Compreender a relação entre átomos e massa. • Compreender o raciocínio matemático necessário para a determinação da massa dos átomos.	CGEB2 CGEB4 CGEB7	EM13CNT301	
2	• Compreender o conceito de mol e relacionar essa unidade ao número de moléculas e de átomos. • Relacionar o mol à constante de Avogadro. • Relacionar mol, massa molar e quantidade de átomos e moléculas. • Produzir material digital explicativo sobre o conceito de mol.	CGEB1 CGEB2 CGEB4 CGEB5 CGEB7		
3	• Entender o que são reações químicas e equações químicas. • Realizar cálculos estequiométricos. • Conhecer um exemplo de como a coleta de dados históricos do meio ambiente pode alertar a sociedade a respeito de problemas ambientais.	CGEB1 CGEB2 CGEB5 CGEB7 CECNTEM1 CECNTEM2 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT205 EM13CNT301 EM13CNT306	Educação ambiental
Fechamento da unidade	• Pesquisar em fontes diversas e aplicar o conhecimento sobre ligações químicas para responder a um problema relativo ao consumo de vitamina C.	CGEB2 CECNTEM3	EM13CNT301 EM13CNT303	

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 80 E 81)

- A imagem de abertura da unidade explora a comprovação da existência do bóson de Higgs, postulado em 1964, para demonstrar a constante evolução e desenvolvimento da ciência. Aborde a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, aproveitando esse momento para trabalhar as atividades de reflexão propostas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 80)

3. Nos processos químicos, essas estimativas são necessárias para prever quantidades de reagentes usados como matérias-primas. Na detecção de contaminantes, pode-se estimar a quantidade de poluentes na água por meio de reações químicas desses contaminantes com outros compostos de massa conhecida. Em todos esses casos, os cálculos proporcionais que serão estudados nesta unidade permitem obter quantidades de compostos participantes de reações químicas.

CAPÍTULO 1 RELAÇÕES ENTRE MASSAS DE ÁTOMOS E MOLÉCULAS (PÁGINA 82)

O Modelo-Padrão e a massa dos átomos (página 82)

- As questões propostas na abertura do capítulo devem ser utilizadas para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o Modelo-Padrão e a massa dos átomos.

Massa atômica (páginas 83 e 84)

- Ao desenvolver este tópico, ressalte que a obtenção das escalas relativas de massas atômicas leva em consideração o conhecimento sobre a estrutura das moléculas que formam as substâncias. No exemplo do texto, somente se podem relacionar as massas envolvidas na síntese da água porque são conhecidas as estruturas e as fórmulas das substâncias que dela participam.

Isótopos e massa atômica (página 85)

- Sugere-se que a atividade resolvida seja utilizada para explicar como é feito o cálculo da média ponderada para as massas atômicas dos elementos. Dessa forma, contribui-se para o desenvolvimento da competência geral **CGEB4**, no âmbito do uso da linguagem matemática e científica para expressar e partilhar informações.

Massas moleculares (páginas 86 a 88)

- O texto "O que é o Inmetro e qual é sua importância", do boxe *Ação e cidadania* (p. 88), pode ser usado para mostrar a importância de se padronizarem pesos e medidas. Antes de iniciar a leitura do texto, pergunte aos estudantes quem já ouviu falar desse órgão e para que ele serve. A partir das respostas dadas, aguce a curiosidade deles para a realização da leitura do texto. Discussões de ideias, como a proposta nesse boxe, promovem a competência geral **CGEB7** (argumentação com base em dados, fatos e informações confiáveis).

Práticas de Ciências – Determinação de um padrão de massa (página 89)

- A atividade desenvolve os aspectos de realizar previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar modelos explicativos da habilidade **EM13CNT301**. Também é desenvolvida a competência geral **CGEB2** (exercício da curiosidade intelectual e utilização de abordagem própria das ciências para resolver problemas).

FONTE COMPLEMENTAR

- *The basics of the Higgs boson* (O básico sobre o bóson de Higgs). Direção: Jeanette Nørgaard. Criação: Dave Barney e Steve Goldfarb. Estados Unidos, 2013 (6 min 29 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IElHgJG5Fe4. Acesso em: 25 set. 2024.

  A animação em inglês, com legendas em português, explica o que é o Modelo-Padrão, o campo de Higgs e o bóson de Higgs.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Proponha uma representação dos átomos e das moléculas com massa de modelar, propiciando aos estudantes uma visualização da relação entre massas e moléculas. Os conjuntos contendo a mesma quantidade de unidades devem ter sua massa medida na balança, para que se obtenha uma escala de massas de átomos e de moléculas.

Representando átomos e moléculas

Material

- massa de modelar de várias cores
- balança comum

Como fazer

Parte A

1. Com a massa de modelar, faça uma representação dos átomos H, O, N, C, de modo que cada um deles apresente tamanho e cor diferentes.
2. Com base nessa representação, monte conjuntos de quinze elementos para cada um.
3. Em seguida, determine a massa de cada conjunto e anote suas observações.
4. É importante que as massas de átomos de um mesmo elemento apresentem a mesma massa, dentro da precisão da balança.

Parte B

1. Com base nos átomos da parte **A**, monte conjuntos de cinco componentes para as seguintes representações de moléculas: H_2O, NO, CO_2, NH_3.
2. Determine a massa de cada conjunto e anote suas observações.

Para discutir

1. Com base nos conjuntos formados, proponha uma escala de massas relativas.
2. Compare as massas obtidas com as massas conhecidas dos átomos e das moléculas e discuta sobre as diferenças encontradas.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Durante o desenvolvimento da atividade prática, avalie o envolvimento e a participação dos estudantes. Durante a discussão, observe como eles expõem suas opiniões, como fundamentam suas argumentações, se escutam com atenção e respeitam a opinião dos colegas. É importante avaliar também o desenvolvimento atitudinal de cada um.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Roteiro (páginas 85 e 87)

1. **b)** (0,5725 · 121 u) + (0,4275 · 123 u) = 121,855 u
2. A proporção 2 : 1 → 1 : 3 deve ser mantida, caso contrário haverá excesso de reagentes.

2A + B → C + 3D				Excesso
2 L	1 L	1 L	3 L	—
5L	2 L	2 L	6 L	1 L de A
10 L	5 L	5 L	15 L	—
56 L	30 L	28 L	84 L	2 L de B

Ação e cidadania – O que é o Inmetro e qual é sua importância (página 88)

1. O Inmetro é o órgão responsável por determinar normas técnicas para produtos industrializados e fiscalizar se os fabricantes desses produtos respeitam essas normas. Um órgão

de fiscalização de pesos e medidas garante que todos os produtos estejam de acordo com determinadas exigências técnicas e tenham o mesmo padrão de qualidade.

2. Espera-se que os estudantes compreendam que, na ausência de regulação de pesos e medidas, seria impossível garantir o cumprimento das exigências mínimas de qualidade de um produto, como a quantidade de biscoitos em um pacote, ou a certeza de que em um pacote de 1 kg de feijão tenha exatamente 1 kg do produto, entre outras.

Práticas de Ciências – Determinação de um padrão de massa (página 89)

As respostas para as questões **1**, **2**, **3** e **5** são variáveis e dependem da realização da atividade.

4. Cálculo do número de grãos de feijão:

1 grão ——— 0,3 g
x ——— 1 000 g
x = 3 333 grãos

Atividades (página 90)

2. Considere que as abundâncias relativas do ^{203}Tl e do ^{205}Tl são, respectivamente, x e y. Portanto:

$$203 \cdot \frac{x}{100} + 205 \cdot \frac{y}{100} = 204{,}4 \text{ u}$$

$x + y = 100$ (pois são os únicos isótopos naturais do tálio)
Resolvendo o sistema, obtém-se $x = 30\%$ e $y = 70\%$.

3. **a)** Se 25% da massa do gás metano é composta de hidrogênio, então 75% da massa restante é de carbono. Dessa forma, a razão entre a massa de carbono e a de hidrogênio é de 3 : 1 no gás metano.

b) Se a proporção entre a massa de carbono e hidrogênio no gás metano é de 3 : 1 e se a massa de carbono é 36 g, então a massa de hidrogênio deve ser 12 g.

c) No gás metano, são necessários 4 átomos de hidrogênio para 1 átomo de carbono para que a proporção em massa seja de 3 : 1; assim, se considerarmos apenas 1 átomo de hidrogênio, a proporção será 4 vezes maior, ou seja, 12 : 1.

6. **b)** Frasco 2.

Frasco 1: 1 V = 2n átomos ⇒ 5 V = 10n átomos
Frasco 2: 1 V = 5n átomos ⇒ 10 V = 50n átomos
Frasco 3: 1 V = 3n átomos ⇒ 10 V = 30n átomos
Frasco 4: 1 V = 2n átomos ⇒ 20 V = 40n átomos

c) Frasco 3.

O número de moléculas em cada um dos frascos é n (frasco 1), 2n (frascos 2 e 3) e 4n (frasco 4).
Massas moleculares: O_2: 32 u, CH_4: 16 u, CO_2: 44 u, H_2: 2u
Massa (m) de gás em cada frasco:
Frasco 1: $m = 32n$
Frasco 2: $m = 16 \cdot 2n = 32n$
Frasco 3: $m = 44 \cdot 2n = 88n$
Frasco 4: $m = 2 \cdot 4n = 8n$

CAPÍTULO 2 QUANTIDADE DE MATÉRIA (PÁGINA 91)

Quantidades de substâncias (páginas 91 e 92)

- Se existem quantidades iguais com massas diferentes, supõe-se que os aglomerados atômicos sejam diferentes entre si. Para compreender essa observação, considere a possibilidade de trabalhar com modelos, como a montagem de moléculas de materiais diversos. Cada estrutura deve ter sua massa determinada. Esse procedimento permitirá observar que quantidades iguais apresentam massas diferentes por serem formadas por números diferentes de átomos e por diferentes elementos.

A unidade mol (páginas 93 e 94)

- A compreensão de como foi estabelecida a unidade mol permite desenvolver aspectos das competências gerais **CGEB1** (valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos) e **CGEB4** (utilizar a linguagem matemática e científica para partilhar informações).
- Uma forma de os estudantes perceberem o quanto esse número é grande é mediante a comparação do mol com quantidades grandes de elementos que podem ser contados, por exemplo, o número de habitantes do planeta comparado com a unidade mol. Assim, eles poderão notar que o estabelecimento dessa unidade é específico para partículas, já que sua ordem de grandeza é incompatível com as quantidades que podemos contar. Para contar os objetos ou os seres em nosso dia a dia, foram criadas a dúzia (12 unidades), o cento (100 unidades), a resma (500 unidades), entre outras.
- O objeto digital *Mol, a "dúzia" química* (p. 93) traz outras comparações de unidades comuns no dia a dia com o mol, colaborando para o aprendizado desse conceito pelos estudantes.
- A competência geral **CGEB2** é trabalhada no âmbito do exercício da curiosidade intelectual, da reflexão e da análise crítica para resolução de problemas.

Práticas de Ciências – O mol e a massa molar (página 96)

- Ao se solicitar aos estudantes a criação de um recurso digital explicando o conceito de mol, o objetivo é desenvolver a capacidade deles de transpor um conceito acadêmico para o universo das redes sociais, agindo como divulgadores de ciência. Desse modo, desenvolvem-se as competências gerais **CGEB4** (utilizar as linguagens visual, sonora e digital, junto com a linguagem científica, para partilhar informações) e **CGEB5** (compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva para se comunicar, acessar e disseminar informações).
- O material produzido pelos estudantes deve ser simples, não necessitando mais do que uma semana de elaboração. O mais importante é avaliar a correção conceitual e a capacidade deles de transpor um conceito acadêmico para o público em geral.

A massa molar e a constante de Avogadro (página 97)

- O texto "Relação entre massa e quantidade de matéria", do boxe *Ampliação* (p. 97), mostra como estabelecer relações de proporcionalidade com o número de átomos presentes na amostra. A atividade resolvida da página 98 também pode ser explorada para reforçar a compreensão desses conceitos.

Ciência tem história – Determinação da constante de Avogadro (página 99)

- A seção aborda a construção da constante de Avogadro. É interessante que os estudantes percebam que esse foi um processo que envolveu diferentes cientistas, e que Avogadro recebeu uma homenagem por seu trabalho pioneiro, reforçando a noção da ciência como uma construção coletiva, que envolve diversos atores.

- A seção promove as competências gerais **CGEB1** (valorizar os conhecimentos historicamente construídos) e **CGEB7** (argumentar com base em fatos e dados confiáveis).

FONTE COMPLEMENTAR

- MÓL, G. de S. *et al.* Constante de Avogadro: é simples determiná-la em sala de aula. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 3, p. 32-33, maio 1996. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc03/exper.pdf. Acesso em: 22 out. 2024.

  O artigo apresenta um experimento simples, que pode ser feito em sala de aula, para determinar a constante de Avogadro. Essa sugestão de leitura aborda também processos e práticas de investigação que podem ser exploradas a partir da história da Química.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Sugere-se que a avaliação seja realizada de forma contínua ao longo de todo o capítulo. No decorrer das aulas, caso julgue oportuno, proponha atividades semelhantes às atividades resolvidas e as apresentadas nos boxes *Roteiro*.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Roteiro (página 93)

1. a) Como a massa atômica do enxofre é 32 u, a massa de 1 mol de átomos de enxofre é 32 g.

b) Cálculo da massa molar do SO_2: $32 + 2 \cdot 16 = 64$ g/mol.

Se cada mol de SO_2 possui 64 g, em 0,5 mol existem 32 g.

Ciência se discute – Comunidade científica põe fim ao padrão físico do quilograma (página 94)

3. Espera-se que os estudantes cheguem à conclusão de que, a partir da constante de Avogadro, é possível determinar quantos átomos de determinado elemento estão presentes em 1 kg desse elemento e, assim, determinar o quilo com base nesse número de átomos.

Roteiro (página 98)

2. $\frac{1 \text{ mol de átomos de C}}{x} = \frac{12 \text{ g}}{78 \text{ g}} \rightarrow x = 6{,}5 \text{ mol de C}$

$\frac{1 \text{ mol de H}}{y} = \frac{6 \cdot 10^{23}}{5{,}4 \cdot 10^{24}} \rightarrow y = 9 \text{ mol de H}$

$\frac{0{,}5 \text{ mol do composto}}{6{,}5 \text{ mol de C}} = \frac{1 \text{ mol do composto}}{z} \rightarrow$

$\rightarrow z = 13 \text{ mol de C}$

$\frac{0{,}5 \text{ mol do composto}}{9 \text{ mol de H}} = \frac{1 \text{ mol do composto}}{w} \rightarrow$

$\rightarrow w = 18 \text{ mol de H}$

$\frac{0{,}5 \text{ mol do composto}}{1 \text{ mol de O}} = \frac{1 \text{ mol do composto}}{t} \rightarrow$

$\rightarrow t = 2 \text{ mol de O}$

Assim, a fórmula molecular do composto é $C_{13}H_{18}O_2$ e a massa molar é 206 g/mol.

Ciência tem história – Determinação da constante de Avogadro (página 99)

3. Ao calcular a quantidade de partículas em volumes iguais de gases diferentes à mesma pressão e temperatura, e constatar que a quantidade de partículas é a mesma, foi possível corroborar experimentalmente a hipótese proposta por Avogadro.

Atividades (páginas 100 e 101)

2. a) Massa molar do O_2 = 32 g/mol

Assim:

$\frac{1 \text{ mol de } O_2}{x \text{ mol de } O_2} = \frac{32 \text{ g}}{96 \text{ g}} \rightarrow x \text{ mol de } O_2 = 3 \text{ mol de } O_2$

b) Massa molar do O_3 = 48 g/mol

Assim:

$\frac{1 \text{ mol de } O_3}{3 \text{ mol de } O_3} = \frac{48 \text{ g}}{y} \rightarrow y = 144 \text{ g de } O_3$

Como os dois frascos estão à mesma pressão e temperatura, se no frasco **A** há 3 mol de O_2, no frasco **B** haverá 3 mol de O_3; portanto, deve-se calcular a massa referente a essa quantidade de matéria.

c) Frasco **A**: 3 mol de O_2 = 6 mol de O = $6 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23}$ = $= 3{,}6 \cdot 10^{24}$ átomos de O.

Frasco **B**: 3 mol de O_3 = 9 mol de O = $9 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23}$ = $= 5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de O.

d) Considerando que todo o gás ozônio contido no frasco **B** se transforme em gás oxigênio, temos a seguinte reação:

$3\ O_3 \rightarrow 4{,}5\ O_2$

Assim, temos:

$\frac{1 \text{ mol de } O_2}{4{,}5 \text{ mol de } O_2} = \frac{32 \text{ g}}{z} \rightarrow z = 144 \text{ g de } O_2$

$\frac{1 \text{ mol de O}}{9 \text{ mol de O}} = \frac{6{,}0 \cdot 10^{23} \text{ átomos de O}}{w} \rightarrow$

$\rightarrow w = 5{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos de O

$\frac{1 \text{ mol de } O_2}{4{,}5 \text{ mol de } O_2} = \frac{6{,}0 \cdot 10^{23} \text{ moléculas de } O_2}{m} \rightarrow$

$\rightarrow m = 2{,}7 \cdot 10^{23}$ moléculas de O_2

3. A queima de 1 mol de CH_4 produz 1 mol de CO_2, e a queima de 1 mol de C_4H_{10} produz 4 mol de CO_2.

16 g de CH_4 ——— 1 mol de CO_2

1 000 g de CH_4 ——— x

x = 62,5 mol de CO_2

58 g de C_4H_{10} ——— 4 mol de CO_2

1 000 g de C_4H_{10} ——— y

y = 69 mol de CO_2

Logo, 1 kg de metano libera menor quantidade de CO_2.

4. Massas molares: $Ca(NO_3)_2$ = 164 g/mol; KNO_3 = 101 g/mol; CH_4N_2O = 60 g/mol.

Em 1 mol de $Ca(NO_3)_2$, há 2 mol de átomos de N.

164 g de $Ca(NO_3)_2$ ——— 28 g de N

1 g de $Ca(NO_3)_2$ ——— x

x = 0,17 g de N

Em 1 mol de KNO_3, há 1 mol de átomos de N.

101 g de KNO_3 ——— 14 g de N

1 g de KNO_3 ——— y

y = 0,14 g de N

Em 1 mol de CH_4N_2O, há 2 mol de átomos de N.

60 g de CH_4N_2O ——— 28 g de N

1 g de CH_4N_2O ——— z

z = 0,47 g de N

Logo, a ureia (CH_4N_2O) apresenta maior teor de N por massa.

6. 1 mol de quinina apresenta 240 g de carbono, que equivalem a 20 mol de átomos; 24 mol de átomos de hidrogênio; 28 g de nitrogênio, que equivalem a 2 mol de átomos; $1{,}2 \cdot 10^{24}$ átomos de oxigênio, que equivalem a 2 mol de átomos. Logo, a fórmula molecular da quinina é $C_{20}H_{24}N_2O_2$.

Massa molar = $20 \cdot 12 + 24 \cdot 1 + 2 \cdot 14 + 2 \cdot 16 = 324$ g/mol

7. Para a sucralose:

400 g ——— $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas

1 g ——— x

$x = 1{,}505 \cdot 10^{21}$ moléculas

Para a sacarose:

340 g ——— $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas

1 g ——— x

$x = 1{,}769 \cdot 10^{21}$ moléculas

Multiplicando o número de moléculas de sucralose por 600 (poder adoçante): $1{,}505 \cdot 10^{21} \cdot 600 = 9{,}03 \cdot 10^{23}$

$$\frac{9{,}03 \cdot 10^{23}}{1{,}769 \cdot 10^{21}} \approx 510$$

8. a) $\frac{1 \text{ mol de } Na^+}{x} = \frac{23 \text{ g}}{9{,}0 \cdot 10^{-2} \text{ g}} \rightarrow x = 3{,}9 \cdot 10^{-3}$ mol de Na^+

$\frac{1 \text{ mol de } K^+}{y} = \frac{39 \text{ g}}{2{,}5 \cdot 10^{-2} \text{ g}} \rightarrow y = 6{,}4 \cdot 10^{-4}$ mol de K^+

$\frac{1 \text{ mol de } C\ell^-}{w} = \frac{35{,}5 \text{ g}}{8{,}4 \cdot 10^{-2} \text{ g}} \rightarrow w = 2{,}4 \cdot 10^{-3}$ mol de $C\ell^-$

b) Em 1 L da bebida, as quantidades de íons sódio, potássio e cloreto seriam:

Na^+

$\frac{2 \cdot 10^{-1} \text{ L}}{1 \text{ L}} = \frac{3{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ mol de } Na^+}{m} \rightarrow m = 1{,}95 \cdot 10^{-2}$ mol

K^+

$\frac{2 \cdot 10^{-1} \text{ L}}{1 \text{ L}} = \frac{6{,}0 \cdot 10^{-4} \text{ mol de } K^+}{n} \rightarrow n = 3{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol

$C\ell^-$

$\frac{2 \cdot 10^{-1} \text{ L}}{1 \text{ L}} = \frac{2{,}4 \cdot 10^{-3} \text{ mol de } C\ell^-}{q} \rightarrow q = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol

9. 8,0 g da substância ——— 7,3 g de carbono

92,0 g da substância ——— x

$x = 84$ g de carbono

A substância contém $92{,}0 - 84{,}0 = 8{,}0$ g de hidrogênio.

$\frac{84}{12} = 7$ mol de carbono; $\frac{8}{1} = 8$ mol de hidrogênio

Logo, a fórmula molecular é C_7H_8.

10. a) $C_5N_4O_{12} \rightarrow (5 \cdot 12) + (4 \cdot 14) + (12 \cdot 16) = 308$ g/mol

b) Resposta pessoal. Alguns exemplos que podem ser apresentados: o antibiótico penicilina, o corante malva, o processo de vulcanização da borracha, o adoçante sacarina.

c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que descobertas ao acaso nas ciências acontecem com pessoas que estão preparadas para reconhecê-las. Cientistas são profissionais treinados com grande conhecimento em determinada área, e seu trabalho é fazer perguntas e buscar respostas a essas perguntas; assim, ao se depararem com algo novo, buscam entender a descoberta.

11. a) $MnO_2 = 55 + (2 \cdot 16) = 87$ g/mol; $A\ell = 27$ g/mol; $A\ell_2O_3 = (2 \cdot 27) + (3 \cdot 16) = 102$ g/mol; $Mn = 55$ g/mol

b) 2 mol de $A\ell_2O_3$: 4 mol de átomos de $A\ell = 4 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23} = 2{,}4 \cdot 10^{24}$ átomos

6 mol de átomos de $O = 6 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23} = 3{,}6 \cdot 10^{24}$ átomos

c) 87 g de $MnO_2 \rightarrow 100\%$

55 g de $Mn \rightarrow x\%$

$x = 63{,}2\ \%$

12. a) $\frac{5{,}0 \cdot 10^{-1} \text{ g}}{x} = \frac{100\ \%}{36\ \%} \rightarrow x = 0{,}18$ g de ácido acetilsalicílico

b) $(12 \cdot 9) + (1 \cdot 8) + (16 \cdot 4) = 180$ g/mol

c) $\frac{1 \text{ mol de } C_9H_8O_4}{x} = \frac{180 \text{ g}}{0{,}18 \text{ g}} \rightarrow x = 0{,}001$ mol de $C_9H_8O_4$

d) $\frac{1 \text{ mol de } C_9H_8O_4}{0{,}001 \text{ mol}} = \frac{6{,}0 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}}{x} \rightarrow x =$

$= 6{,}0 \cdot 10^{20}$ moléculas de $C_9H_8O_4$

CAPÍTULO 3 CONTANDO ÁTOMOS E MOLÉCULAS (PÁGINA 102)

Reações químicas (página 102)

- As duas fotos que abrem o capítulo retratam o mesmo local com uma diferença de 18 anos, mostrando que é possível reverter um quadro de devastação ambiental para uma nova realidade de resgate das nascentes de água e da diversidade da flora e da fauna. Nas aulas de Química é possível discutir diversas reações químicas envolvidas durante o processo de desmatamento e queimada de florestas, bem como as que ocorrem no processo de recuperação dessas áreas.
- Antes de sistematizar a representação das reações químicas com equações, é necessário identificar a ocorrência dos fenômenos de transformação. Sugerimos, inicialmente, familiarizar os estudantes com a identificação de atividades que envolvam reações químicas. Esse tópico promove a competência geral **CGEB1**, a competência específica **CECNTEM1** e a habilidade **EM13CNT101**.
- Pode-se desenvolver um trabalho com o(a) professor(a) de História sobre algumas reações químicas que marcaram a história da humanidade, como a combustão e a fermentação, relacionadas, respectivamente, ao domínio do fogo e ao desenvolvimento de alimentos como o pão.

Equações químicas (páginas 103 a 107)

- Ao abordar o tópico "Tipos de reação" (p. 104 e 105), vale comentar com os estudantes que, como há uma diversidade de reações químicas, vários critérios podem ser adotados para classificá-las segundo a área que se deseja estudar. Entre esses critérios estão, por exemplo, a energia que emitem (exotérmica ou endotérmica) e a produção ou não de sólido a partir de soluções (de precipitação ou não). Nesta coleção, adotou-se como critério o tipo de modificação que ocorre entre o reagente e o produto, com definições e nomenclaturas mais atualizadas. Vale enfatizar, porém, que mais de uma classificação pode ser atribuída a uma transformação.
- O objeto digital *Evidências de reações químicas* (p. 104) traz um vídeo de reações químicas em que é possível observar algumas evidências como formação de gás e mudança de cor. Caso julgue oportuno, oriente a turma a acessá-lo durante a abordagem do tópico "Tipos de reação".
- No tópico "Reatividade dos metais" (p. 106), comente que a ordem de reatividade dos metais permite que se façam previsões a respeito das reações que podem ocorrer entre eles.

Balanceamento de equações (página 108)

- Balancear uma equação consiste em igualar o número de átomos de cada elemento nos reagentes e produtos;

pode-se dizer que se trata de uma expressão matemática de igualdade, pois, embora os símbolos utilizados sejam diferentes, a representação da igualdade mantém o princípio. As equações devem indicar a conservação da massa, o que justifica, também, a necessidade do balanceamento.

Tipos de fórmula (páginas 109 a 111)

- Embora a fórmula mínima não permita identificar uma substância, ela dá a ideia da proporção entre os átomos diferentes que compõem a substância. Também é importante relacionar os tipos de fórmula com a maneira pela qual, com base em uma, se pode chegar à outra. Isso se deve à natureza daquilo que representam: proporções entre átomos e suas relações com massas atômicas, massas moleculares e quantidade de matéria.

Práticas de Ciências – Queima da palha de aço (página 112)

- Antes de desenvolver a etapa "Como fazer", deixe a palha de aço previamente dividida em amostras de aproximadamente 1 g. Durante a queima da palha de aço, os fios de aço ficam incandescentes e é possível observar a presença de faíscas. Com relação à massa, a resposta é variável.
- Ao responder às questões da etapa "Para concluir", os estudantes devem investigar causas e elaborar hipóteses sobre os resultados observados, exercitando a competência geral **CGEB2** e a habilidade **EM13CNT205**.
- O descarte do óxido de ferro produzido após a combustão pode ser feito em lixo comum.

Cálculo estequiométrico (páginas 113 a 116)

- O cálculo estequiométrico deve ser visto como um ponto de convergência que relaciona várias definições trabalhadas até o momento. Considere a possibilidade de introduzir o assunto escrevendo uma reação química na lousa e solicitando aos estudantes que digam o que ela representa. Pode ser utilizada, por exemplo, a reação de combustão do hidrogênio para sondar conceitos esquecidos ou mal compreendidos. Desafie os estudantes a prever as quantidades de hidrogênio e de oxigênio para uma reação em que não sobrem reagentes. Espera-se que eles concluam que, se trabalharem com a proporção da reação (cada unidade representando o mol), chegarão à proporção de massa, quando, então, será possível aplicar a Lei de Proust para qualquer quantidade.

Reagente em excesso e reagente limitante (páginas 118 e 119)

- Você pode iniciar a abordagem desse assunto fazendo uma série de perguntas aos estudantes para facilitar a compreensão. Desafie-os com a seguinte situação-problema: Um dos reagentes tem apenas 90% da substância em relação à massa colocada para reagir. O que deve ocorrer com a massa dos produtos? Isso envolve os conceitos de reagente limitante e reagente em excesso? De que forma? Eles deverão perceber que a reação poderá não ocorrer da forma esperada e com rendimento total, por causa da baixa qualidade ou do grau de impureza da matéria-prima.

Química e Matemática – Razões, proporções e reações químicas (página 123)

- Esta seção relaciona os conceitos de razão e proporção com o balanceamento das equações químicas e os cálculos estequiométricos. Se julgar pertinente, solicite aos estudantes uma pesquisa sobre alguns processos industriais relevantes, como a produção de cloro e soda e a fabricação de metais como o ferro e o alumínio, e em seguida simule com a turma o planejamento da compra de reagentes para uma determinada quantidade de produto. Essa pesquisa também pode trazer temas acerca do mundo do trabalho e processos produtivos.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – O estudo da concentração de CO_2 na atmosfera no século XX (páginas 124 e 125)

- O texto discute como começaram as medições da concentração de CO_2 e como os resultados obtidos foram interpretados. Discuta com os estudantes a influência dos combustíveis fósseis no aumento da temperatura global e também as medidas tomadas pelos governos e pela sociedade para diminuir os impactos das mudanças climáticas no mundo. Dessa forma, são trabalhadas as competências específicas **CECNTEM2** e **CECNTEM3**, as habilidades **EM13CNT301** e **EM13CNT306** e o tema contemporâneo transversal **Educação ambiental**, da área Meio ambiente.
- Ao responder às questões da etapa "Para discutir", os estudantes precisam argumentar com base em fatos e informações confiáveis, exercitando a competência geral **CGEB7**.
- Peça aos estudantes que acessem o simulador indicado no boxe *Para explorar* (p. 124), em que é possível simular a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Esta atividade promove aspectos das competências gerais **CGEB5**, ao utilizar tecnologias digitais de forma crítica, e **CGEB7**, permitindo que eles argumentem com base em informações confiáveis.

SUGESTÃO DE AULA

- O tema desta seção permite o trabalho interdisciplinar com Geografia e Biologia. Esta sugestão de aula utiliza o simulador indicado no boxe *Para explorar* (p. 124). Portanto, será necessário usar a sala de informática.
- Inicialmente, peça aos estudantes que acessem o simulador e selecionem a opção "Ondas". Ao iniciar a simulação, eles devem selecionar as opções "Ver temperatura na superfície" e "Balanço energético". Proponha a eles que variem a concentração de gás de efeito estufa e anotem o que acontece com o balanço energético e a temperatura na superfície quando a concentração aumenta ou diminui.
- Se julgar pertinente, convide o(a) professor(a) de Geografia para conversar com os estudantes sobre a simulação mostrada ao clicar sobre o ícone do calendário. Aqui podem ser explicadas as variações que ocorreram na atmosfera desde a formação do planeta, com destaque para as mudanças ocorridas nas eras glaciais.
- Em seguida, retome o texto do Livro do Estudante e explique a construção da Curva de Keeling. Explique como o processo de respiração das plantas define o formato da curva. Se julgar necessário, convide o(a) professor(a) de Biologia para falar sobre o tema.
- Mostre para os estudantes que, apesar do processo cíclico observado a cada ano, a tendência da curva mostra o aumento na concentração de CO_2 na atmosfera.
- Por fim, solicite aos estudantes que respondam às atividades propostas no item "Para discutir" (p. 125) e, em seguida, converse sobre o que eles reponderam.

FONTES COMPLEMENTARES

- Grupo de Pesquisa em Educação Química (Gepeq). *Interações e transformações I – professor*. Elaborando conceitos sobre transformações químicas. São Paulo: Edusp, 2008. p. 248.

  O livro introduz conceitos iniciais sobre transformações químicas por meio de temas do cotidiano. Contribui também para sua própria aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos de e sobre Química, bem como sobre as múltiplas formas de desenvolver as suas atividades de ensino.

- Primo, J. de O.; Pricinotto, G. Adoçando as oficinas temáticas: da dificuldade em estequiometria à confecção de alfajores. *In*: *XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (Eneq)*, 2016, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2016. Disponível em: http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/resumos/R2152-2.pdf. Acesso em: 25 set. 2024.

  O artigo sobre um método de ensino desenvolvido com estudantes do 2º ano do Ensino Médio possibilita aos estudantes criar hipóteses com base em atividades práticas no estudo da estequiometria.

TEXTO COMPLEMENTAR

A importância do sequestro de carbono no combate ao aquecimento global

O aquecimento global está ligando o alerta por conta dos recordes preocupantes de impactos climáticos globais, influenciado pelo aumento de emissão de gases de efeito estufa (GEE). Atividades antrópicas, como a queima de combustíveis fósseis ou o desmatamento, possibilitam o acúmulo de dióxido de carbono (CO_2 ou gás carbônico) na atmosfera – um dos GEE mais importantes – e isso intensifica essa problemática.

[...] O professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo e coordenador do CCARBON (Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical), Carlos Eduardo Cerri, explica que existem três maneiras de ocorrer essa captura [de carbono].

Como é realizado

Uma das formas de realizar essa retirada é de maneira artificial, a partir do uso de bombas que filtram especificamente o CO_2 no momento que ainda estão nas chaminés, enquanto os outros gases são lançados à atmosfera. Esse gás capturado é bombeado e armazenado em cavidades rochosas por séculos e, por isso, é chamado também de sequestro geológico (em inglês – Carbon Capture Storage) – mas o especialista ressalta que o processo é custoso, cerca de US$ 200 por tonelada, e por isso não é tão utilizado.

Outra forma, porém gratuita, é feita por meio das plantas: "Durante a fotossíntese, as plantas retiram CO_2 da atmosfera e esse carbono, que estava na forma gasosa, agora dentro da planta, está na forma de compostos bioquímicos", desenvolve o docente. Ele conta que, dependendo da planta, ela pode viver por décadas e, durante todo esse período, estará auxiliando no processo de captura e armazenamento do gás.

Esse meio é o mais comum, uma vez que é realizado naturalmente pelas florestas, especialmente no momento em que estão se desenvolvendo, e ajudam a diminuir a concentração de gás carbônico consideravelmente. Para além das árvores, o sequestro de carbono natural ocorre nos oceanos também, nos processos de calcificação de organismos marinhos, no entanto, o excesso do gás promove a acidificação das águas.

O terceiro método citado por Cerri é o que ocorre nos solos, onde, após a captura do dióxido de carbono pela planta, as raízes localizadas no subterrâneo sofrem decomposição por organismos – como fungos, bactérias e outros não vistos a olho nu. "Esse carbono, agora presente no solo, fica na forma de uma série de compostos orgânicos, responsáveis por melhorar as propriedades físicas e químicas do solo"; ele completa que, caso bem trabalhado pelos organismos, o gás pode permanecer por milênios na terra.

[...]

Bueno, F. A importância do sequestro de carbono no combate ao aquecimento global. *Jornal da USP*, São Paulo, 12 mar. 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/a-importancia-do-sequestro-de-carbono-no-combate-ao-aquecimento-global/. Acesso em: 25 set. 2024.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As atividades propostas na etapa "Para concluir" da seção *Práticas de Ciências* (p. 112) podem ser usadas para avaliar a compreensão dos tipos de reações abordados. Da mesma forma, a seção *Atividades* (p. 126 e 127) pode ser utilizada para identificar os pontos frágeis da aprendizagem dos conceitos abordados ao longo do capítulo.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Práticas de Ciências – Queima da palha de aço (página 112)

3. Resposta variável. A massa de óxido de ferro pode ser obtida pela diferença entre a massa do pires com o produto da combustão e a massa do pires. A massa obtida de óxido de ferro é maior que a massa da palha de aço antes da combustão. Isso ocorre porque o produto é formado pela ligação entre átomos de ferro e oxigênio. Assim, a massa do reagente é composta de átomos de ferro e pequena quantidade de impurezas, enquanto a massa do produto é composta dos mesmos átomos de ferro e dos átomos de oxigênio que foram incorporados ao sólido.

4. Na pesagem final, obtém-se a massa de óxido de ferro(III) e, portanto, é possível calcular a massa de ferro presente nessa amostra utilizando-se as massas molares do ferro e do óxido de ferro(III). Considerando A como a massa de óxido de ferro(III) obtida no experimento, temos:

1 mol de Fe_2O_3 (160 g/mol) ——— 2 mol de Fe (56 g/mol)

160 g de Fe_2O_3 ——— 112 g de Fe

A g de Fe_2O_3 ——— x g de Fe

$$x = \frac{112 \cdot A}{160}$$

Se x é a massa em gramas de ferro presente na amostra de óxido de ferro(III) e y é a massa da palha de aço no início do experimento, então, a porcentagem em massa de ferro na palha de aço pode ser obtida por $\frac{100 \cdot x}{y}$.

Roteiro (página 122)

6. $3\ H_2$ ——— $2\ NH_3$

3 mol de H_2 (2 g/mol) ——— 2 mol de NH_3 (17 g/mol)

6 g de H_2 ——— 34 g de NH_3

900 g de H_2 ——— x g de NH_3

$$x = \frac{34 \cdot 900}{6}$$

$x = 5\,100$ g (rendimento teórico)

Para 50% de rendimento, temos:

5 100 g —— 100%

y g —— 50%

y = 2 550 g

Química e Matemática – Razões, proporções e reações químicas (página 123)

1. Como a proporção em mols na reação é de 1 mol de N_2 para 3 mol de H_2, $k = \frac{1}{3}$.

2. 2 000 mol —— 25%

x —— 100%

x = 8 000 mol de NH_3

Usando a proporção estequiométrica, obtém-se que são necessários 4 000 mol de N_2 e 12 000 mol de H_2.

Atividades (páginas 126 e 127)

4. a) $3\ H_2SO_4(aq) + 2\ Fe(OH)_3(s) \rightarrow Fe_2(SO_4)_3(aq) + 6\ H_2O(\ell)$

b) $2\ N_2H_4(g) + N_2O_4(g) \rightarrow 3\ N_2(g) + 4\ H_2O(g)$

c) $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ SO_3(g)$

5. a) Não reagem, pois o Au é menos reativo que o H.

b) Reagem, pois o Ba é mais reativo que o H.

$Ba(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow BaC\ell_2(aq) + H_2(g)$

c) Reagem, pois o Aℓ é mais reativo que o H.

$2\ A\ell(s) + 6\ HC\ell(aq) \rightarrow 2\ A\ell C\ell_3(aq) + 3\ H_2(g)$

Utilize esta questão para reforçar a importância do balanceamento da equação química após a definição dos reagentes e dos produtos.

6. a) No béquer **A**, ocorreu a formação de cobre metálico (Cu), de cor escura, na parte da lâmina que ficou imersa. No béquer **B**, não houve reação, pois a prata é menos reativa que o cobre, presente na forma iônica na solução de sulfato de cobre(II).

b) $Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$

7. Se a combustão completa de 1 mol de álcool isopropílico produz 3 mol de CO_2 e 4 mol de H_2O, esse álcool apresenta 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio em sua molécula. A massa de hidrogênio nessa molécula é de 8 u (8 · 1 u). Portanto, a massa de oxigênio é de 16 u, que é a própria massa atômica desse elemento. Portanto, a molécula possui 1 átomo de oxigênio. Logo, a fórmula molecular do álcool isopropílico é C_3H_8O.

8. A partir da proporção em massa de 444,5 g de C : 61,7 g de H : 493,8 g de O, obtém-se a proporção em mols dividindo a massa correspondente a cada elemento por sua massa atômica. Assim, a proporção em mols de cada elemento na celulose é de aproximadamente 37 C : 62 H : 31 O, que equivale a 1,2 C : 2 H : 1 O ou 6 C : 10 H : 5 O. Logo, a fórmula mínima da celulose é $C_6H_{10}O_5$.

9. Cálculo da quantidade de SO_2, em mol, correspondente a 500 L do gás:

25 L —— 1 mol

500 L —— x mol

x = 20 mol de SO_2

Cálculo da massa de $Ca(OH)_2$

$1\ SO_2(g) + 1\ Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaSO_3(s) + H_2O(\ell)$

1 mol —— 1 · 74 g

20 mol —— x g

x = 1 480 g ou 1,48 kg

10. a) Não, pois a proporção em mol dos reagentes, com base na equação química, é de 4 NH_3 : 5 O_2, ou seja, 68 g de NH_3 : 160 g de O_2.

Em uma mistura de 150 g de amônia e 150 g de oxigênio molecular, há excesso de amônia.

b) Como há amônia em excesso, utiliza-se a quantidade de O_2 para o cálculo da massa de NO formada. A partir dos coeficientes estequiométricos da reação, tem-se:

5 O_2 —— 4 NO

5 mol de O_2 (32 g/mol) —— 4 mol de NO (30 g/mol)

160 g de O_2 —— 120 g de NO

150 g de O_2 —— x g de NO

$x = 150 \cdot \frac{120}{160}$

x = 112,5 g de NO

c) Há amônia em excesso. A proporção em massa ideal para os reagentes é de 68 g de NH_3 : 160 g de O_2. Assim, para 150 g de O_2, utiliza-se 63,75 g de amônia. Como há 150 g de amônia na mistura, conclui-se que 86,25 g de NH_3 estão em excesso.

11. Cálculo da massa de cobre que seria obtida com rendimento de 100%:

444,5 g —— 70%

x —— 100%

x = 635 g de Cu

Cálculo da massa de Cu_2S (calculo estequiométrico):

$Cu_2S(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ Cu(s) + SO_2(g)$

1 · 159 g —— 2 · 63,5 g

y —— 635 g

y = 795 g

12. A partir dos coeficientes estequiométricos da reação, tem-se:

1 $C_{12}H_{22}O_{11}$ —— 4 C_2H_6O

1 mol de $C_{12}H_{22}O_{11}$ —— 4 mol de C_2H_6O (46 g/mol)

1 mol de $C_{12}H_{22}O_{11}$ —— 184 g de C_2H_6O

$1 \cdot 10^6$ mol de $C_{12}H_{22}O_{11}$ —— x g de C_2H_6O

$x = 184 \cdot 10^6$ g = 184 t de C_2H_6O (para 100% de rendimento)

Para 75% de rendimento, obtém-se 184 t · 0,75 = 138 t de C_2H_6O.

13. Cálculo das massas molares:

$CoC\ell_2$: M = (1 · 58,9) + (2 · 35,5) = 129,9 g/mol

H_2O: M = (2 · 1) + (1 · 16) = 18 g/mol

Cálculo estequiométrico

$1\ CoC\ell_2(s) + n\ H_2O(v) \rightarrow CoC\ell_2 \cdot n\ H_2O(s)$

1 mol —— (129,9 + n · 18)

0,5 mol —— 82,95 g

n = 2

Portanto, a fórmula do sal hidratado é $CoC\ell_2 \cdot 2\ H_2O$.

14. A massa molecular do aspartame pode ser calculada por:

(14 · massa atômica do C) + (18 · massa atômica do H) + + (2 · massa atômica do N) + (5 · massa atômica do O) =

= 14 · 12 u + 18 · 1 u + 2 · 14 u + 5 · 16 u =

= 168 u + 18 u + 28 u + 80 u = 294 u

A porcentagem em massa de carbono corresponde a

$\frac{168\ u}{294\ u} \cong 0{,}5714 = 57{,}14\%$

A porcentagem em massa de hidrogênio corresponde a

$\frac{18\ u}{294\ u} \cong 0{,}0612 = 6{,}12\%$

A porcentagem em massa de nitrogênio corresponde a

$\frac{28\ u}{294\ u} \cong 0{,}0952 = 9{,}52\%$

A porcentagem em massa de oxigênio corresponde a

$\frac{80\ u}{294\ u} \cong 0{,}2721 = 27{,}21\%$

Pode-se optar por representar a porcentagem em massa com menos algarismos significativos.

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 128 A 131)

Estudo de caso – Linus Pauling e a vitamina C (páginas 128 e 129)

- A proposta da seção *Estudo de caso* é envolver os estudantes em uma situação-problema na qual eles deverão mobilizar o que aprenderam nesta unidade, seus conhecimentos prévios e o resultado de pesquisas, para encontrar uma resposta ao problema proposto.
- Sugerimos que o trabalho seja realizado em duplas ou em pequenos grupos de até quatro estudantes.
- O grande interesse de Linus Pauling pela vitamina C é o ponto de partida desta atividade. Oriente os estudantes a ler o texto e a anotar as informações que considerarem importantes. Em seguida, eles deverão ler as questões propostas e buscar respondê-las com base no que aprenderam. Caso não consigam encontrar as respostas, oriente-os a pesquisar acerca do assunto.
- A atividade desenvolve a competência específica **CECNTEM3** e a habilidade **EM13CNT301**, ao trabalhar a interpretação de modelos explicativos e dados para construir e avaliar conclusões de uma situação-problema sob uma perspectiva científica.
- A habilidade **EM13CNT303** é trabalhada no âmbito da interpretação de textos de divulgação científica.
- A competência geral **CGEB2** é desenvolvida no exercício da curiosidade intelectual, ao usar a investigação, a análise crítica e a imaginação para investigar causas, elaborar hipóteses e resolver problemas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Estudo de caso – Linus Pauling e a vitamina C (páginas 128 e 129)

2. $C_6H_8O_6 \rightarrow (6 \cdot 12) + (8 \cdot 1) + (6 \cdot 16) = 176$ u

Massa molecular = 176 u

Massa molar = 176 g/mol

3. 1 mol —— 176 g

x mol —— 18 g

$x = 0{,}1$ mol

Aproximadamente 0,1 mol por dia.

5. Na formação da molécula de oxigênio (O_2), os dois elétrons desemparelhados da última camada de um átomo de oxigênio (O) se emparelham com os dois elétrons desemparelhados do outro átomo, formando um composto por meio de uma ligação covalente (os elétrons são compartilhados entre os dois átomos, sendo coerente com a regra do octeto):



Cores-fantasia.

6. Os átomos de hidrogênio têm número atômico 1, e seu elétron está na camada K.

O radical hidroxila é composto de um átomo de hidrogênio (H) e outro de oxigênio (O).



Cores-fantasia.

Na formação do radical hidroxila, o elétron da última camada do átomo de hidrogênio (H) se emparelha com um dos dois elétrons livres do átomo de oxigênio (O), formando um composto por meio de uma ligação covalente.

Nota-se, portanto, que o radical hidroxila é instável, pois apresenta um elétron que se encontra desemparelhado na última camada do átomo de oxigênio.

9. Ácido ascórbico = AH^-

Radical hidroxila = $OH \cdot$

$AH^- + OH \cdot \rightarrow H_2O + A \cdot^-$

Questões globais (páginas 130 e 131)

1. a) Isótopos do elemento químico carbono de números de massa 12 e 13, ou seja, átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons.

b) $(0{,}989 \cdot 12) + (0{,}011 \cdot 13) = 12{,}011$ u

2. Alternativa **c**. Massa molar do Au = 197 g/mol

197 g —— $6{,}0 \cdot 10^{23}$ átomos

1 576 g —— x

$x = 4{,}8 \cdot 10^{24}$ átomos

3. Alternativa **a**. A concentração do princípio ativo é de 10 mg/mL. Portanto, em 50 mL existem $50 \cdot 10 = 500$ mg = 0,5 g. Como a massa molar desse princípio é de 500 g/mol, tem-se:

500 g —— $6{,}0 \cdot 10^{23}$ moléculas

0,5 g —— x

$x = 6{,}0 \cdot 10^{20}$ moléculas

4. a) A massa molecular do etanol pode ser calculada por:

(2 · massa atômica do C) + (6 · massa atômica do H) + + (1 · massa atômica do O) =

$= 2 \cdot 12\ u + 6 \cdot 1\ u + 1 \cdot 16\ u = 46$ u

A porcentagem em massa de carbono corresponde a

$\frac{24\ u}{46\ u} \cong 0{,}522 = 52{,}2\%$

A porcentagem em massa de hidrogênio corresponde a

$\frac{6\ u}{46\ u} \cong 0{,}13 = 13\%$

A porcentagem em massa de oxigênio corresponde a

$\frac{16\ u}{46\ u} \cong 0{,}348 = 34{,}8\%$

c) A partir dos coeficientes estequiométricos da equação da reação, tem-se:

1 C_2H_6O —— 3 O_2

1 mol de C_2H_6O (46 g/mol) —— 3 mol de O_2 (32 g/mol)

46 g de C_2H_6O —— 96 g de O_2

23 kg de C_2H_6O —— x kg O_2

$x = 23 \cdot \frac{96}{46}$

$x = 48$ kg de C_2H_6O

d) Como a densidade do etanol é igual a 0,8 g/mL, calcula-se a massa de etanol equivalente a 57,5 L:

$d = \frac{m}{V}$

$0{,}8 = \frac{m}{57{,}5}$

$m = 46$ kg $= 46\,000$ g

Além disso, o volume molar a 27 °C e 1,0 atm pode ser calculado pela equação dos gases ideais:

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$1 \cdot V = 1 \cdot 0{,}082 \cdot 300$

$V = 24{,}6$ L

A partir dos coeficientes estequiométricos da equação da reação, tem-se:

1 C_2H_6O —— 2 CO_2

1 mol de C_2H_6O (46 g/mol) —— 2 mol de CO_2 (24,6 L/mol)

46 g de C_2H_6O —— 49,2 L de CO_2

46 000 g de C_2H_6O —— x L CO_2

$x = 46\,000 \cdot \frac{49{,}2}{46}$

$x = 49\,200$ L de CO_2

5. Alternativa **b**.

$n(CO_2) = \frac{22 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = 0{,}5$ mol

Em 0,5 mol de moléculas de CO_2, existe 0,5 mol de átomos de carbono e 1,0 mol de átomos de oxigênio.

$n(H_2O) = \frac{6{,}3 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 0{,}35$ mol

Em 0,35 mol de moléculas de H_2O, existe 0,7 mol de átomos de hidrogênio e 0,35 mol de átomos de oxigênio.

$n(N_2) = \frac{1{,}4 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0{,}05$ mol

Em 0,05 mol de moléculas de N_2, existe 0,1 mol de átomos de nitrogênio.

A proporção entre os elementos na nicotina é $C_{0,5}H_{0,7}N_{0,1}$, que equivale a C_5H_7N.

6. Alternativa **b**.

M $(P_4) = 31 \cdot 4 = 124$ g/mol; M $(O_2) = 16 \cdot 2 = 32$ g/mol

124 g —— $5 \cdot 32$ g

248 g —— x

$x = 320$ g de O_2

7. Alternativa **a**.

$1 \text{ t} = 10^6$ g

Com 7,95% de pureza, a massa de calcocita em 1 t do minério é de 79 500 g.

$Cu_2S(s) + O_2(g) \rightarrow 2\,Cu(s) + SO_2(g)$

159 g —— 2 mol

79 500 g —— x

$x = 1\,000 = 1 \cdot 10^3$ mol

8. Alternativa **a**.

Somando as reações dadas, obtém-se a reação global de obtenção da perovskita.

$Pb(NO_3)_2$	+ 2 KI	+ HI	+ CH_3NH_2	$\rightarrow$ 2 KNO_3	+ $CH_3NH_3PbI_3$
1 mol	2 mol	1 mol	1 mol		1 mol
0,6 mol	0,8 mol	0,8 mol	0,7 mol		x

O KI é o reagente limitante. Como a proporção em mol entre KI e $CH_3NH_3PbI_3$ é 2 : 1, a quantidade é de 0,4 mol.

9. A reação I não ocorre, pois o bromo é menos reativo que o cloro. A reação II não ocorre, pois o Pb é menos reativo que o Cr. A reação III ocorre, pois o produto $Cu(OH)_2$ é insolúvel.

10. A reação da transformação em questão pode ser representada pela seguinte equação balanceada:

$CaCO_3(s) + HC\ell(aq) \rightarrow CaC\ell_2(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$

O volume molar de um gás ideal nas condições de 0,10 atm e 27 °C (300 K) pode ser calculado pela lei dos gases ideais:

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$0{,}10 \cdot V = 1 \cdot 0{,}082 \cdot 300$

$V = 246$ L/mol

A partir dos coeficientes estequiométricos da equação da reação, tem-se:

1 $CaCO_3$ —— 1 CO_2

1 mol de $CaCO_3$ (100 g/mol) —— 1 mol de CO_2 (246 L/mol)

100 g de $CaCO_3$ —— 246 L de CO_2

x g de $CaCO_3$ —— 18,7 L

$x = \frac{100 \cdot 18{,}7}{246}$

$x \cong 7{,}6$ g de $CaCO_3$

Conclui-se que há 7,6 g de $CaCO_3$ na amostra de 10 g de calcário e, portanto, o teor de $CaCO_3$ é $\frac{7{,}6}{10} = 0{,}76 = 76\%$.

11. A equação balanceada do processo é:

$C_xH_y + (2x + \frac{y}{2})\,O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$

O volume molar de um gás ideal nas condições de 1 atm e 27 °C (300 K) pode ser calculado pela lei dos gases ideais:

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$1 \cdot V = 1 \cdot 0{,}082 \cdot 300$

$V = 24{,}6$ L/mol

A partir dos coeficientes estequiométricos da equação da reação, tem-se:

1 C_xH_y —— x CO_2

1 mol de C_xH_y (24,6 L/mol) —— x mol de CO_2 (44 g/mol)

24,6 L de C_xH_y —— $44 \cdot x$ g de CO_2

12,3 L de C_xH_y —— 88 g de CO_2

$44 \cdot x = \frac{24{,}6 \cdot 88}{12{,}3}$

$x = \frac{176}{44}$

$x = 4$

1 C_xH_y —— $\frac{y}{2}$ H_2O

1 mol de C_xH_y (24,6 L/mol) —— $\frac{y}{2}$ mol de H_2O (18 g/mol)

24,6 L de C_xH_y —— $18 \cdot \frac{y}{2}$ g de H_2O

12,3 L de C_xH_y —— 36 g de H_2O

$18 \cdot \frac{y}{2} = \frac{24{,}6 \cdot 36}{12{,}3}$

$9 \cdot y = 72$

$y = 8$

Como $x = 4$ e $y = 8$, a fórmula do composto orgânico analisado é C_4H_8 e a equação balanceada do processo é $C_4H_8 + 6\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 4\,H_2O$

12. Alternativa **d**.

A massa molar do $CaC\ell_2$ anidro é 111 g/mol. O composto hidratado contém duas moléculas de água, ou seja, 36 g a mais por mol, já que a massa molar da água é igual a 18 g.

Consideramos, então, que:

111 g ——— 100%

36 g ——— x

$x = 32{,}4\%$

13. Amostra 1: SO_2; amostra 2: SO_3; amostra 3: SO_2

Análise da amostra 1:

$$S: n = \frac{4\text{ g}}{32\text{ g/mol}} = 0{,}125\text{ mol};\ O: n = \frac{4\text{ g}}{16\text{ g/mol}} = 0{,}25\text{ mol}$$

A proporção, em mol, é de 0,125 : 0,25, ou seja, 1 : 2. Portanto, a fórmula do óxido da amostra 1 é SO_2.

Análise da amostra 2:

$$S: n = \frac{16\text{ g}}{32\text{ g/mol}} = 0{,}5\text{ mol};\ O: n = \frac{24\text{ g}}{16\text{ g/mol}} = 1{,}5\text{ mol}$$

A proporção, em mol, é de 0,5 : 1,5, ou seja, 1 : 3. Portanto, a fórmula do óxido da amostra 2 é SO_3.

Análise da amostra 3:

$$S: n = \frac{8\text{ g}}{32\text{ g/mol}} = 0{,}25\text{ mol};\ O: n = \frac{8\text{ g}}{16\text{ g/mol}} = 0{,}5\text{ mol}$$

A proporção, em mol, é de 0,25 : 0,5, ou seja, 1 : 2. Portanto, a fórmula do óxido da amostra 3 é SO_2.

14. 13,9 g de substância x foi formada a partir de 2,07 g de fósforo. Portanto, a porcentagem em massa de fósforo no composto x é $\frac{2{,}07}{13{,}8} = 0{,}15 = 15\%$. Portanto, a porcentagem em massa de cloro corresponde a 85%. Isso significa que no composto x temos fósforo e cloro na proporção em massa de 15 : 85. Dividindo 15 pela massa atômica do fósforo e 85 pela massa atômica do cloro, temos uma proporção de fósforo e cloro em número de mols de aproximadamente 0,48 : 2,4 ou 1 : 5. Assim, conclui-se que a fórmula empírica do composto é $PC\ell_5$.

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**Enem**)

> O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.
>
> Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1º ago. 2012. (Adaptado.)

Considerando-se o valor de $6 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?

a) $7{,}5 \cdot 10^{21}$
b) $1{,}5 \cdot 10^{22}$
c) $7{,}5 \cdot 10^{23}$
d) $1{,}5 \cdot 10^{25}$
e) $4{,}8 \cdot 10^{25}$

Alternativa **b**.

500 mg · 2 = 1 000 mg = 1 g (quantidade a ser ingerida)

1 g · 1 mol/40 g = 0,025 mol

0,025 mol · $6 \cdot 10^{23}$ moléculas/mol = $1{,}5 \cdot 10^{22}$ moléculas

2. (**Uespi**) Os avanços tecnológicos na eletrônica levaram à invenção do espectrômetro de massa, um aparelho que determina a massa de um átomo. Um mineiro, procurando ouro em um riacho, coleta 10 g de peças finas de ouro conhecidas como "pó de ouro". Sabendo que a massa de um átomo de ouro é $3{,}27 \cdot 10^{-25}$ kg, calcule quantos átomos de ouro o mineiro coletou.

a) $3 \cdot 10^{25}$
b) $3 \cdot 10^{22}$
c) $5 \cdot 10^{20}$
d) $5 \cdot 10^{17}$
e) $7 \cdot 10^{16}$

Alternativa **b**.

Cada átomo pesa $3{,}27 \cdot 10^{-25}$ kg

1 átomo —— $3{,}27 \cdot 10^{-25}$ kg

x átomos —— $10 \cdot 10^{-3}$ kg

$x = 3 \cdot 10^{22}$ átomos

3. (**UFRN**) Um fertilizante obtido industrialmente apresenta compostos dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio. O teor de nitrogênio é geralmente expresso em NH_3. Um saco de 17 kg desse fertilizante contém 10%, em massa, de amônia.

Massas atômicas (u): H = 1; N = 14.

A massa de nitrogênio contida no saco é

a) 1,0 kg
b) 1,4 kg
c) 1,7 kg
d) 2,8 kg

Alternativa **b**.

17 kg de fertilizante têm 10% de amônia.

1,7 kg de amônia = 1 700 gramas.

Massa atômica da NH_3 = 17 g/mol

17 g —— 14 g de N_2

1 700 g —— x

x = 1 400 g = 1,4 kg de N_2

4. (**PUC-RJ**) O timerosal ($NaC_9H_9HgO_2S$) é uma substância conservante, adicionada em vacinas e soluções oftalmológicas para evitar o crescimento bacteriano. Por conter mercúrio, um elemento tóxico, em sua estrutura, seu uso vem sendo questionado. Dos valores abaixo, o que mais se aproxima do percentual, em massa, de mercúrio presente na estrutura do timerosal é

Dados: Na = 23, C = 12, Hg = 200, O = 16 e S = 32.

a) 35
b) 50
c) 60
d) 65
e) 70

Alternativa **b**.

O percentual (P) em massa de mercúrio presente no timerosal pode ser calculado da seguinte forma:

$P = n \cdot MM_{Hg}/MM_{timerosal}$, em que n é o número de átomos de mercúrio presentes no timerosal, MM_{Hg} é a massa molar do mercúrio e $MM_{timerosal}$ é a massa molar do timerosal.

$P = 1 \cdot 200/(1 \cdot 23 + 9 \cdot 12 + 9 \cdot 1 + 1 \cdot 200 + 2 \cdot 16 + 1 \cdot 32)$

$P = 0{,}495 \sim 50\%$

3 O COMPORTAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS

INTRODUÇÃO

A unidade é formada por três capítulos. O capítulo 1, referente ao comportamento dos gases, pode ser um momento oportuno para discutir com os estudantes conceitos como as variáveis de estado e sua influência nas transformações gasosas. No capítulo 2, são abordados os grupos dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos e sua importância no dia a dia das pessoas e no setor industrial. No capítulo 3, são apontadas algumas maneiras de calcular a concentração de soluções. Apresentam-se também as propriedades coligativas das soluções e algumas de suas aplicações no dia a dia.

Ao final da unidade, a seção *Pensando Ciências* permite que os estudantes usem estratégias do pensamento computacional na solução de um problema complexo – no caso, descobrir como identificar possíveis adulterações no leite de vaca.

Os objetivos da unidade se articulam a este e a outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas competências gerais, tais como a **CGEB1** (valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos), a **CGEB2** (exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas), a **CGEB4** (utilizar as linguagens matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências e ideias), a **CGEB5** (utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica), a **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis), a **CGEB9** (exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro), a **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação), e as competências específicas **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida) e **CECNTEM3** (uso da tecnologia digital). Também são desenvolvidas habilidades da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, como a **EM13CNT101** e a **EM13CNT307**.

Sugestão de planejamento

Sugere-se que, nesta unidade, a seção *Química e Biologia: A produção de biogás* (p. 142) seja trabalhada em parceria com o(a) professor(a) de Biologia. Outra oportunidade de trabalho interdisciplinar ocorre no tópico *Óxidos, efeito estufa e aquecimento global* (p. 151), que oferece a oportunidade de um trabalho interdisciplinar com Geografia, ao abordar formas de mitigar os problemas causados pelo aquecimento global.

OBJETIVOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Conhecer as variáveis de estado de um gás (pressão, volume e temperatura). • Compreender as relações entre as variáveis de estado durante as transformações gasosas. • Reconhecer o processo de produção de biogás a partir de dejetos como uma fonte de energia que reduz o impacto ambiental gerado pelo descarte desse resíduo.	CGEB1 CGEB2 CGEB5 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT105 EM13CNT106 EM13CNT309	
2	• Reconhecer as funções inorgânicas e suas aplicações no cotidiano. • Entender as relações das funções químicas com o meio ambiente. • Conhecer as causas e consequências de problemas ambientais como o aquecimento global e a chuva ácida.	CGEB1 CGEB2 CGEB4 CGEB7 CGEB9 CGEB10 CECNTEM2 CECNTEM3	EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT301 EM13CNT307	Diversidade cultural
3	• Investigar as soluções e as propriedades coligativas das soluções. • Reconhecer a importância da determinação da concentração de soluto em uma solução. • Compreender o funcionamento do processo de dessalinização da água.	CGEB2 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT310	Ciência e tecnologia Educação para o trânsito
Fechamento da unidade	• Utilizar estratégias do pensamento computacional para resolver problema relativo à identificação de leite possivelmente adulterado. • Reconhecer a utilidade de reações com indicadores para identificar o pH de misturas.	CGEB2 CGEB5 CGEB7	EM13CNT303	

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 132 E 133)

- A abertura da unidade traz como destaque a imagem de um mergulhador usando um cilindro de oxigênio e as bolhas de gás liberadas pela expiração. Se julgar oportuno, utilize o texto da abertura da unidade para identificar as ideias dos estudantes sobre o assunto, usando as emissões de gás carbônico como problematizador.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 132)

2. O aumento da acidez prejudica muitas espécies, especialmente aquelas que possuem calcário em suas estruturas, como corais e moluscos com conchas. Pode-se fazer uma analogia da acidez da água com sua salinidade para facilitar o entendimento dos estudantes. Comente com eles que, da mesma forma que um peixe de rio não sobrevive no mar, um organismo que está adaptado à água levemente básica pode não sobreviver com o aumento da acidez.

CAPÍTULO 1 O COMPORTAMENTO DOS GASES (PÁGINA 134)

Como os gases afetam a vida na Terra (página 134)

- A abertura do capítulo aborda a poluição causada pelo aumento da concentração de alguns gases na atmosfera. Incentive os estudantes a apresentar seus conhecimentos prévios sobre o assunto, valorizando os conceitos historicamente construídos sobre o mundo físico para compreender a realidade, mobilizando a competência geral **CGEB1**.

Características dos gases (páginas 135 a 137)

- O vídeo recomendado no boxe *Para explorar* (p. 136) mostra a história do experimento de Torricelli que deu origem ao barômetro.
- O boxe *Ciência se discute* (p. 137) mostra como a pesquisa e o desenvolvimento científico levam à invenção de equipamentos que protegem a vida dos seres humanos.
- A temperatura corresponde à agitação de partículas. Para os gases, a escala Kelvin é bastante utilizada na ciência. O boxe *Ampliação* (p. 137) mostra a equivalência de temperatura em kelvin, graus Celsius e graus Farenheit.

Práticas de Ciências – Características dos gases (página 138)

- Esta atividade prática está dividida em duas partes. Na parte 1, ocorre uma transformação isobárica. Na parte 2, ocorre uma transformação isotérmica. A partir dos resultados e das respostas obtidas no item "Para concluir", pode-se introduzir o tópico sobre transformações gasosas.
- A realização desta atividade trabalha a competência geral **CGEB2**, ao permitir que os estudantes utilizem a investigação, a reflexão e a análise crítica. Seu conteúdo promove o trabalho com a competência específica **CECNTEM1**.

Transformações gasosas (páginas 139 e 140)

- Mostre, para cada uma das transformações estudadas, o comportamento gráfico das variáveis, a fim de levar os estudantes a fazer comparações, prever extrapolações de dados e relacionar a proporcionalidade entre as grandezas.
- Este tópico promove a habilidade **EM13CNT101**, ao trabalhar a análise e a representação das transformações em sistemas que envolvam quantidade de matéria e de energia.

Práticas de Ciências – Transformações gasosas (página 141)

- Nesta atividade, os estudantes simularão as transformações gasosas por meio de um aplicativo digital. Se considerar pertinente, peça a eles que testem situações diferentes daquelas indicadas no item "Como fazer". Oriente-os a anotar os dados e os resultados dessas transformações, para que tentem analisá-los com base nos conhecimentos adquiridos neste capítulo. Ao usar a tecnologia digital, esta atividade promove a competência geral **CGEB5** e a competência específica **CECNTEM3**.

Química e Biologia – A produção de biogás (página 142)

- No Brasil, além do etanol, mais dois biocombustíveis têm muita importância: o biodiesel e o biogás. Enfatize que, embora o biogás possa ser encontrado na natureza (em locais como pântanos, mangues, lagos e rios), a exploração para fins energéticos dessa forma do biogás não é economicamente viável.
- O objeto digital *Projetos de geração de energia limpa* traz outras fontes de geração de energia limpa em funcionamento no Brasil. Caso considere oportuno, peça aos estudantes que tragam imagens ou vídeos de outros projetos.
- Esta seção trabalha as competências gerais **CGEB1** e **CGEB2**, ao valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico e social e ao recorrer à abordagem própria das ciências para resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Também desenvolve a competência específica **CECNTEM1**, ao analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida. São desenvolvidas, ainda, as habilidades **EM13CNT105**, **EM13CNT106** e **EM13CNT309**.
- Esta seção pode ser complementada pela produção de um biodigestor em um projeto de Feira de Ciências, como o desenvolvido por Fabio Luiz de Souza e Patrícia Martins e descrito no artigo "Ciência e tecnologia na escola: desenvolvendo cidadania, por meio do Projeto 'Biogás – Energia Renovável para o Futuro'" (*Química Nova na Escola*, v. 33, n. 1, 2011. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/03-RSA5309.pdf. Acesso em: 10 set. 2024).

SUGESTÃO DE AULA

- O tema dessa seção permite o trabalho interdisciplinar com Biologia. Se possível, convém realizar essa aula na sala de informática, para que os estudantes possam acessar o conteúdo digital.
- Inicialmente, convide o(a) professor(a) de Biologia para explicar aos estudantes sobre os problemas causados pelo manejo incorreto dos dejetos de animais.
- Em seguida, leia o texto da p. 142 com os estudantes. Explique o esquema da produção de biogás a partir dos dejetos dos animais. Converse com eles sobre as vantagens de

investir em sistemas como esse. Além de preservar o ambiente, os produtores lucram, a longo prazo, com a economia de energia elétrica proporcionada pelo uso do biogás.

- Peça aos estudantes que acessem o objeto digital *Projetos de geração de energia limpa* (p. 142), para que conheçam outros projetos em que se obtém energia preservando o ambiente. Esse conteúdo também pode servir de motivador para uma conversa acerca do mundo do trabalho e dos processos produtivos.
- Por fim, solicite aos estudantes que respondam às atividades propostas no item *Conecte as ideias* e, em seguida, converse sobre o que eles responderam.

FONTE COMPLEMENTAR

- CIBiogás Energias Renováveis. *Como o biogás pode contribuir na preservação do ambiente*. Foz do Iguaçu, [20--]. Disponível em: https://cibiogas.org/blog/como-o-biogas-pode-contribuir-na-preservacao-do-meio-ambiente/. Acesso em: 10 set. 2024. O texto traz informações sobre como o uso do biogás contribui para a preservação do meio ambiente ao mesmo tempo que gera energia.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As situações testadas de forma complementar na seção *Práticas de Ciências* (p. 141) e suas análises feitas pelos estudantes podem ser usadas como avaliação para os conceitos envolvidos na atividade.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 134)

3. Existem dois tipos de radiação ultravioleta que atingem a Terra: ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB). Ambas provocam lesões na pele. As lesões causadas pela radiação UVB são mais superficiais, e aquelas causadas pela radiação UVA são mais profundas. Os dois tipos de radiação são prejudiciais. Portanto, deve-se sempre utilizar o filtro solar.

Práticas de Ciências – Transformações gasosas (página 141)

3. O aumento da temperatura tende a aumentar a velocidade das moléculas. Para que a pressão se mantenha constante, é necessário aumentar o volume do recipiente para que não aumente a quantidade de colisões das moléculas com as paredes do recipiente.

Atividades (página 143)

2. a) Afirmação verdadeira. As observações estão de acordo com a Lei de Boyle.

b) Afirmação verdadeira. No zero termodinâmico, $pV = 0$. Como o volume não é nulo, essa expressão só é verdadeira se a pressão for zero.

c) Afirmação verdadeira. Devido ao movimento constante das partículas, um gás se contrai ou se expande para ocupar todo o volume do recipiente que o contém.

d) Afirmação verdadeira. A temperatura é uma medida da agitação das partículas de um gás.

4. a) Afirmação verdadeira, pois as colisões exercem uma força nas paredes do recipiente que corresponde à pressão do gás.

b) Afirmação falsa, pois, ao nível do mar, a massa de ar sobre a superfície da Terra é maior, o que faz a pressão exercida também ser maior.

c) Afirmação falsa. O volume de um gás é igual ao do recipiente que o contém. É, portanto, variável.

7. Nesse caso, deve-se usar a equação que contém as três variáveis, ou seja:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$$\frac{5\ \text{atm} \cdot 2\ \text{L}}{400\ \text{K}} = \frac{2\ \text{atm} \cdot 5{,}5\ \text{L}}{T_2}$$

$$T_2 = 440\ \text{K}$$

CAPÍTULO 2 FUNÇÕES INORGÂNICAS (PÁGINA 144)

Introdução às funções químicas (página 144)

- Neste capítulo, são abordados os grupos dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos e sua importância no cotidiano das pessoas e no setor industrial. No tocante aos óxidos, é dada atenção especial à sua relação com a poluição atmosférica e com o efeito estufa.

Funções inorgânicas (página 145)

- Comece a abordagem do tema diferenciando as classes de compostos orgânicos dos inorgânicos, para mostrar as características de suas composições aos estudantes. Informe a eles que compostos inorgânicos também podem apresentar carbono, do mesmo modo que os compostos orgânicos podem ter metais. Embora carbonatos, CO_3^{2-}, e cianetos, CN^-, tenham carbono, eles se combinam com metais para formar os compostos iônicos. Por outro lado, a hemoglobina do sangue tem Fe^{2+} em sua estrutura.

Ácidos (páginas 145 a 147)

- Uma estratégia que facilita o estudo em química é dividir uma série de substâncias em grupos menores, formando um conjunto de propriedades semelhantes. No caso dos ácidos, isso não é diferente: suas propriedades fazem com que esse grupo de materiais seja usado com finalidades específicas. Dentre essas propriedades, destacam-se algumas capacidades, como formar soluções eletrolíticas; dissolver metais, com a consequente produção de gás hidrogênio; reagir com carbonatos e bicarbonatos, formando gás carbônico; e reagir com indicadores ácido-base. Esse estudo favorece o desenvolvimento das habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT307**.
- Desenvolva as habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT307** com a leitura do tópico "Principais ácidos e suas aplicações" (p. 146). Os ácidos apresentados são os mais conhecidos, assim como suas aplicações. Eles são usados, geralmente, em laboratórios didáticos e têm características corrosivas que demandam um manuseio cuidadoso.
- É importante ressaltar para os estudantes que a classificação dos ácidos depende do critério adotado. Por exemplo, o grau de ionização é importante para caracterizar a solução eletrolítica que o ácido formará. Considere a possibilidade de fazer uma demonstração da condutibilidade de soluções ácidas de mesma concentração, mas de ácidos variados. Conforme o grau de ionização, a capacidade de condução elétrica é maior ou menor, traduzindo a força do ácido. As diretrizes para essa demonstração estão na atividade sugerida na seção *Atividade complementar* (p. 482 deste manual).

Bases (páginas 148 e 149)

- Com a leitura do texto "A história do sabão", do boxe *Ação e cidadania* (p. 148), os estudantes vão constatar que os hidróxidos participam do cotidiano do ser humano desde a Antiguidade, quando, para a fabricação de sabão, eram usados sebo de animais e cinzas de fogueira. Atualmente, existem muitas receitas caseiras de sabão, sem aquecimento, criadas com o reaproveitamento do óleo de cozinha.
- Desenvolva as habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT307** ao apresentar os hidróxidos (p. 148).
- O desenvolvimento da linguagem química pode ser explorado ao abordar a nomenclatura das bases, favorecendo o trabalho com a competência geral **CGEB4**.

Óxidos (páginas 150 a 153)

- Os óxidos se caracterizam por apresentar o oxigênio ligado a átomo(s) de outro elemento, desde que não seja o flúor, que é mais eletronegativo. Em face da grande reatividade e de sua presença na atmosfera, o gás oxigênio provocou o surgimento de inúmeros óxidos, que podem ser diferenciados pela natureza do elemento que acompanha o oxigênio: metal ou ametal.
- A descoberta do oxigênio, por Lavoisier, e da natureza das reações de combustão mudou as teorias da época e propiciou o desenvolvimento da ciência. O texto do boxe *Ação e cidadania* (p. 150), fornece informações sobre o uso de óxidos na pintura corporal feita pelos Caiapó. Esse boxe pode ser trabalhado em parceria com o(a) professor(a) de História para explorar o tema contemporâneo transversal **Diversidade cultural**, da área Multiculturalismo, na abordagem do uso de substâncias minerais em utensílios e na produção de corantes. Além disso, a competência geral **CGEB7** pode ser mobilizada ao propor aos estudantes que argumentem sobre a importância dos conhecimentos indígenas sobre corantes para a indústria.
- Em razão da diversidade dos compostos de óxido, adotou-se como critério de classificação o comportamento desses materiais quando em contato com água, ácidos e bases. Atenção especial deve ser dispensada à classe dos peróxidos, que apresentam uma característica diferenciada pelo grupo $-O-O-$, que aumenta sua reatividade. O peróxido mais conhecido é o de hidrogênio, principal constituinte da água oxigenada, devido a sua aplicação como descolorante de cabelos e como antisséptico.
- Desenvolva as habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT307** ao apresentar aos estudantes o tópico "Óxidos, efeito estufa e aquecimento global" (p. 151). O monóxido de carbono e o dióxido de carbono são encontrados na forma gasosa. O primeiro é utilizado para transformar o minério de ferro em metal, enquanto o segundo é um dos reagentes da fotossíntese. Ambos, porém, podem acarretar consequências ambientais inadequadas: o CO_2 é um dos responsáveis pelo aquecimento global, e o CO é um gás venenoso para os vertebrados.
- Ainda neste tópico, promova uma discussão com os estudantes sobre o negacionismo climático, que pode ser considerado um exemplo de pós-verdade.
- Os óxidos gasosos sempre estiveram presentes na atmosfera, mas não na concentração encontrada atualmente. Esse crescimento se deve ao intenso uso dos combustíveis fósseis e à prática das queimadas na agricultura extensiva. Assim, a composição do ar atmosférico está sendo modificada, resultando em perturbações climáticas e em outros problemas que se intensificaram a partir da segunda metade do século XX. A fim de diminuir esses efeitos colaterais indesejáveis, têm-se estudado novas possibilidades de ação e alternativas energéticas sustentáveis, como é o caso dos biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. A discussão desse assunto com a turma favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13CNT105**.

Práticas de Ciências – Simulando a chuva ácida (página 154)

- Esta seção trabalha tanto as competências específicas **CECNTEM2** e **CECNTEM3** quanto a habilidade **EM13CNT301**, buscando desenvolver nos estudantes a capacidade de construir questões, elaborar hipóteses e justificar conclusões, bem como a capacidade de interpretar resultados e realizar previsões das atividades experimentais sobre fenômenos.
- O experimento proposto requer materiais de fácil acesso e que não colocam em risco a integridade física dos estudantes. No entanto, a postura na realização de atividades experimentais deve ser de respeito aos procedimentos e de preservação do local de trabalho. Caso a turma trabalhe em grupos, ressalte a importância da participação de todos os integrantes e a realização das etapas de modo organizado.
- O desenvolvimento desta atividade experimental com os estudantes possibilita o exercício do diálogo, do respeito mútuo e do trabalho em equipe com divisão de tarefas e também da tomada de decisões comuns diante de possíveis contratempos. Essas abordagens estão contempladas nas competências gerais **CGEB9** e **CGEB10**.
- É importante chamar a atenção da turma para o que esse experimento mostra: a interação dos materiais gasosos com a água. Para interpretar os fenômenos de modificação da água da chuva, pelo uso da escala de pH, os estudantes terão de lançar mão de conhecimentos já adquiridos, explorando assim a competência geral **CGEB1**. Além disso, os estudantes exercitarão a curiosidade intelectual ao investigar a causa da chuva ácida, trabalhando a competência geral **CGEB2**. Considere a possibilidade de promover uma discussão sobre o conceito de chuva ácida, visto que o pH da chuva é comumente menor que 7, pela ação do CO_2 atmosférico, e aproveite para explorar a habilidade **EM13CNT105**. Aplica-se esse termo, portanto, a chuvas que apresentam propriedades mais ácidas que o normal, ou seja, aquelas cujo pH está abaixo de 5,64.

Sais (páginas 155 e 156)

- Quando se fala em sal, o que nos vem à mente é o ingrediente culinário que dá sabor salgado aos alimentos. Contudo, muitos sais estão presentes na vida diária. O fermento de bolo, em cuja constituição entra o sal bicarbonato de sódio, é apenas um exemplo. Por isso é importante distinguir o que se entende comumente por sal e o grupo de substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Aproveite os exemplos para trabalhar as habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT307**.
- O que são sais? É importante explicar a definição de sal com uma equação que representa a reação entre uma base e um ácido (p. 155). A afinidade entre o cátion da base e o ânion do ácido e entre o cátion hidrogênio e o ânion hidróxido permite não só prever a formação dos produtos água e sal, como também verificar que os sais são compostos iônicos.
- Trabalhe a habilidade **EM13CNT307** ao abordar algumas aplicações dos sais. O $NaC\ell$ é usado na alimentação, além de auxiliar na exploração do petróleo. Alguns sais são usados

no tratamento de água como floculantes, e outros são matérias-primas na fabricação de giz e gesso, por exemplo.

Ciência tem história – Dissociação eletrolítica (página 157)

- O conteúdo desta seção trata do pioneirismo de Svante Arrhenius, que estabeleceu as bases para o estudo de alguns temas científicos, mesmo sendo questionado em sua época.

FONTES COMPLEMENTARES

- Crespo, L. C. *et al. Ludoteca de química para o Ensino Médio*. Campos dos Goytacazes: Essentia, 2011. Disponível em: http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/quimica/novaeja/m2u13/Mem%C3%B3ria%20Qu%C3%ADmica%20-%20Fun%C3%A7%C3%B5es%20Inorg%C3%A2nicas.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.

  Neste livro, o jogo "Memória química – funções inorgânicas" tem como objetivo educativo trabalhar a nomenclatura de compostos inorgânicos pertencentes às funções ácidos, bases, sais e óxidos.

- *Nosso planeta*. Direção: Alastair Fothergill e Keith Scholey. EUA/Reino Unido, Netflix, 2019 (8 episódios).

  O documentário, com episódios que variam de 49 a 53 min, mostra os impactos do aquecimento global sobre os seres vivos.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Verificando a força de ácidos e bases

O objetivo desta atividade é que os estudantes relacionem a força de ácidos e bases com a intensidade da luminosidade da lâmpada do aparelho do teste de condutibilidade. Sugere-se que essa atividade experimental seja realizada pelo(a) professor(a).

Material

- soluções a 0,1 mol/L de: ácido clorídrico, ácido acético (a solução de ácido acético pode ser substituída por vinagre, diluído 5 vezes), soda cáustica, amônia
- 4 béqueres ou copos de vidro
- 1 aparelho para teste de condutibilidade

Como fazer

1. Coloque, em cada um dos béqueres, 50 mL de cada solução.
2. Faça o teste de condutibilidade, observando a intensidade da luminosidade da lâmpada para cada solução.
3. Peça aos estudantes que anotem o que observaram.

Para discutir

1. A intensidade luminosa da lâmpada variou conforme as diferentes soluções foram testadas? Como? Elaborem uma explicação para os resultados observados.

TEXTO COMPLEMENTAR

Reduzir salinização do solo garante produtividade e favorece o meio ambiente

[...] dia 5 de dezembro é celebrado o Dia Mundial do Solo. De acordo com [a] Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a atividade agrícola ocupa, em média, 5 bilhões de hectares. Isso equivale a 38% da área terrestre do planeta.

Com toda essa área ocupada pela agricultura, existe um potencial enorme para que a atividade tenha um protagonismo na preservação ambiental. Por essa razão, a FAO instituiu o dia 5 de dezembro como o Dia Mundial do Solo.

Para 2021, o mote da data comemorativa é: Pare a salinização do solo, aumente a produtividade do solo.

A salinização é o processo de aumento da concentração de sais solúveis presentes no solo, ao ponto de prejudicar a produtividade e o rendimento das culturas agrícolas. Além disso, a salinização atinge também o meio ambiente, prejudicando a vegetação nativa.

Entretanto, a salinização prejudica o meio ambiente de outra forma: reduzindo a capacidade do solo de capturar carbono, como destaca a Chloride Free, organização internacional sem fins lucrativos que tem como propósito proteger a biodiversidade do solo.

Como a biodiversidade do solo pode ajudar a reduzir os gases do efeito estufa

Os chamados gases do efeito estufa são gases que se acumulam na atmosfera da Terra e ampliam o que é conhecido como efeito estufa. Esse fenômeno faz com que o planeta passe a absorver e reter uma parcela maior da radiação solar.

Como consequência, a temperatura global se eleva, trazendo perturbações e instabilidades para o clima da Terra.

Entretanto, o solo é uma grande potência para reduzir esses fenômenos prejudiciais. Isso porque ele pode ser um sumidouro de gases do efeito estufa, especialmente aqueles que têm carbono em sua composição.

Essa capacidade está ligada aos microrganismos benéficos do solo. De acordo com David Johnson e outros pesquisadores, no artigo *Development of soil microbial communities for promoting sustainability in agriculture and a global carbon fix* [Desenvolvimento de comunidades microbianas do solo para promover a sustentabilidade na agricultura e uma correção global de carbono], solos ricos em biodiversidade conseguem capturar uma quantidade de carbono até 50 vezes maior do que aqueles com uma baixa biodiversidade.

Pensando na área ocupada pela agricultura, isso significa que, se os 5 bilhões de hectares ocupados pela atividade agrícola forem ricos em biodiversidade, eles conseguiriam capturar cerca de 50 bilhões de toneladas de carbono por ano.

[...]

Reduzir salinização do solo garante produtividade e favorece o meio ambiente. Canal Rural, 5 dez. 2021. Disponível em: https://www.canalrural.com.br/agricultura/reduzir-salinizacao-do-solo-garante-produtividade-e-favorece-o-meio-ambiente/. Acesso em: 11 set. 2024.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Sugira à turma a construção de um mapa conceitual. Nesta atividade, os estudantes devem preencher as "caixas" vazias sobre o assunto estudado no capítulo. Utilizando essa ferramenta, eles podem representar, organizar e sistematizar o conhecimento sobre funções inorgânicas.
- Observe um exemplo de mapa conceitual que aborda as funções inorgânicas.



RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 144)

1. O material mais usado na correção de solos ácidos é o calcário, que apresenta características básicas.
3. É provável que os estudantes respondam que o sal se forma a partir da evaporação da água do mar, como citado no capítulo anterior, e considerem que a palavra "sal" remete ao cloreto de sódio, sal usado no cotidiano deles. Instigue os estudantes a pensar se essa é a única maneira de se obter um sal e se não existem outros exemplos de sais.

Espera-se que os estudantes respondam a essas perguntas levando em consideração seus conhecimentos prévios relacionados ao cotidiano. Não menospreze essas informações. Utilize as respostas mencionadas para estimular a construção dos conceitos que serão apresentados ao longo do capítulo.

Roteiro (página 147)

1. Por se tratar de substâncias moleculares, o cloreto de hidrogênio e a água não conduzem corrente elétrica quando estão puros. O HCℓ, quando dissolvido na água, sofre ionização e torna a solução condutora de corrente elétrica. Enfatize que, para que ocorra a condução de corrente elétrica, é necessária a existência de cargas livres e que, neste caso, elas só existirão quando ocorrer o processo de ionização.
2. Quanto maior é o grau de ionização de um ácido, maior será a condutividade da solução.
3. A condutividade depende da quantidade de ácido dissolvida. Quanto maior for essa quantidade, maior será a condutividade da solução.

Ação e cidadania – A história do sabão (página 148)

1. Discuta com os estudantes o papel da ciência e dos cientistas nesse processo de desenvolvimento de novos produtos e metodologias e de que maneira isso afeta o cotidiano de todos.

Ação e cidadania – Substâncias minerais no cotidiano dos povos indígenas (página 150)

1. Explore a utilização dos conhecimentos populares em nosso cotidiano. Discuta como as cores dos pigmentos estão associadas à sua composição e de que forma a indústria pode utilizar esse conhecimento para a produção de novas cores.

Práticas de Ciências – Simulando a chuva ácida (página 154)

1. A queima de enxofre forma o SO_2, que é um óxido ácido. Ao entrar em contato com o extrato, reage com a água formando um ácido, o que provoca a alteração da cor do extrato. Ao soprar sobre a forma, o CO_2 também reage e, por ser também um óxido ácido, muda a cor do extrato. Resgate a escala de pH e o significado de seus valores. Enfatize que a cor vai fornecer apenas o caráter da solução e que não é capaz de determinar o valor do pH. Explore o fato de ambos os experimentos produzirem soluções ácidas.
2. O teste permite verificar se a água de chuva está pouco ou muito ácida. Para fazer relação com a questão anterior, deve-se comparar a cor mostrada pelo indicador. Ressalte o caráter ácido das duas soluções. Explore qual gás é expelido quando se sopra e que relação ele tem com os gases presentes na atmosfera.

3. A resposta depende das observações e da forma como o procedimento for realizado. Espera-se que, se o experimento tiver sido executado de forma adequada, os estudantes observem que as cavidades mais próximas do sopro ficaram com uma cor que evidencia um caráter mais ácido, comparado às cavidades mais distantes. Correlacione essas observações à quantidade de gás presente no sopro à medida que ele se espalha.
4. Ao assoprar o extrato, ele adquiriu a cor que indica o caráter ácido. Como a atmosfera contém CO_2, a chuva é naturalmente ácida. Estimule os estudantes a correlacionar essa informação com o ciclo do carbono estudado no capítulo anterior.

Ciência tem história – Dissociação eletrolítica (página 157)

1. Resposta variável. Alguns exemplos são Galileu Galilei, que foi contestado por propor a teoria heliocêntrica; Rachel Carson, que foi contestada ao criticar o uso do DDT; e Louis Braille, que criou um sistema de escrita e leitura para deficientes visuais que só foi reconhecido muitos anos depois de sua criação.

Atividades (páginas 158 e 159)

1. a) Conduz bem a corrente elétrica porque se trata de um composto iônico que se dissocia em água, liberando os íons K^+ e $C\ell^-$ (íons livres).

   b) Conduz bem a corrente elétrica porque, assim como o $HC\ell$, é um composto molecular que sofre ionização em água, passando a apresentar íons livres.

   c) Não é bom condutor de corrente elétrica, porque o $CaCO_3$ libera pequena quantidade de íons, por ser praticamente insolúvel em água, apesar de ser um composto iônico.

   Explore o tipo de ligação química presente em cada composto citado, assim como seu comportamento ao ser dissolvido em água. Ressalte que, para que haja condução de corrente elétrica, é necessária a existência de cargas livres, que no caso dos compostos citados seriam os íons.

10. Porque o hidróxido de sódio é uma base forte, enquanto o hidróxido de magnésio é uma base fraca.

CAPÍTULO 3 SOLUÇÕES E PROPRIEDADES COLIGATIVAS DAS SOLUÇÕES (PÁGINA 160)

As diferentes propriedades de uma solução de sal de cozinha (página 160)

- A adição de sal à água é um hábito bastante comum. Esta seção apresenta duas situações diferentes em que essa prática é adotada: para acelerar o cozimento de alimentos e para retardar o congelamento da água em regiões onde costuma nevar. Esses exemplos mostram como as propriedades físicas de uma solução são diferentes das propriedades do solvente puro.

As soluções (páginas 161 e 162)

- Apresente os diferentes tipos de solução – sólidas, líquidas e gasosas.
- Para iniciar a discussão sobre as soluções formadas por gases e líquidos, pode ser utilizado o boxe *Química e Biologia* (p. 162). Debata o caso da embolia, causada pela formação de bolhas de gases no sangue de mergulhadores quando estes voltam muito rapidamente de grandes profundidades à superfície.
- Ao abordar as soluções formadas pela mistura de líquidos, utilize as fotos da página 162 para questionar os estudantes sobre o significado da descrição "água oxigenada 10 volumes" e "álcool etílico". Por meio desse questionamento inicial, os estudantes serão capazes de reconhecer mais facilmente a aplicabilidade das soluções líquidas no cotidiano.
- Para soluções formadas pela dissolução de sólidos em líquidos, comente a desidratação e reforce que o soro caseiro – exemplo de solução formada por sólidos e líquidos – é usado para tratá-la. Destaque as causas, o perigo que ela representa e o que fazer para evitá-la.

Relações entre a quantidade de soluto e a de solvente ou a de solução (páginas 163 a 166)

- Ao analisar as unidades de medida de concentração em massa e densidade, um olhar desatento pode levar os estudantes a pensar que ambas as unidades de medida representam a mesma grandeza. Para evitar esse equívoco, em vez de iniciar a abordagem dos tópicos com as fórmulas, sugerimos que você trate primeiro dos conceitos e das definições. Deve ficar claro para eles que é fundamental saber exatamente o que está sendo medido e que a densidade se baseia na razão entre a massa e o volume da solução, diferentemente da concentração em g/L, em que se considera a razão entre a massa de soluto e o volume da solução.
- De modo a evidenciar a diferença entre as grandezas, solicite aos estudantes a leitura do texto do boxe *De olho no conceito* (p. 164); em seguida, peça a eles que escolham uma massa de sal e um determinado volume de água e calculem a concentração da solução formada pela dissolução do sal na água e sua densidade. Com esse procedimento, é possível comparar os valores e, como consequência, verificar que são completamente diferentes.
- Como os estudantes terão contato com diversas formas de expressar o conteúdo de soluções (desde gramas de soluto por litro de solução até medidas em partes por bilhão), recomenda-se salientar que essas formas constituem diferentes maneiras de expressar concentração e não propriedades físicas inerentes das soluções. Busca-se, com esse esclarecimento, evitar o uso mecânico de fórmulas para a obtenção dos valores numéricos.
- Antes da demonstração do método de cálculo de cada tipo de concentração, apresente aos estudantes a utilização cotidiana e o conceito envolvido. No caso da concentração em partes por bilhão, por exemplo, sugerimos mostrar o resultado de medidas de concentração de poluentes em rios e, então, explicar o significado desses valores, ou seja, as grandezas que estão sendo usadas para montar a razão que resulta na concentração. Na sequência, inicie uma discussão sobre as grandezas que devem ser empregadas no cálculo da concentração em estudo. O objetivo é conscientizar os estudantes de que os diferentes tipos de concentração são proporções e não fórmulas a serem memorizadas. Embora os estudantes de Ensino Médio compreendam e utilizem no cotidiano os conceitos de porcentagem, podem surgir dificuldades quanto à compreensão e ao uso dos conceitos de partes por milhão (ppm) e partes por bilhão (ppb). Por essa razão, estabeleça uma analogia entre esses tipos de medida e a porcentagem, a fim de ilustrar a necessidade de mudança de medida em virtude da baixa concentração estudada. A contextualização do uso de medidas geológicas e a comparação com o uso da porcentagem em medidas probabilísticas podem auxiliar no entendimento de que a diferença de grandeza das medidas gera a necessidade de mudança de unidade para facilitar a representação numérica. Se julgar conveniente, utilize o texto "Diferentes concentrações para

diferentes finalidades", do boxe *Ampliação* da página 166, para discutir o emprego de diferentes concentrações, dependendo da finalidade de determinado produto.

- As atividades do boxe *Ação e cidadania* (p. 165) abordam as regulamentações de trânsito relativas ao consumo de álcool antes de dirigir veículos automotivos. Comente a relação do estado de embriaguez com os acidentes no trânsito. Isso pode promover uma conscientização dos estudantes sobre o assunto, aproximando o conteúdo escolar de situações vivenciadas no cotidiano.

Propriedades coligativas (páginas 167 a 171)

- Para discutir o efeito da adição de um soluto na temperatura de congelamento e de ebulição da solução, peça aos estudantes que tentem responder qual é a ação que o sal, ao ser adicionado à água, exerce sobre a temperatura dela e o porquê de a temperatura de ebulição da água no nível do mar (100 °C) ser maior que a temperatura de ebulição a uma altitude maior.
- Pode-se iniciar a discussão sobre osmose e pressão osmótica a partir de questionamentos envolvendo atividades do cotidiano: "Por que uma salada temperada murcha após algum tempo?"; "Por que a carne-seca e os peixes salgados, como sardinha e bacalhau, podem ser conservados fora da geladeira, e as carnes e peixes frescos não?"; "Por que as frutas cristalizadas duram mais que as frutas frescas?". A discussão envolvendo essas perguntas possui um caráter interdisciplinar por permitir que se estabeleça uma conexão entre Química e Biologia. Converse com o(a) professor(a) de Biologia para verificar se já foi estudada a estrutura celular. Em caso positivo, parta da membrana celular para chegar à noção de membrana semipermeável. Se esse estudo ainda não tiver sido realizado, apresente a membrana semipermeável e, depois, utilize esse conceito para explicar os fenômenos mencionados aqui.
- Relacione o impedimento da tendência de migração do solvente da solução mais diluída para a mais concentrada com a pressão osmótica, de modo que a osmose reversa se torna mais lógica no momento em que a pressão externa aplicada é superior à pressão osmótica. Dê exemplos de obtenção de água potável que se baseiem nesse processo.

Práticas de Ciências – Osmose (página 172)

- Este experimento pode anteceder a explanação sobre osmose, a fim de motivar os estudantes e desenvolver suas habilidades investigativas.
- É preciso certificar-se da segurança do local em que a atividade será realizada e fazer uso dos equipamentos de segurança citados no Livro do Estudante; no caso, óculos de segurança e avental de algodão com mangas compridas.
- Ao final da atividade, lembre-se de descartar os solutos e as misturas de soluto na pia em água corrente e os resíduos de batata no lixo.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Dessalinização (página 173)

- Esta seção trata do processo de dessalinização da água para obtenção de água potável. Apesar de representar uma solução, essa técnica gera impactos ambientais pelo descarte da salmoura, que é um subproduto do processo. A seção desenvolve a competência geral **CGEB2**, e as competências específicas **CECNTEM1** e **CECNTEM3** ao mostrar uma solução tecnológica, baseada em conhecimentos de diferentes áreas, que minimiza impactos socioambientais e melhora as condições de vida, além de analisar uma situação-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza. Promove também o trabalho com as habilidades **EM13CNT101** e **EM13CNT310**, além do tema contemporâneo transversal **Ciência e tecnologia**.

FONTES COMPLEMENTARES

- Aschcroft, F. M. *A vida no limite*: a ciência da sobrevivência. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

  Relato da ciência da sobrevivência e dos desafios que o ser humano enfrenta em ambientes hostis: em grandes altitudes, sob intensa pressão, no calor e no frio extremos. Os capítulos 1 e 2 ("A vida nas alturas" e "A vida sob pressão", respectivamente), em especial, podem ser utilizados para contextualizar a concentração de oxigênio no ar. Excelente instrumento para propostas interdisciplinares com Biologia e Física.

- Oliveira, S. R.; Gouveia, V. P.; Quadros, A. L. Uma reflexão sobre aprendizagem escolar e o uso do conceito de solubilidade/miscibilidade em situações do cotidiano: concepções dos estudantes. *Química Nova na Escola*, v. 31, n. 1, p. 23-30, fev. 2009. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/05-CCD-0508.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.

  O artigo mostra que muitos estudantes tendem a explanar situações do cotidiano usando uma linguagem do senso comum ou por meio de explicações que poderiam ser dadas mesmo por quem não frequentou a escola. A leitura do artigo contribui também para sua própria aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos de e sobre Química, bem como sobre as múltiplas formas de desenvolver as suas atividades de ensino.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As atividades propostas no boxe *Roteiro* ao longo do capítulo e as atividades propostas em *Atividades* podem ser utilizadas como avaliações formativas.
- Durante o desenvolvimento da atividade prática, avalie o envolvimento e a participação dos estudantes. Além disso, utilize as respostas e as conclusões para verificar o aprendizado deles sobre os assuntos abordados no experimento.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Ação e cidadania – O uso do bafômetro (página 165)

1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam a necessidade de existirem leis que proíbam os motoristas de dirigirem caso tenham ingerido bebidas alcoólicas. Esta atividade pode ser usada para trabalhar o tema contemporâneo transversal **Educação para o trânsito**.
2. Cartaz do estudante. Se considerar necessário, auxilie os estudantes na pesquisa de informações para a confecção dos cartazes.

Roteiro (página 169)

2. O desenho pode representar tanto a entrada como a saída de água da célula, desde que seja indicado que o meio exterior é hipotônico ou hipertônico. A osmose é um tipo de transporte passivo, pois permite a entrada e a saída de água das células sem gasto de energia.

Práticas de Ciências – Osmose (página 172)

1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes tenham observado que nada ocorreu na batata controle (I), e que houve liberação de água nas batatas com os solutos (II e III), deixando-as mais moles. Isso pode ser explicado pelo deslocamento das moléculas de água do interior das células da batata (meio hipotônico) para o soluto, água ou sal (meio hipertônico). Isso ocorre devido à diferença de concentração de soluto existente entre o meio externo e o meio interno das células da batata, pois a membrana das células é semipermeável, ou seja, permite a movimentação de água (solvente) entre os meios intra e extracelular.

   Comparando os solutos adicionados nas batatas II e III com os solutos "puros", espera-se que os estudantes percebam que não houve aumento significativo de umidade advinda do ambiente nos solutos "puros" que justificasse a maior quantidade de água nos solutos adicionados nas batatas, e que a quantidade de soluto se manteve a mesma, ou seja, não houve absorção do soluto pelas batatas. Comparando a batata II com a batata III, espera-se que os estudantes concluam que a batata em que foi colocado o açúcar liberou mais água do que a batata em que foi colocado o sal, devido à diferença de massa molar e, consequentemente, de pressão osmótica. Comparando a batata I, controle, com a batata sem o buraco no meio, espera-se que os estudantes percebam que não houve diferença significativa da exposição ao ar (talvez apenas um leve escurecimento). Já as batatas II e III ficaram nitidamente mais moles, ou seja, sofreram plasmólise.

4. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes sugiram colocar a folha de alface murcha em uma vasilha com água (de preferência gelada) de modo que ocorra a difusão de moléculas de água para o interior das células da folha (meio hipertônico), que apresenta maior concentração de solutos do que a água.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Dessalinização (página 173)

1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem, principalmente, a produção de água para consumo animal, o uso no setor agrícola e industrial, além do tratamento de efluentes.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem o uso de tanques para contenção do concentrado salino e o reúso do rejeito salobro na produção de peixes, como a tilápia rosa, e irrigação de mudas de espécies vegetais da Caatinga, como a erva-sal (*Atriplex nummularia*), empregada como alimento para caprinos e ovinos.

Atividades (páginas 174 e 175)

2. Se a solução contém 0,2 mol em 500 mL, a quantidade de matéria em 1 L é 0,4 mol. Portanto, $C = 0{,}4$ mol/L.

3. Em 2 mL do medicamento estão diluidos 30 mg. A concentração é calculada por $\frac{30\text{ mg}}{200\text{ mL}} = 0{,}15$ mg/mL

4. 200 mL —— 335 mg de Ca
   300 mL —— x
   $x = 502{,}5$ mg de Ca
   0,2 L —— 0,335 g de Ca
   1 L —— y
   $y = 1{,}675$ g de Ca
   Portanto, $C = 1{,}675$ g/L.

5. 20 000 L/min = 1 200 000 L/h
   1 L —— $8 \cdot 10^{-5}$ mol
   1 200 000 L —— x
   $x = 96$ mol

6. Se a concentração passará de 2,0 mol/L para 3,0 mol/L e não há variação de volume, deve-se adicionar 1 mol de KOH, ou seja, 56 g de KOH.

8. Alternativa **b**. Quanto maior é a concentração de íons na solução, maior é a temperatura de ebulição.

9. **a)** 360 g de água equivalem a 20 mol de água.

$$x_{\text{solvente}} = \frac{20}{21} = 0{,}952$$
$$p_{\text{solução}} = x_{\text{solvente}} \cdot p_{\text{solvente puro}}$$
$$p_{\text{solução}} = 0{,}95 \cdot 3{,}2 = 3{,}04 \text{ kPa}$$

   b) Como a fração molar de solvente deve ser a mesma, é necessário 1 mol de sacarose, que equivale a 342 g.

10. A afirmação não está correta, pois o aumento da concentração do soluto provoca o aumento da temperatura de ebulição da solução.

12. O estudante B apresentou a explicação correta, pois, com a adição de um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição aumenta devido à diminuição da pressão de vapor do solvente, ocasionada pela interação entre as moléculas de soluto e de solvente.

17. Se a concentração do soro for diferente da concentração nos fluidos sanguíneos, ocorrerá o fenômeno de osmose, ou seja, haverá passagem de solvente do meio mais diluído para o mais concentrado, o que poderá levar o paciente à morte.

18. O estudante B está correto. A solução de 0,6 mol/L de cloreto de sódio tem uma concentração de íons equivalente a 1,2 mol/L, uma vez que ocorre dissociação total desse sal (0,6 mol/L de Na^+ e 0,6 mol/L de $C\ell^-$). Essa solução é, portanto, mais concentrada que a solução de sacarose (1,0 mol/L).

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 176 A 179)

Pensando Ciências – Como descobrir se o leite foi adulterado? (páginas 176 e 177)

- Aproveite a etapa "Reconhecendo padrões" para retomar os principais tipos de reações químicas estudados ao longo da unidade (reações de combustão, fermentação, oxigenação, desidratação, etc.) e ressalte algumas evidências da ocorrência de reações químicas, como mudanças de coloração, formação de bolhas, liberação de odores, luz ou calor, entre outras.
- Ao desenvolver a etapa "Abstraindo o problema", oriente os estudantes a repetir o mesmo exercício de abstração com os demais problemas levantados nesta atividade e a buscar fontes confiáveis na internet para obter as informações necessárias. Essa abordagem trabalha as competências gerais **CGEB2**, **CGEB5** e **CGEB7**, e a habilidade **EM13CNT303**.
- Para cada substância listada, entre as comumente usadas na adulteração do leite (soda cáustica, ureia, formaldeído, peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio, por exemplo), os grupos devem listar em seu algoritmo as etapas envolvidas para a detecção dessas substâncias.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Pensando Ciências – Como descobrir se o leite foi adulterado? (páginas 176 e 177)

1. Respostas variáveis. Espera-se que haja diferenças entre os algoritmos produzidos pelos grupos, tanto nas substâncias a serem detectadas nas amostras como no método

empregado para a detecção de cada uma delas. Contudo, espera-se observar semelhanças de princípios quanto aos métodos de detecção propostos para uma mesma substância; por exemplo, no caso da detecção de soda cáustica, o procedimento deve envolver indicadores de acidez.

2. Respostas variáveis. Muitos dos algoritmos provavelmente não permitirão identificar com exatidão a presença de determinada substância. Por exemplo, o uso de um indicador de acidez apenas mostra que há uma substância ácida ou básica na amostra, mas não necessariamente permite identificá-la. Para isso, é necessário um procedimento específico.

3. Respostas pessoais. Aproveite para falar da importância da participação de cada integrante do grupo na solução do problema. Ressalte que a contribuição de diferentes pessoas na resolução de problemas costuma ser mais eficaz do que o trabalho individual.

Questões globais (páginas 178 e 179)

2. Alternativa **d**. 50 ppm equivalem a 0,4% de 13 000 ppm. Portanto, a redução foi de 99,6%.

4. Alternativa **d**.

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$$\frac{3{,}0 \text{ atm}}{280 \text{ K}} = \frac{p_2}{320 \text{ K}}$$

$p_2 = 3{,}4$ atm

5. Alternativa **d**. 60% de 5 litros = 3 litros são plasma. Se a quantidade máxima de varfarina por litro de sangue é 4,0 mg, em 3 L essa quantidade será igual a 12,0 mg.

A solução aquosa de varfarina tem concentração de 3,0 mg/mL.

3,0 mg —— 1 mL
12,0 mg —— x
$x = 4$ mL

6. Alternativa **d**. 20 ppm: 20 g de chumbo em 1 000 000 g da crosta terrestre.

1 000 000 g —— 20 g de chumbo
100 g —— x
$x = 0{,}002$ g = 2 mg.

7. Alternativa **b**. Como o volume é constante, temos:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\frac{p_1}{320} = \frac{p_2}{440}$$

$p_2 = 1{,}31 \cdot p_1$

9. Alternativas corretas: 02, 04, 08. Correção das incorretas:

01. esses valores se referem à porcentagem em massa de álcool.

16. O álcool se mistura com a água em qualquer proporção.

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**UFU-MG**) Em uma atividade experimental o professor pegou duas garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta.

a) O balão que murchou foi colocado em água quente, pois o aumento da temperatura causou uma contração dos gases da bexiga.

b) O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente, devido ao aumento da temperatura do sistema e à expansão dos gases presentes na bexiga.

c) O volume do balão que foi colocado em água fria diminuiu, porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo o choque das partículas de gás com as paredes do balão.

d) Em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado, porque o tamanho das partículas de gás foi modificado.

Alternativa **b**. A elevação da temperatura provoca o aumento do volume ocupado pelo ar, como enunciado pela lei de Gay-Lussac.

2. (**Enem**) Ácido muriático (ou ácido clorídrico comercial) é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Sua aplicação em resíduos contendo quantidades apreciáveis de $CaCO_3$ resulta na liberação de um gás. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante seu uso.

A fórmula do gás citado no texto e um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença são, respectivamente:

a) CO_2 e borbulhá-lo em solução de $KC\ell$.

b) CO_2 e borbulhá-lo em solução de HNO_3.

c) H_2 e borbulhá-lo em solução de NaOH.

d) H_2 e borbulhá-lo em solução de H_2SO_4.

e) CO_2 e borbulhá-lo em solução de $Ba(OH)_2$.

Alternativa **e**. A equação a seguir mostra a reação entre o $CaCO_3$ e o $HC\ell$: $CaCO_3 + 2\ HC\ell \rightarrow CaC\ell_2 + CO_2 + H_2O$. Portanto, o gás citado é o CO_2. Ao ser borbulhado em uma solução de $Ba(OH)_2$, ocorre a reação $Ba(OH)_2 + CO_2 \rightarrow BaCO_3 + H_2O$. A formação do carbonato de bário ($BaCO_3$) deixa a solução turva, comprovando a reação entre o $Ba(OH)_2$ e o CO_2.

3. (**UFPI**) Em regiões mais áridas do Nordeste, os pescadores preferem os horários mais frios do dia para pescar. De fato, nesses períodos, a pesca é mais farta, porque os peixes vão à superfície em busca de oxigênio (O_2). A maior concentração de O_2 na superfície, nos períodos mais frios, explica-se pelo fato de a:

a) redução na temperatura aumentar a solubilidade de gases em líquidos.

b) redução na temperatura aumentar a constante de dissociação da água.

c) elevação no número de moles de O_2 ocorrer com a redução da pressão.

d) solubilidade de gases em líquidos independer da pressão.

e) elevação na temperatura reduzir a energia de ativação da reação de redução do oxigênio.

Alternativa **a**. Ao contrário do que ocorre com a dissolução da maior parte dos sólidos, em que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, a solubilidade dos gases em água é maior quando a temperatura do solvente é menor.

4 ENERGIA E TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, serão abordados os tópicos de Termoquímica e de Cinética Química. O capítulo 1 trata da energia envolvida nas transformações químicas e do cálculo da variação de energia nas reações químicas. O capítulo 2 aborda a rapidez das reações, a teoria das colisões e os fatores que afetam a rapidez das reações. Ao final da unidade, a seção *Pensando Ciências* permite que os estudantes usem estratégias de pensamento computacional para determinar a quantidade de calorias em uma porção de um determinado alimento.

Os objetivos da unidade se articulam a este e outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas as competências **CGEB1** (valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos), **CGEB2** (exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas), **CGEB4** (utilizar as linguagens matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências e ideias), **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis), **CGEB8** (conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana), **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação), **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida), **CECNTEM2** (analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida para elaborar argumentos e realizar previsões sobre o funcionamento dos seres vivos) e **CECNTEM3** (uso da tecnologia digital). Também são desenvolvidas as competências específicas e as habilidades das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, como a **EM13CNT101** e a **EM13CNT309**.

Sugestão de planejamento

Sugere-se que, nesta unidade, os boxes *Ação e cidadania* (p. 188) e *Química e Biologia* (p. 190) sejam trabalhados em parceria com o(a) professor(a) de Biologia.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Classificar as transformações químicas em endotérmicas e exotérmicas. • Comparar o poder calorífico de diferentes combustíveis. • Compreender como ocorrem as trocas de calor durante as mudanças de estado físico. • Calcular a variação de entalpia em uma reação química por meio da lei de Hess, das energias de ligação ou das entalpias de formação-padrão dos compostos.	CGEB1 CGEB2 CGEB4 CGEB7 CGEB8 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT104 EM13CNT301 EM13CNT302 EM13CNT307 EM13CNT309	Ciência e tecnologia Educação ambiental Educação para o consumo Educação alimentar e nutricional
2	• Compreender o conceito de rapidez das reações químicas. • Compreender como as reações químicas ocorrem de acordo com a teoria das colisões. • Reconhecer o problema causado pelo descarte de sacolas plásticas no ambiente e conhecer alternativas para minimizar o problema. • Compreender os fatores que influenciam a rapidez das reações químicas e suas implicações em situações do dia a dia. • Conhecer o conceito de catalisador e compreender a sua importância em processos biológicos e industriais.	CGEB1 CGEB2 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT104 EM13CNT303 EM13CNT307	Ciência e tecnologia
Fechamento da unidade	• Utilizar estratégias de pensamento computacional para determinar o teor calórico de uma amostra de alimento.	CGEB4 CECNTEM3		

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 180 E 181)

- O processo de amadurecimento de frutas é um bom tema para a contextualização de conteúdos como a rapidez das reações e a energia envolvida nas transformações químicas. Os estudantes podem observar esse processo no dia a dia com várias frutas, e, em geral, já apresentam conhecimentos prévios sobre o tema, possibilitando o trabalho da **CECNTEM2** (analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida para elaborar argumentos e realizar previsões sobre o funcionamento dos seres vivos).

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 180)

1. Além da cor, podem ser observados o odor, a textura e a aparência do alimento. Para algumas frutas, por exemplo, a maciez pode indicar que ela está madura, pois elas praticamente não sofrem alterações de cor durante o processo de amadurecimento. Já outras frutas exalam um aroma mais forte quando estão maduras.

CAPÍTULO 1 TERMOQUÍMICA (PÁGINA 182)

- As atividades propostas na abertura do capítulo podem ser utilizadas para avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca da energia usada pelo corpo humano para o funcionamento dos órgãos e para realizar as atividades do dia a dia. A atividade 3 pode ser usada para expandir a discussão, abordando o uso da energia pelos seres humanos em diferentes atividades e as consequências do aumento desse consumo para a intensificação do aquecimento global.

A energia dos alimentos é química (página 182)

- O capítulo começa explicando que o organismo obtém energia dos macronutrientes presentes nos alimentos, por meio do metabolismo celular.

Transformações exotérmicas e endotérmicas (página 183)

- Com o auxílio do esquema da página 183, explique aos estudantes a diferença entre as reações endotérmicas e as reações exotérmicas, questionando se eles conhecem exemplos de transformações químicas que absorvem ou liberam calor. Se considerar necessário, retome a lei da conservação da energia explorando o texto do boxe *De olho no conceito* (p. 183).
- Explique a eles como identificar se uma reação é endotérmica ou exotérmica por meio dos diagramas de entalpia. Eles são muito utilizados no estudo da Termoquímica, pois mostram de forma visual e intuitiva a variação de energia em um processo químico.

Energia envolvida nas transformações (página 184)

- Neste tópico é explicado como se obtém a energia envolvida em uma reação química com o uso de uma bomba calorimétrica. Utilize o esquema da bomba calorimétrica para explicar o funcionamento dela aos estudantes.
- As atividades do boxe *Roteiro* (p. 184) trazem situações que envolvem o uso da bomba calorimétrica.
- O boxe *Ampliação* (p. 184) aborda o dispositivo criado por Joule para demonstrar que a energia potencial gravitacional poderia ser transformada em calor. Faça uma analogia desse dispositivo com a bomba calorimétrica, na qual a energia química é transformada em calor. Dessa forma, trabalham-se as competências gerais **CGEB1** (valorizar os conhecimentos historicamente construídos) e **CGEB2** (recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses).
- O objeto digital *A evolução dos termômetros* traz uma linha do tempo desde a evolução do entendimento dos princípios físicos envolvidos, passando pela definição das escalas de temperatura, até a construção e aprimoramento dos termômetros conhecidos atualmente. Aproveite a oportunidade para discutir a importância dos instrumentos de medida para a evolução da ciência, promovendo a competência geral **CGEB1**.

Poder calorífico de um combustível e calor de combustão (página 185)

- As implicações ambientais da queima de combustíveis podem ser trabalhadas neste momento. A comparação da entalpia de combustão dos diferentes combustíveis pode ser empregada como recurso para identificar o combustível mais eficiente em termos energéticos.
- O boxe *Ação e cidadania* (p. 185) promove a discussão sobre a escolha entre um combustível fóssil e um combustível renovável.
- O texto sobre o uso de biocombustíveis indicado na seção *Fontes complementares* (p. 490 deste Manual) pode propiciar um debate sobre as matrizes energéticas de combustíveis. Se considerar pertinente, compartilhe com os estudantes o texto sobre eficiência energética da seção *Texto complementar* (p. 491 deste Manual).
- Este tópico mobiliza as competências gerais **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para defender decisões comuns que respeitem e promovam a consciência socioambiental) e **CGEB10** (agir coletivamente tomando decisões com base em princípios sustentáveis), e as competências específicas **CECNTEM1** (analisar processos tecnológicos para propor ações coletivas que minimizem impactos socioambientais) e **CECNTEM3** (utilizar procedimentos próprios das Ciências da Natureza para propor soluções que considerem demandas globais). Também é promovido o trabalho com as habilidades **EM13CNT101**, **EM13CNT301** e **EM13CNT309**, e com os temas contemporâneos transversais **Ciência e tecnologia**, **Educação ambiental** e **Educação para o consumo**.

Entalpia e variação de entalpia de reação (páginas 186 a 188)

- O boxe *Ciência se discute* (p. 187) promove o trabalho com as habilidades **EM13CNT104** (avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao ambiente, considerando reatividade) e **EM13CNT307** (analisar as propriedades específicas dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações).
- O boxe *Ação e cidadania* (p. 188) aborda a rotulagem com a composição dos alimentos, inclusive o rótulo frontal que informa sobre o excesso de açúcar adicionado, gordura saturada

saturada ou sódio, estabelecido pela legislação brasileira em 2022. Além disso, este conteúdo promove o trabalho com as competências gerais **CGEB8** (conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana) e **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios inclusivos e sustentáveis).

SUGESTÃO DE AULA

- Nesse tema, um trabalho sobre a composição dos alimentos e os problemas causados pelo consumo de alimentos ultraprocessados ajudará a conscientizar os estudantes sobre alguns cuidados com a saúde. Por isso, sugere-se planejar uma aula em parceria com o(a) professor(a) de Biologia para que eles reflitam sobre seus hábitos alimentares. Na véspera da atividade, divida a turma em grupos de três estudantes, e peça a cada grupo que traga um alimento industrializado ou a foto de um rótulo desse tipo de alimento que contenha alta quantidade de gordura saturada ou açúcar adicionado.
- O(A) professor(a) de Biologia pode trazer informações sobre as consequências para a saúde de uma alimentação hipercalórica e da ingestão de açúcar e gorduras em grande quantidade. Sugere-se aproveitar a oportunidade também para trazer a discussão sobre como o consumo de alimentos ultraprocessados pode aumentar o risco de sintomas de ansiedade, de depressão e até de declínio cognitivo (Alejandro, D. Como os alimentos ultraprocessados afetam nossa saúde mental. *Veja Saúde*, 2 jun. 2023. Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/como-os-alimentos-ultraprocessados-afetam-nossa-saude-mental. Acesso em: 21 out. 2024.), trabalhando o tema contemporâneo transversal **Educação alimentar e nutricional**.
- Usando as informações dos rótulos trazidos pelos estudantes, peça a eles que calculem a quantidade de nutrientes contida no alimento que trouxeram. Lembre-os de que os valores apresentados no rótulo referem-se a uma porção daquele alimento.
- Em seguida, reúna os valores calculados e mostre que a ingestão de alguns deles pode fazer com que se atinja a quantidade diária de calorias necessárias, mostrando que devem evitar o consumo desses alimentos ou ingerir pequenas porções. Ao final, sugere-se realizar uma roda de conversa sobre como a condição socioeconômica de uma população está relacionada com o tipo e a variedade de alimentos consumidos.

Lei de Hess (página 189)

- O trabalho com este tópico não deve focar apenas em usar a lei de Hess como um algoritmo para o cálculo do ΔH. Desde que os conceitos prévios tenham sido bem assimilados, o seu uso é bastante vantajoso. Por exemplo, o conceito de entalpia por quantidade de matéria deve estar bem assimilado, para que os estudantes compreendam a necessidade de multiplicar os valores de ΔH em algumas situações.
- O texto do boxe *Química e Biologia* (p. 190) mostra como a lei de Hess é uma alternativa para o cálculo do conteúdo energético de alguns alimentos em que o uso da bomba calorimétrica não gera resultados confiáveis.

Energia de ligação (páginas 190 e 191)

- Ressalte aos estudantes que nem todas as ligações são rompidas para que novas sejam formadas em uma reação química; apresente exemplos, se necessário. Essa noção é importante para evitar concepções alternativas.
- Outra concepção alternativa acerca desse tópico é que o rompimento de ligações libera energia. Ressalte que esse processo é endotérmico, e que a formação de novas ligações é um processo exotérmico.

Entalpia-padrão de formação (ΔH^0_f) (páginas 191 e 192)

- Ao trabalhar esse tópico, é importante explicar aos estudantes que se convencionou que o conteúdo entálpico de cada substância é medido por sua entalpia-padrão de formação, que corresponde à formação de uma substância a partir de substâncias simples. Comente também que se definiu que a entalpia-padrão de formação de uma substância simples, na sua forma mais estável (associada tanto ao estado físico quanto à forma alotrópica), é igual a zero. Isso permite comparar a entalpia-padrão de formação de todas as substâncias em uma escala comum.
- Na página 192 do Livro do Estudante há um exemplo de como calcular o ΔH de uma reação a partir dos valores de entalpia-padrão de formação e com o uso da lei de Hess.

Química e Matemática – Diagramas de entalpia (páginas 193 e 194)

- Em vários conteúdos da Química, a apresentação de informações por meio de recursos visuais é frequente. Em Termoquímica, o uso de diagramas de entalpia é consagrado pela sua capacidade de síntese das informações, consequentemente facilitando a comunicação e a compreensão dos fenômenos estudados. A apresentação de informações por meio de recursos visuais facilita a realização de comparações e a identificação de padrões e tendências entre os dados.
- É importante propiciar aos estudantes oportunidades para que eles construam diagramas e elaborem textos interpretando as informações deles, como é proposto nas atividades desta seção.
- Esta seção promove a competência geral **CGEB4** (utilizar diferentes linguagens) e a específica **CECNTEM3** (avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico utilizando linguagens próprias das Ciências da Natureza). Também mobiliza a habilidade **EM13CNT302**, ao comunicar resultados de análises interpretando gráficos, tabelas e equações.

Práticas de Ciências – Analisando a queima de uma vela (página 195)

- Nesta atividade, os estudantes calcularão a energia liberada na queima de uma vela por meio do aquecimento de uma amostra de água. Auxilie-os na montagem experimental e na tomada de dados, para que sejam respeitadas todas as medidas de segurança. Alternativamente, pode-se realizar o experimento de forma demonstrativa.
- Caso os estudantes apresentem dificuldades para calcular a energia liberada, retome os conceitos de calor sensível e calor latente.

FONTES COMPLEMENTARES

- Cardoso, A. A.; Machado, C. M. D.; Pereira, E. A. Biocombustível, o mito do combustível limpo. *Química Nova na Escola*, n. 28, maio

2008. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc28/03-QS-3207.pdf. Acesso em: 21 out. 2024.

Esse artigo apresenta aspectos ambientais relevantes sobre a produção e o uso do biocombustível, desmitificando a atribuição de "combustível limpo", empregada sobretudo pelos meios de comunicação.

- Nascimento, V. B. A natureza do conhecimento científico e o ensino de ciências. *In*: Carvalho, A. M. P. (org.). *Ensino de ciências:* unindo pesquisa e prática. São Paulo: Pioneira Thomson, 2004.

  Esse trabalho apresenta o resultado de uma ação investigativa, realizada em escolas públicas, envolvendo o conteúdo de termoquímica.

TEXTO COMPLEMENTAR

Eficiência energética e sustentabilidade: qual é a relação?

Eficiência energética tem tudo a ver com sustentabilidade, pois trata-se da utilização dos recursos de forma consciente para atender a necessidades presentes, sem afetar o sustento das gerações futuras. A conservação ambiental é uma das principais razões por trás desse conceito.

Veja bem: os aparelhos utilizados para suprir as necessidades humanas demandam energia, seja eletricidade ou algum tipo de combustível.

Máquinas, meios de transporte, fornos industriais, lâmpadas e inclusive o *smartphone* ou computador no qual você está lendo este texto: tudo precisa de energia e produzir/distribuir energia, em forma de gás, calor ou eletricidade, é um processo muito caro e que promove um grande impacto no meio ambiente.

No entanto, quando essa energia vem de recursos fósseis, todo o ecossistema é comprometido, porque há intensa emissão de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, como a emissão de CO_2, intensificando o aquecimento global e acentuando os impactos negativos causados pelas mudanças climáticas.

É aí que está a relação entre eficiência energética e sustentabilidade.

Ao economizar energia e encontrar alternativas para a sua produção (usando fontes limpas e renováveis), é possível mitigar os danos já causados ao meio ambiente e preservar recursos para as gerações futuras.

Eficiência energética: 6 perguntas respondidas sobre o tema. *Raízen*, 7 out. 2022. Disponível em: https://www.raizen.com.br/blog/eficiencia-energetica. Acesso em: 21 out. 2024.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As atividades propostas nos boxes *Roteiro* (p. 184, 189 e 191) e as apresentadas no final do capítulo podem ser utilizadas como avaliações formativas.
- Caso seja aplicada a sugestão de aula sobre a composição dos alimentos e os problemas causados pelo consumo de alimentos ultraprocessados, os estudantes podem, em uma aula posterior, elaborar um material informativo para a comunidade escolar sobre a importância da leitura de rótulos ao adquirir alimentos, promovendo, assim, o trabalho com a habilidade **EM13CNT302**. Deixe-os livres para escolher a forma de divulgação das informações: cartazes, *folders*, *podcast*, postagens em uma rede social, etc.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Roteiro (página 184)

1. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow Q = 2000 \cdot 1 \cdot 18{,}7 \rightarrow Q = 37400$ cal ou 37,4 kcal

Q = 37,4 kcal para 10 g de glicose, logo Q = 3,74 kcal/g de glicose

2. $Q = 29{,}7 \cdot 0{,}5 = 14{,}85$ kJ

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow 14850 = 250 \cdot 4{,}18 \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T \cong 14{,}2$ °C

Ciência se discute – Alfred Nobel e a invenção da dinamite (página 187)

1. Resposta pessoal. Um cientista pode ser responsabilizado até certo ponto por sua invenção. Por um lado, deve-se considerar as consequências éticas e sociais de uma criação. Por outro lado, uma vez que a invenção está em uso, seu impacto depende das escolhas que a sociedade faz. A responsabilidade não é exclusiva do inventor, mas compartilhada com quem utiliza a invenção e decide como aplicar a tecnologia, o que foge ao controle de seu inventor. É essencial que haja uma educação que promova o uso consciente de novas tecnologias. Assim, tanto os inventores quanto a sociedade devem agir de maneira a minimizar os prejuízos e maximizar os benefícios de seu uso.

Roteiro (página 189)

3. $H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_{subl} = ?$

$H_2O(s) \rightarrow H_2O(\ell)$ $\Delta H_{fus} = 6{,}0$ kJ

$H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_{vap} = 40{,}5$ kJ

Somando-se as duas reações, chegamos à representação da sublimação da água:

$H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_{subl} = 6{,}0 + 40{,}5 = 46{,}5$ kJ/mol

Química e Matemática – Diagramas de entalpia (páginas 193 e 194)

2. a)



b) Se a entalpia de formação dos gases nitrogênio e oxigênio é igual a 0 kJ, a entalpia de 2 mol de NO_2 é de 33 kJ. Portanto, a entalpia de 1 mol de NO_2 é de 16,5 kJ. Usando o diagrama do item anterior, podemos calcular a entalpia do N_2O_4 do seguinte modo: $H(N_2O_4) - 2 \cdot H(NO_2) = -57$ kJ $\rightarrow$ $\rightarrow H(N_2O_4) = -24$ kJ.

3. $\Delta H_{reação} = \Sigma \Delta H_f(\text{produtos}) - \Sigma \Delta H_f(\text{reagentes})$

$\Delta H_{reação} = [8 \cdot \Delta H_f(CO_2(g)) + 9 \cdot \Delta H_f(H_2O(g))] - \Delta H_f(C_8H_{18}(\ell))$

$-5471 = [8 \cdot \Delta H_f(CO_2(g)) + 9 \cdot (-242)] - (-227)$

$8 \cdot \Delta H_f(CO_2(g)) = -5471 + 2405$

$\Delta H_f(CO_2(g)) \cong -383$ kJ/mol

Práticas de Ciências – Analisando a queima de uma vela (página 195)

1. Resposta variável. Para o cálculo utilize a expressão:

$Q_{total} = Q_{aquecimento} + Q_{vaporização}$

$Q_{total} = m_{água} \cdot (T_{final} - T_{inicial}) + m_{evaporada} \cdot 540$

Atividades (páginas 196 e 197)

2. Rearranjando as equações, temos:

$C_{12}H_{26}(\ell) + \frac{37}{2}\cancel{O_2(g)} \rightarrow 12\,\cancel{CO_2(g)} + 13\,\cancel{H_2O(\ell)}$ $\Delta H^0 = -7\,510$ kJ

$6\,\cancel{CO_2(g)} + 7\,\cancel{H_2O(\ell)} \rightarrow C_6H_{14}(g) + \frac{19}{2}\cancel{O_2(g)}$ $\Delta H^0 = +4\,160$ kJ

$2 \cdot [3\,\cancel{CO_2(g)} + 3\,\cancel{H_2O(\ell)} \rightarrow C_3H_6(g) + \frac{9}{2}\cancel{O_2(g)}]$ $\Delta H^0 = 2 \cdot 2\,220$ kJ

$C_{12}H_{26}(\ell) \rightarrow C_6H_{14}(g) + 2\,C_3H_6(g)$ $\Delta H^0 = 1\,090$ kJ/mol

3. A reação **II** libera mais energia do que a reação **I**, pois envolve apenas a formação de ligações químicas C — H; já a transformação **I** envolve o rompimento de ligações C — C e H — H das substâncias simples e formação das ligações C — H do metano. Logo, $|y| > |x|$.

4. 1 mol de CH_3OH apresenta massa de 32 g/mol, logo 160 g correspondem a 5 mol de metanol. Rearranjando as equações fornecidas, tem-se:

$2 \cdot [CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + 3\,H_2(g)]$ $\Delta H = 2 \cdot 206$ kJ

$2 \cdot [2\,H_2(g) + CO(g) \rightarrow CH_3OH(\ell)]$ $\Delta H = 2 \cdot (-128$ kJ$)$

$2\,H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,H_2O(g)$ $\Delta H = -484$ kJ

$2\,CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,CH_3OH(\ell)$ $\Delta H = -328$ kJ (para 2 mol de CH_3OH)

Como 160 g equivalem a 5 mol de metanol, devemos multiplicar o resultado por 2,5. Logo, na obtenção de 160 g de metanol serão liberados $2{,}5 \cdot 328 = 820$ kJ.

5. Combinando-se as equações de combustão segundo a lei de Hess, tem-se:

$C_2H_4(g) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$ $\Delta H = -1\,410$ kJ

$2\,CO_2(g) + 3\,H_2O(\ell) \rightarrow C_2H_5OH(\ell) + 3\,O_2(g)$ $\Delta H = +1\,370$ kJ

$C_2H_4(g) + H_2O(\ell) \rightarrow C_2H_5OH(\ell)$ $\Delta H = -40$ kJ/mol de C_2H_4

7. a) $C_2H_6O(\ell) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 3\,H_2O(\ell)$ $\Delta H = -x$ kJ

$C_2H_6O(g) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 3\,H_2O(\ell)$ $\Delta H = -y$ kJ

A combustão do etanol no estado gasoso libera maior quantidade de energia, pois nesse estado o reagente apresenta maior energia interna, devido à liberdade de movimento das moléculas, havendo uma variação de energia maior até a formação dos produtos, gás carbônico e água. Logo, $|y| > |x|$.

b)



ID/BR

8. b) Não há incoerência, pois a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio envolve rompimento de ligações e formação de ligações para a formação de moléculas de água e gás oxigênio. Logo, há processos endotérmicos e exotérmicos envolvidos, gerando um saldo líquido de liberação de energia no processo.

c) Os 98 kJ indicados na equação termoquímica correspondem ao processo de formação de 0,5 mol de O_2, ou seja, 16 g do gás. Na formação de 4,0 g de O_2, seria liberado um quarto desse valor, ou seja, 24,5 kJ.

9. Ligações rompidas: H — Cℓ (431 kJ/mol) e C ═ C (612 kJ/mol)

Ligações formadas: C — C (−347 kJ/mol), C — H (−413 kJ/mol) e C — Cℓ (−331 kJ/mol)

$\Delta H^0 = 431 + 612 - 347 - 413 - 331 \rightarrow \Delta H^0 = -48$ kJ/mol

10. Usando a equação do processo

$Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \rightarrow 2\ Fe(s) + 3\ CO_2(g)$

pode-se deduzir a equação de somatória das entalpias:

$\Delta H^0_f = [2 \cdot \Delta H^0_f(Fe) + 3 \cdot \Delta H^0_f(CO_2)] - [\Delta H^0_f(Fe_2O_3) + 3 \cdot \Delta H^0_f(CO)]$

Os índices são necessários, pois os valores de entalpia de formação são para um mol da substância, e os coeficientes da reação indicam proporções diferentes de cada substância envolvida. Substituindo pelos valores fornecidos, tem-se:

$\Delta H^0_f = [2 \cdot 0 + 3 \cdot (-393{,}5)] - [(-824{,}2) + 3 \cdot (-110{,}5)]$

$\Delta H^0_f = -1\,180{,}5 + 824{,}2 + 331{,}5$

$\Delta H^0_f = -24{,}8$ kJ

12. A equação de formação do NO_2 seria:

$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g) \qquad \Delta H^0_f = ?$

Pelo diagrama, o valor do $\Delta H^0_f = \dfrac{(180 - 114)}{2}$

Logo, $\Delta H^0_f = 33$ kJ/mol.

CAPÍTULO 2 CINÉTICA QUÍMICA (PÁGINA 198)

- As atividades propostas na abertura do capítulo podem ser utilizadas para avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a rapidez das reações químicas, abordando situações nas quais ocorre a mudança da temperatura ou da superfície de contato dos materiais. Também colabora para promover uma discussão sobre o uso de enzimas fora do ambiente biológico.

As enzimas aceleram as reações químicas (página 198)

- O capítulo inicia mostrando como as enzimas presentes no corpo humano aumentam a velocidade de reações importantes que ocorrem no organismo, em processos como a digestão dos alimentos e a cicatrização.

Rapidez das reações (páginas 199 e 200)

- Apresente a relação matemática que fornece a rapidez de uma reação – a taxa de variação da quantidade de uma substância no decorrer do tempo de reação – e explore suas implicações. É essencial que os estudantes percebam que qualquer grandeza diretamente relacionada com a variação da quantidade de uma substância pode ser utilizada como medida da rapidez de uma reação química. E a assimilação da variação da rapidez de uma reação no decorrer do tempo é igualmente importante, para evitar confusões posteriores.

Como as reações ocorrem? (página 201)

- Inicie este tópico representando algumas transformações, como a síntese do cloreto de hidrogênio [$H_2(g) + Cℓ_2(g) \rightarrow 2\ HCℓ(g)$], da água [$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(g)$] e da amônia [$3\ H_2(g) + N_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$]. Em seguida, solicite aos estudantes um modelo microscópico para explicar essas transformações, promovendo a competência geral **CGEB2** (recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses) e o trabalho com a habilidade **EM13CNT101**. Registre as ideias sugeridas, retome a teoria cinético-molecular e introduza a teoria das colisões. Apresente os diagramas de energia *versus* caminho da reação, por meio dos quais é possível definir energia limiar, complexo ativado e energia de ativação.

Práticas de Ciências – Rapidez de uma reação química (página 202)

- Pode-se iniciar a atividade dividindo a turma em grupos e solicitando a cada equipe a medição do tempo da reação para produzir determinado volume. Como sugestão, estipule os volumes de 20 mL e 40 mL. Se necessário, esta atividade pode ser realizada de maneira demonstrativa.
- Durante a atividade, peça aos estudantes que verifiquem a variação da rapidez da reação com o passar do tempo – a produção de gás torna-se cada vez mais lenta. Isso é explicado pela diminuição da concentração de ácido e a consequente diminuição do número de colisões efetivas.
- Ao final da atividade, dilua as soluções antes de desfazer-se delas na pia.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – A decomposição das sacolas de mercado (página 203)

- O texto da reportagem aborda o uso de fungos para a decomposição de sacolas plásticas. Os pesquisadores estudam métodos de tornar a degradação do plástico mais efetiva.
- Esta seção trabalha as competências **CGEB2** (exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das Ciências para investigar formular e resolver problemas e criar soluções), **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global) e **CECNTEM3** (analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais). Também são mobilizadas as habilidades **EM13CNT101**, **EM13CNT104**, **EM13CNT303** e **EM13CNT307**.

Fatores que alteram a rapidez das transformações químicas (páginas 204 e 205)

- Se julgar pertinente, reproduza em sala a reação com os comprimidos efervescentes inteiro e triturado para facilitar a compreensão da relação entre a superfície de contato dos reagentes e a rapidez da reação. O procedimento para esta atividade está na seção *Atividade complementar* (p. 494 deste Manual).
- Explore com os estudantes a tabela da página 205 do Livro do Estudante. Analise a alteração da rapidez na reação entre o NO e o H_2, pedindo a eles que discutam a influência da concentração dos reagentes.

Catalisadores (página 205)

- Retome o texto de abertura do capítulo sobre a presença de catalisadores biológicos no organismo. Em seguida, explore o gráfico presente no Livro do Estudante (p. 205), explicando que a diminuição da energia de ativação se justifica pela participação dos catalisadores na formação do complexo ativado.
- Se houver possibilidade, sugere-se organizar uma visita a uma indústria da região que utilize catalisadores em seu processo produtivo para que os estudantes tenham contato com esse cenário e percebam também a escala em que as reações industriais ocorrem.

Ciência tem história – O conceito de catalisador (página 206)

- O texto desta seção mostra como o conceito de catalisador foi definido apenas no século XIX, apesar de existirem registros de experimentos com catalisadores desde o século XVI. Dessa forma, é trabalhada a competência geral **CGEB1** (valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico para entender e explicar a realidade) e o tema contemporâneo transversal **Ciência e tecnologia**.

FONTE COMPLEMENTAR

- Souza, A. A.; Farias, R. F. *Cinética química*: teoria e prática. Campinas: Átomo, 2008.

  Além da fundamentação teórica desenvolvida para o ensino de nível superior ou técnico, os dois autores do livro apresentam alguns experimentos que utilizam apenas materiais normalmente encontrados nos laboratórios de Química.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Efeito da superfície de contato

O objetivo desta atividade é observar o efeito da variação da superfície de contato de um reagente, no caso um comprimido efervescente, sobre a rapidez da reação.

Material

- água
- 3 béqueres de 100 mL ou copos de vidro com volume maior do que 100 mL
- um comprimido efervescente
- cronômetro
- colher metálica
- proveta de 100 mL ou copo medidor

Como fazer

1. Divida o comprimido efervescente em três partes iguais.
2. Adicione uma das partes do comprimido a um béquer ou copo contendo 50 mL de água.
3. Com o auxílio do cronômetro, anote o tempo decorrido até o dissolução total do comprimido.
4. Repita o procedimento, desta vez adicionando ao béquer ou copo com água outra parte do comprimido, e divida novamente em três partes. Anote o tempo de reação.
5. Com o auxílio da colher metálica, triture a última parte do comprimido e adicione a um béquer ou copo com água. Anote o tempo de reação.
6. Compare os tempos de reação e discuta com a turma como a mudança da superfície de contato altera a rapidez da reação.

Após o final da atividade, as soluções podem ser descartadas na pia.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As atividades propostas no final do capítulo podem ser utilizadas como avaliações formativas.
- Os estudantes podem elaborar uma síntese sobre os fatores que alteram a velocidade das reações, pesquisando outros exemplos de situações cotidianas. Também pode ser proposta uma pesquisa sobre o uso e o desenvolvimento de catalisadores na indústria química.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Práticas de Ciências – Rapidez de uma reação química (página 202)

2. Resposta pessoal. Espera-se que os valores de tempo sejam semelhantes aos valores obtidos pelos outros grupos.

Atividades (página 207)

3. a) $T = -120\ °C$:

$$\text{Rapidez média}_{(10-110)} = \frac{|900 - 1\,500|}{100} = 6\ \text{mg/dia}$$

$T = -180\ °C$:

$$\text{Rapidez média}_{(10-110)} = \frac{|1\,250 - 1\,500|}{100} = 2{,}5\ \text{mg/dia}$$

b) A degradação foi maior a −120 °C, que é uma temperatura maior do que −180 °C, pois a rapidez da degradação é diretamente proporcional ao aumento da temperatura.

4. a) Fator: superfície de contato maior. Gravetos de madeira possuem maior superfície de contato, o que faz com que a interação química com o oxigênio do ar seja mais rápida.

b) Fator: temperatura. Alimentos se conservam por mais tempo quando armazenados na geladeira, já que a temperatura do ambiente é menor, fazendo com que a rapidez das interações químicas que degradam os alimentos seja menor.

c) Fator: catalisador. Algumas interações químicas precisam de catalisadores, que são substâncias que diminuem a energia de ativação, tornando a rapidez maior.

d) Fator: concentração. Quando se abana o carvão, mais oxigênio entra em contato com ele, aumentando a concentração desse reagente, o que torna a rapidez da interação química maior.

5. b)



Ilustrações: AMJ Studio/ID/BR

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 208 A 211)

Pensando Ciências – Como se determina a quantidade de calorias de um alimento?
(páginas 208 e 209)

- Nesta seção, os estudantes devem elaborar um algoritmo para determinar o teor calórico de uma amostra de alimento. Esse é um problema presente no dia a dia da indústria alimentícia, por exemplo.
- Esta seção trabalha a competência geral **CGEB4** (utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações) e a específica **CECNTEM3** (analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza para propor soluções).

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Pensando Ciências – Como se determina a quantidade de calorias de um alimento?
(páginas 208 e 209)

1. O abacate apresenta massa 40 vezes maior do que a amostra citada no texto. Logo:
Teor calórico dos carboidratos: 40 · 0,6 g · 4 kcal/g = 96 kcal
Teor calórico das proteínas: 40 · 0,12 g · 4 kcal/g = 19,2 kcal
Teor calórico das gorduras: 40 · 1,2 g · 9 kcal/g = 432 kcal
Portanto, o teor calórico total é de 547,2 kcal.

Questões globais (páginas 210 e 211)

1. a) $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2\ HI(g)$

b) 43,8 kcal (obtida pelo gráfico).

c) 3,0 kcal (obtido pelo gráfico).

d) A reação é endotérmica, uma vez que o produto apresenta maior energia do que os reagentes ($\Delta H_{reação} > 0$).

2. b)



3. Alternativa **c**. Na condensação, o vapor perde calor para o ambiente ao passar para o estado líquido. Portanto, o processo é exotérmico. Na fusão, o sólido absorve calor do ambiente para passar para o estado líquido. Portanto, o processo é endotérmico.

4. Alternativa **b**. Algumas espécies químicas intermediárias instáveis são formadas durante uma reação química. Elas apresentam tempo de vida muito baixo (da ordem de femtossegundos). Identificar essas espécies pode contribuir, por exemplo, para a escolha de um catalisador para aquela reação.

5. Alternativa **a**. Pela reação dada, pode-se afirmar que a oxidação de 1 mol de glicose, que contém 180 g, fornece 2 800 kJ. Portanto, na oxidação de 10 g de glicose, obtém-se $\frac{2800}{180} \cdot 10 = 155{,}6$ kJ. Apenas 40% dessa energia é disponibilizada para a atividade muscular: $\frac{40}{100} \cdot 155{,}6 = 62{,}2$ kJ

6. Alternativa **c**. Consultando a tabela, pode-se afirmar que as reações ocorreram com maior rapidez nos experimentos 2 e 4. Como o experimento 4 apresenta concentração dos reagentes e temperatura menor do que o experimento 2, conclui-se que esse aumento na rapidez se dá pela presença de um catalisador.

7. Alternativa **e**. Para que o carbono e o gás oxigênio reajam, é necessário fornecer uma energia de ativação.

8. Alternativa **a**. Comparando o sistema 1 e o sistema 2, pode-se observar que ocorre uma contração de volume, aumentando o número de colisões efetivas. Portanto, V1 < V2. Comparando o sistema 1 e o sistema 3, pode-se observar um aumento da concentração dos reagentes. Portanto, V1 < V3.

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**Enem**) Ao beber uma solução de glicose ($C_6H_{12}O_6$), um cortador de cana ingere uma substância:

a) que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo.

b) inflamável que, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células.

c) que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo.

d) insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo.

e) de sabor adocicado que, utilizada na respiração celular, fornece CO_2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera.

Alternativa **a**. A degradação da glicose produz energia para o corpo humano. Alternativas incorretas: **b)** a glicose não é queimada pelo organismo; **c)** o organismo obtém o oxigênio por meio da respiração; **d)** a glicose é solúvel em água; **e)** a respiração celular aumenta a taxa de carbono na atmosfera.

2. (**UEPB**) Dadas as equações de reações químicas abaixo, responda a questão.

I. Metano + Ar $\xrightarrow{E}$ produtos $\Delta H° = -802$ (kJ/mol)

II. $HC\ell + KOH \longrightarrow$ produtos $\Delta H° = -55$ (kJ/mol)

III. $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta}$ produtos $\Delta H° = +178{,}2$ (kJ/mol)

Julgue os itens a seguir relativos às reações químicas dadas.

I – As reações I e II são exotérmicas.

II – Todas as reações liberam energia na forma de calor.

III – A reação II é endotérmica.

IV – Para promover a reação III, a reação I é mais eficiente que a II, pois libera mais calor.

Estão corretas:

a) Apenas II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e IV.

d) Apenas III e IV.

e) Todas.

Alternativa **c**. Análise dos itens: I. Correto, pois o ΔH mostra que a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. II. Incorreto, pois na reação III a energia dos produtos é maior do que a energia do reagente. III. Incorreto, pois o ΔH mostra que a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. IV. Correta, pois a reação I libera, aproximadamente, 14,5 vezes mais calor do que a reação II.

3. (**Acafe-SC**) Considere a reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio:

$$2\ N_2O_5 \longrightarrow 4\ NO_2 + O_2$$

Considerando que a velocidade de desaparecimento do pentóxido de dinitrogênio seja de $6 \cdot 10^{-3}$ mol · $L^{-1} \cdot s^{-1}$, assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a velocidade de aparecimento de NO_2 expressa em mol · $L^{-1} \cdot s^{-1}$.

a) $1{,}8 \cdot 10^{-3}$

b) $24 \cdot 10^{-3}$

c) $6 \cdot 10^{-3}$

d) $12 \cdot 10^{-3}$

Alternativa **d**. A relação entre velocidade de aparecimento do NO_2 e a velocidade de desaparecimento do N_2O_5 é dada pelos coeficientes estequiométricos da reação. Como são formados 4 mol de NO_2 para 2 mol de N_2O_5 consumidos:

$v(NO_2) = 2 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 12 \cdot 10^{-3}$ mol · $L^{-1} \cdot s^{-1}$.

4. (**UFG-GO**) A água oxigenada comercial é uma solução de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) que pode ser encontrada nas concentrações de 3, 6 ou 9% (m/v). Essas concentrações correspondem a 10, 20 e 30 volumes de oxigênio liberado por litro de H_2O_2 decomposto. Considere a reação de decomposição do H_2O_2 apresentada a seguir:

$$2\ H_2O_2(aq) \longrightarrow 2\ H_2O(aq) + O_2(g)$$

Qual gráfico representa a cinética de distribuição das concentrações das espécies presentes nessa reação?

a)



Ilustrações: UFG-GO. Fac-símile: ID/BR

b)



c)



d)



e)



Alternativa **c**. Transcorrida a reação, a concentração de H_2O_2 deve diminuir e as concentrações de O_2 e H_2O devem aumentar. Como são formados 2 mol de H_2O para cada mol de O_2, a concentração de H_2O no final da reação deve ser maior.

1 PRODUTOS QUÍMICOS EM CASA: MANUAL PARA IDENTIFICAÇÃO, USO E ARMAZENAGEM

INTRODUÇÃO

Produtos de limpeza são utilizados em praticamente todas as residências, na faxina e na desinfecção dos ambientes. No entanto, muitas pessoas que utilizam esses produtos acabam se esquecendo de que quase todos eles, independentemente do tipo (detergente, alvejante, desinfetante, etc.) e da destinação, apresentam em suas formulações substâncias químicas com efeitos tóxicos para a saúde humana. Entre os acidentes mais comuns pelo uso e armazenamento inadequados de produtos de limpeza, estão intoxicações, queimaduras e danos ao sistema respiratório e às funções neurológicas.

De modo geral, para o uso seguro desses produtos, recomenda-se que seja utilizada a quantidade indicada pelo fabricante e que a aplicação deles ocorra em locais abertos ou bem ventilados, e que se evite misturar produtos diferentes.

Este projeto é relevante ao propiciar que os estudantes associem os conteúdos de Química com a realidade deles e elaborem um manual para conscientizar as comunidades escolar e local da utilização e do armazenamento seguros de produtos de limpeza.

O projeto também contribui para o desenvolvimento da competência geral da Educação Básica **CGEB2**, ao estimular a curiosidade intelectual, o pensamento científico, crítico e criativo na elaboração do manual de produtos químicos domésticos; da competência geral **CGEB4**, ao demandar a comunicação e o uso de diferentes linguagens na elaboração do manual; e da competência geral **CGEB5**, ao favorecer a compreensão e a utilização de tecnologias digitais tanto para a elaboração do manual em formato digital como para o seu compartilhamento nas redes sociais.

Sugestão de planejamento

Este projeto foi pensado para ser executado ao longo de um semestre, totalizando oito aulas específicas para sua execução. Contudo, avalie se, no decorrer do semestre, essa periodização e a quantidade de aulas específicas para a execução do projeto são a melhor opção para sua turma, fazendo as adaptações que julgar necessárias.

MAPA DO PROJETO

ETAPA	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Preparação	• Investigar informações sobre os produtos químicos de uso doméstico. • Definir o público-alvo do manual e as informações mais relevantes a serem divulgadas.	CGEB2 CECNTEM3	EM13CNT306 EM13CNT307	
Desenvolvimento	• Confeccionar um manual de identificação, uso e armazenagem que contenha essas informações.	CECNTEM3 CELGGEM7	EM13CNT302 EM13LGG701	
Conclusão	• Divulgar e disponibilizar o manual para a comunidade, em formato físico e/ou *on-line*, visando alcançar o público-alvo.	CGEB5 CECNTEM3	EM13CNT302	Saúde

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

PREPARAÇÃO (PÁGINAS 213 E 214)

- Os questionamentos presentes no tópico "Listando os produtos de limpeza presentes nas residências" possibilitam tanto verificar o conhecimento prévio dos estudantes como também aproximá-los e sensibilizá-los em relação ao tema do projeto.
- Os estudantes podem indicar, entre os produtos de limpeza, o vinagre (ácido acético) e o bicarbonato de sódio. No entanto, vale priorizar apenas os produtos de limpeza que apresentam potencial para causar acidentes domésticos, como intoxicação, envenenamento e queimaduras. Assim, os estudantes vão trabalhar a habilidade **EM13CNT306**. Nesse momento, é importante verificar se eles conhecem algumas precauções relacionadas ao armazenamento de produtos de limpeza, como mantê-los em local fresco e arejado, longe de fontes de calor, entre outros.
- Auxilie os estudantes na organização dos grupos que vão pesquisar os produtos de limpeza e montar as listas que serão distribuídas para o preenchimento entre as pessoas da comunidade escolar e da comunidade local.

- Reforce a importância de realizar essa etapa, uma vez que o conteúdo do manual (produto final do projeto) é variável e dependerá dos itens que os estudantes apontarem na lista inicial. Verifique se os grupos precisam de auxílio no registro dos dados coletados, como as quantidades absolutas e a proporção, em porcentagem, dos produtos mais utilizados.
- Se julgar pertinente, comente com os estudantes que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a higienização frequente das mãos reduz em até 40% o risco de contrair doenças como gripe, diarreia, infecção estomacal, conjuntivite e dor de garganta. O artigo da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, disponível em: https://saude.se.gov.br/infectologista-alerta-sobre-importancia-de-lavar-as-maos/ (acesso em: 16 set. 2024), alerta sobre a importância de lavar as mãos.
- Durante a execução das atividades previstas no tópico "Investigando as informações sobre os produtos listados" (p. 214), os estudantes vão mobilizar a competência geral **CGEB2** ao recorrer à investigação e à análise crítica e a habilidade **EM13CNT307** ao analisar as propriedades de materiais para avaliar a aplicação de seu uso em atividades cotidianas.
- É possível que, durante essa etapa, eles manuseiem os produtos de limpeza para encontrar, em seus rótulos, informações sobre os componentes químicos e as advertências de uso e armazenamento; por isso, previna-os dos riscos durante o manuseio. Providencie equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, óculos e máscaras, e recomende aos estudantes que os utilizem, se necessário.
- Motive os estudantes a analisar a qualidade da comunicação nos avisos e nas recomendações de segurança, verificando, por exemplo, se são visíveis e se a linguagem é clara e de fácil compreensão para a maioria das pessoas.

DESENVOLVIMENTO (PÁGINAS 214 E 215)

- Nesta etapa, serão trabalhadas a competência específica **CECNTEM3** e a habilidade **EM13CNT302**, de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da competência específica **CELGGEM7** e da habilidade **EM13LGG701**, de Linguagens e suas Tecnologias, visto que os estudantes vão comunicar a públicos diversos o resultado de suas análises e explorar tecnologias digitais para efetuar essa comunicação.
- Para auxiliar na organização do texto do manual, pode-se sugerir aos estudantes que se baseiem nos seguintes critérios: (1) os produtos mais encontrados nas residências; (2) os que apresentam maior risco de acidente, em caso de uso ou de armazenamento inadequado; (3) os produtos cujos rótulos apresentam informações incompletas ou não contenham informações sobre os possíveis riscos na manipulação ou no armazenamento inadequado.
- No tópico "Refinando o manual e ajustando detalhes do evento", ressalte aos estudantes que avaliem criteriosamente a necessidade de realizar os ajustes de conteúdo e/ou de diagramação do fôlder, do manual, do panfleto e/ou do folheto, com base nas opiniões dos professores que tiveram acesso à versão preliminar.

CONCLUSÃO (PÁGINA 215)

- Nesta etapa, os estudantes poderão desenvolver a competência geral **CGEB5** e a habilidade **EM13CNT302**, uma vez que vão divulgar o manual que elaboraram para um público amplo e variado, utilizando meios digitais, e para a comunidade escolar, por meio de fôlder, panfleto e/ou folheto impresso. Nesta etapa, eles vão apresentar: um manual com informações relevantes para que a comunidade escolar e a comunidade local possam cuidar melhor da saúde, evitando exposição a riscos ao manusear produtos de limpeza em ambientes domésticos. Logo, trabalha-se também o tema contemporâneo transversal **Saúde**.
- Verifique previamente, com a direção da escola, a possibilidade de disponibilizar computadores com acesso à internet para a apresentação do manual.
- Durante a apresentação, oriente os estudantes para que estejam dispostos a esclarecer as dúvidas dos participantes a respeito dos cuidados que se deve ter no uso e no armazenamento de produtos de limpeza. Reforce a importância de ouvirem os visitantes com empatia.
- Após a divulgação e em posse de alguns *feedbacks* do público, proponha uma roda de conversa sobre o que deu certo e o que pode ser melhorado. Procure criar um bom ambiente para a troca de opiniões, enfatizando a relevância do manual para as comunidades escolar e local, avaliando, também, a participação dos estudantes no evento.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

- Investigando as informações sobre os produtos listados.

1. Respostas variáveis, de acordo com o produto listado.
2. Resposta variável, de acordo com o produto listado. É possível que os estudantes apontem intoxicação de crianças, adultos ou animais domésticos, contaminação de ambientes, queimaduras, incêndio, entre outros riscos.
3. Resposta variável, de acordo com o produto listado. Alguns dos riscos possíveis são: o acesso ao produto por parte de pessoas que não tenham discernimento adequado para manuseá-lo ou possam ingeri-lo (bebês e crianças, por exemplo), o armazenamento de inflamáveis junto a fontes de calor, o uso de embalagens não apropriadas que possam gerar vazamento, entre outros riscos.
4. Resposta variável, de acordo com o produto listado. Na ausência de rótulo no produto, essa informação pode ser obtida na internet.
5. Respostas variáveis, de acordo com o produto listado e com a opinião de cada estudante.

FONTE COMPLEMENTAR

- Pinheiro, G. A. *et al*. Conscientização sobre o uso correto de saneantes domissanitários visando a prevenção de acidentes, intoxicações e contaminação ambiental. *Revista Diálogos*, Taguatinga, Universidade Católica de Brasília, v. 19, n. 1, p. 8-16, dez. 2014. Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rdl/article/view/5243/3515. Acesso em: 27 set. 2024.

  O artigo trata de um projeto de conscientização dos trabalhadores domésticos de Campinas e região sobre o manuseio de produtos saneantes para prevenir intoxicações e reações alérgicas, com oficinas e aplicação de questionários para a definição do público-alvo.

5 ELETROQUÍMICA

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, serão abordados os tópicos de reações de oxirredução, pilhas, baterias e eletrólise. O capítulo 1 trata das reações de oxirredução, das características e do funcionamento das pilhas e baterias e do processo de corrosão. O capítulo 2 aborda os processos de eletrólise ígnea e aquosa, suas aplicações e a reciclagem do alumínio.

A unidade também promove o fazer científico, como nas práticas em que os estudantes investigam o enferrujamento de pregos e a cobreação de um objeto metálico. Os estudantes também são instigados na seção *Estudo de Caso* (p. 254), ao conhecer como é feita a manutenção da Estátuda da Liberdade.

Os objetivos da unidade se articulam a este e a outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas as competências gerais da Educação Básica, tais como a **CGEB1** (valorizar o conhecimento historicamente construído), a **CGEB2** (exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas), a **CGEB7** (argumentar com base em dados, fatos e informações confiáveis), a **CGEB9** (exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro) e a **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação), e também competências e habilidades da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, como a competência específica **CECNTEM1** (propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global) e as habilidades **EM13CNT104**, **EM13CNT106, EM13CNT206**, **EM13CNT302** e **EM13CNT307.**

Sugestão de planejamento

A seção *Química e Física* (p. 230) oferece a oportunidade de um trabalho intedisciplinar com Física, ao trabalhar o funcionamento de automóveis e o processo de recarga de pilhas e baterias. A seção *Ciência tem História* (p. 242) pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar com História, pois aborda o contexto histórico do desenvolvimento científico.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Compreender as reações de transferência de elétrons e o conceito de número de oxidação. • Investigar o processo de formação de ferrugem. • Compreender o funcionamento de uma pilha, a partir do modelo da pilha de Daniell. • Identificar os principais tipos de pilhas comerciais, as indicações de uso para cada tipo e a forma correta de descartar esses dispositivos no final de sua vida útil. • Compreender como ocorrem os processos de corrosão nos metais e conhecer métodos para preveni-la.	CGEB1 CGEB2 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM2 CECNTEM3	EM13CNT104 EM13CNT206 EM13CNT301 EM13CNT302 EM13CNT307	Ciência e tecnologia Educação ambiental Saúde
2	• Reconhecer os processos de eletrólise e suas aplicações. • Estabelecer as diferenças entre uma pilha e uma eletrólise. • Compreender a produção do alumínio a partir de seu minério. • Identificar o processo de reciclagem do alumínio e as vantagens ambientais da reciclagem em relação à produção desse metal a partir de seu minério. • Conhecer o processo de eletrodeposição metálica.	CGEB7 CGEB9 CECNTEM1	EM13CNT101 EM13CNT106	Educação ambiental Trabalho
Fechamento da unidade	• Relacionar o processo de manutenção da estátua da Liberdade com o conceito de transferência de elétrons.	CGEB2 CECNTEM3	EM13CNT301	Ciência e tecnologia

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 216 E 217)

- A abertura desta unidade aborda o processo de transferência de elétrons em reações químicas, que é o fundamento para o funcionamento de pilhas e baterias. Veículos elétricos, que são alimentados por baterias recarregáveis, vêm se apresentando como uma alternativa de deslocamento sustentável que proporciona, entre outros benefícios, a diminuição da poluição nas metrópoles.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 216)

3. Se a energia usada para recarga da bateria vier de uma fonte renovável, a contribuição dos veículos elétricos para o aquecimento global é muito menor do que a dos veículos com motor de combustão interna. Além disso, em cidades com trânsito intenso, a substituição dos veículos com motor de combustão interna por veículos elétricos diminui a poluição local.

CAPÍTULO 1 CONTANDO ELÉTRONS (PÁGINA 218)

- As atividades propostas na abertura do capítulo podem ser utilizadas para avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os processos de transferência de elétrons mais conhecidos, como a formação da ferrugem.

Reações envolvendo transferência de elétrons (página 218)

- A discussão sobre o texto inicial do capítulo também pode ser utilizada para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes. Por exemplo, eles podem não identificar nada em comum entre ferrugem, vitamina C e fotossíntese. Esse pode ser um momento oportuno para que eles desenvolvam a competência geral **CGEB2** (promover a curiosidade intelectual, a reflexão e a imaginação para explicar fenômenos naturais).
- Se julgar oportuno, pergunte aos estudantes qual a característica mais evidente no casco da embarcação mostrada nessa página no Livro do Estudante. Provavelmente eles responderão que é a "ferrugem". Você pode aproveitar as respostas para levantar outros aspectos, por exemplo: "Como se forma a ferrugem? " ou "Esse fenômeno é exclusivo da matéria inanimada? Por quê?".
- Reforce a ideia de que ligações e reações químicas, como o processo de oxidação, estão presentes tanto na matéria inanimada quanto nos seres vivos. Trabalha-se, assim, a competência específica **CECNTEM1**, ao se abordar a estrutura da matéria e as transformações químicas.

Reações de oxirredução (página 219)

- Nesse tópico, deixe claro que, em uma reação química de oxirredução, um dos reagentes recebe elétrons e o outro os perde, transformando-se ambos em produtos.
- Enfatize que, em uma reação de oxirredução, um reagente transfere elétrons para o outro. Agente redutor é aquele que fornece elétrons, e agente oxidante, o que recebe elétrons. Antes de descrever o processo das imagens desta página, questione os estudantes sobre o que poderia estar ocorrendo.

Número de oxidação (Nox) (página 219)

- A correta determinação do Nox de cada átomo é fundamental para a identificação do agente redutor e do agente oxidante e para o balanceamento da reação de oxirredução.
- Se julgar necessário, associe o conceito de Nox a cada uma das regras de determinação apresentadas, reescrevendo os exemplos na lousa. Incentive também o raciocínio com base na diferença de eletronegatividade dos átomos. Trata-se de um procedimento mais eficiente do que a simples memorização e que permite uma compreensão mais efetiva da generalização do Nox das substâncias simples e do Nox do oxigênio nas substâncias compostas.
- Aproveite a atividade proposta no boxe *Roteiro* para contextualizar as reações de oxirredução. Você pode também usar o boxe como atividade de pesquisa, sugerindo aos estudantes que analisem a reação de oxirredução.
- Após apresentar o conceito de Nox, comente sobre a recomendação de manter as garrafas de vinho bem vedadas. A seguir, apresente-lhes a reação química de transformação de etanol em ácido acético na presença de gás oxigênio e verifique qual seria a classificação dada por eles a essa reação. Se julgar válido, exercite com os estudantes algumas combinações entre os elementos químicos e seus respectivos Nox.

Nox e as reações de oxirredução (página 221)

- Nesse momento, é importante que os estudantes compreendam que a reação de oxirredução depende da ocorrência conjunta dos processos de oxidação e redução.
- O trabalho com o boxe *Ciência se discute* (p. 221) possibilita desenvolver com os estudantes a competência geral **CGEB1** (valorizar os conhecimentos historicamente construídos sobre os mundos físico, social e cultural). Organize os estudantes em duplas ou em trios para a leitura do texto. Em seguida, utilize a questão para discutir com eles a controvérsia da descoberta do gás oxigênio.
- A compreensão de uma descoberta científica envolve conhecer o contexto social, político e econômico da época. Por isso, se julgar oportuno, reúna-se com o(a) professor(a) de História e/ou de Sociologia para propor uma atividade conjunta sobre o período e o local em que ocorreu a descoberta do gás oxigênio. O trabalho pode partir de questões-problema como "Por que todos os cientistas citados eram homens?", "Eles eram representantes de que classe social?", "Por que só são mencionados europeus?", entre outras.
- É importante deixar claro que controvérsias na ciência é algo comum e que as descobertas podem ser o resultado de um trabalho individual ou de um trabalho conjunto e compartilhado, pois vários cientistas, em diferentes lugares do mundo, podem se interessar sobre um mesmo assunto e chegar a resultados parecidos. Por exemplo, a teoria da evolução biológica baseada na seleção natural elaborada por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace apresentava muitas semelhanças, embora eles tenham desenvolvido suas ideias de modo independente.

Práticas de Ciências – Por que o ferro enferruja? (página 222)

- Esta seção trabalha a competência específica **CECNTEM3** e a habilidade **EM13CNT301**, pois desenvolve nos estudantes a capacidade de construir questões, elaborar hipóteses, interpretar modelos e justificar conclusões, bem como interpretar resultados e realizar previsões em atividades experimentais sobre fenômenos naturais.
- Se necessário, solicite aos estudantes que providenciem os materiais para a prática.
- Na etapa 2 do tópico "Como fazer", estimule os estudantes a ser criativos no momento de escolha, lembrando que é interessante selecionar também alguns materiais que podem (ou não) reagir com o prego, como água pura, água com sal, óleo, vinagre ou outro líquido, que podem ser colocados em um copo (o prego deve ser deixado imerso no líquido) e que geram dados importantes para a análise final. É desejável que, na turma, não haja repetição de locais escolhidos — por

exemplo, se um estudante escolheu deixar o prego dentro da geladeira, evite que outro faça o mesmo.

- Você também pode fazer parte do experimento, levando consigo um prego para casa. É interessante que você, professor(a), disponha de vários pregos em vários ambientes químicos, para poder apresentar os resultados caso não apareçam nas propostas dos estudantes, ou até mesmo para comparar com os resultados observados e testados por eles.
- Você pode utilizar as questões desta seção para realizar uma avaliação formativa, a fim de verificar o aprendizado dos conceitos trabalhados neste capítulo.

Balanceamento de equações de oxirredução (página 223)

- Se necessário, retome com os estudantes o conceito e a aplicação das regras para a determinação do Nox para a obtenção do Nox médio dos elementos. Assim, em uma reação de oxirredução envolvendo compostos orgânicos, por exemplo, nos quais o Nox dos átomos de carbono é geralmente distinto, não é necessário determinar sua variação para cada átomo, já que a variação do Nox médio é suficiente para manter o controle sobre o número de elétrons.
- É importante destacar que o balanceamento de equações mais complexas depende da compreensão de que: 1) o número de elétrons cedidos no processo de oxidação deve ser igual ao dos recebidos no processo de redução; 2) a variação do Nox permite verificar o número de elétrons envolvidos. Para equações mais simples pode-se recorrer ao método de tentativa e erro.

Reações redox e a produção de corrente elétrica (página 224)

- Os conceitos sobre reações de oxirredução podem ser usados como ponto de partida para discutir o funcionamento de uma pilha. Peça aos estudantes que observem o esquema e, em seguida, aborde o processo de oxidação e redução na pilha e introduza os termos "ânodo" e "cátodo".
- Para auxiliar os estudantes a compreender a função da ponte salina, sugerimos que seja desenhada na lousa uma pilha que mostre o deslocamento dos íons na ponte salina, durante seu funcionamento.
- Discuta a constituição do eletrodo-padrão de hidrogênio, como a utilização de um eletrodo de platina. A partir desse ponto, monte duas pilhas na lousa: a primeira constituída de um eletrodo de hidrogênio e um eletrodo de cobre, e a segunda, de um eletrodo de hidrogênio e um de zinco. As diferenças de potencial geradas nas pilhas podem ser tema de uma discussão acerca da tendência dos elementos de sofrerem oxidação ou redução.

Espontaneidade das reações (página 227)

- Um voltímetro ligado a uma célula galvânica fornece a diferença de potencial (tensão) gerada entre os eletrodos. O potencial positivo está associado com uma reação espontânea, e a tensão negativa, com uma reação não espontânea.

Pilhas comerciais (páginas 227 a 229)

- Destaque as diferenças entre a pilha alcalina e a comum, bem como as vantagens da primeira em comparação com a segunda.
- Como o funcionamento das baterias de íon lítio é bastante complexo, não é necessário detalhá-lo; sugerimos apenas destacar suas vantagens — como a maior durabilidade — e os equipamentos em que são utilizadas, como marca-passos e outros aparelhos médicos implantáveis.
- A seção *Ação e cidadania* (p. 228) auxiliará na aplicação de uma abordagem ambiental ao assunto. Promova uma reflexão em sala de aula sobre os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto de pilhas e baterias, com ênfase na toxicidade das substâncias que a constituem. Dessa forma, são trabalhadas a competência geral **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários) e a competência específica **CECNTEM1** (propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global). Também é promovido o trabalho com as habilidades **EM13CNT104**, **EM13CNT206**, **EM13CNT302** e **EM13CNT307** e com os temas contemporâneos transversais **Saúde**; e **Educação ambiental**, da área Meio ambiente.
- O objeto digital *Logística reversa de pilhas e baterias* mostra as etapas do processo de logística reversa desses dispositivos.

Química e Física – Como funciona a recarga de baterias? (página 230)

- O texto desta seção explica a diferença entre baterias recarregáveis e não recarregáveis. Também mostra como ocorre o processo de recarga em uma bateria de íons de lítio, promovendo o tema contemporâneo transversal **Ciência e tecnologia**.

Corrosão de metais: um exemplo de pilha (página 231)

- Destaque que o processo de corrosão, que pode estar associado ou não a esforços mecânicos, consiste na deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio.
- Promova uma discussão sobre a importância das pesquisas de desenvolvimento de materiais mais resistentes à corrosão, como ligas metálicas e polímeros, tendo em vista que o processo de oxidação é responsável pela diminuição da vida útil de vários equipamentos, fato que provoca gastos econômicos consideráveis para a sociedade. Essa discussão também pode abordar temas acerca do mundo do trabalho e dos processos produtivos.
- Desfaça a concepção equivocada de que apenas os metais sofrem corrosão. De início, saliente as diferenças entre a corrosão química e a eletroquímica. A corrosão pode incidir sobre diversos tipos de material, metálicos (aços ou ligas de cobre) ou não metálicos (plástico, cerâmica ou concreto). De maneira geral, os polímeros são atacados por solventes orgânicos. Não se trata de uma corrosão eletroquímica, apesar de sua classificação como corrosão química.
- Sugerimos a montagem de uma pilha em sala de aula e seu acondicionamento em um espaço reservado por dois dias. Caso a pilha de Daniell tenha sido montada conforme recomendado anteriormente, os estudantes poderão observar a deposição no cátodo e o processo de corrosão no ânodo.
- Aproveite essa oportunidade para rever alguns conceitos do tópico anterior, solicitando que os estudantes tentem explicar a corrosão do ânodo observada.

- Questione os estudantes sobre o que pensam das corrosões do alumínio e do ferro. Em geral, a concepção alternativa que eles apresentam é que o ferro se oxida, mas o alumínio não. A partir dessa ideia prévia, trabalhe na lousa as reações de oxidação dos dois metais mencionados, a fim de mostrar os produtos formados e sua coloração.
- O alumínio possui um potencial de redução menor que o do ferro, ou seja, sua tendência a se oxidar é maior. O produto dessa corrosão, porém, é o óxido de alumínio, o qual, em virtude de sua coloração, é praticamente imperceptível, auxiliando inclusive na proteção do próprio metal de forma anódica.

Proteção contra a corrosão (páginas 232 a 234)

- Reforce que a presença do eletrólito é necessária para a ocorrência da corrosão. Na atmosfera, o ar contém umidade, sais em suspensão, gases e poeira. O eletrólito constitui-se de água, na presença de sais ou gases encontrados no ambiente, que se condensa na superfície metálica. Outros constituintes, como poeira e poluentes diversos, podem acelerar o processo corrosivo.
- Questione os estudantes sobre a corrosão observada em objetos ou estruturas metálicas subterrâneas. Os solos contêm umidade, sais minerais e microrganismos. Alguns também apresentam características ácidas ou básicas. Nesse caso, o eletrólito constitui-se principalmente de água com sais dissolvidos.
- Esse tipo de raciocínio fará com que os estudantes compreendam melhor por que determinados equipamentos são mais propensos à corrosão em face do ambiente a que estão expostos.
- Neste momento coloque em discussão como a corrosão dos materiais metálicos está associada ao fato de eles permanecerem expostos ao meio corrosivo e qual é a possibilidade de apresentarem taxas de corrosão baixas e controladas se alguns procedimentos de proteção forem adotados.
- A indústria de tintas pode ser empregada como ponto de partida para o estudo da proteção anódica. Pigmentos anticorrosivos de inibição anódica são adicionados às tintas quando se deseja que elas protejam o material por proteção anódica. Tais pigmentos criam camadas impermeáveis junto ao metal quando os agentes corrosivos atravessam a película da tinta. Alguns pigmentos, por exemplo, possuem em sua composição íons fosfato. Quando o meio corrosivo rompe a película de tinta, esses íons formam camadas impermeáveis que dificultam o processo oxidativo. São exemplos desse tipo de tinta o zarcão, o fosfato de zinco e o silicato de cálcio.
- Explore a utilização do zinco e do magnésio em estruturas de oleodutos, navios e tanques de combustível como exemplos de proteção contra a corrosão. Comente em seguida os benefícios econômicos proporcionados.
- Enfatize as diferenças entre a proteção anódica e a catódica. Na primeira, as tintas e os óxidos impedem o contato do oxigênio e da umidade com a superfície do metal. Já na segunda, o metal é mantido em contato com um material que possui um potencial de oxidação maior do que o dele, o qual atua como ânodo, sofrendo corrosão, enquanto o metal a ser preservado passa a ser o cátodo. Assim se explica a expressão "metal de sacrifício", pois o metal menos nobre é oxidado para proteger o mais nobre. Depois dessa diferenciação, apresente o conceito de ferro galvanizado – isto é, o ferro revestido com uma película de zinco.

FONTES COMPLEMENTARES

- Tolentino, M.; Rocha-Filho, R. C. O bicentenário da invenção da pilha elétrica. *Química Nova na Escola*, v. 11, p. 35-39, maio 2000. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a08.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.

  O artigo apresenta o contexto da invenção da pilha elétrica por Alessandro Volta, citando também os estudos sobre a condução de eletricidade feitos por Luigi Galvani. Esta sugestão de leitura aborda também processos e práticas de investigação que podem ser explorados a partir da história da Química.

- Zelada, L. A. G.; Aidar, H. S. *Vamos ao laboratório?*: experiências de Química para o Ensino Médio. Uberlândia: Edufu, 2016. Disponível em: http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/e-book_vamos_ao_laboratorio_2016_0.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.

  O livro disponibiliza diversas práticas experimentais em Química, com materiais acessíveis e de baixo custo. Pode ser destacado o experimento 26, sobre a montagem de uma pilha.

TEXTO COMPLEMENTAR

O EDTA como conservante

As quantidades-traço de íons metálicos podem catalisar efetivamente a oxidação pelo ar de muitos componentes presentes em comidas e amostras biológicas (por exemplo, as proteínas no sangue). Para prevenir essas reações de oxidação, é importante desativar ou mesmo remover as quantidades-traço desses íons metálicos. Nos alimentos processados, as quantidades-traço dos íons metálicos surgem como resultado do contato com vários recipientes metálicos (tachos e tonéis) durante os estágios de processamento. O EDTA [ácido etilenodiamino tetra acético] é um excelente conservante de alimentos e um ingrediente comum de produtos alimentícios comerciais como maionese, molho de saladas e óleos.

Quando é adicionado aos alimentos, o EDTA se liga tão firmemente à maioria dos íons metálicos que estes são incapazes de catalisar a reação de oxidação pelo ar. O EDTA e outros agentes quelantes semelhantes são frequentemente chamados agentes sequestrantes em virtude de sua habilidade em remover ou desativar íons metálicos. Além do EDTA, alguns outros agentes sequestrantes comuns são os sais de ácido cítrico e ácido fosfórico. Esses agentes podem proteger da oxidação pelo ar as cadeias insaturadas dos triglicerídeos e outros componentes. Essas reações de oxidação são responsáveis por tornar óleos e gorduras rançosos. Os agentes sequestrantes também são adicionados para prevenir a oxidação de compostos facilmente oxidáveis, como o ácido ascórbico.

Em amostras biológicas, é importante adicionar EDTA como conservante se a amostra for estocada por um longo período. Assim como nos alimentos, o EDTA complexa firmemente os íons metálicos e evita que eles catalisem as reações de oxidação pelo ar que podem levar à decomposição de proteínas e de outros constituintes.

[...]

Skoog, D. A. *et al*. *Fundamentos de química analítica*. São Paulo: Cengage Learning, 2014. p. 439.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Debate: por que a água sanitária "mancha" ou descolore tecidos?

- A água sanitária é um dos desinfetantes e alvejantes mais utilizados no dia a dia. À base de hipoclorito, é um produto facilmente encontrado em supermercados. Além de sua capacidade alvejante, os hipocloritos têm um amplo espectro de atividade antimicrobiana: não deixam resíduos tóxicos, não são afetados pela água, são baratos e agem rapidamente. Eles removem organismos secos ou fixos das superfícies e apresentam baixa incidência de toxicidade grave.

Para discutir

- Sabendo que o composto ativo do alvejante doméstico é o hipoclorito de sódio ($NaOC\ell$), formado quando o cloro reage com hidróxido de sódio diluído e frio, escreva a equação balanceada e indique variações de Nox, agente oxidante e agente redutor para essa reação. (Reagentes: $C\ell_2(g)$; $NaOH(aq)$. Produtos: $NaOC\ell(aq)$; $NaC\ell(aq)$; $H_2O(\ell)$)

  R: $C\ell_2(g) + NaOH(aq) \rightarrow NaOC\ell(aq) + NaC\ell(aq) + H_2O(\ell)$

  Esse processo é chamado de auto-oxirredução, pois a mesma substância, no caso o $C\ell_2$, sofre oxidação e redução. Um dos seus átomos oxida, com o Nox aumentando de 0 para +1 na formação do $NaOC\ell$. O outro átomo reduz, com o Nox diminuindo de 0 para −1 na formação do $NaC\ell$. Portanto, o $C\ell_2$ atua como redutor e oxidante nessa reação.

Orientações

- Caso julgue oportuno, proponha uma prática de observação em sala de aula, colocando tecidos escuros em contato com água sanitária. Essa prática é um bom exemplo para ilustrar visualmente um processo de oxidação.
- Retome a questão que dá título a esta atividade, perguntando aos estudantes se eles identificaram a razão de a água sanitária descolorir os tecidos.
- Informe a eles que, por ser um poderoso agente oxidante, o hipoclorito de sódio é capaz de promover oxidação das substâncias responsáveis pela coloração dos tecidos (corantes). Se você acidentalmente pingar alvejante com cloro em uma calça jeans, por exemplo, verá a eficácia do alvejante como agente oxidante.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- A seção *Atividades* pode ser utilizada como avaliação formativa a fim de se identificarem os pontos frágeis sobre a aprendizagem dos conceitos abordados.
- A construção de mapas conceituais também é eficiente, tanto como método de síntese pelos estudantes quanto como ferramenta de avaliação formativa. Se necessário, você pode acessar o artigo "Construindo mapas conceituais", de Romero Tavares, publicado na revista *Ciências & Cognição* (Rio de Janeiro, v. 12, dez. 2007), disponível em http://revista.cienciasecognicao.org/index.php/cec/article/view/641/423 (acesso em: 18 out. 2024), para obter dicas e instruções sobre a elaboração de mapas conceituais.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 218)

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes associem o termo "oxidação" a alguma situação presenciada no dia a dia, como o escurecimento de objetos metálicos, por exemplo, moedas ou joias.

Roteiro (página 220)

2. No caso do escurecimento da maçã, o gás oxigênio atua oxidando compostos orgânicos presentes na polpa da maçã, gerando substâncias que apresentam coloração escura. Assim, o gás oxigênio é considerado o agente oxidante, enquanto esses compostos da maçã são agentes redutores. O ácido cítrico interfere nessa reação, impedindo a oxidação dos compostos da polpa da maçã. Nesse caso, ele sofre oxidação e é, portanto, o agente redutor do processo. Essa é uma das razões que permitem que o ácido cítrico seja classificado como substância antioxidante e utilizado como conservante de alimentos.

Práticas de Ciências – Por que o ferro enferruja? (página 222)

1. O prego que menos enferrujou deve ter ficado em um local com baixa umidade, ou fora do contato com água, e em condições de baixa concentração de oxigênio, se foi possível. O prego que mais enferrujou deve ter ficado em um ambiente bastante úmido. A intenção é que os estudantes percebam como algumas condições afetam a reação química da formação da ferrugem e outras não. Esse experimento permite discussões sobre o método científico, visto que, muitas vezes, não são exploradas as condições que permitem excluir determinada hipótese. Permita que os estudantes se organizem em grupos ou faça uma discussão coletiva, de modo que cada um expresse algo que observou com os resultados. Espera-se que eles elaborem hipóteses sobre as condições favoráveis e desfavoráveis para a ocorrência da oxidação do ferro, dependendo do objetivo de cada um – seja promover a rápida e intensa oxidação do ferro, seja evitá-la. Eles podem ter como base observações prévias ou situações que experimentaram ao longo da vida. Algumas das condições que os estudantes costumam explorar são umidade, luminosidade e temperatura.

2. **b)** $Fe_2O_3 \cdot x\,H_2O$. Os estudantes devem utilizar seus conhecimentos sobre compostos inorgânicos para elaborar a fórmula do óxido de ferro(III). No entanto, você pode auxiliá-los a representar o "hidratado" na fórmula química.

c) Semirreação de oxidação: $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2\,e^-$; semirreação de redução: $O_2(g) + 4\,H^+(aq) + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2O(\ell)$; equação global: $4\,Fe(s) + 3\,O_2(g) + 2x\,H_2O(\ell) \rightarrow 2\,Fe_2O_3 \cdot x\,H_2O(s)$.

3. Com a esmaltação, a camada de tinta impede o contato do ferro com o ar – portanto, com o gás oxigênio – e com a água.

Ação e cidadania – Descarte de pilhas e baterias (página 228)

1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes façam uma reflexão sobre os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto de pilhas e baterias, com ênfase na toxicidade das substâncias que a constituem, e, em seguida, proponham práticas para o descarte correto desses objetos.

Química e Física – Como funciona a recarga de baterias? (página 230)

2. Resposta pessoal. Se considerar pertinente, peça aos estudantes que pesquisem como é feito o descarte das baterias de chumbo-ácido.

3. b) Porque uma bateria pode fornecer maior tensão ou maior corrente elétrica, dependendo do modo que as pilhas que a constituem estão conectadas.

Atividades (páginas 235 e 236)

3. O $NaC\ell$ e o $MnC\ell_2$ podem ser armazenados em qualquer um dos recipientes, pois os cátions $Na^+(aq)$ e $Mn^{2+}(aq)$ não são capazes de oxidar nem o metal Zn nem o metal Pb. O $CdC\ell_2$ e o $NiC\ell_2$ só podem ser armazenados no recipiente de chumbo, uma vez que os cátions $Cd^{2+}(aq)$ e $Ni^{2+}(aq)$ podem oxidar o metal Zn a $Zn^{2+}(aq)$, sendo reduzido a metal Cd ou Ni, respectivamente. Já $CuC\ell_2(aq)$ não pode ser armazenado em nenhum dos frascos, pois o cátion $Cu^{2+}(aq)$ consegue oxidar tanto o metal Zn quanto o metal Pb.

4. a) Polo negativo:

$Zn(s) + 2\ OH^-(aq) \rightarrow ZnO(s) + 2\ H_2O(\ell) + 2\ e^-$

Polo positivo:

$HgO(s) + 2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \rightarrow Hg(\ell) + 2\ OH^-(aq)$

Equação global: $HgO(s) + Zn(s) \rightarrow ZnO(s) + Hg(\ell)$

5. a) $Pb(s) + 2\ HSO_4^-(aq) + PbO_2(s) + 2\ H^+(aq) \rightarrow$

$\rightarrow 2\ PbSO_4(s) + 2\ H_2O(\ell)$ $\Delta E = 0{,}30 + 1{,}70 = 2{,}00\ V$

c) $Pb(s) + HSO_4^-(aq) \rightarrow PbSO_4(s) + H^+(aq) + 2\ e^-$ $E = 0{,}30\ V$

Ânodo, oxidação e polo negativo

$PbO_2(s) + 3\ H^+(aq)\ HSO_4^-(aq) + 2\ e^- \rightarrow$

$\rightarrow PbSO_4(s) + 2\ H_2O(\ell)$ $E = 1{,}70\ V$

Cátodo, redução e polo positivo

6. $\frac{9}{1{,}5} = 6$ pilhas

10. a) Semirreação anódica: $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2\ e^-$

Semirreação catódica: $O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2O(\ell)$

Equação global:

$2\ Fe(s) + O_2(g) + 4\ H^+(aq) \rightarrow 2\ Fe^{2+}(aq) + 2\ H_2O(\ell)$

b) $1{,}67\ V = 0{,}44\ V + E^\circ(O_2|H_2O) \rightarrow E^\circ(O_2|H_2O) = 1{,}23\ V$

11. Análise das afirmativas falsas:

a) O cátodo é onde ocorre redução. Portanto, é a barra de prata.

b) Os íons Ag^+ atuam como agentes oxidantes.

d) Os elétrons passam pelo fio condutor. Apenas íons se movimentam pela ponte salina.

f) Os elétrons movem-se do ânodo para o cátodo.

12. b) Ânodo: $A\ell(s) \rightarrow A\ell^{3+}(aq) + 3\ e^-$

Cátodo: $Cu^{2+}(aq) + 2\ e^- \rightarrow Cu(s)$

CAPÍTULO 2 ELETRÓLISE (PÁGINA 237)

- As atividades propostas na abertura do capítulo podem ser utilizadas para avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os processos de obtenção de metais e a recarga de baterias.

Energia elétrica gerando transformações químicas (página 237)

- Para iniciar o tópico sobre eletrólises, retome os conceitos a respeito dos processos de oxidação e redução e da recarga de baterias. Deixe claro que nos processos de oxirredução, a energia elétrica é produzida espontaneamente por meio de uma reação química; por sua vez, na eletrólise, as reações químicas ocorrem pela passagem de corrente elétrica no sistema.

SUGESTÃO DE AULA

- Leve para a sala de aula dois tipos de pilhas (alcalina e recarregável) e peça aos estudantes que identifiquem as semelhanças e as diferenças entre elas, assim como as vantagens apresentadas por cada tipo. Os conceitos introduzidos no capítulo anterior servirão de subsídio para que eles constatem as vantagens das pilhas recarregáveis em relação às alcalinas.
- Diante das respostas apresentadas, recomendamos avaliar as ideias fixadas e iniciar uma discussão sobre a espontaneidade das reações químicas envolvidas. Pergunte aos estudantes por que a pilha recarregável pode ser utilizada mais de uma vez. Espera-se que mencionem o uso da energia elétrica. Nesse ponto, apresente a definição do termo "eletrólise" e cite a recarga de uma pilha para exemplificá-lo.
- Faça a leitura do texto da página 237 com os estudantes e, em seguida, peça a eles que respondam às atividades propostas no boxe *Para começar*.

Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa (páginas 238 a 241)

- Certas reações químicas são provocadas pela corrente elétrica. Por isso, será recorrente nas figuras do capítulo a presença de uma bateria, como a da página 238. Saliente o significado da dupla barra (uma grande, representando o polo positivo, e a outra pequena, representando o negativo, presente na imagem da página 240). Trata-se de uma forma simbólica de representar uma bateria – daí a necessidade de os estudantes saberem identificá-la como a fonte de corrente elétrica nos diversos diagramas.
- Uma diferença entre pilhas eletroquímicas, estudadas no capítulo anterior, e a eletrólise, apresentada neste capítulo, reside na espontaneidade das reações químicas envolvidas. Enquanto nas pilhas as reações acontecem espontaneamente, na eletrólise isso não ocorre.

Ciência tem história – Seriam o sódio e o potássio metais? (página 242)

- O texto mostra como os estudos de Lavoisier influenciaram as pesquisas sobre a decomposição da soda e da potassa e como a pilha foi utilizada para que essa decomposição fosse realizada.

Comparação entre a eletrólise e o funcionamento das pilhas (página 243)

- Esta seção propõe uma comparação entre pilha e eletrólise, pois nem sempre as semelhanças e as diferenças entre elas ficam claras. Sugere-se montar uma tabela na lousa com as características do funcionamento de uma pilha e as dos processos eletrolíticos.

Principais aplicações da eletrólise (páginas 244 a 248)

- Para trabalhar o tópico, retome o conteúdo do boxe *Ação e cidadania* (p. 239), que trata da produção e da reciclagem de alumínio. Em seguida, comente a criação do processo Hall-Héroult e explique seu funcionamento com o auxílio do esquema da página 244.
- O boxe *Ciência se discute* (p. 245) traz um texto mostrando o preconceito sofrido pelas mulheres no meio científico,

fenômeno que infelizmente ocorre até hoje. Propõe-se que os estudantes discutam sobre o tema e listem ações para combater a discriminação. Se julgar pertinente, estenda essa discussão para outras áreas do mercado de trabalho. Dessa forma, trabalha-se a competência geral **CGEB9** (exercitar a empatia e a cooperação, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, sem preconceitos de qualquer natureza) e o tema contemporâneo transversal **Trabalho**, da área Economia.

- A anodização é um método de recobrimento de uma camada do respectivo óxido sobre o próprio metal. Saliente que, no caso do alumínio, a formação do óxido protetor ocorre naturalmente, mas pode ser acelerada pela anodização.
- A importância do refino eletrolítico do cobre é explicada pela necessidade de purificar o cobre para que seja utilizado em fios de transmissão de energia elétrica. Saliente que tanto o cátodo como o ânodo são constituídos de cobre. A diferença está em que o ânodo possui cobre impuro, e o cátodo, cobre purificado. Com a aplicação de uma diferença de potencial controlada numa cuba eletrolítica, alguns metais se oxidam no ânion, como o cobre e os menos nobres que ele.
- A importância desse refino é explicada pela necessidade de purificar o cobre para que seja utilizado em fios de transmissão de energia elétrica.
- A eletrólise da salmoura é hoje um processo industrial de vulto, em que se produzem duas das dez substâncias mais utilizadas na indústria química: a soda cáustica e o gás cloro.

Práticas de Ciências – Cobreação de um objeto metálico (página 249)

- O sulfato de cobre(II) penta-hidratado é encontrado em lojas de materiais para jardinagem e agricultura e em lojas de produtos para o tratamento de piscinas.
- Todos devem usar os equipamentos de segurança indicados no Livro do Estudante: avental de algodão com mangas compridas e óculos de segurança.
- A eletrodeposição de cobre, bastante simples e ilustrativa, chama a atenção da turma pela possibilidade de algum objeto metálico deles ser cobreado no experimento.
- A atividade pode ser realizada primeiramente sem a conexão dos fios à bateria. Como esperado, nada acontecerá, já que o processo não é espontâneo. Em seguida, realize o experimento como descrito no livro. Destaque o papel da bateria de transferir elétrons do polo positivo, a barra de cobre, para o polo negativo, por exemplo, uma chave ou outro objeto metálico.
- Ao final da atividade, filtre a solução de sulfato de cobre(II) e armazene-a. Guarde o objeto metálico.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – A reciclagem do alumínio (páginas 250 e 251)

- O texto desta seção descreve o processo de reciclagem do alumínio e discute os benefícios ambientais da reciclagem. Se julgar pertinente, complemente a discussão com a retomada do texto do boxe *Ação e cidadania* (p. 239), abordando temas sociais e aspectos econômicos, como a diminuição dos custos de produção com a economia de energia.
- Esta seção trabalha a competência geral **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para defender pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global) e a competência específica **CECNTEM1** (analisar processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que minimizem impactos socioambientais). Também é promovido o trabalho com as habilidades **EM13CNT101** e **EM13CNT106** e com o tema contemporâneo transversal **Educação ambiental**, da área Meio ambiente.

FONTE COMPLEMENTAR

- Sartori, E. R. *et al*. Construção de uma célula eletrolítica para o ensino de eletrólise a partir de materiais de baixo custo. *Química Nova na Escola*, v. 35, n. 2, p. 107–111, maio 2013. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/07-EEQ-02-12.pdf. Acesso em 18 out. 2024.

  O artigo traz uma proposta de construção de uma célula eletrolítica de baixo custo e descreve como pode ser realizada a eletrólise de uma solução de iodeto de potássio. A leitura do artigo contribui também para sua própria aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos de e sobre Química, bem como sobre as múltiplas formas de desenvolver as suas atividades de ensino.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- As questões propostas na atividade prática podem servir como fixadoras do conteúdo abordado, desde a representação do processo em termos de linguagem química na forma de semirreações até a contextualização dos processos de eletrodeposição em diversas atividades do cotidiano.
- Para verificar a compreensão dos estudantes sobre a diferença entre pilhas e eletrólise, reproduza na lousa a tabela abaixo sem as informações da segunda e da terceira colunas. Em seguida, peça a eles que copiem a tabela no caderno e preencham as informações nos campos em branco.

	Pilha	Eletrólise
Tipo de reação	oxirredução	oxirredução
Força eletromotriz	energia química	energia elétrica
Espontaneidade das reações	espontâneas	não espontâneas
Configuração típica da célula	pilha de Daniell	eletrólise da água
Cátodo	polo positivo: redução	polo negativo: redução
Ânodo	polo negativo: oxidação	polo positivo: oxidação

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 237)

3. Apesar de apresentarem um custo inicial maior, as pilhas e baterias recarregáveis apresentam custo menor a longo prazo. No aspecto ambiental, o uso desses dispositivos diminui a extração de matérias-primas e a quantidade de lixo produzido.

Ação e cidadania – Produção *versus* reciclagem do alumínio (página 239)

1. Resposta pessoal. Caso os estudantes não façam a separação do material reciclável, ajude-os a encontrar pontos de coleta na região onde residem.

Ciência tem história – Seriam o sódio e o potássio metais? (página 242)

1. Primeiramente, a definição operacional de elemento químico dava margem a compreender que o número de substâncias simples de uma época não era absoluto, podendo mudar no futuro. Um segundo motivo, foi a hipótese de Lavoisier em relação à potassa e à soda serem substâncias compostas, o que levou à busca por se confirmar ou não isso.
2. A pilha elétrica permitiu a Humphry Davy realizar investigações experimentais, até então impossíveis para a ciência, decompondo uma série de substâncias compostas, as quais se acreditava serem substâncias simples. Isso o levou à identificação de novos elementos químicos.

Roteiro (página 246)

3. A propriedade é o potencial-padrão de redução. O processo é realizado controlando-se o potencial aplicado ao sistema, de forma que íons metálicos de elementos com potenciais de redução inferiores ao do cobre são oxidados no ânodo e permanecem em solução. Já aqueles com potenciais de redução superiores ao do cobre não se oxidam no ânodo, mas se desprendem da placa e se depositam no fundo do recipiente, na forma metálica, constituindo a chamada lama anódica.

Práticas de Ciências – Cobreação de um objeto metálico (página 249)

2. Polo negativo: $Cu^{2+}(aq) + 2\ e^- \rightarrow Cu(s)$

   Polo positivo: $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2\ e^-$
3. Caso se deseje depositar prata sobre um objeto metálico, é necessário substituir a solução de sulfato de cobre(II) por uma solução contendo íons prata, por exemplo, nitrato de prata. Além disso, é necessário substituir a peça de cobre por uma peça de prata.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – A reciclagem do alumínio (páginas 250 e 251)

2. Os cientistas pesquisam a utilização de compostos extraídos da lama vermelha no tratamento de efluentes para a absorção de metais pesados; na área da construção civil como matéria-prima de materiais cerâmicos, tijolos e telhas; na indústria química como catalisadores, como remediadores de solos ácidos devido à alcalinidade da lama e na extração de óxidos puros como o óxido de ferro (Fe_2O_3), para a produção de aços, e o óxido de titânio (TiO_2), para a produção de tintas, corantes para alimentos, cosméticos, catalisadores e protetores solares.
4. Em comparação com outros materiais recicláveis, as sucatas de alumínio têm valor maior, estimulando as cooperativas e catadores a priorizarem a coleta desse material. Assim, os materiais com valor mais baixo são encaminhados para a reciclagem em quantidade menor. A sociedade pode separar e descartar os materiais recicláveis em pontos de coleta, não deixando essa tarefa apenas por conta dos catadores. O poder público pode estabelecer preços mínimos para a compra dos materiais recicláveis, estimulando os catadores e cooperativas a recolher e a processar todos os tipos de material. E as empresas que usam embalagens e materiais recicláveis em seus produtos podem fazer parcerias com empresas recicladoras, criando um número maior de pontos de coleta e entrega de material reciclável e auxiliando no transporte desse material para a reciclagem.

Atividades (páginas 252 e 253)

2. **d)** Cátodo (−): $4\ H_2O(\ell) + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2(g) + 4\ OH^-(aq)$

   Ânodo (+): $2\ H_2O(\ell) \rightarrow 4\ H^+(aq) + O_2(g) + 4\ e^-$

   Equação global: $2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ H_2(g) + O_2(g)$
4. **a)** O cátodo – eletrodo negativo – atrai os cátions presentes na solução, ou seja, íons Na^+ e H^+ (provenientes da autoionização da H_2O). Na^+ apresenta potencial de redução muito inferior ao do H^+ e da H_2O. Como a concentração de íons H^+ provenientes da autoionização da água é muito baixa, a espécie que descarrega no cátodo é a H_2O.

   O ânodo – eletrodo positivo – atrai os ânions presentes na solução, ou seja, íons $C\ell_2$ e OH^- (provenientes da autoionização da H_2O). A concentração de íons OH^- provenientes da autoionização da água é muito baixa. Embora o potencial de oxidação do $C\ell_2$ seja inferior ao da água, por questões cinéticas, a espécie que descarrega preferencialmente no ânodo é o $C\ell_2$.

   c) Através do dreno retira-se a solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH(aq)). Íons sódio estão presentes no sistema aquoso e íons OH^- são formados no cátodo da célula eletrolítica, conforme representado na semirreação catódica do item anterior.
7. Alternativa **a**. Análise das alternativas incorretas: **b)** O magnésio é obtido no cátodo; **c)** O magnésio é obtido na forma de MgO; **d)** A reação é de oxirredução.
9. **c)** Nesse caso, os íons Au^{3+} que migrariam para o cátodo seriam aqueles presentes na solução de nitrato de ouro. No ânodo ocorreria a oxidação da água:

   $2\ H_2O(\ell) \rightarrow 4\ H^+(aq) + O_2(g) + 4\ e^-$

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 254 A 257)

Estudo de caso – A manutenção da Estátua da Liberdade (páginas 254 e 255)

- A proposta da seção *Estudo de caso* é envolver os estudantes em uma situação-problema na qual eles deverão mobilizar o que aprenderam nesta unidade, seus conhecimentos prévios e o resultado de pesquisas, para encontrar uma resposta ao problema proposto. Sugerimos que o trabalho seja realizado em duplas ou em grupos de até quatro estudantes.
- A parte externa da Estátua da Liberdade é composta de chapas de cobre moldadas, que adquiriram a cor esverdeada devido à oxidação de sua superfície. O contato entre essas chapas e as vigas internas de ferro provoca a corrosão do ferro, exigindo a manutenção.
- São trabalhadas nesta seção a competência geral **CGEB2** (usar a investigação, a análise crítica e a imaginação para investigar causas, elaborar hipóteses e resolver problemas) e a competência específica **CECNTEM3** (investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais). São desenvolvidos também a habilidade **EM13CNT301** e o tema contemporâneo transversal **Ciência e tecnologia**.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões globais (páginas 256 e 257)

2. Alternativa **b**. O cloro é oxidante porque sofre redução. A prata é redutora porque sofre oxidação.

3. Alternativa **b**. A camada de estanho metálico é responsável pela proteção da lata contra a oxidação, pois é uma espécie bastante resistente à reação com substâncias do alimento. Desse modo, evita-se a contaminação do conteúdo da conserva por íons metálicos. Ao se amassar a lata, a camada de estanho pode ser rompida, expondo o ferro, pouco resistente à oxidação. Os íons de ferro formados contaminam o alimento.

5. Alternativa **e**. O Cu^{2+} presente na calda sofre redução, e o ferro da faca oxida, formando o íon Fe^{3+}. Esse é um processo espontâneo, pois a sua ddp é positiva.

6. Alternativa **e**. O elemento que sofrerá oxidação mais facilmente é aquele que apresenta o menor potencial.

7. Alternativa **a**. Para que o brilho seja restaurado, os íons Ag^+ devem sofrer redução, recebendo elétrons do alumínio metálico.

8. Alternativa **c**. O alumínio é obtido por meio da eletrólise ígnea da alumina extraída da bauxita.

9. **b)** A equação global do processo é:

$Ni^{2+}(aq) + 2\ C\ell^-(aq) \rightarrow Ni(s) + C\ell_2(g)\quad \Delta E° = 1{,}36 + 0{,}24 = -1{,}60\ V$

Logo, a tensão mínima necessária é de 1,60 V.

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**Enem**) Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio (NaOH) e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução ($E°$) da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro.

Semirreação de redução	$E°$ (V)
$2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$	−0,83
$Co(OH)_2 + 2\ e^- \rightarrow Co + 2\ OH^-$	−0,73
$Cu(OH)_2 + 2\ e^- \rightarrow Cu + 2\ OH^-$	−0,22
$PbO + H_2O + 2\ e^- \rightarrow Pb + 2\ OH^-$	−0,58
$A\ell(OH)^{4-} + 3\ e^- \rightarrow A\ell^{3+} + 4\ OH^-$	−2,33
$Fe(OH)_2 + 2\ e^- \rightarrow Fe + 2\ OH^-$	−0,88

Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência?

a) $A\ell$
b) Co
c) $Cu(OH)_2$
d) $Fe(OH)_2$
e) Pb

Alternativa **a**.

Para que haja maior liberação de gás hidrogênio (H_2), é necessária a presença de uma espécie que atue como agente redutor da água. Para isso, o potencial de redução dessa espécie deve ser menor que o potencial de redução da água. De acordo com a tabela, o íon $A\ell(OH)_4^-$ e o composto $Fe(OH)_2$ são os únicos que se enquadram nessas condições. No entanto, a diferença de potencial-padrão de redução entre a água e o $Fe(OH)_2$ é muito pequena, de modo que a presença de $A\ell$ seria mais eficiente do que a presença de Fe. As equações abaixo representam o processo.

Semirreação de redução: $6\ H_2O + 6\ e^- \rightarrow 3\ H_2 + 6\ OH^-$

Semirreação de oxidação: $2\ A\ell + 8\ OH^- \rightarrow 2\ A\ell(OH)_4^- + 6\ e^-$

Equação global: $6\ H_2O + 2\ A\ell + 2\ OH^- \rightarrow 3\ H_2 + 2\ A\ell(OH)_4^-$

2. (**Enem**) Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando à produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura.



Enem, 2019. Fac-símile/ID/BR

Li, Y.; Dai, H. Recent advances in zinc-batteries. *Chemical Society Reviews*, v. 43, n. 15, 2014 (adaptado).

No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é

a) $H_2(g)$
b) $O_2(g)$
c) $H_2O(\ell)$
d) $OH^-(aq)$
e) $Zn(OH)_4^{2-}(aq)$

Alternativa **e**.

De acordo com a figura, no eletrodo de zinco ocorre a transformação de zinco metálico, de número de oxidação igual a zero, em $Zn(OH)_4^{-2}$, íon no qual o zinco apresenta número de oxidação igual a +2. Portanto, no eletrodo de zinco ocorre oxidação e representa o ânodo da bateria, local onde é formado $Zn(OH)_4^{-2}$.

3. (**Enem**) Células solares à base de TiO_2 sensibilizadas por corantes (S) são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO_2 é responsável por absorver a energia luminosa (hv) e o corante excitado (S*) é capaz de transferir elétrons

para o TiO_2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas.



Enem, 2018. Fac-símile/ID/BR

$TiO_2 \mid S + hv \rightarrow TiO_2 \mid S^*$ (1)

$TiO_2 \mid S^* \rightarrow TiO_2 \mid S^+ + e^-$ (2)

$TiO_2 \mid S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2 \mid S + \frac{1}{2}I_3^-$ (3)

$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^-$ (4)

Longo. C.; De Paoli, M. A. Dye-sensitized solar cells: a successful combination of materials. *Journal of the Brazilian Chemical Society*. n. 6, 2003 (adaptado).

A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois

a) reduz íons I^- a I_3^-.

b) regenera o corante.

c) garante que a reação 4 ocorra.

d) promove a oxidação do corante.

e) transfere elétrons para o eletrodo de TiO_2.

Alternativa **b**.

De acordo com a sequência de reações, nota-se que inicialmente o conjunto de óxido de titânio e corante deve estar na forma não ionizada. Após a excitação do corante e a transferência do elétron, esse conjunto acaba adquirindo a configuração $TiO_2|S^+$. Para que a bateria solar mantenha o funcionamento, esse conjunto deve ser regenerado a $TiO_2|S$. Essa regeneração ocorre pela reação da equação 3.

4. (**Enem**) Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma solução de $CuSO_4$. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons Cu^{2+} da solução são depositados na forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando à solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, e sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto de acordo com suas forças redutoras relativas. Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são:

Enem. Fac-símile: ID/BR

a) Au, Pt, Ag, Zn, Ni e Pb.

b) Au, Pt e Ag.

c) Zn, Ni e Pb.

d) Au e Zn.

e) Ag e Pb.

Alternativa **b**. Quanto maior a força redutora, maior é a capacidade desse elemento de sofrer oxidação. Os metais que sedimentam são aqueles que sofrem redução, ou seja, que tem força redutora menor que a do cobre.

6 EQUILÍBRIOS QUÍMICOS

INTRODUÇÃO

Esta unidade é composta de três capítulos. No capítulo 1, são apresentados os conceitos de reações reversíveis e de equilíbrio, o modo de calcular as constantes de equilíbrio e, por último, alguns fatores que afetam o equilíbrio químico (com a enunciação do princípio de Le Châtelier). No capítulo 2, são apresentadas as teorias ácido-base aceitas atualmente pela comunidade científica, abordando-se questões relacionadas ao equilíbrio iônico da água, ao pH e aos cálculos relativos a ele e, por fim, são apresentados os sistemas-tampão. O capítulo 3 aborda os equilíbrios heterogêneos e o conceito de produto de solubilidade.

Os objetivos da unidade se articulam a este e outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas as competências gerais **CGEB1** (valorizar o conhecimento historicamente construído), **CGEB2** (exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas), **CGEB4** (utilizar a linguagem matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências e ideias), **CGEB5** (compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação nas diversas práticas sociais), **CGEB7** (argumentar com base em dados, fatos e informações confiáveis), **CGEB9** (exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro) e **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação). Trabalham-se também as competências específicas **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida), **CECNTEM2** (Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Terra) e **CECNTEM3** (avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico) e habilidades da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, como a **EM13CNT104**, a **EM13CNT205** e a **EM13CNT301**.

Sugestão de planejamento

Sugere-se que, nesta unidade, a seção *Química e Biologia* (p. 289) seja trabalhada em parceria com o(a) professor(a) de Biologia. Outra oportunidade de trabalho interdisciplinar interessante ocorre na seção *Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente* (p. 298), que também oferece um contexto de abordagem interdisciplinar com Biologia, ao tratar da despoluição de efluentes contaminados.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Compreender o conceito de equilíbrio químico e determinar constantes de equilíbrio a partir de reações químicas. • Utilizar uma analogia para analisar a trajetória de uma reação química até seu equilíbrio químico. • Relacionar a síntese industrial da amônia com o aumento da produção de alimentos. • Identificar os desafios que envolvem o aumento da produção e da distribuição de alimentos. • Compreender o princípio de Le Châtelier.	CGEB1 CGEB2 CGEB4 CGEB7 CGEB9 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM2 CECNTEM3	EM13CNT205 EM13CNT301	
2	• Compreender o que são ácidos, bases, pH e sistema-tampão. • Aplicar os conhecimentos de pH em situações do cotidiano. • Utilizar um simulador para investigar o pH de diferentes soluções. • Assimilar o funcionamento de um sistema-tampão. • Compreender como a acidificação dos oceanos afeta a vida marinha e propor ações pra minimizar esses impactos.	CGEB1 CGEB3 CGEB4 CGEB5 CGEB9 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM2 CECNTEM3	EM13CNT104 EM13CNT205 EM13CNT301 EM13CNT303	Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras Ciência e tecnologia
3	• Compreender os processos que envolvem equilíbrios químicos em sistemas com mais de uma fase. • Conhecer o processo de retirada de metais pesados da água por meio da precipitação.	CECNTEM3	EM13CNT307	Educação ambiental
Fechamento da unidade	• Utilizar o conhecimento científico para avaliar o enfrentamento de uma situação-problema relacionada ao uso de medicamentos.	CGEB2 CGEB9 CGEB10 CECNTEM3	EM13CNT301 EM13CNT303	

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 258 E 259)

A abertura da unidade introduz o tema de equilíbrio químico ao abordar o que ocorre no organismo dos alpinistas em grandes altitudes. A hemoglobina (Hb) é a proteína responsável pelo transporte do oxigênio até as células do corpo, e a equação que representa o equilíbrio com a oxiemoglobina, de forma simplificada, é a seguinte:

$$Hb(aq) + O_2(aq) \rightleftharpoons HbO_2(aq)$$

A hipóxia (literalmente, baixa oxigenação), também conhecida como "mal das alturas", consiste na diminuição de oxigênio (O_2) no sangue. Um dos mecanismos de resposta do organismo em uma situação de hipóxia é produzir mais hemoglobina de modo a favorecer o equilíbrio no sentido de produzir oxiemoglobina. É por esse motivo que os alpinistas, quando vão alcançando grandes altitudes, necessitam permanecer por tempo prolongado à altitude, para que o organismo consiga se adaptar e produzir mais hemoglobina.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 258)

1. Resposta variável. Os estudantes podem explicar que a variação no equilíbrio causa prejuízos às indústrias, pois é capaz de interferir no rendimento das reações e, no caso do meio ambiente, causar a morte de seres vivos. O equilíbrio químico afeta o rendimento das reações, o que pode ser um desafio para a síntese de determinados compostos em escala industrial. No meio ambiente, alterações na composição do meio, como mudanças de pH ou a presença de poluentes, por exemplo, podem afetar os equilíbrios preexistentes causando problemas ambientais.
2. Respostas variáveis. Após a discussão, espera-se que os estudantes concluam que essa é uma prática fraudulenta. A fraude, falsificação ou adulteração de produtos alimentícios ou bebidas destinadas ao consumo humano que os torne passíveis de danos à saúde é proibida por lei e, para evitar essa prática, é necessário intensificar a fiscalização. No caso do leite, a fermentação láctica diminui o pH. O azedo do leite fora do prazo de validade pode ser neutralizado pela adição de hidróxido de sódio, mas essa adulteração não o torna próprio para o consumo.

CAPÍTULO 1 ESTADO DE EQUILÍBRIO (PÁGINA 260)

Reconhecendo os equilíbrios químicos (páginas 260 e 261)

- O texto de abertura do capítulo trata da reação que ocorre em lentes fotocromáticas, que escurecem na presença de luz solar (mais precisamente de raios ultravioleta).
- É preciso chamar a atenção dos estudantes para a introdução de um novo símbolo na notação de reação química: quando se consideram a reversibilidade e a possibilidade de a reação se dar nos dois sentidos, utiliza-se, em vez de uma seta simples (→), o símbolo ⇌, ou seja, a dupla semisseta.
- Para exemplificar a reversibilidade (p. 261), sugerimos comentar como a formação ou a deterioração de estalactites ou estalagmites dependem da quantidade de gás carbônico existente no meio. Desse modo, explora-se a competência específica **CECNTEM1** ao analisar o fenômeno natural.

Equilíbrio químico (páginas 262 e 263)

- Apresente aos estudantes o conceito de equilíbrio químico usando raciocínios lógicos que envolvam a rapidez de determinadas reações. Pode-se estabelecer uma analogia entre equilíbrio químico e uma pessoa andando em uma esteira (equilíbrio entre as velocidades do andar da pessoa e do rolar da esteira, em direções opostas, porém iguais em módulo). Essa imagem é mais eficiente do que a de equilíbrio entre duas massas em uma balança de pratos.
- Na discussão sobre equilíbrio químico, atente para que os estudantes não se apeguem à concepção alternativa de que um equilíbrio é sempre estático. Tal ideia pode ser proveniente de experiências prévias sobre o termo "equilíbrio", geralmente ligadas a exemplos em que não ocorrem alterações no sistema, como uma régua equilibrada sobre um suporte. Por essa razão, eles tendem a considerar que, quando o equilíbrio químico se estabelece, a reação cessa e não ocorrem mais alterações, tanto em nível macroscópico quanto em nível molecular. Portanto, recomendamos destacar que o resultado macroscópico deriva do estado molecular, embora não seja uma reprodução exata dele. Mais informações a respeito das concepções alternativas dos estudantes sobre equilíbrio químico e de estratégias para superá-las são encontradas na seção *Fontes complementares* (p. 511 deste Manual).
- Para compreender adequadamente a relação entre as concentrações das substâncias existentes no equilíbrio, os estudantes devem ser capazes de distinguir sistemas homogêneos de sistemas heterogêneos (p. 263). Neste momento, é preciso relembrar aos estudantes que nos sistemas homogêneos há apenas uma fase e, nos heterogêneos, mais de uma.

Práticas de Ciências – Estabelecendo o equilíbrio químico (páginas 264 e 265)

- O desenvolvimento da atividade experimental com os estudantes organizados em grupos possibilita o exercício do diálogo, o respeito mútuo e o trabalho em equipe com divisão de tarefas. Essas abordagens são contempladas na competência geral **CGEB9**.
- Nesta seção, os estudantes trabalham tanto a competência específica **CECNTEM3** quanto as habilidades **EM13CNT301** e **EM13CNT205**, pois desenvolvem a capacidade de construir questões, de elaborar hipóteses e de justificar conclusões, bem como interpretar resultados e realizar previsões sobre fenômenos com base na observação.
- O experimento sugerido requer poucos materiais; todos eles são acessíveis e nenhum põe em risco a integridade física dos estudantes. Mesmo assim, é preciso sempre salientar os cuidados que devem ser observados em relação aos procedimentos de segurança e às condições do local na realização de atividades experimentais. Quanto aos equipamentos de segurança, são necessários óculos de segurança e avental de algodão com mangas compridas. Se optar pela realização da atividade em grupo – o que é recomendável –, ressalte a importância da participação de todos os integrantes, de seguir as etapas de maneira organizada e da tomada conjunta de decisões diante de possíveis obstáculos e contratempos. Essa abordagem permite o trabalho com a competência geral **CGEB10**.

- Espera-se, com essa atividade, que os estudantes consigam visualizar, por analogia, que equilíbrio não significa necessariamente quantidades iguais de reagentes e de produtos e que, com isso, descrevam o significado de um equilíbrio dinâmico e como variam as velocidades de reações diretas e inversas enquanto o sistema tende ao equilíbrio. Desse modo, os estudantes desenvolvem a habilidade **EM13CNT205**.

Constantes de equilíbrio (páginas 266 a 268)

- Uma vez estabelecido que o equilíbrio químico é caracterizado pela não variação das concentrações das espécies existentes no sistema, discuta a tabela da página 266, que apresenta os dados experimentais. Para que os estudantes compreendam a expressão da constante de equilíbrio (*K*) e não apenas memorizem que o coeficiente estequiométrico de uma substância aparece como expoente da concentração da mesma substância, sugerimos reescrever a equação química da seguinte maneira:

  $$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g) \Rightarrow H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons HI(g) + HI(g)$$

  Logo, fica mais claro que a relação de $K = \frac{[\text{produtos}]}{[\text{reagentes}]}$ pode ser escrita assim:

  $$K = \frac{[HI][HI]}{[H_2][I_2]} = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

- Na sequência, fazendo uso do que foi discutido no tema anterior a respeito da variação desprezível da concentração de sólidos e líquidos puros em sistemas heterogêneos, justifique a expressão da constante de equilíbrio na reação:

  $$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$$

  Essa expressão não considera nem ferro sólido nem cobre sólido, tendo em vista que as concentrações de ambos são virtualmente invariáveis. A reação ocorre na superfície de contato do sólido com o(s) outro(s) reagente(s).

- Na discussão desse tópico, a competência geral **CGEB4** é bastante explorada, pois as linguagens matemática e química serão muito utilizadas e precisam fazer sentido para os estudantes, a fim de que o entendimento seja alcançado.

- Para complementar a discussão sobre as constantes de equilíbrio, explore o boxe *Ampliação* (p. 266). Peça aos estudantes que comparem a lei de ação das massas, proposta pelos químicos noruegueses Guldberg e Waage, em 1864, com a forma atualmente aceita dela. Os estudantes perceberão que as concentrações dos produtos não aparecem na lei proposta por Guldberg e Waage. Esse boxe ajuda a trabalhar a competência geral **CGEB1**.

Cálculo das constantes de equilíbrio (página 269)

- O trabalho deste tema favorece o desenvolvimento da competência geral **CGEB4**, pois estimula os estudantes a utilizar informações expressas em diferentes linguagens, como a química, presente nas fórmulas matemáticas.

Ciência tem história – Influências sociais na síntese industrial da amônia no século XX (páginas 270 e 271)

- O texto desta seção aborda os aspectos socioeconômicos que motivaram cientistas a buscar uma síntese mais efetiva para a amônia. Sua leitura evidencia que o conhecimento químico é uma construção humana, inserida no contexto social. Espera-se que a leitura auxilie os estudantes a desenvolver uma visão crítica a respeito de potenciais descobertas científicas de grande importância no mundo contemporâneo, o que favorece o desenvolvimento das competências gerais **CGEB2**, **CGEB7** e da competência específica **CECNTEM3**.

- Aproveite o momento para integrar o assunto com o componente curricular de Geografia, explicando o crescimento populacional ocorrido no começo do século XIX e como isso influenciou a demanda de alimentos. Ao explorar a atividade **3**, trabalhe com os estudantes o conceito de empatia e aproveite para exercitar a competência geral **CGEB9**.

- O trabalho com leitura, interpretação e discussão permite o desenvolvimento da leitura inferencial.

Princípio de Le Châtelier (páginas 272 e 273)

- A discussão do princípio de Le Châtelier é muito importante no conjunto de conteúdos referentes ao equilíbrio químico, uma vez que racionaliza a influência de variáveis experimentais no estado de equilíbrio. Ao mesmo tempo, trata-se de um assunto que requer grande atenção do(a) professor(a) por possibilitar que os estudantes desenvolvam concepções alternativas a respeito do tema. Por essa razão, recomendamos a leitura do artigo "Analogias no ensino de equilíbrio químico", indicado na seção *Fontes complementares*, no qual são apresentadas algumas analogias comuns utilizadas por professores em sala de aula, que podem gerar distorções na compreensão dos conceitos químicos por parte dos estudantes.

- Antes de iniciar a abordagem do tópico *Efeito dos catalisadores* (p. 273), verifique as ideias prévias que os estudantes têm sobre catalisadores. Esclareça que o catalisador é um componente que participa da reação, embora não se verifique seu consumo no processo global nem se alterem as concentrações de produtos e reagentes quando atingido o equilíbrio. Logo, sua principal função consiste em possibilitar que a reação alcance o equilíbrio em um tempo menor, aumentando a rapidez das reações químicas. Enfatize que o catalisador não afeta a composição do equilíbrio químico, e, sim, o tempo necessário para estabelecê-lo.

- Contextualize o tema retomando brevemente o que são enzimas e a importância delas para a vida, uma vez que os seres vivos não podem depender de reações muito lentas para sobreviver.

FONTES COMPLEMENTARES

- Borges, J. C.; Hipólito, D. A. Uma descoberta que mudou o mundo. *Ciência Hoje On-line*, 3 out. 2008. Disponível em: https://cienciahoje.org.br/coluna/uma-descoberta-que-mudou-o-mundo/. Acesso em: 16 set. 2024.

  O artigo discute o impacto social e ambiental da síntese da amônia, desenvolvida há mais de cem anos.

- Machado, A. H.; Aragão, R. M. R. Como os estudantes concebem o estado de equilíbrio químico. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 4, p. 18-20, nov. 1996. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/aluno.pdf. Acesso em: 16 set. 2024.

  Esse artigo discute algumas concepções alternativas dos estudantes a respeito do equilíbrio químico, principalmente sobre sua interpretação molecular.

- Raviolo, A.; Garritz, A. Analogias no ensino de equilíbrio químico. *Química Nova na Escola*, São Paulo, n. 27, p. 13-25, 2008.

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc27/04-ibero-3.pdf. Acesso em: 16 set. 2024.

Os autores fazem uma revisão bibliográfica reunindo diversas analogias empregadas por professores para ensinar o equilíbrio químico. A leitura do artigo contribui também para sua própria aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos de e sobre Química, bem como sobre as múltiplas formas de desenvolver as suas atividades de ensino.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Após a execução da atividade proposta na seção *Práticas de Ciências* (p. 264), peça aos estudantes que escrevam um pequeno texto sobre as características de um processo reversível e o estado de equilíbrio dinâmico. Eles podem trocar com um colega e fazer a correção desse texto em duplas.
- Peça aos estudantes que expliquem como o princípio de Le Châtelier pode ser utilizado para maximizar a produção de amônia, retomando o texto da seção *Ciência tem história* (p. 270).

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Esta atividade tem como objetivo trabalhar noções de digressão, generalizações indevidas, carência de dados e incoerências.

Após a realização da atividade, promova uma discussão com a turma sobre as respostas, relacionando-as ao que foi aprendido. Avalie não apenas as respostas escritas, mas também a participação dos estudantes nas discussões e sua capacidade de argumentação durante a correção do texto.

Leia o texto a seguir e responda às perguntas.

Bactérias como a Acetobacter são capazes de transformar etanol em ácido acético – líquido incolor responsável pelo cheiro e gosto fortes do vinagre. Na reação de formação desse ácido, uma vez estabelecido o equilíbrio, a concentração de reagentes deve ser maior do que a concentração do produto. Entretanto, se aumentarmos a temperatura, o equilíbrio será deslocado no sentido da formação dos produtos, aumentando assim a quantidade de reagentes. Portanto, podemos concluir que aumentar a temperatura em todas as reações químicas sempre favorece a formação de produtos, e que a constante de equilíbrio (*K*) sempre aumenta quando a concentração de produtos é maior do que a dos reagentes.

Texto elaborado para fins didáticos.

1. Quais pontos do texto se desviam do foco principal e poderiam ser mais claros ou relevantes para a discussão?

   R: A digressão aparece na informação sobre as bactérias capazes de realizar a reação e no comentário sobre o líquido ser incolor e responsável pelo cheiro e gosto fortes do vinagre. Como o foco principal é o equilíbrio de formação do ácido acético, o texto poderia abordar a equação específica da reação ou seus aspectos dinâmicos, por exemplo.

2. O texto sugere que algumas ideias se aplicam a todas as reações químicas. Você consegue identificar exemplos que não se encaixam nessa afirmação? Como poderia reformular essa parte?

   R: Resposta pessoal. Exemplo de resposta: A afirmação de que "aumentar a temperatura em todas as reações químicas sempre favorece a formação de produtos" é uma generalização indevida. Cada reação tem um caráter exotérmico ou endotérmico que influencia seu comportamento a uma alteração de temperatura. Reações exotérmicas são desfavorecidas com o aumento da temperatura.

3. Em relação à afirmação sobre o aumento da temperatura e seu efeito no equilíbrio, quais contradições você consegue perceber?

   R: Resposta pessoal. Exemplo de resposta: Quando o texto afirma que "se aumentarmos a temperatura, o equilíbrio será deslocado para a direita, aumentando assim a quantidade de reagentes", há uma incoerência, pois, além de os reagentes estarem à esquerda ao equacionarmos uma reação, em reações endotérmicas, a formação de produtos seria favorecida e não a de reagentes.

4. Existem informações ausentes que poderiam ajudar a tornar as conclusões do texto mais robustas? Quais dados seriam importantes?

   R: Sim, o texto carece, por exemplo, de informações sobre os reagentes e produtos envolvidos, a presença ou não de um catalisador, o tipo de reação (endotérmica ou exotérmica) e o valor da constante de equilíbrio (*K*).

5. Pesquise a reação descrita no texto e reescreva-o fazendo os ajustes necessários com base nas observações feitas nas perguntas anteriores.

   R: Alguns tipos de bactérias são capazes de produzir ácido acético por oxidação aeróbica do etanol. Simplificadamente, a reação que ocorre é: $CH_3CH_2OH(aq) + O_2(g) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell)$. Uma vez estabelecido o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes é maior do que a dos produtos, uma vez que a constante desse equilíbrio é baixa ($K_c = 1{,}76 \cdot 10^{-5}$). Como se trata de uma reação exotérmica, se a temperatura for reduzida, o equilíbrio será deslocado para a direita, aumentando a quantidade de produto formado. Essa reação é lenta, por isso, em escala industrial, são utilizados catalisadores, como o pentóxido de vanádio (V_2O_5).

   Portanto, podemos concluir que aumentar a temperatura nem sempre favorece a formação de produtos e que um valor de constante de equilíbrio (K_c) baixo indica que há uma concentração menor de produtos do que de reagentes no equilíbrio.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 260)

2. Resposta pessoal. Os estudantes provavelmente vão responder com base no senso comum de equilíbrio, relacionando-o com algo estável, constante ou até mesmo nulo, pensando em Física e no estado de um sistema em que as forças se anulam. No entanto, a resposta esperada deve relacionar as reações reversíveis e a velocidade em que essas reações ocorrem.

   Essa questão pode ser utilizada para a introdução do conceito de equilíbrio químico. As hipóteses dos estudantes serviriam de ponto de partida para construir esse conceito.

3. Um estado em equilíbrio é aquele cujas propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo; isso se dá porque, em nível molecular, as reações químicas ocorrem simultaneamente, em ambos os sentidos e com a mesma rapidez. Além disso, nem a matéria nem a energia são removidas ou adicionadas ao sistema.

Práticas de Ciências – Estabelecendo o equilíbrio químico (páginas 264 e 265)

2. Em cada transferência, a quantidade de água passada do béquer **A** para o béquer **B** e no sentido oposto foram diferentes. A quantidade de água transferida de **A** para **B** diminuiu a cada etapa, enquanto na transferência de **B** para **A** o volume de água transferido aumentou. Espera-se que os estudantes indiquem que isso ocorreu até certo momento. Em alguma das etapas, a quantidade de água transferida foi a mesma e continuou constante, momento em que o experimento é interrompido. A quantidade de água transferida representa a velocidade da reação correspondente, de modo que, no início, a velocidade de $A \rightarrow B$ é maior que a velocidade de $B \rightarrow A$, mas, no final do experimento, as velocidades de ambas as reações (direta e inversa) se igualam. Na parte I do experimento, o volume de água nos béqueres grandes influencia a quantidade de água que será transferida. Até certo ponto, quanto maior o volume de água no béquer grande, mais água será transferida desse béquer para o outro.

4. O tamanho dos béqueres utilizados na transferência de água está relacionado com a velocidade de cada uma das reações (direta e inversa) e, consequentemente, com o estado final de equilíbrio. Na primeira parte, como os béqueres eram iguais, o volume final de cada um dos recipientes (**A** e **B**) terminaram com a mesma quantidade de água. Na parte II, por causa do béquer de maior capacidade utilizado para a transferência de água de **A** para **B,** o béquer **B** terminou com maior quantidade de água. Os béqueres de transferência representam as constantes de velocidade da reação direta e inversa, que, na parte I, são iguais, enquanto na parte II a constante de velocidade da reação direta é maior que a da reação inversa.

5. A expressão da constante de equilíbrio para a reação $A \rightleftharpoons B$ é $K_c = \frac{[B]}{[A]}$, em que [A] é a concentração de **A**, em mol/L, e [B], a concentração de **B**, em mol/L, ambas no equilíbrio. Na analogia, a concentração de **A** e **B** pode ser entendida como o volume de água em cada um dos recipientes (**A** e **B**, respectivamente). Assim, como o volume de **B** é maior que o de **A** na parte II, enquanto os volumes de **A** e **B** são iguais na parte I, a constante de equilíbrio é maior na parte II do que na parte I. A modificação dos tamanhos dos béqueres de transferência, que causou estados finais diferentes na parte I e na parte II, é análoga a uma alteração na temperatura, que favoreceu a reação direta.

Roteiro (página 269)

3. a) $K_p = \frac{(p_{N_2O_4})}{(p_{NO_2})^2}$

b) $K_p = \frac{(p_{H_2O})}{(p_{H_2})}$

c) $K_p = \frac{(p_{NOCl})^2}{(p_{NO})^2 \cdot (p_{Cl_2})}$

d) $K_p = \frac{(p_{Cl_2}) \cdot (p_{PCl_3})}{(p_{PCl_5})}$

Ciência tem história – Influências sociais na síntese industrial da amônia no século XX (páginas 270 e 271)

1. A produção de alimentos não era suficiente para alimentar uma quantidade cada vez maior de pessoas, o que motivou a pesquisa de meios que pudessem aumentar a produtividade dos solos. A partir da produção industrial da amônia, foi possível fertilizar o solo e aumentar a quantidade de alimentos produzidos. Essa questão pode ser utilizada para enfatizar o papel da ciência para a humanidade.

2. Não, porque o equipamento elaborado por eles era capaz de sintetizar pequenas quantidades de amônia; logo, foi preciso a adaptação do trabalho de laboratório para a indústria, feita por Carl Bosch. Essa adaptação proporcionou a produção de toneladas de amônia, suprindo a demanda agrícola. A produção em escala industrial exige integração de outros profissionais com os cientistas. Peça aos estudantes que reflitam sobre quais são as outras profissões envolvidas em todo esse processo.

3. Resposta variável. Os estudantes podem citar que conflitos territoriais, deslocamentos populacionais e crises econômicas interferem na distribuição de alimentos. Eles ainda podem falar sobre a necessidade de cooperação entre governos e ações humanitárias para mitigar conflitos, diminuir o efeito das crises climáticas para alcançar o objetivo de fome zero.

Atividades (página 274)

4.



É possível estender essa questão e pedir aos estudantes que acrescentem a curva da variação da pressão parcial de um dos reagentes.

7.



CAPÍTULO 2 EQUILÍBRIOS ÁCIDO-BASE (PÁGINA 275)

Ácidos e bases no cotidiano (página 275)

- A foto de abertura apresenta o grafismo indígena como uma importante expressão cultural, espiritual e social dos povos originários. As pinturas no corpo e no rosto dos indígenas revelam a identidade cultural das etnias a que pertencem e são diferentes para cada ocasião. Essa prática carrega inúmeros significados, mas atualmente se tornou também uma maneira de expressão política, e alguns povos utilizam as pinturas como forma de protesto contra a invasão de suas terras, o desmatamento e o garimpo ilegal. Os materiais usados nas pinturas variam conforme os recursos disponíveis. Uma das tinturas mais conhecidas é preparada com jenipapo, fruto do qual se extrai o líquido que se transforma em tinta preta em contato com a pele. A coloração vermelha é obtida de sementes de urucum, e a coloração branca, do calcário ou da tabatinga. Utilizam-se gordura animal ou óleo extraído de plantas para fixar a cor na pele.

- A Lei 11 645/08 torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira no Ensino Fundamental e Médio, e o tema das pinturas corporais é um modo muito interessante de abordar a cultura indígena relacionada aos pigmentos, corantes e equilíbrios ácido-base. Por meio dessa abordagem, trabalha-se também a competência geral **CGEB3** (valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais) e o tema contemporâneo transversal **Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras**, da área Multiculturalismo.
- O objeto digital *Pinturas corporais indígenas* contém informações sobre as pinturas corporais usadas por algumas etnias brasileiras, como os seus significados e os materiais usados na confecção das tintas.
- Incentive os estudantes a apresentar os conhecimentos prévios que têm sobre o assunto, valorizando os conceitos historicamente construídos sobre o mundo físico para compreender a realidade, aptidão contemplada na competência geral **CGEB1**.
- Este capítulo pretende reconstruir os conceitos de basicidade e acidez por meio de sua relação com o equilíbrio iônico da água. Ao retomar esse conceito, aproveite para explorar a habilidade **EM13CNT104**. Os conceitos de pH e as titulações ácido-base são abordados com vistas a propiciar o entendimento da determinação quantitativa das soluções ácidas e básicas. O objetivo principal, porém, consiste na transição do pensamento qualitativo para o pensamento quantitativo no estudo das propriedades de soluções ácidas e básicas.

Ácidos e bases segundo a teoria de Arrhenius (página 276)

- A associação da teoria de Arrhenius com os ácidos vem do fato de que esses materiais formam soluções eletrolíticas, mas com uma característica comum: o cátion sempre é H^+ (um próton). Esse íon aparece porque, ao ocorrer a ionização/dissociação do ácido, o hidrogênio perde seu único elétron para o ânion, mais eletronegativo.
- De modo semelhante ao que ocorre com os ácidos, as bases sofrem ionização/dissociação quando dissolvidas em água, formando soluções eletrolíticas. Contudo, o ânion é sempre o hidróxido, OH^-, característico do grupo das bases.

Ácidos e bases segundo a teoria de Brönsted-Lowry (páginas 276 e 277)

- Neste momento, deixe claro para os estudantes que eles entrarão em contato com uma nova perspectiva que vai se somar à adotada até aqui.
- Explicite os diferentes modelos atômicos que podem ser usados dependendo da complexidade do problema a ser resolvido. Por exemplo, represente uma figura com átomos de substâncias no estado gasoso para a observação das propriedades de translação; para essa representação, o modelo de Dalton é suficiente.
- Entretanto, para abordar os conceitos de ácido e de base de acordo com a teoria de Brönsted-Lowry, precisamos recorrer a um modelo atômico mais detalhado, como o de Rutherford-Böhr, por exemplo. A ligação da espécie H^+ com a água (H_2O) envolve o conceito de ligação interatômica covalente.
- Quando está sem nenhum elétron, essa espécie tende a se associar com a água por uma ligação covalente coordenada, formando o íon hidrônio, H_3O^+. Diz-se, então, que, quando em solução, os prótons estão solvatados.
- O hidrônio é solvatado por outras moléculas de água, e a espécie mínima formada é $(H_3O \cdot 3\ H_2O)^+$ ou $H_9O_4^+$. É comum, porém, sua representação ser simplificada para $H^+(aq)$ ou $H_3O^+(aq)$.
- Dissociar e ionizar são fenômenos diferentes. O primeiro termo significa quebrar ou separar, e o segundo, formar íons. A leitura do boxe *De olho no conceito* (p. 277) ajudará os estudantes a compreender esses termos.
- Se julgar oportuno, complemente a discussão com o texto do boxe *Ampliação* (p. 277), que apresenta uma terceira teoria sobre ácidos e bases (a teoria de Lewis). Alternativamente, pode-se trabalhar com os estudantes o texto completo da referência.

Constantes de ionização de ácidos e de dissociação de bases (página 278)

- Sugerimos que você se apoie nas discussões a esse respeito realizadas anteriormente. Descreva o que acontece com a dissolução de ácido acético puro em água, por exemplo. Ele se dissolve na água, e algumas de suas moléculas são ionizadas, gerando íons acetato e íons hidrônio, os quais podem se recombinar dando origem a moléculas de ácido acético. No equilíbrio, as concentrações das espécies são constantes, mas não há término dos processos. Enfatize que todas essas espécies estão presentes no meio ao mesmo tempo e que sua proporção determinará o valor da constante de equilíbrio. No caso em análise, a concentração de íons acetato será baixa em relação à de ácido acético não ionizado. Outros ácidos podem apresentar maior ou menor grau de ionização no equilíbrio.
- Peça aos estudantes que verifiquem como o valor da constante de equilíbrio varia de acordo com a extensão da dissociação; para isso, eles devem usar a equação de equilíbrio químico e os conhecimentos adquiridos sobre a extensão de reações.
- Na sequência, apresente-lhes a definição de K_a e destaque a relação existente entre a força dos ácidos e o valor da constante de dissociação. Comparativamente, valores mais altos indicam ácidos mais fortes, e valores menores, ácidos mais fracos. O mesmo raciocínio utilizado para os ácidos aplica-se às bases, com a análise do valor de K_b.

Equilíbrio iônico e produto iônico da água (páginas 279 e 280)

- Para introduzir o equilíbrio iônico da água, pode-se comentar que a água pura apresenta condutividade elétrica e que é possível medir esse valor, embora seja extremamente baixo. Essa condutividade só pode ser explicada pela existência de íons derivados da autoionização das moléculas de água; a partir dessa conclusão, apresente o equilíbrio iônico da água e a expressão da sua constante de equilíbrio. Considerando a temperatura em que a densidade da água é igual a 1 g/mL, comente que a concentração da água é constante e equivale a 55,55 mol/L, e que esse valor já está considerado no valor tabelado de K_w. Reforce o fato de que a constante de equilíbrio depende da temperatura utilizando a tabela da página 280, que relaciona o valor de K_w com a temperatura, e que os valores extremamente baixos indicam que as concentrações de H_3O^+ e de OH^- na água também correspondem a valores muito baixos.
- Se julgar necessário, trabalhe o boxe *Ampliação* (p. 279) para fazer uma breve revisão sobre as interações intermoleculares, os estados de agregação da água e sua capacidade de dissolver substâncias polares.

Determinação do pH (páginas 281 e 282)

- A partir da determinação da $[H_3O^+]$ e da $[OH^-]$ na água pura e neutra, a 25 °C, construa a escala de pH. Os estudantes tendem a achar que os valores possíveis de pH estão compreendidos apenas entre 0 e 14, mas comente que, se uma solução tiver $[H^+]$ maior que 1 mol/L, o pH será negativo, e que uma solução alcalina com $[OH^-]$ maior que 1 mol/L apresentará pH maior que 14. É importante salientar que a correspondência entra a concentração de soluções ácidas e básicas com o pH funciona razoavelmente bem dentro da escala de 0 a 14 em soluções aquosas. No caso de soluções mais concentradas, é maior a divergência entre o cálculo teórico do pH e o valor real. Além disso, não é possível obter valores de pH muito distantes da escala de 0 a 14 porque há um limite na preparação de soluções com concentrações muito elevadas de ácidos e bases. Também é importante reforçar que o pH igual a 7 corresponde a uma solução neutra apenas a 25 °C.
- O boxe *De olho no conceito* (p. 281) pode ser utilizado para retomar cálculos com logaritmo, e o tema propicia o desenvolvimento de questões interdisciplinares com o(a) professor(a) de Matemática. Aproveite esse momento para desenvolver a competência geral **CGEB4**.

Indicadores ácido-base (página 283)

- Para ilustrar a presença de indicadores ácido-base na natureza e seu papel nas plantas, indique a leitura do boxe *Ampliação* (p. 283), que trabalha o tema contemporâneo transversal **Ciência e tecnologia**, ao apresentar a pesquisa de Robert Boyle com extrato de violetas.
- Os indicadores naturais de pH são substâncias orgânicas presentes em flores e vegetais que contêm antocianinas, pigmentos capazes de mudar de cor dependendo do pH. Sugere-se utilizar a experimentação como ferramenta de aprendizagem utilizando materiais e reagentes de baixo custo e presentes no cotidiano dos estudantes. Beterraba, cenoura, repolho roxo, amora, flores coloridas (como azaleias), água, álcool, vinagre e limpador com amoníaco são exemplos de materiais que possibilitariam abordar diversos conteúdos como polaridade das substâncias, solubilidade, extração por solventes, equilíbrios ácido-base e indicadores ácido-base. Tubos de ensaio, béqueres, papel de filtro e outros materiais de laboratório podem ser facilmente substituídos por utensílios de cozinha. Os experimentos ajudam na compreensão dos conteúdos, além de contextualizar e promover a elaboração de hipóteses e o pensamento científico.
- A *Atividade complementar* sugerida neste Manual (p. 516) é uma pesquisa de campo para avaliar o pH do solo. Se julgar pertinente, esta atividade pode propiciar um debate sobre temas do mundo do trabalho e dos processos produtivos.

Titulação ácido-base (página 285)

- Ao trabalhar esse tópico, enfatize que o **ponto de equivalência** e o **ponto de viragem** observados na titulação não têm o mesmo significado. O primeiro representa o momento em que todas as espécies químicas da amostra terão sido tituladas, ao passo que o segundo indica quando a solução atingiu o pH necessário para que a cor do indicador mudasse. Por isso, ao realizar uma titulação, a escolha do indicador é fundamental para evitar erros.
- Nas soluções de ácidos fracos ou de bases fracas, o pH do meio, depois de atingir o ponto de equivalência, será definido pela constante de ionização da substância. Por esse motivo, os valores do pH da solução podem estar muito longe da faixa na qual o indicador muda de cor, como na titulação de soluções de uma base fraca como a amônia, que resultaria em um pH próximo de 5 no ponto de viragem. A fenolftaleína, portanto, é um péssimo indicador para o experimento.
- Ressalte a necessidade de uma escolha cuidadosa do indicador para cada caso e aproveite para trabalhar o conceito de erro experimental e, assim, desenvolver a habilidade **EM13CNT205**.
- Ao abordar o pH de soluções muito diluídas, quando confrontados com a solicitação, por exemplo, de determinar o pH de uma solução de $HC\ell$ com concentração de 10^{-9} mol/L, os estudantes, de modo geral, respondem que o pH será igual a 9. Na verdade, essa resposta representa a simples regra memorizada de que $pH = -\log [H_3O^+]$, embora se trate do equívoco de que o pH acima de 7 corresponde a substâncias básicas, o que não faz sentido no caso do ácido clorídrico. O problema ocorre quando os estudantes não consideram grandezas e não ponderam sobre a origem do conceito de pH, decorrente da autoionização da água, cuja concentração é de H_3O^+ igual a 10^{-7} mol/L. Se refletirem um pouco a respeito, eles vão perceber que o efeito de um ácido tão diluído seria apenas a redução de alguns centésimos do pH da água pura. Lance a eles esse desafio para dirimir os prováveis problemas conceituais desenvolvidos durante o estudo desta unidade.

Práticas de Ciências – Investigando o pH de soluções (página 286)

- Ao desenvolver o item **3** da etapa "Como fazer", o pH da água pura é 7 e ela é considerada neutra. Durante o preenchimento da tabela, estimule a curiosidade dos estudantes a testar também as outras substâncias disponíveis. No caso do café, seu pH é 5, portanto, ele é ácido. Ao testar a hipótese, espera-se que os estudantes compreendam que não é possível diluir o café até que ele se torne básico.

AMOSTRA (0,5 L)	pH	A AMOSTRA É ÁCIDA, BÁSICA OU NEUTRA?	pH APÓS ADIÇÃO DE 0,25 L DE ÁGUA	pH APÓS ADIÇÃO DE 0,5 L DE ÁGUA	A AMOSTRA DILUÍDA É ÁCIDA, BÁSICA OU NEUTRA?
Suco de laranja	3,50	ácida	3,68	3,80	ácida
Leite	6,50	ácida	6,62	6,68	ácida
Sabonete	10,00	básica	9,82	9,70	básica
Canja de galinha	5,80	ácida	5,97	6,08	ácida
Sangue	7,40	básica	7,30	7,24	básica

- O desenvolvimento da atividade experimental com os estudantes organizados em grupos possibilita o exercício do diálogo, o respeito mútuo e o trabalho em equipe com divisão de tarefas. Essas abordagens são contempladas na competência geral **CGEB9**.
- Se optar pela realização da atividade em grupo – o que é recomendável –, ressalte a importância da participação de todos os integrantes, de seguir as etapas de maneira organizada e da tomada conjunta de decisões diante de possíveis obstáculos e contratempos. Essa abordagem permite o trabalho com a competência geral **CGEB10**.
- A atividade com o simulador permite aos estudantes utilizar as tecnologias de informação de forma crítica para produzir conhecimento; com isso, exploram-se a competência geral **CGEB5** e a habilidade **EM13CNT301** (pelo uso de instrumentos de medição para interpretar resultados experimentais).
- Caso a escola não tenha uma sala de informática para que a atividade seja realizada, os estudantes podem utilizar seus próprios dispositivos, pois o simulador está disponível para *tablets* e *smartphones*.

Sistema-tampão ou solução-tampão
(páginas 287 e 288)

- O conceito de solução-tampão pode ser um grande desafio para os estudantes, em virtude de se utilizarem diversos conhecimentos recém-adquiridos. É esperado, portanto, que nem todos apresentem a desenvoltura necessária com os procedimentos matemáticos básicos para a compreensão do sistema-tampão.
- Ilustre a necessidade de manter o pH constante tanto para o meio ambiente (o aumento de CO_2 poderia levar a uma diminuição do pH oceânico e provocar a solvatação de recifes de corais e a mortandade de peixes em água acidificada) quanto para o funcionamento do corpo humano (o transporte do oxigênio pelo sangue depende do pH). O boxe *Ampliação* (p. 287) pode ser trabalhado para encaminhar a discussão deste último tópico. O texto do boxe *Ação e cidadania* (p. 288) discute o efeito tamponante da saliva e sua importância para a saúde bucal. Essa abordagem permite o trabalho com o tema contemporâneo transversal **Saúde**.

Química e Biologia – A acidificação dos oceanos **(página 289)**

- Nesta seção, trabalha-se a habilidade **EM13CNT303**, pois os estudantes são convidados a interpretar textos de divulgação científica relacionados às temáticas das Ciências da Natureza, que estão disponíveis em diferentes mídias, e a construir estratégias de seleção de fontes confiáveis.
- O texto aborda a problemática da acidificação dos oceanos e as consequências disso para os ecossistemas marinhos. Ele integra uma coletânea que reúne textos sobre as mudanças climáticas. Caso julgue oportuno, extrapole esse tema em discussão com os estudantes, procurando desenvolver a **CECNTEM2**.

FONTES COMPLEMENTARES

- Chagas, A. P. Teorias ácido-base do século XXI. *Química Nova na Escola*, n. 5, p. 28-30, maio 1999. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc09/historia.pdf. Acesso em: 20 set. 2024.

  O texto discorre sobre a perspectiva histórica das diversas teorias ácido-base formuladas no século XX , apresentando as relações entre elas e a evolução natural que culminou no conteúdo ensinado atualmente. O artigo aborda também processos e práticas de investigação que podem ser exploradas a partir da história da química.

- Fiorucci, A. R.; Soares, M. H. F. B.; Cavalheiro, E. T. G. Ácidos orgânicos: dos primórdios da química experimental à sua presença em nosso cotidiano. *Química Nova na Escola*, n. 5, p. 6-10, maio 2002. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a02.pdf. Acesso em: 20 set. 2024.

  O artigo aborda uma perspectiva sobre o cotidiano e o histórico dos ácidos orgânicos. Ele descreve a primeira obtenção dessas substâncias em laboratório e comenta suas propriedades e aplicações, tanto naturais como industriais.

TEXTO COMPLEMENTAR

Curva de titulação: ponto de equivalência × ponto de viragem

O gráfico abaixo apresenta a variação do pH durante uma titulação ácido-base com a utilização de um ácido forte e uma base forte. É possível observar que essa variação se torna maior quando o sistema se aproxima do ponto de equivalência.



Curva de titulação ácido-base de ácidos fortes com bases fortes.

No início da titulação, a diferença de grandeza entre a quantidade de H_3O^+ na solução e a quantidade de OH^- em uma gota de titulante é grande o suficiente para que não haja muita alteração de pH. Quando o sistema está próximo do ponto de equivalência, a concentração de H_3O^+ na solução é tão baixa que a quantidade de OH^- em uma gota de titulante é capaz de alterar drasticamente seu pH.

Formalmente, o ponto de equivalência (ponto no qual todos os H_3O^+ foram neutralizados) não é o mesmo que o ponto de viragem experimental observado durante a titulação. O pH de viragem é uma característica única de cada indicador. No caso de titulações de ácidos fortes por bases fortes, indicadores que sofram alteração de cor dentro da faixa de pH entre 5 e 9 podem ser adotados sem que haja grande erro na medida do volume de titulante necessário para atingir o ponto de equivalência.

Nas titulações de bases fracas ou ácidos fracos, o sal resultante sofrerá hidrólise e o pH do meio será definido pelo K_h da substância.

Texto elaborado para fins didáticos

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Determinação de pH de diferentes solos

Solos podem ser naturalmente ácidos ou terem sido acidificados por meio de processos que removem elementos do solo, como K, Ca, Mg e Na, com o uso de fertilizantes ou manejo incorreto do solo.

Em regiões de plantações, essa perda de nutrientes pode prejudicar o crescimento de alguns vegetais que necessitam desses nutrientes e de um solo mais alcalino. Além disso, a plantação pode ser prejudicada pela redução de microrganismos do solo, essenciais para o cultivo de algumas espécies. Nessa atividade de campo, os estudantes vão medir o pH de solos da região da escola ou de dentro da escola. No entanto, para facilitar a medição, é mais interessante utilizar uma solução de cloreto de cálcio 0,01 mol/L, em vez de água. O cloreto de cálcio pode ser encontrado em supermercados, pois é o principal constituinte de antimofos comuns para uso residencial.

Material

- 1 pá de jardim
- 2 bandejas de plástico
- 1 pilão pequeno de madeira
- 1 peneira que retenha areia grossa
- 6 copos plásticos transparentes com capacidade para 200 mL
- 1 colher de sopa
- 3 colheres de plástico
- 3 funis
- 3 filtros para café
- solução de $CaC\ell_2$ 0,01 mol/L
- papel tornassol azul e vermelho
- solução de fenolftaleína a 1%
- papel indicador universal

Como fazer

1. Coletar a amostra de solo com o auxílio da pá de jardim.
2. Secar ao ar livre, em bandejas de plástico.
3. Moer o solo com o auxílio de um pilão e, posteriormente, peneirá-lo.
4. Pesar 10 g de solo seco (utilizar uma colher de sopa rasa).
5. Adicionar 25 mL da solução de cloreto de cálcio 0,01 mol/L.
6. Agitar ocasionalmente por 30 min.
7. Fazer uma filtragem simples utilizando o filtro de café.
8. Separar a mistura filtrada em 3 copos: um para medir o pH com papel tornassol, outro com fenolftaleína e outro para o papel indicador universal.
9. Determinar o pH em cada um dos copos, utilizando cada um dos indicadores.

Para concluir

1. O solo analisado tem caráter ácido ou básico? Justifique a sua resposta.
2. Utilizando o valor do pH encontrado no experimento, calcule a concentração de íons H^+ e OH^- presentes no filtrado analisado.
3. Em solos em que o pH é básico, há maior disponibilidade de cálcio, magnésio e fósforo para as plantas, o que favorece o seu desenvolvimento. Qual é a função desses elementos no metabolismo vegetal?

O caráter ácido ou básico do solo depende da amostra colhida pelos estudantes. O cálcio é essencial para a formação e estabilidade das paredes celulares das plantas, contribuindo para a rigidez estrutural e integridade das células, além de atuar na sinalização celular e divisão celular. O magnésio é o átomo central da molécula de clorofila, fundamental para a fotossíntese, atuando também como cofator enzimático em várias reações metabólicas, incluindo a síntese de carboidratos e proteínas. O fósforo é importante para o armazenamento e transferência de energia nas células vegetais, sendo componente do ATP, e participa na formação de ácidos nucleicos (DNA e RNA), influenciando a replicação celular e a síntese proteica.

Fonte de pesquisa: Antunes, M. *et al*. pH do solo: determinação com indicadores ácido-base no Ensino Médio. *Química Nova na Escola*, v. 31, n. 4, nov. 2009. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_4/11-EEQ-3808.pdf. Acesso em: 14 out. 2024.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

Durante o desenvolvimento da atividade prática, avalie o envolvimento e a participação dos estudantes. Além disso, utilize as respostas e as conclusões deles como modo de avaliar a compreensão dos assuntos abordados no experimento.

Podem ser propostas outras atividades com o uso do simulador para serem usadas como atividades avaliativas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 275)

1. De acordo com a teoria ácido-base de Arrhenius, substâncias ácidas são aquelas que, em solução aquosa, liberam íons H^+, e substâncias básicas são as que, em solução aquosa, liberam íons OH^-. Os estudantes também podem responder com base na teoria de Brönsted-Lowry, na qual ácidos são doadores de prótons e bases são receptoras de prótons.
2. O pH é uma escala utilizada para determinar o caráter ácido, básico ou neutro das soluções. A segunda resposta é variável. Os estudantes podem citar a importância de conhecer o pH em que ocorrem as reações químicas no corpo humano, a manutenção do pH de corpos de água ou do solo para a agricultura dentro de valores específicos para a manutenção da vida, etc. Comente que grandes variações de pH no sangue, por exemplo, podem levar o indivíduo a óbito, mostrando a grande relevância do estudo do pH nos organismos.
3. Sistema-tampão é a solução que tem a capacidade de evitar que o pH sofra grandes variações com a adição de pequenas quantidades de ácido ou de base. Peça aos estudantes que levantem hipóteses sobre a composição de um sistema-tampão e seu mecanismo de ação.

Roteiro (páginas 277, 281 e 285)

1. $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$

   Par conjugado

   Par conjugado

   HF: ácido H_2O: base H_3O^+: ácido F^-: base

   No caso dos pares conjugados dessa questão, convém utilizar a teoria de Bröwsted-Lowry para identificar as substâncias ácida e básica de cada par conjugado.
2. Com base na Teoria de Dissociação de Arrhenius, considera-se que o ácido acético é um ácido porque, ao ser dissolvido em água, produz cátions exclusivamente do tipo H^+. Também se trata de um ácido, de acordo com a Teoria Protônica de Brönsted-Lowry, porque é uma espécie química capaz de ceder prótons. Se julgar pertinente, faça uma comparação entre a teoria de Arrhenius e a de Brönsted-Lowry para algumas substâncias básicas, como metilamina, amônia e hidróxido de sódio, questionando os estudantes sobre qual delas se aplica melhor a cada um dos exemplos.

3. A neutralização total envolve a equação:

$H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$

$n_{H^+} = n_{OH^-} = 2{,}0 \cdot 10^{-5} \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 1{,}0 \cdot 10^{-6}$ mol

$n_{H^+} = n_{HC\ell} = 1{,}0 \cdot 10^{-6}$ mol

$C = \dfrac{n_{HC\ell}}{V_{solução}}$

$V_{solução} = \dfrac{1{,}0 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-2}} = 5 \cdot 10^{-5}$ L ou 0,05 mL

Caso julgue necessário, apresente aos estudantes a resolução utilizando a regra de três.

4. $[H_3O^+] = 5 \cdot 10^{-8}$ mol/L

$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(5 \cdot 10^{-8}) = -(\log 5 + \log 10^{-8}) =$
$= -(0{,}7 - 8)$

$pH = 7{,}3$

Práticas de Ciências – Investigando o pH de soluções (página 286)

Para concluir

1. Quando se dilui uma solução aquosa, o pH tende a se aproximar de 7. Portanto, quando uma solução ácida é diluída, o pH aumenta e, quando a solução original é básica, o pH diminui. Os estudantes podem experimentar buscar contraexemplos de suas generalizações.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes concluam que uma solução inicialmente ácida não se tornará básica com a adição de água. A adição de água, como discutido anteriormente, aproxima o pH do valor 7, ou seja, da neutralidade, e não ultrapassa esse limite. A característica ácida da amostra é inerente às substâncias que a compõem e não da sua concentração. A concentração altera apenas o grau da acidez ou basicidade. Essa questão também pode ser feita oralmente pelos estudantes, antes de eles realizarem o experimento virtual.

3. Como o pH do sabonete é 10 e o do leite é 6,5, a mistura, independentemente das proporções, teria pH entre 10 e 6,5. No caso de partes iguais, a solução resultante deve ter pH acima de 7, ou seja, básica. Pode-se fazer um paralelo entre essa atividade e a atividade **1**, visto que, na atividade **1**, propõe-se a adição de uma substância de pH 7, a água, para análise da variação do pH de uma outra solução qualquer.

Ação e cidadania – O pH da saliva e as cáries (página 288)

2. Atividade de pesquisa. Organize os estudantes em grupos para a realização da pesquisa e oriente-os na seleção de fontes confiáveis de informação. Ressalte a importância da higiene bucal para reduzir o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. Se julgar oportuno, peça a eles que pesquisem também os alimentos que facilitam a remoção de resíduos gerados durante a alimentação e que contribuem para reduzir a acidez da saliva, evitando problemas bucais.

Química e Biologia – A acidificação dos oceanos (página 289)

1. Sim, pois esses organismos são suscetíveis à acidificação dos oceanos. O texto descreve, por exemplo, "impactos no metabolismo, crescimento e calcificação, expressão gênica, sistema imunológico e estrutura da comunidade, que poderiam produzir efeitos devastadores na cadeia alimentar e nos ecossistemas". Comente com os estudantes que a alcalinização do meio também produz efeitos semelhantes. É muito comum que os estudantes acreditem que a alcalinização provoque menos danos que a acidificação dos oceanos.

2. No texto, é mencionado que a produção do esqueleto pode ser comprometida pela dificuldade na deposição de carbonato de cálcio. As estruturas calcárias expostas à água também podem ser dissolvidas, reduzindo a capacidade de sustentação e proteção do organismo. Se julgar pertinente, apresente a reação da dissolução do carbonato de cálcio em meio ácido: $2H^+(aq) + CaCO_3(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$.

3. Promova uma discussão com os estudantes sobre a relação entre as ações antrópicas e a acidificação dos oceanos. Faça-os refletir, por exemplo, sobre como atitudes como a utilização de transporte coletivo no lugar de veículos individuais pode reduzir a emissão de gases que influenciam no processo de acidificação. Os estudantes podem trabalhar em pequenos grupos para elaborar uma lista de ações que minimizem os impactos causados pela acidificação dos oceanos e expor o trabalho final no mural da escola, por exemplo.

Atividades (páginas 290 e 291)

2. **a)** A amônia interage com a água produzindo íons NH_4^+ e OH^-, ocorrendo um aumento da concentração de íons OH^-. Como consequência, o pH aumenta.

   b) Ao aumentar a concentração de ácidos nitroso e nítrico, há aumento da concentração de íons H^+ (ou H_3O^+), e o pH diminui.

3. **b)** O valor de pH mede a concentração de íons H^+ em solução e está relacionado com a acidez. Ou seja, quanto menor o valor de pH, mais ácido será o meio e, portanto, maior será a concentração de íons H^+ em solução.

   Dessa forma, a solução que apresenta o maior valor de pH será a menos ácida. Logo, essa solução será a do ácido ascórbico, que apresenta o menor valor de K_a.

4. De acordo com o gráfico, o valor de K_w para 45 °C é aproximadamente $4{,}0 \cdot 10^{-14}$. Considerando que na água pura $[H_3O^+] = [OH^-]$, temos:

$K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$

$4{,}0 \cdot 10^{-14} = x \cdot x$

$x^2 = 4{,}0 \cdot 10^{-14}$

$x = [H_3O^+] = [OH^-] = 2 \cdot 10^{-7}$ mol/L

Note que o valor exato de K_w não pode ser obtido por meio do gráfico. Então, o valor encontrado para as concentrações de H^+ e OH^- é aproximado.

5. **a)** detergente líquido: $pH = 8 \Rightarrow [H^+] = 10^{-8}$ mol/L e $[OH^-] = 10^{-6}$ mol/L

   limpador multiúso: $pH = 11 \Rightarrow [H^+] = 10^{-11}$ mol/L e $[OH^-] = 10^{-3}$ mol/L

   limpador de forno: $pH = 13 \Rightarrow [H^+] = 10^{-13}$ mol/L e $[OH^-] = 10^{-1}$ mol/L

   c) $\dfrac{[OH^-]_{limpador\ multiúso}}{[OH^-]_{detergente\ líquido}} = \dfrac{10^{-3}}{10^{-6}} = 10^3$. Portanto, a concentração de íons OH^- do limpador multiúso é 1 000 vezes maior do que a do detergente líquido.

7. **a)** $C = \dfrac{29{,}6 \cdot 10^{-3}}{176 \cdot 150 \cdot 10^{-3}} = 1{,}12 \cdot 10^{-3}$ mol/L

   b) $K_a = \dfrac{[H^+] \cdot [C_6H_7O_6^-]}{[C_6H_8O_6]}$

$8 \cdot 10^{-5} = \dfrac{x \cdot x}{(1{,}12 \cdot 10^{-3} - x)}$

$x^2 \simeq 9 \cdot 10^{-8}$

$x \simeq 3 \cdot 10^{-4}$ mol/L

c) $pH = -\log 3 \cdot 10^{-4} = 4 - \log 3 = 4 - 0{,}5$

$pH = 3{,}5$

O pimentão, a tangerina, a manga, o morango e o mamão são outros alimentos ricos em vitamina C. Ao contrário do que é muito difundido, a vitamina C não se degrada logo após a preparação do suco. Após 6 horas, a perda é de cerca de 20% da vitamina C apenas.

9. a) $CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$

b) A escala de pH corresponde a uma escala logarítmica da $[H^+]$, de modo que um decréscimo de 0,3 no valor de pH corresponde a um aumento de $[H^+]$ de 2 vezes, pois $\log 2 = 0{,}3$. Ou seja, a $[H^+]$ dobraria.

Considerando $pH = 8$, então $[H^+] = 10^{-8}$ mol/L.

Se $pH = 7{,}7 \Rightarrow [H^+] = 2 \cdot 10^{-8}$ mol/L ($pH = 8 - \log 2 = 7{,}7$).

CAPÍTULO 3 EQUILÍBRIOS EM SISTEMAS HETEROGÊNEOS (PÁGINA 292)

- Este capítulo é constituído por dois módulos: equilíbrios heterogêneos e produto de solubilidade. Recomendamos usar o texto de abertura do capítulo para contextualizar o tema que será tratado e verificar as primeiras impressões dos estudantes sobre ele.

Acidificação dos oceanos (página 292)

- Uma das metas do ensino de Química na Educação Básica é levar os estudantes a compreender quimicamente fenômenos em curso no ambiente em que vivem, tanto natural quanto construído pelo ser humano. Para contextualizar essa proposta, o capítulo se inicia com um texto sobre o problema da acidificação da água dos mares relacionado à sobrevivência dos corais. Sugerimos utilizá-lo como base para uma discussão na sala de aula sobre poluentes e suas consequências ambientais. Você pode convidar os estudantes a observar, analisar, explicar e propor soluções para enfrentar essa situação-problema com um pensamento crítico e fundamentado na ciência. Paralelamente, retome conceitos sobre ácidos e suas reações, com enfoque na formação de equilíbrios heterogêneos.

Equilíbrios heterogêneos (páginas 293 e 294)

- Discuta a formação de estalactites e estalagmites e, com base nas reações químicas reversíveis envolvidas, explique a expressão da constante de equilíbrio (K_c) em sistemas heterogêneos sólido-gás e líquido-gás, ressaltando que ela resulta da interpretação de dados experimentais e não de deduções puramente matemáticas.
- Se considerar oportuno, proponha novamente a discussão sobre o motivo de as concentrações de substâncias sólidas, representadas por (s), e líquidas, representadas por (ℓ), em um sistema heterogêneo, serem suprimidas da expressão da constante K_c.
- Se julgar conveniente, utilize o boxe *Química e Biologia* (p. 293) para ilustrar um exemplo de equilíbrio heterogêneo que apresenta consequências biológicas.
- Retome então o princípio de Le Châtelier e os fatores que afetam o equilíbrio químico: concentração, pressão e temperatura. Nesse momento, se houver disponibilidade, faça uso de animações e *softwares* para que os estudantes não criem a concepção errônea de que o equilíbrio químico é estático ou que se assemelha ao equilíbrio de pratos em uma balança, como demonstram diversas pesquisas na área do ensino de Química. A partir do experimento, expanda os conceitos para os sistemas heterogêneos. Na discussão da influência da temperatura na alteração do equilíbrio, o ponto de partida pode ser a solubilidade do café instantâneo na água. Proponha a discussão sobre o aumento da solubilidade em água quente. Paralelamente, realize a atividade proposta na seção *Práticas de Ciências* (p. 297), que estuda a influência da temperatura na solubilidade dos sais. Nesse momento, recupere os conceitos de entalpia e de reações endotérmicas e exotérmicas.

Produto de solubilidade (K_{PS}) (página 296)

- É importante não confundir a solubilidade de um composto com seu produto de solubilidade. A solubilidade indica a quantidade dissolvida de sólido em certo volume de solução saturada. O produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio que está diretamente relacionada à solubilidade do composto. Conceitos como solução saturada, solução insaturada e curvas de solubilidade podem ser relembrados, caso se detectem dúvidas a respeito.

Práticas de Ciências – A influência da temperatura na solubilidade dos sais (página 297)

- Solicite aos estudantes o uso dos equipamentos de segurança indicados no livro: óculos de segurança e avental de algodão com mangas compridas.
- Antes de iniciar o experimento, é necessário ferver água suficiente para fornecer a cada grupo entre 300 mL e 500 mL de água quente. Identifique com letras grandes o conteúdo do recipiente, para a segurança dos estudantes. Introduza nele água na mesma proporção que gelo. Empregue os valores obtidos (alturas dos precipitados) como gerador de uma discussão sobre as razões das diferenças constatadas, entre as quais podem ser apontadas: diferença de temperatura nos sistemas; volume das soluções; quantidade de sulfato de cobre(II) introduzido; e outras.
- Ao final da atividade, devem-se guardar as soluções devidamente separadas e rotuladas, pois elas podem ser utilizadas em outras atividades desse tipo.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Despoluição da água por precipitação (páginas 298 e 299)

- Esta seção trata da retirada de metais pesados contidos em efluentes industriais por meio de reações de precipitação. Desse modo, trabalha-se a competência específica **CECNTEM3** (analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico), a habilidade **EM13CNT307** (analisar as propriedades específicas dos materiais para propor soluções seguras e sustentáveis) e o tema contemporâneo transversal **Educação ambiental**, da área Meio ambiente.

SUGESTÃO DE AULA

- Inicialmente, convide o(a) professor(a) de Biologia para mostrar aos estudantes as consequências da contaminação causada pelo descarte de efluentes contaminados sobre os organismos vivos.
- Em seguida, leia o texto com a turma e proponha aos estudantes que formem grupos e discutam as consequências

sociais da contaminação da água por metais pesados. Depois, peça que cada grupo apresente as suas conclusões.

- Por fim, peça aos estudantes que respondam às atividades do item "Para discutir" e, em seguida, converse sobre o que eles responderam.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Durante o desenvolvimento da aula sugerida na *Sugestão de aula*, avalie o envolvimento e a participação dos estudantes. Além disso, utilize as respostas e as conclusões deles como maneira de avaliar a compreensão dos assuntos abordados.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Práticas de Ciências – A influência da temperatura na solubilidade dos sais (página 297)

1. O experimento demonstra como a temperatura influencia a solubilidade dos compostos. Embora, na maioria dos casos, o aumento da temperatura resulte em um aumento da solubilidade, como no caso do sulfato de cobre(II), em alguns casos o aumento da temperatura provoca uma diminuição da solubilidade, como nos casos do acetato de cálcio e do hidróxido de cálcio.
2. A solubilidade do sulfato de sódio diminui com o aumento da temperatura.

Atividades (páginas 300 e 301)

2. Alternativa **e**. A constante de equilíbrio se altera somente com a mudança da temperatura.
3. $K_{PS} = [Fe^{3+}] \cdot [OH^-]^3$

   $1{,}0 \cdot 10^{-39} = 10^{-3} \cdot [OH^-]^3$

   $[OH^-]^3 = 10^{-36}$

   $[OH^-] = 10^{-12}$ mol/L
4. Alternativa **a**. Se a solução apresenta pH = 10 ⇒ pOH = 4 ⇒ ⇒$[OH^-] = 10^{-4}$ mol/L.

   Como a dissociação produz um mol de B^{2+} para 2 mol de OH^-, temos que $[B^{2+}] = 5 \cdot 10^{-5}$ mol/L.

   $K_{PS} = [B^{2+}] \cdot [OH^-]^2 = (5 \cdot 10^{-5}) \cdot (10^{-4})^2 = 5 \cdot 10^{-13}$
5. $K_{PS} = [Ca^{2+}] \cdot [F^-]^2$

   $4 \cdot 10^{-11} = [Ca^{2+}] \cdot (5 \cdot 10^{-5})^2$

   $[Ca^{2+}] = 1{,}6 \cdot 10^{-2}$ mol/L

   Esses cálculos mostram que a precipitação de fluoreto de cálcio na água fluoretada ocorrerá quando a concentração de íons de cálcio for superior a $1{,}6 \cdot 10^{-2}$ mol/L, valor superior ao teor desses íons ($4 \cdot 10^{-3}$ mol/L) na amostra analisada. Portanto, não ocorrerá precipitação de CaF_2.
6. **b)** A transformação química associada à alteração do pH da água do aquário corresponde ao equilíbrio envolvendo o dióxido de carbono e água, com formação dos íons H^+ e HCO_3^-. Os íons H^+ formados são os responsáveis pela acidificação da água do aquário. O borbulhamento de CO_2 contínuo na ausência de luz desfavoreceu a fotossíntese, aumentando a concentração de CO_2 dissolvido na água.
8. Alternativa **c**. Como o $Ca(NO_3)_2$ é solúvel, uma solução saturada desse sal apresenta uma grande quantidade de íons Ca^{2+} dissolvidos que, ao entrarem em contado com os ânions SO_4^{2-} presentes na solução, precipitarão na forma de $CaSO_4(s)$.
9. **b)** pH = 8 ⇒ $[H^+] = 10^{-8}$ mol/L

   $K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-8} \cdot [OH^-] = 10^{-14}$

   $[OH^-] = 10^{-6}$ mol/L

   c) O CO_2 é um gás de efeito estufa, e o aumento de sua concentração na atmosfera implica um aumento desse fenômeno, que, em proporções globais, pode propiciar o aquecimento global. Com isso, há um aumento na temperatura média da água do mar. De acordo com o texto, temperaturas acima do normal podem acarretar uma série de consequências que podem levar os corais à morte. Além disso, o aumento da concentração de CO_2 na atmosfera faz com que aumente a pressão parcial do CO_2 nesse sistema, de forma a aumentar a dissolução desse gás na água do mar, tornando-a menos alcalina (ou provocando uma acidificação da água do mar). O equilíbrio abaixo é favorecido no sentido da formação de íons H^+.

   $CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H^+(aq)$

   Quanto maior a quantidade de íons H^+ dissolvida, maior a dissolução de carbonato de cálcio e a consequente destruição de corais. O processo pode ser representado por:

   $CaCO_3(s) + H^+(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + HCO_3^-(aq)$

   Somando as duas etapas, temos:

   $CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq)$

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 302 A 305)

Estudo de caso – Comprimidos e antiácidos: o que eles podem nos contar sobre o controle do pH (páginas 302 e 303)

- É indicado que os estudantes trabalhem em duplas ou em pequenos grupos de até quatro integrantes. O desenvolvimento da atividade com os estudantes organizados em grupos possibilita o exercício do diálogo, do respeito mútuo e do trabalho em equipe com divisão de tarefas, contemplando a competência geral **CGEB9**.
- Se optar pela realização da atividade em grupo – o que é recomendável –, ressalte a importância da participação de todos os integrantes, de seguir as etapas de maneira organizada e da tomada conjunta de decisões diante de possíveis obstáculos e contratempos. Essa abordagem permite o trabalho com a competência geral **CGEB10**.
- A utilização de comprimidos analgésicos e antiácidos é o ponto de partida desta seção. Peça aos estudantes que leiam o texto e procurem interpretá-lo. Em seguida, eles devem ler as questões propostas e buscar respostas com base no que aprenderam; caso não consigam encontrá-las, oriente-os para que façam as pesquisas necessárias.
- As pesquisas podem ser realizadas em livros disponibilizados para a turma durante a aula ou na internet, caso a escola tenha acesso fácil a computadores (ou mesmo com a utilização de *tablets* ou *smartphones*, caso esses equipamentos façam parte da rotina de aula da escola).
- É importante ressaltar que, mais do que acertar as respostas, o objetivo é que os estudantes possam trabalhar os conceitos estudados no capítulo de maneira contextualizada e utilizar o conhecimento científico na resolução de um problema real. Anote os problemas conceituais que possam ter surgido e, depois, discuta-os com os estudantes, fazendo as devidas correções.
- A atividade desenvolve a habilidade **EM13CNT301** ao trabalhar a interpretação de modelos explicativos e dados para construir e avaliar conclusões de uma situação-problema de uma perspectiva científica.
- A habilidade **EM13CNT303** é trabalhada no âmbito da interpretação de textos de divulgação científica.
- A competência geral **CGEB2** é desenvolvida no exercício da curiosidade intelectual, ao estimular a investigação, a análise

crítica e a imaginação para investigar causas, elaborar hipóteses e resolver problemas.

- A seção *Estudo de caso* pode ser utilizada para avaliar a capacidade de leitura e compreensão de texto, de pesquisa e de seleção de fontes de pesquisa e informação, além da apropriação de métodos próprios das ciências, como a elaboração de perguntas e hipóteses.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Estudo de caso – Comprimidos e antiácidos: o que eles podem nos contar sobre o controle do pH (páginas 302 e 303)

1. Alterações do pH dentro da faixa de 6,8 a 8 são toleradas pelo nosso organismo. Considerando que o sangue tem pH igual a 7,4, são, portanto, toleradas variações que não ultrapassem uma diferença de 0,6 para cima ou para baixo desse valor normal. Fazendo a conversão de pH para concentração de íons H^+, essa diferença equivale a $10^{-0,6}$ mol/litro, ou seja, há cerca de 0,25 mol/litro para mais ou para menos da concentração normal de H^+ no sangue. Os estudantes podem utilizar uma calculadora científica *on-line* para os cálculos que envolvem potências de 10 com expoentes não inteiros.

4. A reação da qual a questão trata é a seguinte: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. Quando o pH do sangue diminui (aumenta a concentração de H^+), o equilíbrio da reação é favorecido no sentido dos reagentes, ou seja, para o aumento da produção de H_2CO_3 e de CO_2. Esse CO_2 em excesso é, então, liberado para o meio externo pelos pulmões e, por isso, ocorre a hiperventilação, isto é, o aumento da intensidade e da frequência respiratórias. Os estudantes podem ter dificuldades para relacionar a hiperventilação com a redução da pressão parcial de CO_2 sanguínea. Caso isso ocorra, promova uma breve discussão em pequenos grupos ou com a turma inteira para evitar a manutenção de concepções alternativas.

5. Caso a menina tivesse ingerido grandes quantidades de bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$), a concentração de íons bicarbonato (HCO_3^-) no sangue dela aumentaria, pois, em água, o bicarbonato de sódio se dissocia da seguinte forma: $NaHCO_3 \rightleftharpoons Na^+ + HCO_3^-$. Esse aumento da concentração de íons HCO_3^-, então, consumiria íons H^+ livres no sangue, produzindo H_2CO_3, segundo a reação: $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3$. Isso, portanto, levaria à diminuição da concentração de H^+ no sangue, aumentando o pH dele. Nesse caso, o sistema de tamponamento do sangue agiria da seguinte maneira: com a diminuição de íons H^+ livres no sangue, ocorreria um aumento relativo da quantidade de íons OH^- livres. O H_2CO_3, então, liberaria íons H^+, os quais reagiriam com o OH^-, produzindo água. Isso favoreceria o equilíbrio no sentido dos produtos: $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. O organismo reagiria com uma hipoventilação para aumentar a concentração de CO_2 no sangue e, consequentemente, favorecer o equilíbrio para a formação dos reagentes: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. Faça um paralelo com a atividade **4**, evidenciando o papel do sistema respiratório na manutenção do pH sanguíneo.

6. A hipoventilação resulta em um aumento da concentração de CO_2 no sangue, porque a liberação de CO_2 para o meio externo pelos pulmões diminui. O aumento da concentração de CO_2 no sangue, por sua vez, leva à produção de H_2CO_3. Esse ácido se ioniza, formando íons H^+ e, portanto, diminuindo o pH sanguíneo. A seguinte reação tem seu equilíbrio favorecendo a formação dos produtos: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. No entanto, a hiperventilação leva a uma diminuição da concentração de CO_2 no sangue porque a liberação de CO_2 para o meio externo pelos pulmões aumenta. Isso favorece a formação dos reagentes da reação mencionada, consumindo íons H^+ livres no sangue e, portanto, aumentando o pH sanguíneo. A hiperventilação e a hipoventilação podem ser causadas por diversos fatores, como a asma, no caso da hipoventilação, e podem ser estimuladas pelo organismo como um mecanismo compensatório. Faça um esquema na lousa com os estudantes, mostrando as alterações na ventilação como causa ou consequência da variação do pH sanguíneo, utilizando os exemplos desta seção.

7. O sangue da menina se encontrava com uma concentração de íons H^+ além do normal. A injeção intravenosa de bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) fez aumentar a concentração de íons bicarbonato (HCO_3^-) no sangue. Isso, por sua vez, consumiu íons H^+ que estavam em excesso no sangue, restabelecendo o pH, conforme a reação: $H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3$. Quando ocorre um aumento do pH do sangue, os rins atuam (1) aumentando a reabsorção de HCO_3^-, o que eleva a concentração desse íon no sangue (de forma semelhante à descrita acima) , e (2) aumentando a excreção de íons H^+ para a urina, o que diminui a concentração desse íon no sangue. Ambos contribuem para a elevação do pH sanguíneo. Apesar de alterações na ventilação serem respostas compensatórias às variações de pH sanguíneo, elas não são 100% eficientes, e o organismo conta com variações na reabsorção e excreção de íons pelo sistema excretor para normalizar o pH nesses casos.

Questões globais (páginas 304 e 305)

1. Alternativa **d**. Os sucos de abacaxi e limão apresentam caráter ácido; portanto, as cores apresentadas após a adição de indicador de repolho roxo devem ser as que se encontram nessa faixa (rosa ou vermelha). Essa questão é qualitativa. Não há necessidade de conhecer o pH exato do suco de limão e do suco de abacaxi para determinar a coloração exata, mas as cores que podem ser observadas com o indicador de repolho roxo.

2. Alternativa **e**. Pela escala de cor apresentada, têm-se as substâncias amoníaco e leite de magnésia como básicas, e vinagre e leite de vaca como substâncias ácidas. Para explorar ainda mais essa questão, proponha uma discussão sobre a natureza ácida ou básica de uma solução que se apresenta roxa após a adição do indicador de repolho roxo. Como o roxo se encontra em uma faixa de pH que vai de aproximadamente 6,5 a 9, a solução pode ser levemente ácida, neutra ou básica, de modo que não é possível determinar a sua natureza exata utilizando esse indicador.

3. **a)** O recipiente com ácido kójico contém 7 moléculas de ácido não ionizadas e 3 moléculas ionizadas. Portanto, o grau de ionização é de 30%. Já o recipiente com ácido hialurônico contém 5 moléculas de ácido não ionizadas e 5 moléculas ionizadas. Portanto, o grau de ionização é de 50%. O ácido hialurônico é mais forte que o ácido kójico.

b) Para um ácido forte como o $HC\ell$, espera-se que as três moléculas sofram ionização ao serem dissolvidas em água.

4. Alternativa **a**. A espécie neutra que contribui significativamente para oxidar o vírus é o $HC\ell O$, que é ácido.

5. Alternativa **d**. Ao aumentar a quantidade de oxigênio na etapa 2, o equilíbrio é deslocado no sentido da formação de produtos, consumindo o NO(g).

6. Alternativa **c**. O aumento da concentração de CO_2 na atmosfera desloca a reação no sentido da formação de produtos, aumentando a concentração de H^+, que causa diminuição do pH.

7. Alternativa **b**. A substância com maior K_{PS} é a mais solúvel.

8. Alternativa **a**. Como a escala de pH é logarítmica, cada unidade que diminui no pH significa que a solução ficou 10 vezes mais ácida. Ao diminuir duas unidades, a solução ficou $10^2 = 100$ vezes mais ácida.

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. **(Enem)** O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um "sabonete de aço inoxidável", constituído de aço inox (74%), cromo e níquel. A principal vantagem desse "sabonete" é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



Estrutura I

$CH_2 = CH - CH_2 - S - S - CH_2 - CH = CH_2$

Estrutura II

Enem, 2019. Fac-símile/ID/BR

Na conversão de I em II, o "sabonete" atuará como um

a) ácido.
b) redutor.
c) eletrólito.
d) tensoativo.
e) catalisador.

Alternativa **e**. De acordo com o texto, ao neutralizar o odor, o "sabonete" não se desgasta. Por esse motivo, conclui-se que ele é o catalisador da reação que converte I em II.

2. **(Fuvest-SP)** Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações químicas que dificultam sua absorção pelas plantas. O quadro mostra algumas dessas transformações, em função do pH do solo.

Elementos presentes nos nutrientes	pH do solo (4 5 6 7 8 9 10 11)
Fósforo	Formação de fosfatos de ferro e de alumínio, pouco solúveis em água; Formação de fosfatos de cálcio, pouco solúveis em água
Magnésio	Formação de carbonatos pouco solúveis em água
Nitrogênio	Redução dos íons nitrato a íons amônio
Zinco	Formação de hidróxidos pouco solúveis em água

Fuvest, 2017. Fac-símile: ID/BR

Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, o seu pH deverá estar entre

a) 4 e 6.
b) 4 e 8.
c) 6 e 7.
d) 6 e 11.
e) 8,5 e 11.

Alternativa **c**. De acordo com o quadro, quando pH < 6, ocorrem modificações não desejadas nos compostos que contêm fósforo e nitrogênio. Quando pH > 7, compostos com zinco sofrem modificações não favoráveis a sua absorção. Da mesma maneira, para pH > 8 e pH > 9, o fósforo e o magnésio, respectivamente, formam compostos com cálcio, os quais também são absorvidos pelas plantas. Portanto, a faixa de pH ideal para que o solo forneça todos esses elementos para as plantas é entre 6 e 7, região destacada na tabela abaixo.

Elementos presentes nos nutrientes	pH do solo (4 5 6 7 8 9 10 11)
Fósforo	Formação de fosfatos de ferro e de alumínio, pouco solúveis em água; Formação de fosfatos de cálcio, pouco solúveis em água
Magnésio	Formação de carbonatos pouco solúveis em água
Nitrogênio	Redução dos íons nitrato a íons amônio
Zinco	Formação de hidróxidos pouco solúveis em água

Fuvest, 2017. Fac-símile: ID/BR

3. **(UEMG)** Uma fábrica de sucos realizou análises físico-químicas em um laboratório de controle de qualidade do suco de limão com manjericão e do suco de tomate e obteve os seguintes resultados:

– Suco de limão com manjericão: pH = 2,3

– Suco de tomate: pH = 4,3

Dados: log 5 = 0,7

Com base nos resultados, é **correto** afirmar que:

a) O suco de limão com manjericão é 2 vezes mais ácido que o suco de tomate.
b) A concentração de OH^- nos dois sucos é igual a zero.
c) No suco de tomate a $[H^+]/[OH^-] = 1$.
d) A concentração de H^+ no suco de limão com manjericão é igual a $5 \cdot 10^{-3}$ mol/L.

Alternativa **d**. Como a escala de pH é uma escala logarítmica, a diminuição de uma unidade de pH implica uma concentração de íons $[H^+]$ 10 vezes maior, de modo que o suco de limão com manjericão é 100 vezes mais ácido que o suco de tomate. Como para soluções aquosas temos $K_w = [H^+][OH^-]$, então $[OH^-]$ é diferente de zero e, para que em uma solução $[H^+]/[OH^-]$ seja igual a 1, a $[H^+]$ e a $[OH^-]$ devem ser iguais, de modo que a solução, nesse caso, é neutra e não ácida como nos sucos de tomate e de limão com manjericão. Se a $[H^+] = 5 \cdot 10^{-3}$ mol/L, então o pH da solução é igual a 2,3.

$pH = -\log[H^+]$

$pH = -\log(5 \cdot 10^{-3})$

$pH = -(\log 5 + \log 10^{-3})$

$pH = -(0{,}7 - 3 \cdot \log 10)$

$pH = -(0{,}7 - 3)$

$pH = 2{,}3$

7 A QUÍMICA DA VIDA

INTRODUÇÃO

Esta unidade é composta de quatro capítulos. O capítulo 1 trata dos ciclos biogeoquímicos. No capítulo 2, são abordadas as cadeias carbônicas e suas classificações e algumas propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. O capítulo 3 trata dos hidrocarbonetos, do petróleo e discute alguns casos de isomeria plana. No capítulo 4, são apontadas as diversas utilizações dos compostos orgânicos e descritas as características de suas estruturas, assim como sua nomenclatura e propriedades. Apresentam-se também as suas aplicações e as implicações ambientais. Espera-se, desse modo, despertar o interesse dos estudantes e levá-los a constatar a relação entre esses compostos e o cotidiano. Ao final da unidade, a seção *Estudo de caso* (p. 366 e 367) aborda o uso do DDT, para que os estudantes avaliem os prós e os contras da utilização dessa substância.

Os objetivos da unidade se articulam a esse e a outros contextos e ao desenvolvimento de competências gerais, como a **CGEB1** (valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos), a **CGEB2** (exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas) e a **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis). Também são desenvolvidas habilidades como a **EM13CNT101** e a **EM13CNT105**, ao analisar os ciclos biogeoquímicos e fontes não renováveis de energia, e como a **EM13CNT104** e a **EM13CNT307**, ao analisar propriedados dos materiais e seus usos, e avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais ao ambiente.

Sugestão de planejamento

Sugere-se que, nesta unidade, os ciclos biogeoquímicos do capítulo 1 sejam abordados em parceria com o(a) professor(a) de Biologia. Outra oportunidade de trabalho interdisciplinar, com o(a) professor(a) de Língua Portuguesa, ocorre na seção *Química e Língua Portuguesa*, ao ser trabalhado o uso de uma mesma palavra com diferentes sentidos. O capítulo 3 também permite um trabalho interdisciplinar com o(a) professor(a) de Geografia, ao tratar das mudanças climáticas.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Compreender os ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. • Construir um terrário para observar o ciclo da água. • Pesquisar fontes de emissão de gás carbônico na comunidade escolar, discutir ações de redução desse gás com os colegas e divulgá-las para a comunidade.	CGEB1 CGEB2 CGEB4 CGEB7 CGEB9 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM2 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT105 EM13CNT203 EM13CNT205 EM13CNT301 EM13CNT303	
2	• Compreender as propriedades do átomo de carbono que permitem a formação de cadeias carbônicas. • Classificar átomos e cadeias carbônicas. • Identificar as diferentes acepções do termo “orgânico”.	CGEB1 CGEB4		
3	• Identificar as características e as propriedades dos hidrocarbonetos e alguns casos de isomeria plana. • Conhecer as principais fontes de hidrocarbonetos. • Discutir a relação entre as características das fontes de energia renováveis e não renováveis e as emergências climáticas.	CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT104 EM13CNT206 EM13CNT307 EM13CNT309	Ciência e tecnologia Educação ambiental
4	• Reconhecer funções orgânicas e aplicações no cotidiano. • Entender as relações das funções químicas com o ambiente. • Produzir álcool em gel em um experimento.	CGEB1 CGEB3 CGEB9 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM2	EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT307	
Fechamento da unidade	• Avaliar os problemas causados pelo uso do DDT no controle da população do mosquito causador da malária.	CGEB7 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT104 EM13CNT304	Educação ambiental Saúde

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 306 E 307)

- Para sondar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre ciclos biogeoquímicos e funções orgânicas, considere a possibilidade de colocar em prática a proposta da abertura da unidade. Aproveite-a para coletar os conhecimentos prévios deles e as opiniões individuais ou as opiniões discutidas por grupos de estudantes.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 306)

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes se recordem, por exemplo, que a digestão envolve enzimas que quebram moléculas complexas em unidades menores, enquanto a fotossíntese utiliza a energia solar para converter gás carbônico e água em glicose. Ambos os processos são exemplos de interações químicas essenciais para a vida.

CAPÍTULO 1 CICLOS BIOGEOQUÍMICOS (PÁGINA 308)

Introdução aos ciclos biogeoquímicos (página 308)

- A abertura do capítulo aborda especificamente o ciclo da água. Nesse momento, pode ser oportuno perguntar aos estudantes o que se lembram sobre o ciclo da água, assunto também tratado no Ensino Fundamental.
- Incentive-os a apresentar seus conhecimentos prévios sobre o assunto, valorizando os conceitos historicamente construídos sobre o mundo físico para compreender a realidade, aptidões relacionadas à competência geral **CGEB1**.

Ciclo da água (página 309)

- A explicação do esquema do ciclo da água promove a habilidade **EM13CNT101**, ao levar os estudantes a analisar as transformações da água e refletir sobre a pouca quantidade de água doce disponível no planeta Terra.
- Além disso, mobiliza-se também a habilidade **EM13CNT105**, ao discutir com os estudantes os impactos causados no ciclo da água pela ação humana.
- O objeto digital *Cidades-esponjas* (p. 309) discute as mudanças que podem ser feitas na infraestrutura das cidades ou no planejamento de novas áreas urbanas para evitar enchentes e outros problemas relacionados à filtração da água pelo solo.

Práticas de Ciências – Construindo um terrário para observar o ciclo da água (página 310)

- O desenvolvimento desta atividade experimental, com os estudantes organizados em grupos, possibilita o exercício do diálogo, do respeito mútuo e do trabalho em equipe com divisão de tarefas. Essas abordagens são contempladas na competência geral **CGEB9**.
- Esta seção trabalha tanto as competências específicas **CECNTEM2** e **CECNTEM3** quanto a habilidade **EM13CNT301**, procurando desenvolver nos estudantes as capacidades de construir questões, de elaborar hipóteses e de justificar conclusões, bem como a de interpretar resultados e realizar previsões das atividades experimentais sobre fenômenos. Além disso, estimula a curiosidade intelectual por meio de abordagens próprias das ciências, contemplando a competência geral **CGEB2**.
- Este experimento requer materiais acessíveis e que não coloquem em risco a integridade física dos estudantes. Quanto aos equipamentos de segurança, sugere-se a utilização de óculos de segurança e de avental de algodão com mangas compridas. Se optar pela realização da atividade em grupo – o que é recomendável –, ressalte a importância da participação de todos os integrantes, da realização das etapas de maneira organizada e da tomada de decisões comuns diante de possíveis obstáculos e contratempos. Essa abordagem permite o trabalho com a competência geral **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação).
- O terrário construído pelos estudantes representa um ecossistema em miniatura, e a observação dos eventos ocorridos dentro do terrário lhes possibilitará estabelecer relações entre esta atividade prática e os processos observados em outros ecossistemas, de escalas maiores, como um lago, uma floresta ou uma cidade, desenvolvendo assim as habilidades **EM13CNT101** (analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria), **EM13CNT105** (analisar os ciclos biogeoquímicos), **EM13CNT203** (avaliar efeitos de intervenções nos ecossistemas com base no ciclo da água, utilizando representações) e **EM13CNT205** (interpretar resultados de atividades experimentais). Sugerimos que você proponha a construção do terrário no início dos estudos desta unidade e que as observações sejam feitas ao longo das aulas.

Ciclo do carbono (página 311)

- A habilidade **EM13CNT101** pode ser trabalhada, ao explorar o esquema do ciclo do carbono.
- Apresente dados recentes que mostrem que a interferência humana afeta o ciclo do carbono, levando os estudantes a interpretar os efeitos das atividades humanas sobre esse ciclo, mobilizando, assim, a habilidade **EM13CNT105**.

Ciclo do oxigênio (página 312)

- Ao explorar o esquema do ciclo do oxigênio, a habilidade **EM13CNT101** é desenvolvida.
- Se julgar oportuno, fale com os estudantes sobre a quantidade de oxigênio dissolvida na água e como esse indicador é importante para a qualidade da água. Explique-lhes que a água saturada com ar a 1 atm e 20 °C contém aproximadamente 9 ppm de O_2. Os peixes e outras formas de vida aquáticas dependem desse oxigênio para viver. Quantidades excessivas de material orgânico biodegradável na água retiram o oxigênio disponível para os seres vivos.
- Trabalhe a habilidade **EM13CNT105**, ao explorar as influências humanas sobre o ciclo do oxigênio.

Ciclo do nitrogênio (página 313)

- A fim de mobilizar a habilidade **EM13CNT101**, ao explorar o esquema do ciclo do nitrogênio, esclareça aos estudantes que, além dos elementos obtidos diretamente do gás carbônico da

atmosfera (carbono e oxigênio) e da água do solo (hidrogênio e oxigênio), todos os elementos necessários às plantas são provenientes da desintegração das rochas. O nitrogênio é a exceção, pois ele é obtido indiretamente e majoritariamente através da fixação por bactérias e cianobactérias que têm a capacidade de assimilar o nitrogênio atmosférico.

- Caso julgue oportuno, retome com os estudantes o processo Haber-Bosch para a produção da amônia, mobilizando, assim, a habilidade **EM13CNT105**.

Ciência tem história – Johanna Döbereiner e o sucesso da soja brasileira (páginas 314 e 315)

- Esta seção enfatiza não só o papel das mulheres na ciência como também a pesquisa de ponta feita no Brasil. Além disso, a leitura e a interpretação de texto de divulgação científica favorecem o desenvolvimento da habilidade **EM13CNT303**.

FONTE COMPLEMENTAR

- Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe). Disponível em: http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/. Acesso em: 20 out. 2024.

  Site com vários materiais educativos sobre a biogeoquímica da Terra, que podem ser utilizados para elaboração de percursos didáticos.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Aproveite o terrário construído na seção *Práticas de Ciências* para sistematizar os conhecimentos adquiridos sobre o ciclo da água. Procure identificar pontos frágeis no aprendizado desse ciclo (e de outros ciclos) e promova ações no sentido de remediar o aprendizado dos estudantes.
- Um dos pontos centrais deste capítulo é garantir que os estudantes tenham uma visão integrada dos ciclos biogeoquímicos. Propor a elaboração de um esquema global que integre as etapas de todos os ciclos pode ser uma forma de avaliar a compreensão dos estudantes.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Atividades (página 316)

1. Resposta variável. Sugestão de resposta: Durante a fotossíntese, as plantas utilizam o CO_2 atmosférico na produção de moléculas orgânicas necessárias para seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que liberam gás oxigênio para a atmosfera. Quando as plantas morrem, o CO_2 volta para a atmosfera, fechando o ciclo do carbono. Na respiração, as plantas e os animais utilizam o oxigênio atmosférico e liberam CO_2, participando do ciclo do oxigênio.

3. O papel dos decompositores nos ciclos biogeoquímicos é garantir que as substâncias presentes nos seres vivos retornem ao ambiente para que possam ser usadas em novos processos. Os principais constituintes das substâncias celulares, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, estão presentes em todos os resíduos vegetais e animais. Os decompositores são responsáveis pela degradação enzimática dos restos de seres vivos.

4. b) É possível estimar os efeitos das mudanças analisando a concentração dos componentes desses ciclos na atmosfera, na litosfera, na biosfera e na hidrosfera ao longo do tempo e comparando-a. Por exemplo, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera indica alterações no ciclo do carbono. Explore as mudanças climáticas mais discutidas na atualidade e os impactos que elas geram mundialmente nos aspectos ambientais, políticos, sociais e econômicos.

5. c) Resposta variável. Espera-se que os estudantes citem que as atividades humanas interferem na qualidade da água, comprometendo a quantidade de água disponível para uso da população humana.

A utilização da linguagem verbal e não verbal do texto multissemiótico (tira) permite o desenvolvimento da competência geral **CGEB4**. Além disso, para realizar esta atividade, os estudantes devem elaborar um texto argumentativo, mobilizando a competência geral **CGEB7**. Aproveite para discutir como as mudanças climáticas e os hábitos de consumo da população afetam o ciclo da água e a disponibilidade de água para consumo. Enfatize o consumo de água nos diversos setores da economia, como na agropecuária, na indústria têxtil, na mineração, entre outros.

CAPÍTULO 2 CARBONO E CADEIAS CARBÔNICAS (PÁGINA 317)

A versatilidade do carbono (página 317)

- O texto destaca a importância da Química Orgânica, abordando a presença dos átomos de carbono na constituição de substâncias e produtos, usando como exemplo o algodão, que é formado majoritariamente por celulose. O aspecto do desenvolvimento tecnológico associado ao emprego de compostos de carbono também é abordado.

Introdução à Química Orgânica (página 318)

- A apresentação da evolução histórica da Química Orgânica permite aos estudantes perceber que o desenvolvimento desse ramo da Química também depende da investigação científica e da tecnologia. O conteúdo abordado na página, por exemplo, evidencia as descobertas e os estudos que chegaram à Teoria da Força Vital, bem como destaca as contribuições de Friedrich Wöhler e Adolph Kolbe para derrubar essa teoria. Essa abordagem trabalha a competência geral **CGEB1**, ao valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo para compreender a realidade.
- O boxe *Química e Biologia* (p. 318) cita a cientista israelense Ada Yonath, uma das vencedoras do Prêmio Nobel de Química em 2009. Aproveite esse momento para conversar com os estudantes sobre a importância e a valorização da participação das mulheres na ciência.

O carbono e as ligações covalentes (páginas 318 a 321)

- A caracterização das ligações do carbono e de seus compostos pode ser feita com o uso de modelos para as moléculas. Considere a possibilidade de iniciar esse estudo com a atividade da seção *Práticas de Ciências*, da página 322, sobre geometria molecular, por meio da qual é possível visualizar a forma tetraédrica do carbono, o modo como ocorrem as ligações e a forma das moléculas propostas, o que possibilita sua comparação com as representações das fórmulas por símbolos químicos (fórmulas estruturais planas, semiexplícitas, etc.).
- O tópico "Formas de representação de uma molécula orgânica" (p. 320) mostra que as fórmulas orgânicas podem sofrer pequenas variações em sua representação, dependendo do propósito da representação.

Práticas de Ciências – Geometria molecular (página 322)

- O propósito desta atividade é proporcionar aos estudantes uma oportunidade para observar espacialmente as moléculas orgânicas, o que futuramente os auxiliará no entendimento das estruturas de compostos orgânicos mais complexos e na sua representação por fórmulas estruturais planas. Dessa forma, trabalha-se a competência geral **CGEB4** (utilizar diferentes linguagens para partilhar informações).
- Para facilitar o trabalho, uma sugestão é tirar cópias ampliadas da figura utilizada como modelo, colá-las sobre uma folha de papel ou cartolina e recortá-las.
- Em um trabalho conjunto com o(a) professor(a) de Matemática, se julgar conveniente, aproveite a ocasião para discutir assuntos relativos à geometria.
- Ao final da atividade, os modelos podem ser guardados. Lembre-se de que a realização desta atividade em sala de aula não requer uso de equipamentos de segurança, mas, se a opção for por fazê-la em laboratório, dois equipamentos são imprescindíveis: avental de algodão com mangas compridas e óculos de segurança.

Carbono e cadeias carbônicas (páginas 323 e 324)

- Considere a possibilidade de reservar mais tempo de aula para abordar a classificação do carbono e a classificação das cadeias carbônicas, pois é fundamental que os estudantes identifiquem as características de cada cadeia, como ferramenta para facilitar a associação dos compostos às respectivas funções e nomenclatura.

Algumas características dos compostos orgânicos (páginas 325 e 326)

- Demonstre que as funções orgânicas podem derivar-se umas das outras e que tais modificações conferem propriedades diferentes a cada grupo de substâncias. Por exemplo, uma molécula de metano poderá ser comparada com uma de metanol e, dessa forma, poderá ser identificado um grupo polar. Essa abordagem permitirá discutir as propriedades físicas, como as mudanças de solubilidade em água e o estado físico da substância na temperatura ambiente.

Química e Língua Portuguesa – Uma palavra, vários significados (página 327)

- Esta seção tem por objetivo conscientizar os estudantes dos vários significados que as palavras podem apresentar em diferentes contextos. O contato com textos de diversos gêneros os auxiliará a ampliar as possibilidades de interpretação e de posicionamento crítico em relação a eles, levando em consideração seus diferentes propósitos.

SUGESTÃO DE AULA

- Em colaboração com o(a) professor(a) de Língua Portuguesa, faça uma oficina de leitura e proponha a busca de informações em dicionários.
- Reúna textos extraídos de diversas fontes para que os estudantes discutam os diferentes significados de palavras ou de contextos selecionados. Divida a turma em grupos, de acordo com a quantidade de textos selecionada.
- Após a leitura e a pesquisa do significado dos termos indicados, peça aos grupos que apresentem para a turma as informações obtidas.

FONTE COMPLEMENTAR

- *Aí tem química, Química Orgânica, Química do Carbono*. [*S. l., s. n.*], 2010. 1 vídeo (12 min 25 s). Publicado pelo canal CCEAD PUC-Rio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1q-PAI93C80. Acesso em: 27 set. 2024.

  O vídeo, produzido pela PUC-Rio em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, traz uma introdução sobre o conteúdo de Química Orgânica.

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

- As atividades do boxe *Roteiro* são boas ferramentas de acompanhamento do aprendizado dos estudantes e podem ser usadas como avaliações formativas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Roteiro (página 319)

2. A molécula em questão pode ser representada por:



A estrutura de Lewis dessa molécula pode ser escrita assim:

Práticas de Ciências – Geometria molecular (página 322)

2.



ID/BR

3.



ID/BR

Após os estudantes alinharem seus modelos de tetraedros, como mostrado anteriormente, eles devem chegar à seguinte representação da cadeia:



Roteiro (página 324)

3. Respostas variáveis. Sugestões de resposta:

a)



b)



Atividades (páginas 328 e 329)

3. a)



b)



c)



11. Tem cadeia homogênea porque apresenta apenas átomos de carbono e hidrogênio. Não é aromático, apresenta insaturação, sua fórmula molecular é $C_{10}H_{16}$ e tem cadeia carbônica ramificada.

CAPÍTULO 3 HIDROCARBONETOS (PÁGINA 330)

Hidrocarbonetos e mudanças climáticas (página 330)

- O texto de abertura cita o relatório do IPCC de 2023, que relaciona os eventos climáticos extremos ao aumento de emissão de GEE. Trata-se de um assunto extremamente relevante e este capítulo é estratégico para ampliar essa discussão, já que continuamos a utilizar, em larga escala, a combustão de hidrocarbonetos contidos nos combustíveis fósseis como importante fonte de energia.
- A foto de abertura apresenta uma tragédia climática recente, embora estejam se tornando cada vez mais frequentes os eventos climáticos extremos. Aproveite esse momento para propor uma reflexão sobre as mudanças climáticas causadas pela queima de combustíveis fósseis.
- Uma sugestão é iniciar a discussão, perguntando aos estudantes quais combustíveis são geralmente utilizados para abastecer os veículos automotivos e qual é a origem desses combustíveis.
- A seguir, discuta as questões propostas em *Para começar*. Espera-se que os estudantes concluam que, apesar da importância do petróleo como fonte de energia, o seu uso em larga escala tem relação direta com o aquecimento global e com sérias consequências ambientais, sociais e econômicas.

Hidrocarbonetos (páginas 331 a 336)

- Iniciamos o estudo das funções orgânicas com os hidrocarbonetos. Vale a pena citar alguns desses compostos presentes em combustíveis do nosso dia a dia e analisá-los quanto à polaridade, solubilidade, densidade, TF e TE, além da combustibilidade.
- Neste capítulo, optamos por apresentar algumas características e propriedades dos compostos aromáticos antes da análise dos compostos alifáticos. É importante enfatizar como as duplas conjugadas se comportam nos compostos aromáticos, explorando o fenômeno da ressonância para justificar a estabilidade dos compostos aromáticos.
- É importante que os estudantes percebam que a classificação dos hidrocarbonetos segue o formato geral de nomenclatura, isto é, prefixo + infixo + sufixo. A partir da fórmula geral das séries homólogas dos hidrocarbonetos, é possível iniciar o estudo da isomeria plana e reforçar o fato de a fórmula molecular não ser suficiente para identificar os compostos orgânicos, isto é, os compostos orgânicos são identificados pelas suas fórmulas estruturais.

Petróleo: fonte de hidrocarbonetos (páginas 337 a 339)

- Há algumas teorias sobre a origem do petróleo. A explicação apresentada no texto refere-se ao modelo mais aceito atualmente. É interessante comentar que o petróleo raramente é encontrado na superfície ou é jorrado de forma espontânea e abundante. O petróleo encontra-se aprisionado em rochas porosas e sua extração demanda muita tecnologia e grandes investimentos, e muitos poços de petróleo são desativados mesmo contendo cerca de 70% de petróleo remanescente, pela inviabilidade técnica e financeira para extraí-lo.
- Considere a possibilidade de utilizar o texto "O transporte do petróleo", do boxe *Ampliação* (p. 337), para comentar os extensos oleodutos e gasodutos para transporte e dos riscos inerentes ao transporte marítimo desse recurso. Se julgar oportuno, solicite uma compilação de acidentes envolvendo petróleo. Essa abordagem trabalha os temas contemporâneos transversais **Ciência e tecnologia** e **Educação ambiental**, da área **Meio ambiente**.
- Sobre o refino do petróleo e a destilação fracionada, reforce o fato de que cada fração corresponde a uma mistura de substâncias e, por isso, há uma faixa de ebulição para cada uma das frações obtidas na torre de fracionamento. Explique o significado da palavra craquear ("quebrar", "romper"), de modo que os estudantes a associem ao processo de "quebra" das moléculas de hidrocarbonetos de cadeia longa para produzir, principalmente, gasolina e óleo *diesel*, com vistas a atender à grande demanda desses combustíveis.

A queima de combustíveis fósseis e as mudanças climáticas (página 339)

- Este é um tema importante e é preciso abordá-lo com dados técnicos e consistentes a partir de fontes confiáveis.
- É interessante equacionar a combustão completa de alguns componentes de combustíveis – CH_4 (GNV), C_4H_{10} (GLP), C_8H_{18} (gasolina) e $C_{16}H_{34}$ (óleo *diesel*) – e comentar que a combustão incompleta gera monóxido de carbono e fuligem, sendo o monóxido de carbono um gás muito tóxico para os seres

humanos, enquanto o dióxido de carbono é um GEE muito prejudicial ao planeta, especialmente pela quantidade que vem sendo emitida.

- Sobre esse assunto, também é importante discutir as fontes alternativas de energia, comparando a matriz energética brasileira com a matriz energética mundial. Se possível, apresente aos estudantes gráficos relacionados à matriz energética de outros países. Aproveite para explorar o objeto digital *Principais fontes de energia elétrica nos estados brasileiros* (p. 339) durante essa abordagem.
- O conteúdo deste tópico trabalha a competência específica **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia), as habilidades **EM13CNT101**, **EM13CNT307** e **EM13CNT309** e os temas contemporâneos transversais **Ciência e tecnologia** e **Educação ambiental**.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Petróleo e problemas ambientais (página 340)

- O texto desta seção aponta os problemas causados pelos derramamentos de petróleo e mostra as dificuldades para remediar a contaminação causada por eles.
- Se julgar pertinente, peça aos estudantes que pesquisem grandes derramamentos de petróleo no mundo e façam um resumo das consequências desses acidentes. Essa abordagem trabalha a competência específica **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos para propor ações que aperfeiçoem processos produtivos e minimizem impactos socioambientais) e a habilidade **EM13CNT104**.
- A pesquisa também pode focar nas populações costeiras atingidas por esses derramamentos, e os estudantes podem propor estratégias para minimizar os prejuízos dessas populações. Dessa forma, são trabalhadas a competência geral **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com responsabilidade, tomando decisões com base em princípios éticos e sustentáveis) e a habilidade **EM13CNT206**.
- Ao realizar a atividade 3 do item "Para discutir", os estudantes obterão informações sobre métodos de despoluição de locais atingidos por derramamentos de petróleo. Essa abordagem trabalha a competência específica **CECNTEM3** (analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais) e a habilidade **EM13CNT309**.

Carvão mineral: fonte de hidrocarbonetos aromáticos (página 341)

- O carvão mineral já foi a principal fonte de hidrocarbonetos aromáticos, mas hoje a indústria petroquímica tornou-se importante alternativa na obtenção desses compostos. A partir do benzeno, a indústria química produz vários produtos, como corantes, explosivos, detergentes, etc. Ressalte a importância dos diferentes usos dos compostos aromáticos, apesar da toxicidade de vários deles.
- O texto sobre hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, do boxe *Ação e cidadania* (p. 341), pode ajudar a iniciar uma discussão sobre os cuidados que devemos ter na preparação e no consumo dos alimentos.

Isomeria (páginas 341 e 342)

- Neste capítulo, são abordados apenas os casos de isomeria plana de cadeia e de posição, que ocorrem em hidrocarbonetos.
- Relacionar o tangram com a isomeria é uma forma lúdica de os estudantes entenderem que as possibilidades de formação de diferentes compostos orgânicos é muito grande, visto que é possível variar as quantidades de átomos de carbono, os tipos de cadeias carbônicas e a posição das insaturações, das ramificações e dos grupos funcionais, as funções orgânicas, além dos casos de isomeria espacial. Há alguns trabalhos sobre como a utilização de jogos e de contextualização contribuem nos processos pedagógicos.

Práticas de Ciências – Destilação seca da madeira (página 343)

- É importante checar todo o material a ser utilizado e testar o experimento antes da realização com os estudantes, tomando os seguintes cuidados e recomendações:

1. A rolha do tubo menor pode ser de cortiça, mas precisa estar muito bem adaptada ao tubo de ensaio, pois toda fumaça formada durante o aquecimento deve sair apenas pelo tubinho recurvado em L. O tubo de ensaio deve ficar inclinado como demonstrado na figura.
2. É necessário tomar cuidado com o manuseio do bico de Bunsen, a fim de garantir a segurança dos estudantes.
3. Verificar se os palitos de dente estão acomodados no fundo do tubo de ensaio menor, distantes da rolha com o tubo recurvado em L, antes de iniciar o aquecimento.
4. A rolha acoplada ao tubo de ensaio maior também deve estar totalmente adaptada ao tubo, para que não escape fumaça para o ambiente. O ideal é que essa rolha seja de borracha. Um possível escape de fumaça pelas rolhas impede que a fumaça saia com pressão suficiente pelo ponto **A**, dificultando a visualização da "fumaça" pegando fogo ao aproximar um palito de fósforo aceso. O objetivo é verificar que há gases combustíveis saindo pelo ponto **A**.
5. A combustão da "fumaça" que sai pelo ponto **A** ocorre de forma intermitente, pois há muito vapor de água na fumaça. Por isso, é importante reaproximar um palito de fósforo aceso abaixo da saída de vapores sempre que a chama apagar.
6. Após o experimento, deixe a aparelhagem em repouso por algum tempo, para que esfrie.

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

- Solicite aos estudantes que elaborem um texto estruturado com as principais ideias e conteúdos do capítulo.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Petróleo e problemas ambientais (página 340)

3. Resposta pessoal. Algumas técnicas são descritas a seguir:
   - Barreiras de contenção: são barreiras físicas flutuantes que evitam o espalhamento do petróleo para uma área ainda maior.
   - Recolhedor ou *skimmer*: é um equipamento que faz a captação e o bombeamento do petróleo para um local de armazenamento seguro.

- Biorremediação: é uma técnica que usa microrganismos capazes de metabolizar os produtos tóxicos, transformando-os em produtos não tóxicos.

Práticas de Ciências – Destilação seca da madeira (página 343)

2. Espera-se que os estudantes observem a transformação da madeira em pequenos palitinhos de carvão vegetal (coloração preta), com formação de muita fumaça esbranquiçada após algum tempo de aquecimento. É importante que o aquecimento seja intenso, com o auxílio de um bico de Bunsen regulado na chama azul, e que toda a extensão dos palitos seja transformada em carvão. O aquecimento deve ocorrer até que não se observe mais saída de fumaça.

3. Na destilação seca da madeira, o aquecimento ocorre com pouquíssima quantidade de gás oxigênio, que estava presente inicialmente no ar atmosférico dentro do tubo de ensaio. Com o aquecimento, o ar é expulso e a madeira é aquecida na ausência de oxigênio, promovendo transformações químicas que resultam na decomposição de alguns componentes da madeira e na formação de novas substâncias. Em uma combustão completa, a quantidade de oxigênio é abundante, transformando a maior parte do carbono contido nos palitos em CO_2.

Atividades (páginas 344 e 345)

4. d) Ambas apresentam a mesma fórmula molecular e, portanto, são isômeras. Por apresentarem diferentes classificações de suas cadeias carbônicas (octano tem cadeia normal e o 2,2,4-trimetilpentano tem cadeia ramificada), são isômeros planos de cadeia.

e) O octano apresenta maior temperatura de ebulição pela ausência de ramificações, permitindo uma maior interação entre suas cadeias carbônicas.

5. c) Existem quatro possibilidades:


buta-1,2-dieno (alcadieno)

$HC \equiv C - CH_2 - CH_3$ but-1-ino (alcino)

$H_3C - C \equiv C - CH_3$ but-2-ino (alcino)


ciclobuteno (cicleno)

7. b) A quantidade de carbono armazenada em milhões de anos está sendo liberada intensivamente em menos de 200 anos, interferindo no ciclo longo do carbono. O dióxido de carbono, um gás de efeito estufa, liberado através da queima em grandes proporções de combustíveis fósseis está provocando um aumento do efeito estufa e consequente aquecimento global. O aumento da temperatura média do planeta tem provocado uma série de eventos climáticos extremos: ondas de calor e de muito frio, secas e enchentes, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar, escassez de água, etc. Todos esses eventos trazem consigo uma série de consequências socioeconômicas.

8. a) hexano



tolueno



etilbenzeno



para-dimetilbenzeno



11. São 5 isômeros planos possíveis com fórmula C_6H_{14}:


hexano


2-metilpentano


3-metilpentano


2,2-dimetilbutano


2,3-dimetilbutano

12. São 4 isômeros possíveis com a fórmula C_8H_{10}:


1,2-dimetilbenzeno ou orto-dimetilbenzeno


1,4-dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno


1,3-dimetilbenzeno ou meta-dimetilbenzeno


etilbenzeno

CAPÍTULO 4 FUNÇÕES ORGÂNICAS (PÁGINA 346)

Introdução às funções orgânicas (página 346)

- O capítulo traz como destaque os compostos orgânicos. A abordagem dos combustíveis usados nas atividades humanas é uma boa maneira de fornecer uma contextualização aos estudantes, relacionando ciência, tecnologia e sociedade, e desenvolvendo, assim, a competência específica **CECNTEM1**.
- O etanol da cana-de-açúcar é um combustível muito utilizado e é o produto destacado na abertura do capítulo. Aproveite para explorar a pintura de Benedito Calixto (1853-1927), se possível em parceria com o(a) professor(a) de História, destacando a importância da cultura da cana-de-açúcar na economia do Brasil Colônia. Essa abordagem promove a competência geral **CGEB3**, ao valorizar e fruir uma manifestação artística e cultural brasileira.
- Incentive os estudantes a apresentar seus conhecimentos prévios sobre o assunto, valorizando os conceitos historicamente construídos sobre o mundo físico para compreender a realidade, de forma a mobilizar a competência geral **CGEB1**.

Funções nitrogenadas (páginas 347 a 351)

- Antes de iniciar o trabalho deste tópico, se considerar adequado, relembre aos estudantes que as funções orgânicas são caracterizadas pelos constituintes de seus compostos e por sua localização nas estruturas das moléculas, e aproveite esse momento para trabalhar a habilidade **EM13CNT307**. Mostre-lhes a sistematização da nomenclatura dos compostos orgânicos: o prefixo indica o número de átomos de carbono da estrutura principal; o sufixo, a função a que pertence; e o infixo, o tipo de ligação entre os átomos de carbono.
- Após a leitura do texto "Cafeína", do boxe *Ciência se discute* (p. 348), se considerar oportuno, explique as evidências experimentais e a interpretação dos resultados. As figuras mostram a influência de algumas substâncias no comportamento de aranhas. Estenda a discussão para o que acontece em seres humanos, ressaltando que o metabolismo, o tamanho e o grupo animal a que pertencem são muito diferentes. Discuta, então, a fundamentação das comparações realizadas com base em dados isolados.
- Ao desenvolver o tópico referente à classe das aminas (p. 348), explique aos estudantes que elas são derivadas da amônia, e aproveite para retomar o ciclo do nitrogênio e para mobilizar a habilidade **EM13CNT105**.
- Ao desenvolver o tópico referente a nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos (p. 350), considere a possibilidade de iniciar o estudo das funções nitrogenadas com os nitrocompostos, presentes em substâncias como o nitrobenzeno (reagente para a obtenção de fenilamina, substância importante na indústria de corantes).
- Quanto às nitrilas, podem ser citadas a propenonitrila, matéria-prima para obtenção de uma fibra têxtil conhecida como orlon, que é empregada, por exemplo, na fabricação de cobertores e tapetes.
- A ligação do grupo orgânico nas nitrilas ocorre no átomo de carbono do grupo $—C \equiv N$, ao passo que, nas isonitrilas, ela se dá no átomo de nitrogênio $C \equiv N—$.
- Uma nitrila importante é a acetonitrila, comumente utilizada na extração de pesticidas da água.

Funções halogenadas (páginas 351 e 352)

- Neste tópico, além de mostrar as estruturas dos compostos halogenados, comentam-se suas aplicações e também as implicações ambientais. Espera-se, desse modo, despertar o interesse dos estudantes e levá-los a constatar a relação entre esses compostos e o cotidiano, permitindo, assim, o trabalho com a habilidade **EM13CNT307**.
- Apesar de ainda terem muitas aplicações, os haletos orgânicos são substâncias altamente tóxicas, fato que levou à restrição de seu uso. Para melhor compreensão dessa classe de compostos e de seu impacto toxicológico, explore o texto "Organoclorados: um problema de saúde pública", da seção *Texto complementar* deste Manual. Outro grupo importante de haletos orgânicos é o dos CFCs (p. 351). Se julgar oportuno, ao abordar o ozônio, faça a ligação com o ciclo do oxigênio e, assim, mobilize a habilidade **EM13CNT105**.
- Com relação à nomenclatura, seguem-se as regras Iupac já estudadas, com a colocação, como prefixo, do nome do haleto que substituiu o átomo de hidrogênio, ou com a designação de um sal orgânico (cloreto de + o nome do grupo orgânico).

Funções oxigenadas (páginas 353 a 360)

- O trabalho com as funções oxigenadas permite a exploração da habilidade **EM13CNT307**, pois, a cada grupo funcional apresentado, são analisadas as propriedades, a adequação ao uso e as diferentes aplicações de cada composto.
- O texto do boxe *Ampliação* (p. 353), exemplifica a infinidade de materiais do organismo humano e sua natureza química, e esclarece um assunto de grande divulgação na mídia, relacionado ao consumo de alguns alimentos de origem animal, como o torresmo. O trabalho com esse boxe auxilia no desenvolvimento da habilidade **EM13CNT104**.
- Utilize, sempre que possível, as tabelas de temperatura de fusão e de ebulição dos compostos de função oxigenada para comparar os valores apresentados entre diferentes funções (com a mesma massa molecular) e entre substâncias pertencentes à mesma função orgânica. Peça aos estudantes uma possível explicação para essas diferenças.
- Além dos flavorizantes, apresentados como ésteres de grande uso, poderão ser destacados os ésteres dos ácidos graxos, com os quais se realizam as reações de saponificação.

Isomeria óptica (páginas 360 a 363)

- Este tópico aborda a fabricação de fármacos enantioméricos e a segurança dos usuários, citando o caso da talidomida. Dessa forma, mobiliza-se a habilidade **EM13CNT104**.
- Para entender a isomeria óptica, é necessária uma abordagem que mostre espacialmente esse fenômeno, de modo que os estudantes possam associá-lo aos modelos de moléculas. O texto proposto na abertura do capítulo explora a diferença entre dois conceitos de extrema importância – a simetria e a sobreposição –, necessários à compreensão do assunto.

Práticas de Ciências – Produzindo álcool em gel (página 364)

- O desenvolvimento desta atividade experimental com os estudantes possibilita o exercício do diálogo, do respeito mútuo e do trabalho em equipe com divisão de tarefas. Essas abordagens estão contempladas na competência geral **CGEB9**.

- Este experimento requer materiais acessíveis, mas que devem ser manuseados com cuidado para não colocar em risco a integridade física dos estudantes. Quanto aos equipamentos de segurança, sugere-se a utilização de óculos de segurança e de avental de algodão com mangas compridas. Se optar pela realização da atividade em grupo – o que é recomendável –, ressalte a importância da participação de todos os integrantes e a tomada de decisões comuns diante de possíveis contratempos. Essa abordagem permite o desenvolvimento da competência geral **CGEB10**.
- Esta seção mobiliza as competências específicas **CECNTEM2** e **CECNTEM3**, ao desenvolver nos estudantes a capacidade de construir questões e justificar conclusões, bem como a capacidade de interpretar resultados e realizar previsões das atividades experimentais sobre fenômenos. Ao responder às questões propostas, os estudantes mobilizam a habilidade **EM13CNT301**, elaborando hipóteses com a utilização de instrumentos de medição.
- A etapa do experimento que requer mais atenção é o momento de incorporação do carbopol, que deve ser feito lentamente, ao mesmo tempo em que o álcool se encontra sob intensa agitação.
- Se julgar oportuno, solicite a colaboração do(a) professor(a) de Biologia para discutir o efeito causado pelo álcool nos microrganismos.
- Aproveite o momento para discutir com os estudantes a importância do álcool em gel durante a pandemia de covid-19.

FONTE COMPLEMENTAR

- Marcelino-Jr., C. de A. C. *et al*. Perfumes e essências: a utilização de um vídeo na abordagem das funções orgânicas. *Química Nova na Escola*, n. 19, p. 15-18, maio 2004. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc19/a05.pdf. Acesso em: 26 set. 2024.

  O artigo retrata uma pesquisa realizada em uma turma do Ensino Médio, na qual se verificou a interferência positiva de um vídeo de produção própria na abordagem inicial das funções orgânicas oxigenadas.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Identificação de aldeídos e cetonas

Nesta atividade, será demonstrado como diferenciar experimentalmente um aldeído de uma cetona utilizando o reagente de Fehling.

O reagente de Fehling A é formado pela dissolução de sulfato de cobre(II) em água, formando uma solução azul. O reagente de Fehling B é uma solução incolor de tartarato de sódio e potássio aquoso, produzido em meio fortemente alcalino.

Os aldeídos são oxidados pelo reagente. Nessa reação também ocorre a precipitação do óxido de cobre(I), de cor vermelha. As cetonas não reagem.

Material

- 2 tubos de ensaio
- béquer
- tripé
- lamparina
- tela de amianto
- água
- 5 mL de formol (solução de metanal)
- 5 mL de propanona (acetona)
- reagentes de Fehling A e B

Como fazer

1. Coloque, em cada um dos béqueres, 50 mL de cada solução. Identifique os tubos de ensaio (1 e 2).
2. Coloque 10 gotas de formol no tubo 1 e 10 gotas de acetona no tubo 2. Os estudantes não devem saber quais são as substâncias adicionadas. Comente apenas que uma delas é um aldeído e a outra é uma cetona.
3. Adicione 10 gotas do reagente de Fehling A e 10 gotas do reagente de Fehling B ao tubo 1.
4. Coloque o tubo 1 dentro do béquer com água e aqueça-o em banho-maria por 15 minutos.
5. Repita o procedimento para o tubo 2.

Para concluir

1. O reagente de Fehling provoca a oxidação do composto orgânico. Com essa informação, como é possível identificar a classe funcional dos compostos dos tubos 1 e 2?

   R.: *Aquele que sofrer oxidação será o aldeído, que é oxidado, transformando-se em ácido carboxílico. A cetona não sofre oxidação. Portanto, o tubo que apresentou mudança de cor contém formol, e o tubo que não apresentou evidência de reação contém acetona.*
2. Pesquise quais são os outros tipos de compostos que podem ser identificados utilizando o reagente de Fehling.

   R.: *O reagente de Fehling é utilizado na identificação de monossacarídios (açúcares) do tipo aldose, que apresentam o grupo aldeído. Os estudantes também podem identificar os monossacarídios do tipo cetose, pois eles são convertidos em aldoses pela base contida no reagente. Apenas as cetonas presentes em compostos, os quais têm a carbonila ligada a um carbono que contém uma hidroxila, são oxidadas pelo reagente de Fehling. Um exemplo prático para seu uso é detectar glicose na urina, auxiliando no diagnóstico da diabetes.*

TEXTO COMPLEMENTAR

Organoclorados: um problema de saúde pública

[...]

O problema da contaminação por organoclorados tem se agravado e adquirido proporções dramáticas, tanto pela sua intensificação quanto pela sua extensão geográfica. Outrora, as zonas contaminadas eram muito reduzidas. Atualmente tendem a cobrir o planeta inteiro e podemos encontrar DDT até na neve do Alasca [...].

Os níveis de organoclorados na água dos oceanos têm causado sérios problemas ecológicos, como, por exemplo, o fracasso da reprodução da truta-do-mar, na Laguna Madre, no Texas, e da águia-marinha, no Báltico [...]. Além disso, podem-se encontrar golfinhos contaminados com DDT, desde o litoral paulista até regiões da Antártida [...].

Como os compostos organoclorados são muito lipossolúveis e se acumulam nas gorduras dos organismos, eles

percorrem rapidamente a cadeia alimentar, com resultados desastrosos para espécies, incluindo o homem, que ocupam o topo desta cadeia [...].

[...]

Entre 1993 e 1995 foi realizado, em Hong Kong, um monitoramento dos níveis de pesticidas organoclorados em amostras de leite de vaca. Em várias amostras, os níveis de DDE e BHC excederam os limites permitidos pelo Coder Committee on Pesticide Residues. Apesar [de a] China ter proibido o uso desses pesticidas, desde 1983, os resultados desse trabalho revelam que tais substâncias ainda persistem no meio ambiente, causando contaminação da cadeia alimentar [...].

O mesmo pôde ser observado recentemente com populações da área urbana e rural de Portugal. Apesar de nesse país o uso de organoclorados ter sido proibido desde 1988, estas substâncias foram encontradas em níveis bastante elevados no soro sanguíneo de vários indivíduos [...].

No Brasil, o problema não é diferente! Recentemente, foram encontrados resíduos de pesticidas organoclorados persistentes (POPs) em amostras de sangue de várias pessoas que vivem e trabalham na área urbana do Rio de Janeiro [...]. Na Cidade dos Meninos, município de Duque de Caxias, RJ, uma antiga fábrica de inseticidas do Ministério da Saúde, desativada na década de 1950, abandonou ao ar livre quantidade elevada de inseticida, que tinha como principal constituinte o BHC. O poluente atingiu o solo e a vegetação. Foram encontrados traços de veneno até na água de coco do local, e escavações comprovaram que o lençol freático também está contaminado [...].

[...]

Um relatório escrito pela Secretaria de Saúde de Paulínia (SP), sobre exames médicos de 181 moradores do bairro Recanto dos Pássaros, contaminado por uma indústria química, indicou que 86% desses moradores apresentaram pelo menos um produto tóxico acima dos índices recomendados. De acordo com o documento, os exames revelaram que quatro pessoas tinham BHC acima dos níveis recomendados, 28 tinham Heptacloro (seis crianças), 20 tinham Aldrin (cinco crianças), sete tinham Endrin (quatro crianças), duas tinham Endossulfan e 44 tinham DDT (17 crianças). O relatório apontou, também, incidência de tumores hepáticos e de tireoide, benignos e malignos, alterações neurológicas, típicas de exposição aos organoclorados, alto índice de dermatoses, de rinites alérgicas, disfunções gastrointestinais, pulmonares e hepáticas. Ainda, segundo o documento, 35% das crianças apresentavam distúrbios neurocomportamentais que podem, inclusive, afetar sua capacidade de aprendizado [...].

FLORES, A. V. *et al*. Organoclorados: um problema de saúde pública. *Ambiente & Sociedade*, v. 7, n. 2, p. 112-124, jul./dez. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/asoc/v7n2/24690.pdf. Acesso em: 26 set. 2024.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- Durante o desenvolvimento da atividade prática, avalie o envolvimento e a participação dos estudantes. Além disso, utilize as respostas e as conclusões para verificar o aprendizado deles em relação aos assuntos abordados no experimento.
- Sugira aos estudantes que elaborem um quadro com a nomenclatura, as principais características e exemplos das funções orgânicas estudadas no capítulo. Esse exercício pode ser uma boa ferramenta para a sistematização dos conteúdos abordados.
- Caso julgue pertinente, elabore com a turma o jogo Pistas orgânicas, disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/06-RSA-04-17.pdf (acesso em: 23 out. 2024). Esse jogo apresenta uma proposta lúdica de ensino para trabalhar o tema funções orgânicas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Roteiro (página 347)

1. a)



b)



Roteiro (páginas 349, 350, 354 e 359)

4. a)



b)



c)



5. Fenilamina: amina primária



Dimetilamina: amina secundária



6.



9.



10. a) Metanol:

b) Propan-2-ol:



c) Metilpropan-2-ol:



11. $HC \equiv C-CH_3(g) + H_2O(\ell) \longrightarrow H_2C = C(OH)-CH_3(aq)$

propino — propen-2-ol

14. São produtos diferentes. O etanoato de metila é obtido da reação entre o ácido etanoico e o metanol:



O metanoato de etila provém da reação entre o ácido metanoico e o etanol:



Com base nas fórmulas estruturais, pode-se notar que a posição do grupo —COO muda de um composto para outro.

Explore, a partir do nome do éster, qual parte se refere ao ácido e qual se refere ao álcool. Em seguida, discuta com os estudantes qual é o número de carbonos existentes na fórmula dos ácidos e dos álcoois que deram origem a cada um dos ésteres citados.

Atividades (página 365)

1. a) $C_{17}H_{20}N_4O_6$

b)



c) Álcool e amina.

5. a)



b)



c) Ácido metanoico e etanol.

d)

ácido acético (ácido etanoico) — octan-1-ol

e) Acetato de iso-octanol.

8. $(HO)_2C=CH-CH_2$

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 366 A 369)

Estudo de caso – O dilema do uso do DDT
(páginas 366 e 367)

- Esta seção permite que os estudantes mobilizem a competência específica **CECNTEM3**, uma vez que vão analisar uma situação-problema envolvendo o uso de produtos químicos, como o DDT, para combater doenças que afligem populações de diversas partes do mundo, especialmente de países menos desenvolvidos.
- Assim, de acordo com a habilidade **EM13CNT304** e a competência geral **CGEB7**, estimule a análise e o debate sobre o dilema proposto e avalie se os estudantes se posicionam com argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, e se são capazes de distinguir e de respeitar diferentes pontos de vista. Para isso, eles devem mobilizar a habilidade **EM13CNT104** e a competência específica **CECNTEM1**, ao considerar a composição, a toxicidade e a reatividade do DDT. Também são trabalhados os temas contemporâneos transversais **Saúde** e **Educação ambiental**, da área Meio ambiente.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Estudo de caso – O dilema do uso do DDT
(páginas 366 e 367)

1. Os fatores que contribuem são: ser lipossolúvel (ou seja, leva mais tempo para ser eliminado do organismo) e ter uma meia-vida muito alta, podendo se acumular na cadeia alimentar.

3. b) Esta atividade pretende exercitar a investigação e a criação de hipóteses coerentes para explicar o aumento e o declínio de casos de malária no país. Entre as possíveis hipóteses que podem ser aventadas pelos estudantes para explicar o aumento de casos entre 1970 e 1990 estão, por exemplo: o aumento da população brasileira, falhas nas campanhas de pulverização de DDT, resistência dos mosquitos ao DDT, falhas no controle biológico dos mosquitos (eliminação de focos de larvas dos mosquitos, por exemplo), habitações precárias. Entre as possíveis hipóteses para explicar a diminuição dos casos de malária no Brasil a partir dos anos 2000 estão, por exemplo: as melhorias no controle biológico dos mosquitos, a melhoria das condições das habitações, o uso de outros inseticidas.

5. Respostas pessoais. Observe se os estudantes apresentam em suas opiniões os argumentos discutidos nas atividades. Você pode organizá-los em grupos que representem os diferentes pontos de vista e promover um debate.

Questões globais (páginas 368 e 369)

1. Alternativa **d**. O texto da questão indica que o nitrogênio é absorvido pelos animais pela fixação do nitrogênio pelos microrganismos fixadores; portanto, pela transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.

4. Alternativa **e**. Presença do grupo C = O.

5. Alternativa **e**. Presença do grupo — CHO.

12. a)



b)



ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**Urca-CE**) As queimadas acabam por liberar CO_2 [na] atmosfera, onde se acumula e atua como um dos principais gases do efeito estufa. Sobre o ciclo do carbono é **correto** afirmar

a) As emissões de CO_2 resultam no aumento do buraco da camada de ozônio;

b) O CO_2 armazenado nas moléculas orgânicas é liberado no processo de respiração;

c) A fixação de CO_2 no solo necessita da participação de bactérias e fungos;

d) A quimiossíntese é a fixação de CO_2 em moléculas orgânicas;

e) Fotossíntese e respiração reduzem a quantidade de CO_2 atmosférico.

Alternativa **b**. A respiração é uma das formas de liberação de CO_2 para o ambiente no ciclo do carbono.

Alternativas incorretas: a) Não só as emissões de CO_2 como as de outros gases contribuem para o aumento da camada de ozônio. c) A fixação do CO_2 é feita pela fotossíntese e não por bactérias e fungos. d) A quimiossíntese é o processo de fixação do nitrogênio. e) A fotossíntese e a respiração liberam CO_2 na atmosfera.

2. (**UEM-PR**) Sobre a assimilação biológica do N_2 pelos seres vivos, assinale o que for **correto****.

**A resposta corresponde à soma das alternativas corretas.

01) A amônia proveniente da decomposição de seres vivos e o nitrato produzido por nitrobactérias são fontes de nitrogênio do solo para as plantas.

02) Íons amônio são utilizados por bactérias *Nitrosomonas* na fotossíntese.

04) Algumas angiospermas fazem associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, as quais fornecem íons amônio diretamente para a planta.

08) O maior reservatório natural de nitrogênio do planeta está presente nas moléculas orgânicas nitrogenadas (ácidos nucleicos e proteínas) dos seres vivos.

16) Parte dos compostos nitrogenados presentes no solo é utilizada por bactérias desnitrificantes, com liberação de N_2 [na] atmosfera.

Soma das alternativas corretas: **02** + **04** + **08** + **16** = **30**.
Alternativa incorreta: **01**. A amônia derivada da decomposição dos seres vivos é absorvida pelo solo. Já o nitrato é absorvido pelas plantas depois de passar pelo processo de nitrificação.

3. (**EBMSP-BA**) Desde a década de [19]40 do século XX, inseticidas do grupo dos organoclorados, principalmente o DDT, são utilizados nas lavouras devido à sua alta eficiência contra diversos insetos. Entretanto, se absorvido pela pele ou se contaminar os alimentos, o DDT pode causar doenças do fígado, como a cirrose e o câncer, tanto em animais quanto em humanos. Devido aos problemas que causa, o uso do DDT está proibido em diversos países.



Amabis, J. M.; Martho, G. R. *Biologia das populações*. v. 3. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 399.

A magnificação trófica é uma das principais consequências da intensa utilização do DDT no ambiente. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre ecologia, é **correto** afirmar:

a) Por acumularem uma maior biomassa, se comparadas a todos os outros níveis representados, o nível trófico das águias deverá acumular uma maior quantidade de DDT em seus componentes orgânicos.

b) Os produtores, como o fitoplâncton, são os principais prejudicados pela contaminação por DDT devido ao efeito bioacumulador produzido por esse tipo de praguicida.

c) O extrato horizontal mais largo da base da cadeia ilustra o efeito nefasto de biomagnificação para esse tipo de contaminante.

d) Os efeitos danosos associados à magnificação trófica são exclusivos nos organismos componentes das cadeias alimentares de ambiente aquático.

e) Ao longo de uma cadeia alimentar, quanto menor a quantidade de energia disponível para cada nível trófico, maior a concentração esperada do DDT como contaminante bioacumulado.

Alternativa **e**. Alternativas incorretas: a) Ao observar o gráfico, nota-se que as águias acumulam maior quantidade de DDT por estar no último nível trófico e não pela baixa quantidade de biomassa. b) O efeito bioacumulador não ocorre em produtores, mas, sim, nos organismos finais da cadeia alimentar. c) O extrato horizontal mais largo da cadeia indica a maior quantidade de biomassa. d) Os efeitos danosos ocorrem também em cadeias alimentares de ambientes terrestres.

8 QUÍMICA, SISTEMA PRODUTIVO E AMBIENTE

INTRODUÇÃO

As reações químicas ocorrem o tempo todo e nem sempre nos damos conta disso: cada vez que inspiramos e expiramos, várias transformações se concretizam em nosso corpo.

O capítulo 1 aborda os conhecimentos sobre reações químicas aplicados à natureza e ao sistema produtivo. O capítulo 2 trata dos polímeros sintéticos, mostrando os processos de obtenção de diversos plásticos, além de discutir questões reacionadas ao seu uso, descarte e reciclagem. O capítulo 3 explora o tema da gestão de resíduos, mostrando alternativas para o tratamento deles, bem como dos problemas causados pelo descarte inadequado de componentes que contêm metais pesados, como o chumbo. Ao final da unidade, na seção *Pensando Ciências* (p. 412), os estudantes vão utilizar estratégias do pensamento computacional na solução de um problema complexo, no caso, descobrir como corrigir o solo ácido na agricultura.

Os objetivos da unidade se articulam a este e a outros contextos e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Nesta unidade, são promovidas competências gerais como a **CGEB1** (valorizar o conhecimento historicamente construído), a **CGEB2** (recorrer a abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses e resolver problemas), a **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis), a **CGEB9** (exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro), e a **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação), além das competências específicas **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais com base nas relações entre matéria e energia para propor ações que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida), **CECNTEM2** (construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Terra) e **CECNTEM3** (avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico) e habilidades como a **EM13CNT104** e a **EM13CNT301**.

Sugestão de planejamento

O assunto trabalhado no tópico "Processo de obtenção de alguns metais" pode ser trabalhado de forma interdisciplinar com os(as) professores(as) de Biologia e Geografia. Além disso, pode-se trabalhar o boxe *Química e Geografia* (p. 405) em parceria com o(a) professor(a) de Geografia. No Projeto, o(a) professor(a) de Língua Portuguesa pode colaborar com a produção da série de vídeos.

MAPA DA UNIDADE

CAPÍTULO	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
1	• Reconhecer alguns tipos de reação química e suas aplicações. • Analisar, em um experimento que envolve amostras com diferentes tratamentos, quais condições alteram uma reação de fermentação.	CGEB2 CGEB7 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT104 EM13CNT301 EM13CNT303 EM13CNT307 EM13CNT309	Educação ambiental Saúde
2	• Identificar polímeros sintéticos, seus monômeros e aplicações. • Compreender os processos de polimerização usados na fabricação de polímeros sintéticos. • Reconhecer a necessidade do descarte correto e da reciclagem de plásticos.	CGEB1 CGEB2 CGEB7 CGEB10 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT101 EM13CNT301 EM13CNT307 EM13CNT309	Educação ambiental
3	• Reconhecer o problema do envio de lixo eletrônico para os países menos desenvolvidos. • Discutir o impacto do ser humano no meio ambiente e as soluções para minimizar esse impacto.	CGEB7	EM13CNT104 EM13CNT105	Educação ambiental Saúde Trabalho
Fechamento da unidade	• Utilizar de estratégias do pensamento computacional na busca de soluções para um problema relacionado à acidez do solo. • Aplicar o conhecimento sobre substâncias inorgânicas para propor uma solução visando corrigir a acidez de um solo.	CGEB2 CGEB5 CGEB7 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT301 EM13CNT303	Ciência e tecnologia

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

ABERTURA DA UNIDADE (PÁGINAS 370 E 371)

- A fotografia de abertura de unidade mostra o uso do sabão de babaçu produzido pelos indígenas. Esse é um exemplo de produto biodegradável e fabricado de modo sustentável. Aproveite esse momento para valorizar os conhecimentos dos indígenas.

- Avalie utilizar as atividades da abertura para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e planejar a condução das aulas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões para refletir (página 370)

2. Apesar de serem compostos biodegradáveis, os sabões diminuem a tensão superficial da água, diminuindo a quantidade de gás oxigênio dissolvido. Portanto, o excesso de sabão descartado na água pode prejudicar a vida aquática.

3. O uso de embalagens retornáveis e não descartáveis é uma alternativa ao uso de embalagens plásticas descartáveis.

CAPÍTULO 1 REAÇÕES QUÍMICAS NA NATUREZA E NO SISTEMA PRODUTIVO (PÁGINA 372)

Reações químicas e a obtenção de produtos (página 372)

- O uso do formol como componente de produtos para tratamento de cabelo passou a ter um controle rigoroso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devido à toxicidade dessa substância. Esse tema pode ser usado para discutir a necessidade do conhecimento químico para avaliar o risco de certas substâncias à saúde, trabalhando a competência geral **CGEB7** e as habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT307**.
- Os álcoois formam uma classe de substâncias orgânicas, entre as quais, no Brasil, o etanol é uma das mais conhecidas e importantes economicamente. Neste capítulo, serão discutidas as principais reações dessa classe de substâncias, bem como sua importância e modos de obtenção, com o objetivo de conscientizar os estudantes quanto à abrangência do uso desses materiais. Essa abordagem trabalha as competências específicas **CECNTEM1** e **CECNTEM3** e a habilidade **EM13CNT101**.

Processos de obtenção de alguns metais (página 373)

- O estudo da obtenção de metais oferece a oportunidade de trabalhar a competência específica **CECNTEM1**, pois permite a análise de processos tecnológicos envolvidos na extração de metal do minério. Como a extração tem impactos ambientais e sociais, os estudantes podem propor ações que aperfeiçoem esse processo, de modo a diminuir os impactos socioambientais.
- A temática da mineralogia possibilita o desenvolvimento de projetos interdisciplinares relacionando diferentes componentes curriculares: Química (com a constituição dos minerais, estrutura química e métodos de obtenção), Geografia (com o estudo da localização das jazidas no Brasil e as consequências sociais da extração de minérios), Biologia (com as modificações da fauna e da flora nas regiões mineradoras e a poluição da água e do solo) e História (com o estudo do período conhecido como Idade dos Metais).
- O texto do boxe *Ação e cidadania* (p. 376) discute os impactos ambientais causados pela mineração no Brasil. O tema pode promover o trabalho da competência geral **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para defender ideias e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental), da competência específica **CECNTEM1** (analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos para propor ações e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos e minimizem impactos socioambientais), das habilidades **EM13CNT101**, **EM13CNT104** e **EM13CNT309** e dos temas contemporâneos transversais **Educação ambiental** e **Saúde**.

Galvanoplastia (página 375)

- O aparato exigido para o processo de galvanoplastia é relativamente simples. As deposições ocorrem com facilidade à temperatura ambiente, e tanto o custo financeiro como o energético são baixos. Ressalte para os estudantes que a espessura, a composição e, em consequência, as propriedades dos filmes são controladas por parâmetros de deposição, como o potencial aplicado, a composição das soluções e o pH do banho.

Reações que envolvem funções oxigenadas (página 376)

- Para introduzir esse tema, chame a atenção dos estudantes para as várias maneiras de se obter os álcoois e conte a eles algumas curiosidades a respeito de cada uma dessas reações. Pode-se mencionar, por exemplo, as épocas em que esses métodos foram descobertos, assim como o uso inicial e a finalidade de cada reação. Outra estratégia possível consiste em organizar os estudantes em grupos para a realização de seminários. Nesse caso, cada grupo deverá apresentar as características de uma das reações de obtenção dos álcoois.
- Como ferramenta motivacional, se preferir, antecipe e desenvolva, neste momento, a atividade experimental "Investigando a fermentação", apresentada na seção *Práticas de Ciências* (p. 380). Essa atividade permitirá a discussão de evidências da ocorrência dessa reação e levará os estudantes a constatar que o processo posto em prática é bioquímico (destaque o papel do fermento biológico). O desenvolvimento dessa atividade permite a abordagem da habilidade **EM13CNT301**, visto que os estudantes vão formular questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas e empregar instrumentos de medição.
- As reações de oxidação dos álcoois são muito conhecidas, mas nem sempre são associadas a essa definição científica. Então, pode-se partir do conhecimento prévio dos estudantes sobre a obtenção do vinagre e a combustão do etanol para chegar a esse conceito. Em seguida, pode-se trabalhar a tabela na qual constam as reações de oxidação de álcoois primário, secundário e terciário (p. 378).
- Outra reação específica desse grupo é a desidratação, que pode ocorrer pela reação entre as moléculas de álcoois (desidratação intermolecular) ou pela modificação estrutural e funcional de um álcool, em que é comum a liberação de molécula(s) de água (desidratação intramolecular). Nessas reações, formam-se compostos diversos como os éteres e os alcenos.

Práticas de Ciências – Investigando a fermentação (página 380)

- A intenção é que os estudantes acompanhem o experimento, observando em quais frascos há evidência de que a fermentação está ocorrendo e comparando as velocidades da reação. Alerte-os de cinco em cinco minutos para que façam as anotações ou deixe-os gerenciar o próprio tempo. O trabalho executado nessa atividade contempla a competência geral **CGEB2**.
- Ao final do experimento, oriente os estudantes a realizar o descarte adequado do conteúdo dos erlenmeyers.

Obtenção e reações de ácidos carboxílicos (página 381)

- Nos alimentos fermentados, como o chucrute, o iogurte e outros, os ácidos carboxílicos são produzidos por reações bioquímicas. Explore e destaque esse fato para mostrar aos estudantes a importância do modo como essas reações ocorrem, partindo de açúcares e de álcoois. Para isso, sugira a leitura do boxe *Ampliação* (p. 381), em que se comenta o uso dos ácidos carboxílicos como aditivos em alimentos, empregados em sua conservação por diferentes mecanismos.
- As reações específicas desse grupo de substâncias podem ser abordadas tanto em face de sua relevância nos processos metabólicos como na produção de novos materiais. Utilize, se julgar oportuno, o texto do boxe *Ampliação* (p. 383), para abordar a questão de ácidos graxos em alimentos.
- No tópico "Obtenção e reações de ésteres" (p. 384), pode-se introduzir esse grupo funcional abordando as reações químicas envolvidas na produção de aromatizantes utilizados pela indústria alimentícia. Se considerar adequado, antes de desenvolver o tema "Transesterificação" (p. 385), faça uma sondagem para verificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o biodiesel. Considere a sugestão de anotar na lousa as respostas às seguintes questões: "O que é biodiesel?"; "Qual é sua importância atualmente?"; "Quais aspectos ambientais, econômicos e sociais associados ao uso do biodiesel?"; "Quais são as características da estrutura e da composição do biodiesel?".
- Dependendo das respostas obtidas nessa sondagem, complemente o assunto com as informações do texto sobre transesterificação e explore também o boxe *Ciência se discute*, ambos na página 385. A discussão sobre o uso do biodiesel trabalha a competência geral **CGEB7**.
- Outras reações dos ésteres podem ser destacadas como alternativas, como a obtenção de álcool, no Brasil, extraído principalmente da cana-de-açúcar.
- O tópico "Propriedades e aplicações dos ésteres naturais: gorduras e óleos" (p. 386 e 387), presente no dia a dia dos estudantes, pode ser atrelado à definição de lipídios e seus principais constituintes. A ideia é que eles compreendam que essa classe de compostos está relacionada aos ésteres, os quais, com base em reações específicas, conferem propriedades especiais aos usos desses ésteres.
- Cabe destacar a ação detergente, que está relacionada com as características moleculares dos sabões e detergentes: uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, as quais satisfazem, simultaneamente, a interação entre estruturas polares e apolares. A formação das micelas, que caracteriza a emulsão entre água e óleo, também merece destaque.

Sabões (página 388)

- Destaque o processo produtivo do sabão e seu caráter anfifílico e a decorrente ação tensoativa desse tipo de substância.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – Ciência dos aromas: os segredos por trás do gosto da sua comida (página 390)

- O texto apresentado nesta seção aborda o tema dos aromas naturais e sintéticos. Na etapa "Para discutir", aproveite a questão 3 para explorar a opinião dos estudantes a respeito da produção e do consumo de alimentos ultraprocessados. Permita que eles apontem as vantagens e as desvantagens desses produtos e discuta a importância da alimentação saudável. Essa abordagem contempla o trabalho com a habilidade **EM13CNT303**.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Óleos e gorduras no corpo humano

Um aspecto que também pode ser discutido sobre os ácidos graxos é o efeito da ingestão de óleos e gorduras no corpo humano. Peça aos estudantes que leiam o texto disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/06/17/consumir-gordura-demais-faz-mal-veja-8-doencas-relacionadas-a-ela.htm (acesso em: 22 out. 2024.), e que façam as atividades a seguir.

a) Com base nas informações do texto, cada estudante deve citar casos de pessoas conhecidas que apresentam alguma das doenças citadas no texto.

b) O estudante deverá propor mudanças de hábitos alimentares para prevenir problemas de saúde e socializá-las com os colegas. Explore também o apelo das propagandas de margarinas nas quantidades de ômega-3 ou de óleos poli-insaturados em sua composição. Assim, proponha uma atividade em que os estudantes tenham de descrever o apelo desses comerciais (tanto de televisão como da internet e de revistas). Em seguida, sugira a eles que façam uma pesquisa para verificar as informações veiculadas nos comerciais e compará-las com as orientações confiáveis sobre como se previnem doenças do coração e se controlam os níveis de colesterol, entre outros aspectos.

O trabalho deve ser finalizado com a discussão das conclusões de cada pesquisa, a fim de mostrar como o conhecimento é importante para evitar o consumo inadequado de alimentos, bem como os equívocos ocasionados pelos apelos de *marketing*.

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

- Os estudantes podem criar um mapa conceitual para sistematizar as informações contidas no capítulo, dividindo-o em dois ramos: processos de obtenção de metais e reações que envolvem funções oxigenadas. Em seguida, você pode designar para cada estudante um dos ramos para que seja detalhado com exemplos práticos e outras informações citadas no Livro do Estudante, as quais não foram contempladas no mapa conceitual.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Ciência se discute – Desenvolvimento e utilização do biodiesel (página 385)

1. Resposta variável. Espera-se que os estudantes compreendam que a utilização de biodiesel em veículos é uma estratégia para diminuir a poluição do ar, pois em comparação com combustíveis derivados do petróleo, ele reduz a emissão de óxidos de enxofre, monóxido de carbono e material particulado. Assim, problemas como o efeito estufa e a chuva ácida são minimizados. Além disso, o biodiesel é um combustível renovável e, por isso, considerado sustentável.

Atividades (página 391)

4. Por conter o grupo funcional álcool, caso este esteja ligado a um átomo de carbono primário ou secundário, pode ser oxidado pelo oxigênio presente no ar, produzindo novos compostos, os quais terão cheiro diferente do composto inicial.

5. **a)** $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

b)
```
CH3 — CH — CH2 — CH = C — CH2 — CH2 — OH
        |              |
       CH3            CH3
```

c)
```
CH3 — CH — CH2 — CH2 — CH — CH2 — CH2 — OH
        |                |
       CH3              CH3
```

d)
```
      ___
     /   \
    |     |—OH
     \___/
```

7. O citrato trissódico, o citrato tripotássico e citrato de cálcio são sais que podem ser obtidos pela reação do ácido cítrico com uma base:

Ácido cítrico + 3 NaOH → citrato trissódico + 3 H_2O
Ácido cítrico + 3 KOH → citrato tripotássico + 3 H_2O
2 Ácido cítrico + 3 $Ca(OH)_2$ → citrato de cálcio + 6 H_2O

O citrato de trietila é um éster, obtido pela reação do ácido cítrico com o etanol:

Ácido cítrico + 3 C_2H_5OH → citrato de trietila + 3 H_2O

8. **a)**
```
                O
                ||
H3C — O — C — (CH2)7 CH = CH(CH2)5 CH3

                O
                ||
H3C — O — C — (CH2)7 CH = CH(CH2)7 CH3

                O
                ||
H3C — O — C — (CH2)16 — CH3
```

b) O outro produto obtido na reação é a glicerina.

```
    H    H    H
    |    |    |
H — C — C — C — H   glicerina
    |    |    |
   OH   OH   OH
```

9. Decomposição térmica do carbonato de cálcio:

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

Hidratação do óxido de cálcio:

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

CAPÍTULO 2 POLÍMEROS SINTÉTICOS (PÁGINA 393)

Plásticos (página 393)

- A abertura do capítulo apresenta um breve histórico do desenvolvimento dos plásticos, algumas de suas características físicas e químicas, além de abordar a popularização do uso desse material.
- Peça aos estudantes que respondam às questões do tópico "Para começar", para verificar os conhecimentos prévios que eles já têm sobre o tema, bem como suas ideias sobre o uso e o descarte de plásticos.

Monômeros e polímeros (página 394)

- O entendimento sobre polímeros requer que se conheça de onde são obtidas essas estruturas tão grandes. Portanto, considere a possibilidade de abordar a natureza dos monômeros, suas características e a formação da macromolécula pela repetição dessas unidades básicas.
- O texto do boxe *Ação e cidadania* (p. 394) discute a importância de se conhecer a composição dos materiais, bem como as possíveis reações químicas que podem ocorrer.

Tipos de polímeros (página 395)

- Considere a possibilidade de trazer para a sala de aula exemplos de polímeros de uso cotidiano, obtidos por meio de reações diferentes. Se considerar oportuno, registre na lousa o tipo de reação de obtenção de cada um e as características de seus monômeros.
- Se considerar adequado, recomende a leitura do boxe *Ampliação* (p. 396), que mostra a trajetória do pesquisador Charles Goodyear. É importante dar destaque à modificação da estrutura polimérica para variar suas propriedades e à classificação dos polímeros em face dos diferentes tipos de monômeros que podem formá-los.

Práticas de Ciências – Cadeias poliméricas (página 398)

- O objetivo desta seção é incentivar os estudantes a montar diferentes cadeias poliméricas utilizando lacres de latas de alumínio e clipes de papel, e a relacionar as propriedades de diferentes polímeros com o tipo de cadeia. Eles podem ter dificuldades para estabelecer a relação correta entre o tipo de cadeia e as propriedades do polímero. Por exemplo, quanto maior a ramificação da cadeia, menor será a elasticidade. A atividade 4 ("Como fazer") dessa seção promove a habilidade **EM13CNT301**, no aspecto da representação e da interpretação de modelos de uma perspectiva científica. Desenvolve, também, as competências gerais **CGEB1** (valorizar o conhecimento sobre o mundo físico) e **CGEB2** (utilizar as ciências com criticidade e criatividade).

Ciência tem história – Polímeros mais resistentes, baratos e versáteis (página 399)

- O texto aborda como aconteceram as pesquisas para a síntese e o desenvolvimento de polímeros sintéticos mais baratos e duráveis. Aproveite para retomar os conceitos de catalisador e estrutura molecular e como esses aspectos foram importantes para o sucesso da pesquisa.

Reciclagem de materiais plásticos (página 400)

- O tópico mostra as vantagens que o uso dos plásticos trouxe para a sociedade, mas também discute os problemas causados pelo seu descarte em grande quantidade e a dificuldade de reciclar a maior parte desse material.
- O objeto digital *Microplásticos* oferece informações sobre a contaminação causada pelos microplásticos na costa brasileira.
- Proponha um debate para que os estudantes avaliem o uso de materiais plásticos no seu dia a dia e pensem em estratégias para a redução do consumo e a reutilização desse tipo de material. Desse modo, trabalha-se as competências gerais **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias que promovam

a consciência socioambiental e o consumo responsável), e **CGEB10** (agir pessoal e coletivamente com princípios éticos e sustentáveis), e as competências específicas **CECNTEM1** (analisar processos tecnológicos para propor ações individuais e coletivas que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global), e **CECNTEM3** (analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais), bem como as habilidades **EM13CNT101**, **EM13CNT307** e **EM13CNT309**, além do tema contemporâneo transversal **Educação ambiental**, da área **Meio ambiente**.

SUGESTÃO DE AULA

- A contaminação por microplásticos é um tema que ganhou destaque nos últimos anos em razão da gravidade do problema. Esse tema pode ser trabalhado em parceria com o(a) professor(a) de Biologia. Peça aos estudantes que leiam o texto indicado no boxe *Para explorar* (p. 400). Em seguida, solicite a eles que façam um resumo do texto. Os textos também podem ser trocados entre os estudantes, de maneira que eles compartilhem informações e avaliem as produções dos colegas.
- No resumo, estarão informações sobre as fontes da contaminação por microplásticos e os efeitos dessa contaminação. Divida a turma em grupos e peça aos estudantes que proponham ações individuais e coletivas para combater esse problema.

FONTE COMPLEMENTAR

- Seara da Ciência, Universidade Federal do Ceará. *Cola de caseína*. Fortaleza, [20--]. Disponível em: https://seara.ufc.br/pt/sugestoes-para-feira-de-ciencias/sugestoes-de-quimica/cola-de-caseina/. Acesso em: 30 set. 2024.

A caseína é uma proteína encontrada no leite. Este experimento descreve como é feita a obtenção de polímeros dos recursos renováveis e com características biodegradáveis, usando materiais de baixo custo.

TEXTO COMPLEMENTAR

Polímeros biodegradáveis: a cura do planeta

[...]

Para falar sobre as aplicações dos polímeros biodegradáveis foram convidados o engenheiro químico Classius Ferreira da Silva, que atua na área de biopolímeros para aplicações biomédicas [curativos e arcabouços, no Laboratório de Biotecnologia Natural (BioNat), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – Campus Diadema)] e a engenheira química Cristiana Maria Pedroso Yoshida, também do BioNat, onde trabalha, principalmente, na área de biopolímeros para aplicações em alimentos (embalagens ativas e inteligentes).

Em sua pesquisa sobre curativos biodegradáveis para feridas crônicas, o professor Classius argumentou que o objetivo principal é curar o mais rapidamente o paciente de feridas crônicas, mas sem poluir. "Não são curativos domésticos. São para feridas crônicas (diabetes), pessoas acamadas e grandes queimaduras. São curativos de alto desempenho que são manipulados por profissionais da saúde", completou.

De acordo com o pesquisador, esses curativos promovem mais comodidade e proteção ao paciente, possuem uma função metabólica (cicatrizadora) e protetora (evitar a entrada de bactérias) e, ainda, evitam a perda de líquidos. Suas estruturas podem ser de espuma, hidrogel, hidrocoloides, fibras têxteis e películas.

Para o cientista, os curativos inteligentes fornecem informação sobre a ferida, com a indicação de mudança de cor do curativo. Os ativos possuem moléculas farmacológicas. Ele também lembrou que alguns curativos comerciais, hoje disponíveis, têm como princípios ativos elementos como a prata, o mel e o carvão (mineral).

Esses novos modelos de curativos trazem benefícios não apenas para o tratamento de pacientes, mas também representam uma transformação na indústria e em como esses materiais são decompostos na natureza, enquanto os polímeros sintéticos possuem vantagens como boas propriedades mecânicas, processamento e custo benefício. Em contraponto, eles também significam dois grandes problemas, que são a baixa taxa de biodegradação (lixo hospitalar) e as trocas traumáticas, provocando dor no paciente.

[...]

"Uma das propriedades dos polímeros naturais é que eles são bioabsorvíveis. Eles são colocados na ferida e degradados no local. Ele some na ferida. A desvantagem é a baixa propriedade mecânica, por isso, geralmente, são utilizados de forma conjugada com os curativos sintéticos."

No laboratório da UNIFESP (BioNat) se trabalha com bioativos à base de óleos de buriti, andiroba babaçu e rosa mosqueta, além de compostos de espinheira santa, babosa, chá verde, entre outros. "Já existe no mercado curativos e gases à base de vários compostos", complementou.

Segundo o pesquisador, o tempo de fechamento de feridas com curativos à base dos compostos naturais variam, em média, em 14 dias.

[...]

Conselho Federal de Química. *Polímeros biodegradáveis*: a cura do planeta. Brasília, DF: 18 ago. 2021. Disponível em: https://cfq.org.br/noticia/polimeros-biodegradaveis-a-cura-do-planeta/. Acesso em: 30 set. 2024.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO

- A seção *Atividades* (p. 401) pode ser utilizada como avaliação formativa, a fim de identificar os pontos frágeis na aprendizagem dos conceitos abordados. As atividades propostas na seção *Práticas de Ciências* (p. 398) também podem ser usadas para avaliar a compreensão dos estudantes sobre as cadeias poliméricas.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Roteiro (página 395)

2. a) Equação da reação de polimerização na obtenção do polímero PP (polipropileno):

$$n\,H_2C{=}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} \longrightarrow \left(-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}- \right)_n$$

Atividades (página 401)

3. O polímero é formado por uma reação de polimerização de adição:



acrilonitrila

poliacrilonitrila

4.



5.



cianoacrilato de metila



policianoacrilato de metila

6.



7.



metacrilato de metila

CAPÍTULO 3 GESTÃO DE RESÍDUOS: PRÁTICAS E DESAFIOS (PÁGINA 402)

Descarte adequado de resíduos perigosos: uma questão de saúde pública e ambiental (página 402)

- A abertura do capítulo discute a situação na comunidade de Agbogbloshie, em que a situação de extrema pobreza leva os moradores a buscar sua subsistência na coleta de materiais no lixo eletrônico enviado por outros países.
- Peça aos estudantes que respondam às questões do tópico "Para começar", e em seguida, ao discutir as respostas dadas por eles, encaminhe a conversa para que eles percebam que suas ações podem ter consequências globais.

O que acontece com o lixo descartado? (página 403)

- Se considerar pertinente, peça aos estudantes que façam uma pesquisa sobre a destinação do lixo recolhido no bairro onde moram ou no bairro onde a escola está localizada, e os eventuais problemas provocados pela destinação inadequada de lixo.
- O texto do boxe *Ação e cidadania* (p. 404) promove uma discussão sobre a importância da coleta seletiva e de propiciar condições dignas para os trabalhadores desse setor. Trabalha-se, dessa forma, o tema contemporâneo transversal **Trabalho**, da área **Economia**.

Química e Geografia – Como o descarte de equipamentos eletrônicos está transformando alguns países nos lixões do mundo (página 405)

- O texto desta seção retoma o assunto abordado na abertura do capítulo, do envio de lixo eletrônico dos países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Discute-se a importância da logística reversa para que os fabricantes assumam a responsabilidade de reciclar ou dar o destino adequado a partes não recicláveis dos seus produtos. Também é abordada a questão ambiental relacionada aos diversos tipos de contaminação que o descarte inadequado de lixo eletrônico pode causar. Dessa forma, a seção mobiliza o tema contemporâneo transversal **Educação ambiental**, da área **Meio Ambiente**.
- O objeto digital *Celulares: de onde vêm, para onde vão* mostra a cadeia envolvida na produção, no uso e no descarte dos celulares. O tema pode ser interessante para os estudantes, pois os celulares e o uso constante deles fazem parte das culturas juvenis.

Os perigos do mercúrio: de Minamata ao Tapajós (página 407)

- Ao tratar da contaminação por mercúrio, ajude os estudantes a entender como se dá o ciclo desse metal na natureza, com o auxílio da figura da página 407.
- Também é indicado fazer a leitura do boxe *De olho no conceito* (p. 407), para que os estudantes compreendam os conceitos de bioacumulação e biomagnificação.

Práticas de Ciências – Impactos do descarte ilegal (página 409)

- Esta seção propõe uma atividade de pesquisa e elaboração de um plano de ação para que o poder público se comprometa a descontaminar uma área que pertencia a uma fábrica de baterias de chumbo-ácido. Se considerar necessário, auxilie os estudantes a elaborar o plano de ação de modo que contenha uma argumentação fundamentada e persuasiva. Esta seção trabalha a competência geral **CGEB7** (argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local), as habilidades **EM13CNT104** e **EM13CNT105**, além dos temas contemporâneos transversais **Educação ambiental**, da área **Meio ambiente** e **Saúde**.

FONTE COMPLEMENTAR

- Oliveira R. S. *et al*. O lixo eletroeletrônico: uma abordagem para o Ensino Fundamental e Médio. *Química Nova na Escola*, v. 32, n. 4, p. 240–248, 5 maio 2010. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.

  O artigo contém informações sobre a gestão do lixo eletrônico, com base no desmonte de equipamentos usados. A leitura do artigo contribui também para sua própria aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos de e sobre Química, bem como sobre as múltiplas formas de desenvolver as suas atividades de ensino.

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

- A seção *Atividades* pode ser utilizada como avaliação formativa. As atividades dos boxes *Ação e cidadania* (p. 404) e *Química e Literatura* (p. 408) podem ser usadas para uma avaliação que relaciona a Química com aspectos do mundo do trabalho.

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Para começar (página 402)

3. Espera-se que estudantes informem que o descarte frequente de dispositivos eletrônicos contribui para o aumento do e-lixo. Devem explicar que a obsolescência programada é uma estratégia de *design* e tecnologia que encoraja a troca frequente de produtos, agravando o problema. Além do *design* mais atraente, certos aplicativos deixam de ser atualizados e, consequentemente, deixam de funcionar em prazos pré-estabelecidos pelos fabricantes. Para mitigar esses efeitos, os estudantes podem sugerir a promoção de políticas que aumentem a durabilidade dos produtos, facilitem a reciclagem e a reutilização e informem os consumidores sobre a importância do descarte adequado de dispositivos eletrônicos.

Ação e cidadania – Sobrevivência e condições dignas de trabalho (página 404)

1. As cooperativas geram empregos para os catadores com condições seguras e adequadas de trabalho. Além disso, promovem a destinação adequada do material reciclável.

Química e Geografia – Como o descarte de equipamentos eletrônicos está transformando alguns países nos lixões do mundo (páginas 405 e 406)

2. Resposta pessoal. A logística reversa de pilhas e baterias já funciona em algumas cidades do Brasil e pode ser usada como exemplo.

3. As 340 medalhas têm, no total, $340 \cdot 6{,}7 = 2278$ g.

1 mol —— 197 g

0,012 mol —— x

$x = 2{,}36$ g de Au para 100 *smartphones* → 0,0236 g de Au por *smartphone*

$$\frac{2\,278}{0{,}0236} = 96\,526 \text{ smartphones}$$

Química e Literatura – O Chapeleiro Maluco (página 408)

1. O poder público deve estabelecer normas de segurança para os ambientes de trabalho e fiscalizar o cumprimento dessas normas. A sociedade pode auxiliar nessa fiscalização denunciando ambientes perigosos para os trabalhadores.

Atividades (página 411)

2. a) É um líquido escuro e malcheiroso gerado da decomposição de resíduos orgânicos em aterros e lixões. Ele é formado pela degradação biológica dos materiais orgânicos, em presença de água, proveniente da chuva, que se infiltra na matéria orgânica em decomposição. O chorume pode conter alta concentração de substâncias tóxicas, incluindo metais pesados, compostos orgânicos, nutrientes e patógenos, em virtude do tipo de material descartado.

b) Ao converter um lixão em aterro controlado, os resíduos são cobertos com camadas de terra, o que reduz a incidência de pragas e insetos. O chorume do lixo já depositado continua poluindo o solo e os lençóis freáticos, pois não há planejamento da impermeabilização do solo.

3. A obsolescência programada é uma estratégia na qual empresas fabricam produtos com vida útil reduzida para estimular a compra de novos itens com maior frequência. Essa prática contribui negativamente para a sustentabilidade, ao aumentar o consumo de recursos naturais e a produção de resíduos.

FECHAMENTO DA UNIDADE (PÁGINAS 412 A 415)

Pensando Ciências – Como corrigir o solo ácido na agricultura? (páginas 412 e 413)

- Esta seção permite o desenvolvimento das competências específicas **CECNTEM1** e **CECNTEM3**, utilizando como ferramenta o pensamento computacional. Além disso, ao propor o exercício da curiosidade intelectual, com abordagem própria das ciências, proporciona o trabalho com a competência geral **CGEB2**.
- No *site* da Embrapa Hortaliças, disponível em https://www.embrapa.br/hortalicas/batata/correcao-do-solo (acesso em: 28 set. 2020), há informações sobre a correção de solo ácido para o cultivo da batata, que podem ser úteis para o desenvolvimento da atividade, ao mesmo tempo que promove o trabalho com o tema contemporâneo transversal **Ciência e tecnologia**.
- Aproveite a etapa "Reconhecendo padrões" para relacionar os conteúdos abordados na unidade. Se preciso, retome o conteúdo, levantando as dúvidas a fim de solucioná-las.
- Na etapa "Abstraindo o problema", é de suma importância que os estudantes atentem aos demais pontos do problema complexo, mobilizando, assim, a habilidade **EM13CNT301**. Oriente-os a buscar, nas fontes de informações da área, estudos que abordem o cálculo para a aplicação de bases na calagem, por exemplo. Essas informações também costumam estar disponíveis em *sites* de fabricantes e no rótulo de seus produtos. Sempre que julgar necessário, oriente-os também para a seleção dos pontos relevantes. Essa etapa do trabalho permite aos estudantes o desenvolvimento da competência geral **CGEB7**.
- Ao desenvolver a etapa "Abstraindo o problema", oriente os estudantes a repetir o mesmo exercício de abstração com os demais problemas levantados nesta atividade e a buscar fontes confiáveis na internet para obter as informações necessárias. Essa abordagem trabalha as competências gerais **CGEB2**, **CGEB5** e **CGEB7,** além da habilidade **EM13CNT303**.

- Para cada substância listada, entre as comumente usadas na adulteração do leite (soda cáustica, ureia, formaldeído, peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio, por exemplo), os grupos devem listar em seu algoritmo as etapas envolvidas para a detecção dessas substâncias

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS

Questões globais (páginas 414 e 415)

2. **a)** Reação de formação do acetato de metila:

A partir dos coeficientes estequiométricos da equação da reação, tem-se:



ácido acético — acetato de metila

1 mol de ácido acético (60 g/mol) —— 1 mol de acetato de metila (74 g/mol)

60 g de ácido acético —— 74 g de acetato de metila

x g de ácido acético —— 19,6 g de acetato de metila

$x = 60 \cdot \frac{19,6}{74}$

$x \cong 15,9$ g de ácido acético

b) De acordo com a equação química da esterificação para obtenção de acetato de metila, o álcool utilizado é o $CH_3 - OH$, cujo nome é metanol.

c) A partir dos coeficientes estequiométricos da equação da reação, tem-se:

1 mol de ácido acético (60 g/mol) — 1 mol de metanol

60 g de ácido acético — 1 mol de metanol

15,9 g de ácido acético — x mol de metanol

$x = \frac{15,9}{60}$

$x \cong 0,27$ mol de metanol

6. **b)**



ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO

1. (**Fuvest-SP**) O sabor artificial de laranja é conseguido usando acetato de octila.

a) Equacione a reação de esterificação que permite obter esse composto.

b) Dê o nome dos reagentes empregados.

a) $CH_3 - COOH + HO - (CH_2)_7 - CH_3 \longrightarrow$
$\longrightarrow CH_3 - COO - (CH_2)_7 - CH_3 + H_2O$

b) Ácido etanoico e octan-1-ol.

2. (**Fatec-SP**) A polimerização por adição consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual, em sua estrutura, ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, formando-se apenas o polímero. (O polietileno é um exemplo de polímero formado por reação de adição). Considere as seguintes substâncias:

I. 3-bromopropeno-1 (C_3H_5Br)

II. tetrafluoretano ($C_2H_2F_4$)

III. propanol-1 (C_3H_7OH)

IV. cloroeteno ($C_2H_3C\ell$)

As que poderiam sofrer polimerização por adição são:

a) I e II.

b) I e III.

c) I e IV.

d) II e III.

e) II e IV.

Alternativa **c**.

Os compostos I (3-bromoprop-1-eno) e IV (cloroeteno) apresentam ligações duplas em suas cadeias carbônicas. Para que um monômero sofra polimerização por adição, deve ser insaturado.

3. (**Enem**) O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume (líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde, ano 1, n. 4, dez. 2000. Adaptado.

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas abordadas no texto?

a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.

b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e, sobre ele, colocada cal virgem.

c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume, canalizado para ser tratado e neutralizado.

d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume.

e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos.

Alternativa **c**.

O lixão é um depósito sem cobertura, onde são despejados os resíduos sólidos sem nenhum tratamento. A penetração do chorume provoca poluição do solo e dos lençóis freáticos. No aterro sanitário, os resíduos são depositados no solo impermeabilizado, com um sistema de drenagem de chorume, que é levado para uma estação de tratamento. Os aterros sanitários são cobertos com terra e têm o solo compactado, dificultando o acesso de animais.

2 SÉRIE DE VÍDEOS: IDENTIFICANDO *FAKE NEWS* SOBRE TEMAS CIENTÍFICOS

INTRODUÇÃO

Viver na chamada era da informação significa aprender a lidar com um enorme volume de dados. Com a disseminação e a popularização das redes sociais, desenvolveu-se um grande potencial de circulação de informações duvidosas e falsas, conhecidas como *fake news*. Por essa razão, é de suma importância fornecer aos estudantes os elementos necessários para que eles sejam capazes de reconhecer as *fake news*, bem como entender os perigos e a responsabilidade implicados em sua propagação.

Portanto, discutir a problemática das *fake news* relacionadas a temas científicos é fundamental, sobretudo em tempos de desinformação e de negacionismo. Atualmente, há diversas manifestações contrárias à vacinação ou que instigam a população a questionar as mudanças climáticas globais (se elas de fato estão ocorrendo, se são um fenômeno natural ou causado por atividade humana). Esses movimentos, além de enganar a opinião pública, são também perigosos, pois podem pôr em risco a saúde da população e o bem-estar social.

Tendo em vista esse cenário, este projeto tem a intenção de auxiliar os estudantes a desenvolver tanto a capacidade de identificar elementos que caracterizam as *fake news* relacionadas às ciências quanto apresentar argumentos e evidências fundamentados no conhecimento científico para refutá-las. Dessa forma, diferentes expressões da cultura digital, das culturas juvenis e das diferentes mídias podem ser trabalhadas.

Este projeto foi pensado para ser executado ao longo de um semestre, utilizando-se um total de oito aulas específicas.

Contudo, avalie se um semestre e a quantidade de aulas específicas para a execução do projeto são os mais adequados para sua turma e, se for o caso, faça as adaptações que julgar necessárias.

MAPA DO PROJETO

ETAPA	OBJETIVOS	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES	TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Preparação	• Pesquisar e selecionar *fake news* relacionadas a temas científicos. • Identificar e estabelecer critérios que caracterizam as *fake news*.	CGEB2 CECNTEM1 CECNTEM3	EM13CNT105 EM13CNT303 EM13CNT306	
Desenvolvimento	• Roteirizar, produzir e divulgar uma pequena série de vídeos apresentando *fake news*, discutindo seus impactos negativos na sociedade e refutando-as com base no conhecimento científico.	CGEB5 CGEB7 CECNTEM3	EM13CNT302 EM13CNT306	
Conclusão	• Apresentar os vídeos para as comunidades escolar e externa. • Avaliação final.	CGEB5 CGEB7 CECNTEM3	EM13CNT302	

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

PREPARAÇÃO (PÁGINAS 417 E 418)

- Este projeto contribui para o desenvolvimento da **CGEB2**, uma vez que os estudantes vão exercitar a curiosidade intelectual, ao investigar um conjunto de notícias com o objetivo de analisá-las criticamente e de identificar algumas das características que permeiam as notícias falsas. Assim, de acordo com a competência geral da Educação Básica **CGEB5**, os estudantes farão uso de tecnologias digitais para se comunicar, acessar e disseminar informações, além de produzir e difundir conhecimentos relacionados às *fake news*, exercendo protagonismo na vida pessoal e coletiva. Será possível trabalhar também a competência geral **CGEB7**, uma vez que, ao selecionarem fontes confiáveis para promover o conhecimento científico, os estudantes serão estimulados a desenvolver o respeito e a consciência vinculados a um posicionamento ético relacionado ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
- Ao apresentar o projeto aos estudantes, se julgar oportuno, utilize a questão das mudanças climáticas (a negação de que elas estejam ocorrendo ou de que não estejam ligadas a atividades humanas) como exemplo de *fake news* relacionada a ciências. Desse modo, você poderá não só avaliar o conhecimento prévio da turma, mas também verificar quanto os estudantes estão aptos a questionar a veracidade de informações a respeito do tema e, ainda, trabalhar com a habilidade **EM13CNT105**.

Analisando textos e identificando *fake news*

- A realização de busca e seleção de notícias sobre temas científicos promove o previsto na habilidade **EM13CNT303**, ao levar os estudantes a interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.

- Este trabalho também promove a competência específica **CECNTEM3**, pois, ao propor argumentos contra informações negacionistas, os estudantes são levados a investigar situações-problema e a avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza.
- Nessa primeira etapa de busca e identificação de *fake news*, é importante enfatizar para os estudantes os cuidados que devem ser tomados com relação a notícias sem referências ou a fontes de pesquisa, sobretudo aquelas veiculadas em redes sociais.
- Se julgar oportuno, pergunte aos estudantes se eles já receberam *fake news* em suas redes sociais e se conseguiram identificá-las. Antes de iniciar a preparação, você pode perguntar aos estudantes também quais critérios eles usam ou julgam válidos para distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa.
- Caso seja necessário, ajude os estudantes a encontrar notícias incorretas ou enganosas nas mídias. Pergunte a eles se já ouviram ou se já receberam informações com manchetes como "Vacinas causam autismo"; "Vacinas contra HPV não são seguras"; "Mudanças climáticas não são reais e muito menos causadas pela ação humana"; "Se a evolução é real, e o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos?"; "A Terra é plana, não esférica, pois não conseguimos ver a circunferência"; entre outras.
- Após a seleção das notícias, dos artigos e das reportagens, proponha aos grupos que iniciem uma análise dos materiais procurando identificar os elementos que podem estar conferindo credibilidade a eles.
- Não deixe de complementar as discussões destacando as consequências das *fake news* na sociedade. É importante que os estudantes reconheçam e avaliem o impacto que a disseminação de notícias falsas pode acarretar em níveis individual e coletivo, trabalhando, assim, a habilidade **EM13CNT306**.
- Se houver necessidade, oriente os estudantes a consultar os *sites* sugeridos no boxe *Para explorar* (p. 417).
- Os estudantes terão de pesquisar e reunir notícias consideradas *fake news*, do mesmo modo que deverão fazer um levantamento dos elementos que costumam caracterizar esse tipo de notícia. É importante que esses elementos sejam compreendidos e usados como critérios para analisar os materiais selecionados para, depois, serem compartilhados com os demais grupos.

Planejando os próximos passos

- O cronograma é muito importante para a produção e a divulgação dos vídeos. Estabeleça datas-limite para a execução geral das etapas e deixe os estudantes mais livres para definir os detalhes do cronograma, ou seja, o estabelecimento de datas para a realização de cada uma das tarefas. Se necessário, auxilie-os nessa elaboração e na organização dos grupos para o projeto.

DESENVOLVIMENTO (PÁGINAS 418 E 419)

- Esta etapa do projeto promove a competência geral **CECNTEM3** e as habilidades **EM13CNT302** e **EM13CNT306**, pois leva os estudantes a produzir conteúdos e promover ações de comunicação para combater notícias falsas.
- Sugira aos estudantes que pensem em tópicos para a elaboração do roteiro; por exemplo: uma **introdução** breve apresentando o problema; o **objetivo** do vídeo; o **argumento** que será explicado; os **resultados** esperados (as evidências científicas que contradizem os argumentos falsos); uma **conclusão** (explicação da importância de reconhecer *fake news*; seus prováveis impactos sobre a integridade física, individual, coletiva da sociedade, além da socioambiental; o papel do conhecimento científico para a compreensão e a interpretação de fenômenos das Ciências da Natureza).
- Outro aspecto relevante que deve ser considerado durante a produção do vídeo é o cuidado com a linguagem, que tem de ser apropriada tanto aos termos técnicos e conceituais das Ciências da Natureza quanto ao texto em si. Por isso, considere sugerir aos estudantes que busquem auxílio do(a) professor(a) de Linguagens. Além disso, pode ser importante procurar especialistas que validem o conteúdo técnico-científico do roteiro do vídeo.
- A padronização da série de vídeos é um detalhe fundamental. Por isso, ao longo da produção, considere sugerir aos estudantes que escolham um membro de cada grupo como responsável pela criação de um *design* único, incluindo elementos como o estilo das fontes, as cores, entre outros.

CONCLUSÃO (PÁGINA 419)

- A conclusão do projeto exercita tanto a competência específica **CECNTEM3** quanto a habilidade **EM13CNT302**, pois o resultado do trabalho dos estudantes contemplará a comunicação e a divulgação dos vídeos para um público variado, por meio de mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Além disso, o projeto permitirá a discussão de temas científicos de relevância sociocultural e ambiental.
- Durante o evento, incentive os estudantes a debater o conteúdo do projeto e a esclarecer dúvidas dos participantes a respeito dos vídeos.
- O pós-evento é um momento de análise sobre o que deu certo e o que pode ser melhorado no projeto. Procure criar um bom ambiente para a troca de opiniões, enfatizando não só a relevância do produto final para as comunidades escolar e externa, mas também a importância da participação dos estudantes no evento.

FONTES COMPLEMENTARES

- Martins, L. R. *Fake news* e os impactos na divulgação científica. Agência Universitária de Notícias (AUN), 27 set. 2018. Disponível em: https://paineira.usp.br/aun/index.php/2018/09/27/fake-news-e-os-impactos-na-divulgacao-cientifica/. Acesso em: 21 set. 2024.

  O artigo discorre sobre o impacto da disseminação de informações falsas na ciência e os desafios para combatê-la.
- Monari, A. C. P.; Bertolli Filho, C. Saúde sem *fake news*: estudo e caracterização das informações falsas divulgadas no canal de informação e checagem de *fake news* do Ministério da Saúde. *Revista Mídia e Cotidiano*, Niterói, Universidade Federal Fluminense, v. 13, n. 1, abr. 2019. Disponível em: https://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/article/view/27618/16539. Acesso em: 21 set. 2024.

  O artigo identifica e discute as principais características das *fake news* no âmbito da saúde pública e traça um perfil desse tipo de conteúdo disseminado na sociedade.

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO

O momento de reunião pós-evento da turma, a fim de elaborar uma conclusão, pode servir de instrumento de avaliação em grupo. Se julgar oportuno, peça aos estudantes que registrem as conclusões e solicite que as entreguem a você posteriormente.

Também é possível elaborar rubricas para que você e os estudantes possam avaliar o trabalho dos grupos. Se julgar adequado, utilize as questões propostas na etapa "Desenvolvimento" como critério de avaliação da rubrica. Avalie também a clareza da linguagem, as evidências apresentadas, o uso de fontes confiáveis, etc.

2 2 3 3 8 0

ISBN 978-85-418-3551-0

2 900002 233803